

Marcin Nasiłowski
Rozpraszanie Rayleigha

Założmy że elektron jest jednowymiarowym oscylatorem harmonicznym. Równanie Newtona dla niego ma zatem postać

$$m \ddot{x} = -m\omega_0^2 x - qE_0 \sin(\omega t)$$

Jego rozwiązaniem jest

$$x = A \sin(\omega t)$$

wstawiając to do równania różniczkowego otrzymujemy

$$-mA\omega^2 \sin(\omega t) = -mA\omega_0^2 \sin(\omega t) - qE_0 \sin(\omega t)$$

Dzieląc przez $m\sin(\omega t)$ dostajemy

$$A(\omega^2 - \omega_0^2) = qE_0$$

$$A = \frac{qE_0}{m(\omega^2 - \omega_0^2)}$$

zatem

$$x = \frac{qE_0}{m(\omega^2 - \omega_0^2)} \sin(\omega t)$$

moment dipolowy

$$p = qx = \frac{q^2 E_0}{m(\omega^2 - \omega_0^2)} \sin(\omega t) = p_0 \sin(\omega t)$$

czyli

$$p_0 = \frac{q^2 E_0}{m(\omega^2 - \omega_0^2)}$$

Policzmy teraz wektor Pointinga

$$S = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

$$S = \frac{1}{c \mu_0} E_0^2$$

$$S = \epsilon_0 c E_0^2$$

Jego średnia wartość

$$\langle S \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2$$

Moc promieniowania dipola jest opisana wzorem

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\omega^4 p_0^2}{32 \pi^2 \epsilon_0 c^3} \sin^2(\theta)$$

wstawiając wyznaczone wcześniej p_0

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\omega^4 \frac{q^4 E_0^2}{m^2 (\omega^2 - \omega_0^2)^2}}{32 \pi^2 \epsilon_0 c^3} \sin^2(\theta)$$

i trochę uładniając dostajemy

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\omega^4 q^4 E_0^2 \sin^2(\theta)}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 32 \pi^2 \epsilon_0 c^3}$$

Różniczkowy przekrój czynny wynosi

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{dP}{d\Omega} \frac{1}{\langle S \rangle}$$

wyrażając przez bardziej znane wartości

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\omega^4 q^4 E_0^2 \sin^2(\theta)}{m^2 (\omega^2 - \omega_0^2)^2 32 \pi^2 \varepsilon_0 c^3 \varepsilon_0 c E_0^2} \frac{2}{\varepsilon_0 c E_0^2}$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\omega^4 q^4 \sin^2(\theta)}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 16 \pi^2 \varepsilon_0^2 m^2 c^4}$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\omega^4 \sin^2(\theta)}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2} \frac{q^4}{16 \pi^2 \varepsilon_0^2 m^2 c^4}$$

„Zauważamy”, że drugi człon po prawej stronie jest dokładnie równy kwadratowi klasycznego promienia elektronu

$$\frac{q^4}{16 \pi^2 \varepsilon_0^2 m^2 c^4} = r^2 = \text{kwadrat klasycznego promienia elektronu}$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\omega^4 r^2 \sin^2(\theta)}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2}$$

$$d\sigma = \frac{\omega^4 r^2 \sin^2(\theta)}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2} d\Omega$$

$$\sigma = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{\omega^4 r^2 \sin^3(\theta)}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2} d\theta$$

$$\sigma = 2\pi \frac{\omega^4 r^2}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2} \int_0^\pi \sin^3(\theta) d\theta$$

rozważmy teraz tylko powyższą całkę

$$I = \int_0^\pi \sin^3(\theta) d\theta$$

$$I = \int_0^\pi \sin(\theta) (1 - \cos^2(\theta)) d\theta$$

$$I = \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta - \int_0^\pi \sin(\theta) \cos^2(\theta) d\theta$$

$$I = -(-1 - 1) - \frac{1}{3}(-1 - 1) = 2 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$$

wracając do przekroju czynnego

$$\sigma = \frac{16\pi}{3} \frac{\omega^4 r^2}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2}$$

Dla $\omega \gg \omega_0$

$$\sigma = \frac{16\pi}{3} r^2$$

Dla częstości fotonu znacznie większych od częstości drgań elektronu rozpraszanie jest stałe

Dla $\omega \ll \omega_0$

$$\sigma = \frac{16\pi}{3} \frac{\omega^4 r^2}{\omega_0^4} = C \omega^4 \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

Dla częstości fotonu znacznie mniejszych od częstości drgań elektronu rozpraszanie jest proporcjonalne do λ^{-4} . Co jest zgodne z tym co skądinąd wiemy na temat rozpraszania Rayleigha.