

- 第二讲：矩阵消元
 - 消元法
 - 消元矩阵
 - 逆

第二讲：矩阵消元

这个方法最早由高斯提出，我们以前解方程组的时候都会使用，现在来看如何使用矩阵实现消元法。

消元法

有三元方程组
$$\begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ 3x + 8y + z = 12 \\ 4y + z = 2 \end{cases}$$
，对应的矩阵形式 $Ax = b$ 为

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 12 \\ 2 \end{bmatrix}。$$

按照我们以前做消元法的思路：

- 第一步，我们希望在第二个方程中消去 x 项，来操作系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ ，

下划线的元素为第一步的主元（pivot）：
$$\begin{bmatrix} \underline{1} & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{row_2 - 3row_1} \begin{bmatrix} \underline{1} & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

这里我们先不管 b 向量，等做完 A 的消元可以再做 b 的消元。（这是 MATLAB 等工具经常使用的算法。）

- 第二步，我们希望在第三个方程中消去 y 项，现在第二行第一个非零元素成为了第

二个主元：
$$\begin{bmatrix} \underline{1} & 2 & 1 \\ 0 & \underline{2} & -2 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{row_3 - 2row_2} \begin{bmatrix} \underline{1} & 2 & 1 \\ 0 & \underline{2} & -2 \\ 0 & 0 & \underline{5} \end{bmatrix}$$

注意到第三行消元过后仅剩一个非零元素，所以它就成为第三个主元。做到这里就算消元完成了。

再来讨论一下消元失效的情形：首先，主元不能为零；其次，如果在消元时遇到主元位置为零，则需要交换行，使主元不为零；最后提一下，如果我们把第三个方程 z 前的系数改成 -4 ，会导致第二步消元时最后一行全部为零，则第三个主元就不存在了，至此消元不能继续进行了，这就是下一讲中涉及的不可逆情况。

- 接下来就该回代（back substitution）了，这时我们在 A 矩阵后面加上 b 向量写成增广矩阵（augmented matrix）的形式：[A | b] =

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 8 & 1 & 12 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 6 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 5 & -10 \end{array} \right]$$

不难看出， z 的解已经出现了，此时方程组变为

$$\begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ 2y - 2z = 6 \\ 5z = -10 \end{cases}, \text{从第三个方程}$$

求出 $z = -2$ ，代入第二个方程求出 $y = 1$ ，再代入第一个方程求出 $x = 2$ 。

消元矩阵

上一讲我们学习了矩阵乘以向量的方法，有三个列向量的矩阵乘以另一个向量，按列的

线性组合可以写作 $[v_1 \ v_2 \ v_3] \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = 3v_1 + 4v_2 + 5v_3$ 。

但现在我们希望用矩阵乘法表示行操作，则有 $[1 \ 2 \ 7] \begin{bmatrix} row_1 \\ row_2 \\ row_3 \end{bmatrix} = 1row_1 +$

$2row_2 + 7row_3$ 。易看出这里是一个行向量从左边乘以矩阵，这个行向量按行操作矩阵的行向量，并将其合成为一个矩阵行向量的线性组合。

介绍到这里，我们就可以将消元法所做的行操作写成向量乘以矩阵的形式了。

- 消元法第一步操作为将第二行改成 $row_2 - 3row_1$ ，其余两行不变，则有

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{另外，如果三行都不变，消元矩})$$

阵就是单位矩阵 $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， I 之于矩阵运算相当于1之于四则运算。）这个

消元矩阵我们记作 E_{21} ，即将第二行第一个元素变为零。

- 接下来就是求 E_{32} 消元矩阵了，即将第三行第二个元素变为零，则

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}。这就是消元所用的两个初等矩阵（elementary matrix）。$$

- 最后，我们将这两步综合起来，即 $E_{32}(E_{21}A) = U$ ，也就是说如果我们想从 A 矩阵直接得到 U 矩阵的话，只需要 $(E_{32}E_{21})A$ 即可。注意，矩阵乘法虽然不能随意变动相乘次序，但是可以变动括号位置，也就是满足结合律（associative law），而结合律在矩阵运算中非常重要，很多定理的证明都需要巧妙的使用结合律。

既然提到了消元用的初等矩阵，那我们再介绍一种用于置换两行的矩阵：置换矩阵

（permutation matrix）：例如 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix}$ ，置换矩阵将原矩阵的两行做了互换。顺便提一下，如果我们希望交换两列，则有 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b & a \\ d & c \end{bmatrix}$ 。

我们现在能够将 A 通过行变换写成 U ，那么如何从 U 再变回 A ，也就是求消元的逆运算。对某些“坏”矩阵，并没有逆，而本讲的例子都是“好”矩阵。

逆

现在，我们以 E_{21} 为例， $\begin{bmatrix} ? & ? & ? \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，什么矩阵可以取消这

次行变换？这次变换是从第二行中减去三倍的第三行，那么其逆变换就是给第二行加上

三倍的第三行，所以逆矩阵就是 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

我们把矩阵 E 的逆记作 E^{-1} ，所以有 $E^{-1}E = I$ 。