科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	1	有關carotid-cavernous fistula，那二者不正確？ A. shunt between meningeal branches of internal carotid artery and cavernous sinus is high flow B. dural shunt between meningeal branches of external carotid artery and cavernous sinus is low flow C. 常併發chemosis D. 可聽到ocular bruits E. ophthalmoplegia絕對不可能發生於兩側	AE	Handbook Neurosurgery 9th edition, p1321
神經外科	複	2	新生兒的periventricular-intraventricular hemorrhage(PIVH)之risk factors，那兩項可能性較低？ A. volume expansion B. diarrhea C. asphyxia D. seizure E. fever	BE	Handbook Neurosurgery 9th edition, p1424
神經外科	複	3	在加護病房，使用dopamine下列敘述那兩項不正確？ A. a vasoconstrictor B. 容易轉變成norepinephrine C. 可引起hypoglycemia D. 平常使用量為2-5 mg/kg/minute E. 可引起cerebral vasodilatation	CD	Handbook Neurosurgery 9th edition, p143

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	4	有關上頸椎的風濕性關節炎（R.A），那些選項描述不正確？ A. 常併發atlantoaxial subluxation B. subluxation以posterior subluxation較常見 C. pannus formation為acute inflammatory granulation tissue發生在odontoid附近 D. 正常成人的atlanto-dental index< 2mm E. 會造成atlas的transverse ligament變loosening	BCD	Handbook Neurosurgery 9th edition, p1196
神經外科	複	5	下列病變引起的Dementia，那兩項是最明顯可以治療的？ A. multi-infarct dementia B. Creutzfeldt-Jakob disease C. subdural hematoma D. hydrocephalus（normal pressure hydrocephalus） E. Parkinson's disease	CD	Handbook Neurosurgery 9th edition, p189
神經外科	複	6	下列疾病中，那三種較可能會造成communicating hydrocephalus？ A. Aqueductal stenosis B. Meningitis C. Subarachnoid hemorrhage D. Choroid plexus papilloma E. Atresia of the foramina of Luschka and Magendie	BCD	Neurosurgery, Wilkins, et al. 2nd ed., p3626

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	7	評估頭部外傷病患時所用之Glasgow Coma Scale，包含下列哪些項目？ A. Pupil size B. Eye opening C. Corneal reflex D. Verbal response E. Motor response	BDE	Miller 5th ed. 2000, p1378
神經外科	複	8	顱內動脈瘤（intracranial aneurysm）的好發部位有那三項？ A. Posterior communicating artery B. Anterior communicating artery C. Middle cerebral artery D. Middle meningeal artery E. Superficial temporal artery	ABC	Neurosurgery, Wilkins, et al. 2nd ed., p2302
神經外科	複	9	顱內壓升高（increased intracranial pressure）時，那些處置正確？ A. Hypoventilation B. Hyperventilation C. Head elevation D. Carotid artery massage E. Infusion of osmotic diuretics (Mannitol or Glycerol)	BCE	Neurosurgery, Wilkins, et al. 2nd ed., p350
神經外科	複	10	關於腦膜瘤（meningioma）之敘述哪兩項是正確的？ A. 腦膜瘤是由dura layer長出的腫瘤 B. 腦膜瘤是由arachnoid layer長出的腫瘤 C. 腦膜瘤是由pia layer長出的腫瘤 D. 腦膜瘤有少部分是惡性的 E. 腦膜瘤皆是良性的	BD	Neurosurgery, Wilkins, et al. 2nd ed., p843-845

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	11	Normal pressure hydrocephalus之典型臨床表現包括下列哪三種項目？ A. Tremor B. Dementia C. Urine incontinence D. Paraparesis E. Ataxia	BCE	Handbook Neurosurgery 9th edition, p 417
神經外科	複	12	頭部外傷病人發生acute epidural hematoma造成uncal herniation時，臨床上較會有哪二項表現？ A. 同側瞳孔放大（ipsilateral pupil dilatation） B. 對側瞳孔放大（contralateral pupil dilatation） C. 同側肢體乏力（ipsilateral hemiplegia） D. 對側肢體乏力（contralateral hemiplegia） E. 雙下肢無力（paraplegia）	AD	Handbook Neurosurgery 9th edition, p 927
神經外科	複	13	水腦症（hydrocephalus）患者在下列哪兩種情形時，較不適合裝置ventriculoperitoneal shunt？ A. Normal pressure hydrocephalus B. Hydrocephalus due to active TB meningitis C. Hydrocephalus due to active Cryptococcal meningitis D. Hydrocephalus due to active bacterial meningitis E. Intraventricular hemorrhage with acute hydrocephalus	DE	Neurosurgery, Wilkins, et al. 2nd ed., p3625-3643

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	14	有關霧霧症（Moyamoya disease）之敘述，下列哪兩項不正確？ A. 診斷工具以血管攝影為主 B. 疾病早期變化是stenosis in the supraclinoid portion of internal carotid artery C. 疾病變化通常是單側 D. 疾病晚期變化是內頸動脈完全阻塞，Moyamoya vessels消失，腦部血液供應以外頸動脈及脊椎動脈為主 E. 疾病變化之顯現，CT優於MRI	CE	Neurosurgery, Wilkins, 1996, 2nd ed., p2125
神經外科	複	15	有關大範圍之腦梗塞之敘述，下列哪兩項不正確？ A. 腦水腫最厲害時間是梗塞後第三至第五天 B. Craniectomy應該做hemicraniectomy C. 只作Subtemporal craniectomy也有效 D. 小腦梗塞以Posterior inferior cerebellar artery梗塞最常見 E. 在作Suboccipital craniectomy時，小腦梗塞組織不必切除	CE	Neurosurgery, Wilkins, 1996, 2nd ed., p2151-2154
神經外科	複	16	有關Spinal dysraphysm之敘述，下列哪兩項不正確？ A. Spina bifida occulta只有椎板缺陷，並無神經組織的問題 B. Spina bifida occulta通常發生在胸椎或腰椎 C. Spina bifida occulta可由產前篩選出來 D. Meningocele內只有腦脊髓液無神經組織 E. Meningocele和Spinal canal不相通	CE	Neurosurgery, Wilkins, 1996, 2nd ed., p3453

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	17	下列四種情況不考慮為Massive brain infarction病人作Craniectomy？ A. 病人年紀很大 B. 病人有很厲害的缺血性心臟病 C. 病人已有很厲害的Alzheimer's disease D. 病人神經學上的障礙程度，無法令家屬接受 E. 栓塞部位在非優勢大腦半球上	ABCD	Neurosurgery, Wilkins, 1996, 2nd ed., p2153
神經外科	複	18	有關懷孕期間已出血之動脈瘤及動靜脈畸形(AVM)之敘述，下列哪兩項不正確？ A. 懷孕期間已出血之動脈瘤處理原則與未懷孕者相同 B. 懷孕期間已出血之動脈瘤以保守治療為主 C. 懷孕期間已出血之動靜脈畸形(AVM)以保守治療為主 D. 懷孕期間已出血之動脈瘤要盡早夾除 E. 動脈瘤夾除之後懷孕應立即中止	BE	Neurosurgery, Wilkins, 1996, 2nd ed., p2425
神經外科	複	19	有關Jefferson's fracture之敘述，下列那兩項不正確？ A. Jefferson's fracture 發生在頸椎第二節 B. Jefferson's fracture骨折發生機制通常是頭頂受力 C. Jefferson's fracture通常伴隨脊髓受傷 D. 電腦斷層掃瞄是Jefferson's fracture最佳檢查工具 E. Jefferson's fracture病人只是戴上occipito-mandibular brace或halo-vest即可，一般不必手術	AC	Sabiston Textbook of Surgery, 15th ed., p1402

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	20	下列那四項頸椎骨折通常一般不必開刀固定？ A. Jefferson's fracture B. Odontoid frature, type I C. Odontoid fracture, type II D. Odontoid fracture, type III E. Hangman's fracture	ABDE	Sabiston Textbook of Surgery, 15th ed., p1402
神經外科	複	21	下列那四項頸椎骨折是發生在第二頸椎？ A. Jefferson's fracture B. Odontoid frature, type I C. Odontoid fracture, type II D. Odontoid fracture, type III E. Hangman's fracture	BCDE	Sabiston Textbook of Surgery, 15th ed., p1402
神經外科	複	22	有關頭部外傷之敘述，下列那兩項不正確？ A. Acute subdural hematoma之預後和腦實質受損程度有關 B. 通常放大的瞳孔和Acute subdural hematoma是同側 C. 通常肢體無力和Acute subdural hematoma是同側 D. 即使血比容低，Acute subdural hematoma在電腦斷層掃瞄下仍呈現高密度 E. 核磁共振掃瞄可看出腦實質受損程度	CD	Neurosurgery, Wilkins, 1996, 2nd ed., p2797-2806

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	23	有關頭部外傷之敘述，下列那兩項不正確？ A. Epidural hematoma在老人和嬰兒比較常見 B. Epidural hematoma較少伴隨腦實質受損 C. 若頭部外傷後一小時內的電腦斷層掃瞄無Epidural hematoma，即可排除發生Epidural hematoma的可能性 D. 後顱腔Epidural hematoma發生比例，比Acute subdural hematoma高 E. Temporal lobe hematoma比Frontal lobe hematoma危險	AC	Neurosurgery, Wilkins, 1996, 2nd ed., p2801-2805
神經外科	複	24	有關Subdural hygroma之敘述，下列哪兩項不正確？ A. 發生機制可能因CSF經蜘蛛膜上的裂隙堆積在Subdural space B. 和Chronic subdural hematoma一樣有內膜和外膜 C. 治療上可先用burr hole drainage D. 通常第一次術後不會再復發 E. 再發者可放shunt至腹腔引流	BD	Neurosurgery, Wilkins, 1996, 2nd ed., p2801
神經外科	複	25	關於Spinal epidural abscess下列何者為是？ A. Hematogenous spread是最常見來源 B. Staphylococcus aureus是最常見感染菌種 C. Streptococcus是最常見感染菌種 D. Tuberculosis是最常見慢性感染菌種 E. Pus通常位於Dura的前側	ABD	Wilkins Neurosurgery Vol.3, p3327-3329

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	26	下列病症與PICA (Posterior Inferior Cerebellar Artery) 阻塞有關？ A. 與病灶異側（contralateral）Horner's syndrome B. 對側半邊軀幹痛覺及溫度的感覺喪失 C. 同側肢體ataxia D. 同側肢體麻木感 E. 同側palate paralysis	BCDE	Adams RD, Principles of neurology, 5th edition, p689
神經外科	複	27	頭部電腦斷層顯示壹位於優勢大腦頂葉的腫瘤，患者可能出現下列何種病症？ A. Agraphia B. Left-right confusion C. Digit agnosia D. Aphasia E. Acalculia	ABCDE	Handbook Neurosurgery 9th edition, p106
神經外科	複	28	Meningiomas復發與否主要歸咎於 A. 患者的年齡 B. 腫瘤是否有顱骨的侵犯 C. 組織病理學分類上的不同 D. 術後是否有殘存的腫瘤 E. 患者的性別	BCD	Youman's Neurological surgery, 4th Edition, p2817-2818
神經外科	複	29	腦瘤之治療，下列何者正確？ A. Choroid plexus papilloma最好犯為側腦室 B. Choroid plexus papilloma造成水腦於手術切除瘤後，大都無法解除 C. 中樞神經淋巴瘤對放射治療效果不好，仍以手術為重 D. 顱內脂肪瘤最常見於額葉 E. 顱內脂肪瘤通常不需手術切除	BE	Neurosurgery, Wilkins, 2nd ed., p1741-1749

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	30	有關頭部外傷，下列何者不正確？ A. 前顱窩骨折會造成Raccoon sign B. 中顱窩骨折會造成Battle's sign C. 有腦脊液外流時，要立即手術修補 D. 有腦脊液外流時，不需使用抗生素 E. 腦灌注壓小於30 mmHg，即會造成腦缺氧	CE	Principles of Surgery, Schwartz, 6th ed., p664
神經外科	複	31	有關脊椎外傷，下列何者不正確？ A. C3以上脊髓損傷，病人可能發生呼吸衰竭 B. T7以上脊髓損傷，會造成神經性低血壓 C. Brown-Sequard syndrome乃同側痛覺消失，對側肌力喪失 D. Central cord syndome造成兩上肢無力，痛覺消失，下肢正常 E. Anterior spinal artery syndrome造成癱瘓，痛覺喪失，但觸感正常	BC	Principles of Surgery, Schwartz, 6th ed., p668-670
神經外科	複	32	有關於腦血管手術，下列何者為真？ A. 腦栓塞最常侵犯的血管為中大腦動脈 B. 正常顱內壓為15~20 mmHg C. Moyamoya disease好發年齡為10~15歲 D. Moyamoya disease是小孩最常發生腦部缺血之原因 E. Moyamoya disease疾病之嚴重程度與初次發病年齡有關，初發病年紀愈大，癒後愈差	AD	Principles of Surgery, Schwartz, 6th ed., p662,675

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	33	有關脊椎腫瘤，何者為誤？ A. 最常見之脊髓內腫瘤為astrocytoma及ependymoma B. 最常見之腦膜內、脊髓外腫瘤為神經瘤及腦膜瘤 C. 脊椎腦膜瘤好發於男性 D. 轉移性脊椎腫瘤以頸椎最常見 E. 轉移性脊椎腫瘤原發處多為肺部	CD	Neurosurgery, Wilkins, 2nd ed., p1769-1791
神經外科	複	34	下列何者會造成假性腦瘤？ A. 乳突炎 B. 矢狀竇腦膜瘤 C. 頸靜脈阻塞 D. 真性紅血球增多症 E. 顱內靜脈竇阻塞	ACDE	Neurological Surgery, Youmans, 4th ed., p2981
神經外科	複	35	關於OPLL下列何者為是？ A. C-spine佔70% B. 好發於C5-6 level C. segmental type多於continuous type D. Cord injury之主因，乃因vascular而非compression. E. Cord injury之主因，乃因compression而非vascular	ACD	Wilkins Neurosurgery Vol.3, p3781-3782
神經外科	複	36	關於brain abscess何者為是？ A. Abscess的來源，常來自於sinusitis and otitic origin B. Abscess通常位於腦的superficial area C. Metastatic abscesses常是multiple，且常分佈於MCA territory D. Abscess伴隨congenital heart disease常是solitary，且endocarditis是重要的致病因子 E. 限制Abscess擴散的重要原因，是本身形成capsule formation	ABCE	Wilkins Neurosurgery Vol.3, p3285-3287

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	37	2016年世界衛生組織WHO區分Glioma之惡性度以及預後之評估，是依靠： A. Nuclear atypia B. Genetic molecular factors C. Necrosis D. Mitotic figures E. Microvascular增生	ABCDE	Wilkins Neurosurgery, p735
神經外科	複	38	關於正常壓力水腦症（NPH）何者正確？ A. 臨床上病人呈痴呆及小便失禁 B. 腰椎穿刺壓力在180 mmH2O以下 C. CT上呈側腦室脹大 D. 分流術治療可達90% 成功 E. 可找到致病因的NPH對手術治療的反應較差	ABC	Wilkins Neurosurgery, p328-329
神經外科	複	39	聽神經瘤（acoustic neuroma）手術的適應症，以下何者為是： A. 追蹤期間腫瘤迅速擴大 B. 放射線手術後，水腫消退，而腫瘤仍再長大者 C. 老年人只有輕微症狀時 D. 和病人討論治療的選擇時，由病人做決定 E. 腫瘤<2cm，而ASA Grade ³Ⅲ時	ABD	Youmans, p2845
神經外科	複	40	下列何種tumor源自於glial cell？ A. Astrocytoma B. Ganglioneuroma C. Ependymoma D. Neurofibroma E. Oligodendroglioma	ACE	Handbook Neurosurgery 9th edition, p593

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	41	何種NPH情況下行V-P shunt手術會預期有較好的結果？ A. unstable gaits很明顯 B. expansion of normal flow in aqueduct C. idiopathic NPH D. 3rd ventricle變化 E. increased periventricular lucency	ABDE	Wilkins Neurosurgery, p331
神經外科	複	42	下列關於顱內動靜脈畸形的敘述何者正確？ A. 顱內動靜脈畸形的發生率約為動脈瘤的七分之一 B. 大多數顱內動靜脈畸形在40歲前會產生症狀 C. 顱內動靜脈畸形較好發於男性 D. 顱內出血及癲癇發作是顱內動靜脈畸形的前發症狀 E. 顱內動靜脈畸形愈大愈容易破裂	ABCD	Wilkins Neurosurgery, p2434-2435
神經外科	複	43	下列關於外傷性腦脊髓液鼻漏（CSF rhinorrhea）之敘述何者正確？ A. 大部份病患經保守療法後可癒合 B. 可由測定鼻分泌物的糖份作診斷 C. 常併發氣顱症pneumocranium D. 外傷性腦脊髓液鼻漏比自發性腦脊髓液鼻漏更容易引發腦膜炎 E. CSF引流有可能造成CSF流動梯度的改變而引發感染	ABCDE	Wilkins Neurosurgery, p2773-2781
神經外科	複	44	下列何者為腦內出血（Intracerebral hemorrhage）病人後續惡化（delayed deterioration）的常見原因？ A. 再出血（Rebleeding） B. 痙攣（Seizure） C. 水腦症（Hydrocephalus） D. 腦膿瘍（Brain abscess） E. 腦水腫（Brain edema）	ABCE	Handbook Neurosurgery 9th edition, p1402

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	45	一位四十歲男性病患，主訴近三個禮拜來右側肢體逐漸無力，同時出現口齒不清現象，經過影像學檢查後，發現為左側大腦之病灶，經手術切除，病理報告為多形性膠質母細胞瘤，則我們預期在病理切片上可以找到哪些變化？ A. Hypercellularity B. pleomorphism of cell C. vascular proliferation D. necrosis E. dura membrane invasion	ABCD	Handbook Neurosurgery 9th edition, p 631
神經外科	複	46	關於alcohol withdrawal syndrome的預防性治療，下列敘述何者為非？ A. Benzodiazepines為主要治療藥物，用來減少autonomic hyperactivity B. Atenolol 會mask symptoms of alcohol withdrawal，不能用來控制withdrawal 相關的血壓高和tachyarrhymias C. 不能使用肌肉鬆弛劑，如baclofen D. Thiamine可用來預防acute Wernicke encephalothy E. 如有seizure發生，可使用phenytoin	BC	Handbook Neurosurgery 9th edition, p219
神經外科	複	47	下列哪些顱內構造有經過cavernous sinus？ A. Optic nerve B. Internal carotid artery C. Trigerminal nerve, manidibular branch D. Trochlear nerve E. Oculomotor nerver	BDE	Handbook Neurosurgery 9th edition, p96

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	48	關於腦下垂體腫瘤，下列敘述何者為非？ A. 大部份是benign adenoma B. 多數是neurohypophyseal tumor C. Pituitary macroadenoma的定義是tumor diameter > 1公分 D. Secretory adenoma最常造成的hormone oversecretion是Cushing disease E. Mass effect可能造成bitemporal hemianopsia	BD	Handbook Neurosurgery 9th edition, p741
神經外科	複	49	45歲女性，主訴sudden onset headache，腦部電腦斷層檢查結果為diffuse subarachnoid hemorrahge(SAH)，下列描述何者為非？ A. SAH主要發生原因是ruptured intracranial aneurysm B. Trauma是most common cause of SAH C. 可考慮CTA或angiogram來排除腦部血管病兆 D. Hydrocephalus, vasospasm是可能的後續變化 E. Hunt and Hess classification是根據SAH的多寡及有無腦室內出血，預測病人的預後	AE	Handbook Neurosurgery 9th edition, p96
神經外科	複	50	下列關於Rathke's cleft cyst的描述何者正確？ A. 源自remnants of Rathke's pouch的nonneoplastic lesion B. 通常位於sellar或suprasellar region C. 常見症狀為頭痛和視野缺損，不會造成endocrine disturbance D. Rathke's cleft cys常見的鑑別診斷有pituitary adenoma, craniopharyngioma E. 有症狀的Rathke's cleft cyst建議內視鏡或經顱手術引流	ABDE	Handbook Neurosurgery 9th edition, p783

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	51	關於corticosteoirds replacement治療，下列敘述何者正確？ A. 長期使用steroid會suppress hypothalamic-pituitary-adrenal axis，造成adrenal atropy B. 正常生理狀況Zona fasciculata會每天分泌15-20mg cortisol C. During physiologic stress, adrenal gland分泌的cortisol會上升至250-300mg/day D. fatigue, anorexia為常見的steroid withdrawl症狀 E. Addison's disease為primary adrenocortical insufficiency，只需補充glucocorticoids，不需補充mineralocorticoids	ABCD	Handbook Neurosurgery 9th edition, p158
神經外科	複	52	下列對spinal schwannoma的描述何者錯誤？ A. slow growing benign tumor B. most arise from ventral(motor) rootlets C. recurrence is common after total excision D. 早期常見症狀為radicular apin E. 大部份與neurofibromatosis有關	BCE	Handbook Neurosurgery 9th edition, p817

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	53	59歲男性工作時從3米高處跌落，送至急診室時意識清楚，雙上肢麻痛合併allodynia，muscle power：0-1分，雙下肢muscle power：3分，頸椎電腦斷層顯示C4-6 spur formation, spinal canal stenosis，下列相關描述何者錯誤？ A. 電腦斷層無骨折或移位，可將頸圈移除 B. Methylprednisolone for treatment of acute spinal cord injury is highly recommended C. 臨床表現為典型anterior cord syndrome D. Loss of bulbocavernosus reflex為spinal shock的表現之一 E. Interruption of sympathetics只會發生在胸椎損傷的病人	ABCE	Handbook Neurosurgery 9th edition, p971-980
神經外科	複	54	下列關於trigeminal neuralgia描述，何者錯誤？ A. sharp, electric shock-like pain in the distribution of one or more branches of trigeminal nerves B. Carbamazepine(Tegretol)可用來治療trigeminal neuralgia C. 通常是anterior inferior cerebellar artery造成壓迫 D. 安排 brain MRI 排除顱內腫瘤, multiple sclerosis E. 75%病人只需藥物治療即可達到症狀緩解，不須開刀或侵入性治療	CE	Handbook Neurosurgery 9th edition, p1638

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	55	下列關於vestibular schwannoma敘述何者錯誤？ A. benign tumor located in the cerebellopontine angle B. 通常源自 cochlear portion of cranial nerve VIII C. 同側hearing loss, headache, fascial numbness為常見的clinical triad D. 可能與loss of tumor-suppressor gene on the long arm of chromosome 22有關 E. Radiation therapy或stereotactic surgery無法用來治療vestibular schwannoma	BCE	Handbook Neurosurgery 9th edition, p683
神經外科	複	56	下列關於Critical care of aneurysm patients 敘述何者錯誤？ A. 避免動脈再次破裂出血的治療選擇有 coiling or surgical clipping B. aneurysm size是rebleeding的唯一risk factor C. cerevral vasospasm只會發生在動脈破裂後的病人 D. vasospasm主要發生在SAH後的3-14 days E. angiography是診斷vasospasm的唯一方式	BCE	Handbook Neurosurgery 9th edition, p1241
神經外科	複	57	下列關於腦下垂體瘤的術後照顧何者錯誤？ A. 如果是經鼻內視鏡手術，在nasal packing移除前可使用預防性抗生素 B. 不能使用post-op steroids，會造成傷口感染率上升 C. diabetes insipidus的診斷criteria是Urine output > 250ml/hr, urine specific graviti > 1.005 D. 術後一旦發生diabetes insipidus，病人需終生服用desmopressin(DDAVP) E. SIADH是術後常見的問題	BCDE	Handbook Neurosurgery 9th edition, p776

版權：台灣外科醫學會

科別	題目類別	題號	題目	答案	出題參考
神經外科	複	58	下列何者不是評估ICH score的factor？ A. GCS B. Intraventricular hemorrhage C. Blood pressure D. ICH volume E. Gender	CE	Handbook Neurosurgery 9th edition, p1413
神經外科	複	59	下列關於antieplileptic drugs的敘述何者錯誤？ A. Valprooic acid(Depakine)不會導致畸胎，可用於治療懷孕的癲癇病人 B. Carbamepine(Tegretol)可用來治療partial seizures和trigeminal neuralgia C. 在使用Phenytoin(Dilantin)前，可作HLA-B1502檢驗，避免發生Steven-Johnson syndrome D. Levetiracetam(Keppra)與其他藥物的相互反應少，但有可能發生嗜睡或疲倦的副作用 E. Ethosuximde是治療absence seizure的首選用藥	AC	Handbook Neurosurgery 9th edition, p465
神經外科	複	60	下列External ventricular drain(EVD) related infection的相關敘述何者錯誤？ A. S.epidermidis和S. aureus是常見的organism B. low CSF glucose level是可能的異常發現 C. CSF protein的變化是ventricular catheter infection的可靠指標 D. Rountine CSF sampling可有效降低管路感染的機率 E. Tunneling和antibiotic coated catheter無法降低管路感染的機率	CD	Handbook Neurosurgery 9th edition, p359

版權：台灣外科醫學會