成人科值班常用藥物一覽

本篇僅記錄值班常用藥物，藥物種類繁多沒辦法每個都寫上去。每家醫院習慣也不同，請依照所在醫院調整。

PGY 職前加油站 - 黃品叡醫師 / 2022.08.12 更新

分類	藥品學名	商品名	常用頻率	途徑	補充
退燒	Acetaminophen	Panadol/Paramol/Titen	1tab Q6HPRN	PO	退燒，第一線退燒、第一線止痛藥
	Diclofenac	Voren	1 supp PRN	R	不能 NG/口服者使用
	Lysine	Stin/Asparin	1amp Q6HPRN	IVF	第二線退燒
	Ibuprofen	Purfen/Brufen/Sconin /Ibuprofen	1tab Q8HPRN	PO	第三線退燒，建議積極調查發燒原因(感染/發炎/腫瘤/藥物/內分泌)
止痛	Acetaminophen	Panadol/Paramol/Titen	1tab QID	PO	第一線口服止痛
	Naproxen	Naposin/Proxen	1tab TID	PO	第二線口服止痛，S/E：GIB，AKI
	Cerecoxib	Celebrex	1cap QD	PO	COX-2，非骨頭痛需自費
	Etoricoxib	Arcoxia	1tab QD	PO	COX-2，非骨頭痛需自費
	Ketorolac	Keto	1amp Q6HPRN	IVF	最強 NSAID，S/E：GIB，AKI
	Parecoxib	Dynastat	1amp Q12HPRN	IVF	長效 NSAID，長庚愛用，一支 700 元
	Acetaminophen/ Tramadol	Ultracet/Traceton	1tab QID	PO	第三線口服止痛，Opioid 類，易 N/V，常併用 Morphine 止痛
	Meperidine	Demerol/Pethidine	1amp Q4HPRN	IVF	Weak Opioid，區域醫院常用止痛
	Nalbuphine	Bain/Mutonpain	1amp Q8HPRN	IVF	Weak Opioid，區域醫院常用止痛
	Tramadol	Tradol/Tramol	1amp Q6HPRN	IVF	Weak Opioid，多數醫院常用止痛
	Morphine	Morphine	3mg Q6HPRN	IVF	3mg 起始→5mg→8mg→10mg
	Tizanidine	Sirdalud	1tab TID	PO	肌肉鬆弛劑，止痛效果差時可以併用
	Pregabalin	Lyrica	1cap QD	PO	神經痛，S/E：嗜睡
呼吸喘	Ipratropium	Atrovent	1amp Q8HPRN	INHL	A+B 為急性止喘神器，為 Anti-Ach + SABA。Bricanyl 會 HR↑注意心律
	Terbutaline	Bricanyl	1amp Q8HPRN	INHL	
	Salbutamol	Ventolin	1amp Q8HPRN	INHL	Anti-Ach，擔心吸 SABA 會 HR↑可用
	Ipratropium/ Salbutamol	Combivent	1amp Q8HPRN	INHL	Anti-Ach + SABA，有 SABA，會輕微 Tachycardia
	Epinephrine	Bosmin	1amp Q8HPRN	INHL	嚴重氣喘，氣管痙攣/出血使用
	Furosemide	Lasix	0.5amp st	INHL	利尿劑，Fluid-overload 用 CXR：Pulmonary edema, pleural effusion
	Hydrocortisone (100mg/amp)	Solu-Cortef	1amp st	INHL	類固醇，短效型(Q6H)，COPD 或 Interstitial lung disease 用
化痰	Acetylcysteine	Fluimaril/ Actein	1tab QD	PO	口服化痰藥(發泡錠)，若為打顯影劑前使用，則為 2tab BID
	Mucosolvan	Ambroxol	1tab TID	PO	口服化痰藥
	Acetylcysteine	Encore	1amp Q8H	INHL	吸入化痰藥；味道臭
	Bromhexine	Bisolvon	4ml BID	INHL	吸入化痰藥；效果較 Encore 強
	Mesna	Siruta	1amp BID	INHL	最強化痰藥，但不是每家醫院都有

咳嗽	Dextromethorphan	Medicon	1tab TID	PO	第一線口服止咳，與咳嗽藥水併用
	Dextromethorphan	Regrow	1tab QD	PO	長效止咳，劑量為 Medicon 四倍
	Codeine	Codeine	1tab Q6H	PO	第二線口服止咳，強力止咳/乾咳
	Platycodon	Cough mixture	5ml QID	PO	咳嗽藥水，治乾咳效果佳
止暈	Diphenhydramine	Vena	1amp st	IVF	止暈效果好，暈眩急性期好用
	Diphenidol	Cephadol/Sinphadol	1tab QID	PO	第一線口服止暈(短期控制)
	Fexofenadine	Allegra	1tab BID	PO	短效 Anti-histamine(Q12H)
	Levocetirizine	Xyzal	1tab QD	PO	長效 Anti-histamine(QD)
止吐	Metoclopramide	Primperan	1amp Q8H	IVF	Ileus 止吐，促進胃排空，會 EPS
	Prochlorperazine	Novamin	1amp Q8H	IVF	非 Ileus 止吐(藥物，麻醉後)，會 EPS
	Mosapride	Mopride	1tab TID	PO	促進腸胃蠕動，不會 EPS
	Granisetron	Kytril	1amp Q12H	IVF	化療止吐(自費)，效果佳
	Aprepitant	Emend	1tab QD	PO	化療止吐(自費)，效果佳
便祕	Sennoside	Trough	1tab HS	PO	第一線軟便藥
	Sennoside/Bisacodyl	Conslife	1tab HS	PO	第一線軟便藥，效果較 Trough 好
	Bisacodyl (supp)	Dulcolax	1supp Q8HPRN	R	第二線軟便藥，塞屁股
	Lactulose	Duphalac 60ml	15ml BID	PO	第三線軟便藥，短期使用開 60ml 最高可開 60ml TID
	Sterculia+Frangula	Normacol	1pack BID	PO	纖維質，長期便祕可用；會塞 NG
	Monosodium phosphate	Evac enema	1PC st	R	灌腸，較 Glycerine 效果好
	Glycerin	Glycerin enema	1PC st	R	灌腸(自費)，較 EVAC 舒服
腹瀉	Dioctahedral smectite	Smecta	1pack TID	PO	第一線止瀉藥，橘子口味藥粉，配水喝，無效即可改常 Imodium
	Loperamide	Imodium/Imolex	1tab QD	PO	最強止瀉藥，S/E：易便秘
胃藥	MgO	Mag Mag	1tab TID	PO	制酸劑，軟便劑量為 2tab TID
	鋁鎂制酸劑	Gowell	1tab TID	PO	制酸劑
	Oxethazaine/Polymigel	Strocain	1tab TID	PO	含制酸劑+局部麻醉，胃痛好用
	Famotidine	Gaster	1amp QD	IVF	H2 blocker，不想給自費 PPI 可用
	Famotidine	Gaster	1tab QD	PO	H2 blocker，不想給自費 PPI 可用
	Esomeprazole	Nexium	1amp QD	IVF	PPI(沒有四個月內胃鏡報告須自費)
	Esomeprazole	Nexium	1tab QD	PO	PPI(沒有四個月內胃鏡報告須自費)
	鋁鎂制酸劑/ Simethicone	Ulwycon susp	10ml TID	PO	藥粉泡的口服懸浮液 可制酸+消脹氣
	Alginos oral susp	Alginos	10ml TID	PO	胃乳
脹氣	Simethicone	Gascon	1tab TID	PO	能吃就用吃的
	Simethicone	Gascon(水)	10ml TID	PO	不能吃就用水劑
打嗝	Metoclopramide	Primperan	1amp Q8H	IVF	第一線使用，但往往效果不佳
	Chlorpromazine	Wintermin	0.25tab QD	PO	安眠藥，但對打嗝有奇效，1/4 tab 用起，S/E：嗜睡
	Baclofen	Befon	1tab TID	PO	肌肉鬆弛劑，可與 Wintermin 併用

睡覺	Diphenhydramine	Vena	1amp st	IVF	快速入睡，願意打針的病人可給
	Lorazepam	Ativan	1tab HS	PO	第一線安眠藥；BZD，肝不好、Delirium 禁用
	Zolpidem	Stilnox	1tab HS	PO	若病人為入睡障礙，可加上 Stilnox
	Estazolam	Eurodin/Eszo	1tab HS	PO	常中斷睡眠，加 Eurodin；BZD
	Zopiclone	Imovane	1tab HS	PO	常中斷睡眠，不能用 BZD，用此藥
	Quetiapine	Seroquel	1tab HS	PO	安眠效果差，但副作用少，可治療 Delirium，記得選 25mg/tab 的劑型
眼藥水	Sulfamethoxazole	Sinomin	1gtt TID	OU	眼睛痛/結膜炎
	Chloramphenicol	CM eye drop	1gtt TID	OU	砂眼
	Gentamicin (藥膏)	Gentamicin	1XX BID	OU	眼睛/眼皮外傷
	人工淚液	Artelect	1gtt TID	OU	人工淚液
	Antazoline/ Chlorhexidine	Alminto	1gtt BID	OU	眼睛過敏
	Neostigmine	O.N.S.D.	1gtt TID	OU	用眼過度的痠痛
皮膚藥膏	Zinc oxide	ZnO	1XX TID	TOP1	尿布疹/該逼紅疹
	Doxepin	Ichderm	1XX PRN	TOP1	皮膚癢
	Chlorpheniramine	C.B. strong	1XX BID	TOP1	最強止癢/蕁麻疹
	Neomycin+Bacitracin+Polymycin	Spersin oint	1XX BID	TOP1	抗生素軟膏 擦/燒/割傷
	Triamcinolone/ Nystatin/Neomycin	Mycomb/ Extracomb	1XX BID	TOP1	抗生素軟膏(藥效/殺菌效果較強) 刀/割/撕裂/燙傷
	Silver sulfadiazine	Silvadene (50gm)	1XX TID	TOP1	小面積燙傷
	Silver sulfadiazine	Flamazine (500gm)	1XX TID	TOP1	大面積燙傷
	ZnO+Vena+Camphor+Dibucaine	Sinbaby lotion	1XX BID/PRN	TOP1	爽身乳液
	Undecylenic+Zinc	Kinglenic	1XX BID	TOP1	濕癬
	Heparinoid/propylene/chloroxylenol	Hirudoid/ Cividoid	1XX PRN	TOP1	瘀青(喜療妥)
過敏鼻炎	Fluticasone	Avamys	1 spray Q8HPRN	INH	類固醇，消腫效果較佳
	Azelastine	Azetin	1 spray Q8HPRN	INH	H1 blocker，較速效
止血	Transamine	Transamine	1tab TID	PO	
	Transamine	Transamine	1amp Q8H	IVF	
	Phytomenadione	Vitamin K	1amp QD	IVF	大量出血或 Coagulopathy 使用
	Epinephrine	Bosmin	1amp Q8HPRN	INH	呼吸道出血用
癲癇	Lorazepam	Ativan/Anxicam	1amp Q2M	IVF	中短效鎮靜，癲癇 2 分鐘打一次
	Diazepam	Valium	1amp Q15M	IVF	長效鎮靜，癲癇 15 分鐘打一次
	Valproate acid	Depakine	1amp Q8H	IVF	肝好，Loading: 2amp st
	Levetiracetam	Keppra	1amp Q12H	IVF	肝不好，Loading: 2-3amp st
解尿困難	Tamsulosin	Harnalidge	1tab QN/QD	PO	放鬆 Prostate
	Urocholine	Bethanecol	1tab TID	PO	增加膀胱收縮力

血糖	Regular insulin	Actrapid HM	By order	SC	俗稱 RI，1U 可降 25mg/dl 血糖
	Glucose 50%	Glucose 50%	By order	IVF	俗稱 D50W 血糖<70 給兩支，血糖<40 給四支
雜項	Dexamethasone	Dexaltin	1XX TID	TOP1	口內膏
	Chlorhexidine	Parmason	1XX TID	PO	漱口水
	Benzydamine	Difflaim	1puff BID	TOPI	口噴劑(插管後喉嚨痛，自費)
	Benzocaine	Benazon	1XX TID	R	痔瘡(效果較好)
	Lidocaine/Hydrocortisone	Xylmol	1XX TID	R	痔瘡
	Triamcinolone/ Nystatin/Neomycin	Mycomb otic sol	1ggt TID	EAR	中耳炎
電解質不平衡	0.9% N/S 500ml	N/S	1500ml QD	IVF	
	0.45% N/S 500ml	H/S	60ml/hr	IVF	Hyper-Na 用
	3% Normal saline 500ml	3% N/S	10-15ml/hr	IVF	Hypo-Na 用，run 10-15ml/hr，一天最多不要提高超過 10mEq Na
	Potassium chloride	20mEq KCl	1amp in N/S 100ml run 1hr	IVF	低血鉀用，一支 in 100ml N/S run 1 小時(低太快會 arrhythmia/asystole)
	Potassium gluconate	Radi-K	1tab TID	PO	1-3PC BID-TID (常用 2PC TID)
	Calcium gluconate	Calglon	1amp st	IVF	低血鈣和高血鉀(穩定心包膜)用
	Calcium acetate	Procal	1tab TID	PO	術後手腳痲使用
	Magnesium sulfate	MgSO4	1amp st	IVF	Hypo-Mg 用
常用點滴	0.9% N/S 500ml	N/S	1500ml QD	IVF	500ml
	0.45% N/S 500ml	H/S	60ml/hr	IVF	500ml
	Polystarch 6%	Voluven	1btl st	IVF	500ml，Volume expender，S/E：AKI
	Glucose 5%	D5W	1500ml QD	IVF	有 250，500，1000ml 三種劑型 長庚常用 D5W 和 D5S 交替 Run
	Glucose 10%	D10W	少用	IVF	500ml，Glucose 濃度同台 5
	Glucose 20%	D20W	少用	IVF	20ml
	Glu/NS (5+0.9%)	D5S	1500ml QD	IVF	1000ml
	Glu/NS (2.5+0.45%)	D0.45S	1500ml QD	IVF	500ml，可當 Half saline (H/F)用
	Glu/NS (5+0.9%)	D5S	1500ml QD	IVF	500ml，長庚常用 D5W/D5S 交替 Run
	Lactate ringer	L/R	By order	IVF	500ml，多用於補 Drainage 半量
	Taita No.1	台 1	By order	IVF	500ml，多用於小兒科
	Taita No.2	台 2	少用	IVF	500ml
	Taita No.3	台 3	By order	IVF	500ml，常並用 Taita No.5 使用
	Taita No.5	台 5	By order	IVF	有 250ml，400ml，500ml 三種劑型
	Oliclinomel	Oliclinomel	63ml/hr	IVF	1500ml/包，包含糖份/蛋白質/脂質
	Kabiven	Kabiven	63ml/hr	IVF	1448ml/包，包含糖份/蛋白質/脂質
	Aminofluid	AA fluid	60ml/hr	IVF	1000ml, Amino acid 3%, glucose 7.5%
	Bfluid	Bfluid	60ml/hr	IVF	1000ml, Amino acid 3%, glucose 7.5%

※補充：Half-Saline 和 Jusomine 也可用作吸入性化痰藥使用(頻率 1amp Q8HPRN)

※詳細 ICU 藥物泡法資訊，可參考《常見藥物之安定性與泡製法》：https://reurl.cc/7pD22y

成人抗生素劑量調整

Ref: 2019熱病、抗生素仿單
泌尿科R3黃品叡/郭惠如藥師 (2020.10.09)

學名	商品名	CCr > 50	50 > CCr > 10	CCr < 10	H/D dosage	CVVH dosage	CAPD dosage	SLED dosage	備註	常見副作用
Penicillin G (3mu/amp)	Penicillin G	3mu Q6H	3mu Q8H	2mu Q8H	2mu Q8H	2mu Q8H	2mu Q8H	-		Seizure、Na↑、溶血
Oxacillin (500mg/amp)	Prostaphlin	1000mg Q4-6H 2000mg Q4H	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	MSSA首選	Rash、Hepatitis(可逆)、Leukopenia(>2wks)
Ampicillin (500mg/amp)	Ampolin	1000mg Q4-6H 2000mg Q4H	CCr30-50, 1-2g Q6-8H CCr10-29, 1-2g Q8-12H	1-2g Q12H	1-2g Q12H + 1-2g AD	1-2g Q8-12H	0.5-1g Q12H	No data	Listeria首選	
Amoxicillin	Amoxicillin	-	-	-	-	-	-	-	嘉基無IV form	Maculopapular rash (EBV, CMV, CLL, Allopurinol)
Ampi+Salbactum (1500mg/amp)	Unasyn	1500mg Q6-8H 3000mg Q6-8H	1500mg Q12H 3000mg Q12H	1500mg Q24H 3000mg Q24H	3000mgQN	3000mgQ12H	3000mgQD	No data	AB菌：3000mg Q6H	
Amo+Clavulanate (600mg/amp)	Augmentin	1200mg Q8H	CCr30-601200mg Q8H CCr10-30:600mg Q12H	600mg QD	600mg QN	No data	No data	No data		Diarrhea (clavulanate), Hepatitis, Rash.
Piperacillin +Tazobactam (2250mg/amp)	Tazocin	4500mg Q8H 4500mg Q6H	3375mg Q6H	2250mg Q6H	2250mg Q8H + 750mg AD	MIC<16, 3375mg Q6H MIC>16, 4500mg Q8H	2250mg Q8H	No data		thrombocytopenia, Na↑↑ 2.79mEq Na per gm of PIP
Cefazolin (1000mg/amp)	Cefa	1-2g Q8H	1-2g Q12H	1-2g QD	1-2g QN	1-2g QD	0.5g Q12H	No data		
Cefuroxime (750mg/amp)	Furoxime	0.75-1.5g Q8H	0.75-1.5g Q8-12H	0.75-1.5g QD	0.75-1.5g QD (AD)	0.75-1.5g Q8-12H	0.75-1.5g QD	No data		
Cefmetazole (1000mg/amp)	Cetazone	2000mg Q12H	2000mg QD	1000mg QD	1g QN	No data	No data	No data		PT↑，菌量大易被分解
Flomoxef (1000mg/amp)	Flumarin	1000mg Q8-12H	1000mg QD	1000mg QOD	1000mg QOD	No data	No data	No data		PT↑，HB↓，Eosinophilia
Ceftriaxone (500mg/amp)	Rocephin	1g Q12H/2g QD 2000mg Q12H	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	肝功能不好避免使用 Meningitis：2g Q12H	禁併用2價陽離子(esp鈣離子) sludge(pseudocholelithiasis),gallstone pancreatitis
Cefotaxime (1000mg/amp)	Loforan/ Claforan	2000mg Q8-12H	2000mg Q12-24H	2000mg QD	2000mg QN	2000mg Q12-24H	1000mg QD	No data		
Ceftazidime (1000mg/amp)	Fortum	2000mg Q8-12H	2000mg Q12-24H	2000mg Q24-48H	2000mg Q24-48H + 1000mg AD	1000-2000mg Q12-24H	500 mg QD	1000mg Q8H 2000mg Q12H		
CPZ + Sulbactam (1000mg/amp)	Brosym	2000mg Q12H 4000mg Q12H	CCr30-50, 同左 CCr10-29, 2000mg Q12H	1000mg Q12H	No data	No data	No data	No data	AB菌：4000mg Q12H 肝代膽排組織分佈佳	↑PT
Cefepime (500mg/amp)	Maxipime	2000mg Q8H	CCr30-50, 2000mg Q12H CCr10-29, 2000mg QD	1000mg QD	1000mg QN	2000mg Q12-24H	2000mg QOD	No data	僅列出Max dosage調整 其餘見熱病	Non-convulsie status epileptius (esp. in renal insufficiency)
Gentamicin (80mg/amp)	Gentamicin	80mg Q12H 160mg QD	80mg QD	80mg QOD	1.7-2 mg/kg QOD + 50% dosage AD	1.7-2 mg/kg QD	見熱病	6mg/kg QOD (SLED開始前30min給)		Renal, Oto(balance,hearing), NM paralysis
Amikacin (250mg/amp)	Amikin	7.5mg/kg Q12H	7.5mg/kg QD	7.5mg/kg QOD	7.5mg/kg QOD + 50% dosage AD	7.5mg/kg QD	15-20mg lost per L of dialysate/day	No data		Renal, Oto(balance,hearing), NM paralysis
Ertapenem (1000mg/amp)	Invanz	1000mg QD	CCr30-50, 1000mg QD CCr10-29, 500mg QD	500mg QD	500mg QN	500-1000mg QD	500mg QD	1000mg QD	交互作用:Depakine (濃度降低)	Visual hallucination. DRESS
Meropenem (250mg/amp)	Mepem	1000mg Q8H	CC30-50, 1000mg Q12H CCr10-29, 500mg Q12H	500mg QD	500mg QN	1000mg Q12H	500mg QD	500mg Q8H	交互作用:Depakine (濃度降低)	
Ciprofloxacin (200mg/btl)	Ciproxin	400mg Q12H	400mg QD	400mg QD	400mg QN	200-400mg Q12H	400mg QD	No data		CNS, Neuropathy, 易induce R
Levofloxacin (250mg/btl)	Cravit	750mg QD	750mg QOD	750mg once, then 500mg QOD	750mg once, then 500mg QOD	750mg once, then 500mg QOD	750mg once, then 500mg QOD	No data		Tendinopathy, Allergy, MG, Retinal detachment
Moxifloxacin (400mg/btl)	Avelox	400mg QD	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	No data		Tendinopathy, Allergy, MG, Retinal detachment
Azithromycin (250mg/tab)	Zithromax	500mg QD	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	For atypical infection: 500mg QD * 3d (PO)	
Clarithromycin (500mg/tab)	Klaricid	500mg Q12H	500mg Q12-24H	500mg QD	500mg QD (AD)	500mg Q12-24H	500mg QD	No data	交互作用:motilium (QT prolong)	

學名	商品名	CCr > 50	50 > CCr > 10	CCr < 10	H/D dosage	CVVH dosage	CAPD dosage	SLED dosage	備註	常見副作用
Vancomycin (500mg/amp)	Vancomycin	500mg Q8H 1000mg Q12H	500mg Q12H	500mg QD	500mg Q2-3D	500mg QD-QOD	500mg Q2-3D	No data	第四次給藥前抽血中濃度	Red man,Rash,Fever, ↓ Plt&PMN, Renal, Oto IgA bullous dermatitis
Teicoplanin (200mg/amp)	Targocid	L/D:400mg Q12H*3 400mg QD L/D:800mg Q12H*3 800mg QD	L/D:400mg Q12H*3 400mg QOD L/D:800mg Q12H*3 800mg QOD	L/D:400mg Q12H*3 400mg Q3D L/D:800mg Q12H*3 800mg Q3D	L/D:400mg Q12H*3 400mg Q3D L/D:800mg Q12H*3 800mg Q3D	L/D:400mg Q12H*3 400mg QOD L/D:800mg Q12H*3 800mg QOD	見熱病	No data	Mild inf:6mg/kg Severe inf:12mg/kg High penetration in lung, fluid	Fever, Skin reaction, ↓ PLT, Renal?
Daptomycin (500mg/amp)	Cubicin	4-6mg/kg QD	CCr30-50, 4-6mg/kg QD CCr10-29, 6mg/kg QOD	6mg/kg QOD	6mg/kg QOD	6mg/kg QOD	6mg/kg QOD	No data	穿透↓X in PNA、CNS	不可加dextrose. Myositis, BM, Eosinophilic PNA
Linezolid (600mg/bag)	Zyvox	600mg Q12H	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整		GI,BM,LA,neuropathy(peri,optic) d-d(MAOI,SSRI,HTN),rhabdo
Fosfomycin (2000mg/amp)	Fosfomycin	2000mg Q8H	2000mg Q12H	2000mg QD	2000mg QOD	No data	No data	No data	穿透佳， AG並用可降低腎毒(協同運輸)	HyperNa,HypoK,cytopenia,Eos,Skin,aplstic anemia, 肝炎黃疸.↑digoxin,↓避孕
Tigecycline (50mg/amp)	Tygacil	100mg, then 50mg Q12H	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	Hepatic dosage(Child C) 100mg, then 25mg Q12H	N/V/D, ↑ UN, Pancreatitis, Photosens Pseudotumor cerebri, Pigmentation; Hepatic failure
Colistin (2MU/amp)	Colimycin	2MU Q12H	2MU QD	見熱病	見熱病	見熱病	見熱病	No data	2MU = 66.8 mg	Neuro(circumoral paresthesia,vertigo,vision,confusion,ataxia,NMB), Renal, Polymyxin E1(IH)
TMP+SMX (400/80mg/amp)	Baktar/ Sevatrim	5-20mg/kg/day divided Q6-12H	CCr30-50, 5-20mg/kg/day devided Q6-12H CCr10-29, 5-10mg/kg/day devided Q12H	不建議使用, if use, 5-10 mg/kg QD	不建議使用, if use, 5-10 mg/kg QD	5mg/kg Q8H	No data	No data	Steno,PJP,Toxo,Norcar.IV=PO 請依照適應症給予對應dosage	**Hallucination**,N/V,Hepatitis,HyperK,Rash,SJS/TEN, Fever,**BM,RTA(IV),**teratogenic,aseptic meningitis,Photosens. ↑ SU/Warfarin →hypoglycemia/bleeding
Clindamycin (300mg/amp)	Ulecin	600mg Q8H 300mg Q6H	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整		C.diff(D, toxicMegacolon), rash, fever
Clindamycin (150mg/cap)	Clincin/ Cleocin	150-450mg Q6H	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整		
Metronidazole (500mg/amp)	Flagyl	500mg Q8H	500mg Q8H	500mg Q12H	500mg Q12H + 500mg AD	500mg Q8H	500mg Q12H	No data		Metallic taste, Neuropathy(auto,peri,optic) CNS(aseptic meningitis,encephalopathy,seizure) 褐尿
Fluconazole (100mg/amp)	Diflucan	400mg QD	200mg QD	200mg QD	400mg QN	400mg QD	200mg QD	No data	僅列出Max dosage調整 其餘見熱病	D-D common. N/V/D,HA,rash,abd pain, ↑ GOT, ↑ QT. Alopecia(scalp+pubic) if 400mg qd >3mo(12-20%)
Anidulafungin (100mg/amp)	Eraxis	L/D:200mg,then 100mg QD	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	L/D:1.5-3mg/kg M/D:0.75-1.5mg/kg/day	不經肝腎代謝;X in CSF & urine
Amphotericin-B (50mg/amp)	Fungizone	0.3-1 mg/kg QD	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整		RTA(I), hypoK&Mg, Cardiac(VT/VF,Brady), HoTN
Amphotericin-B (50mg/amp)	Ambisone	3-5mg/kg QD 6mg/kg QD	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整	不用調整		
Voriconazole (200mg/amp)	Vfend	6mg/kg Q12H*3 dose 4mg/kg Q12H	PO	PO	避免使用	避免使用	避免使用	避免使用	inj急採	hepatitis, cholestasis, vision, Rash, ↑ QT. Hallucination,Photosensitivity(skin CA),IF w/ fever & HTN, D-D, hypoglycemia, pneumonitis.Rx level:1.5-5
Ganciclovir (500mg/amp)	Cymevene	I/D: 5mg/kg Q12H M/D: 2.5-5mg/kg QD	見熱病	見熱病	見熱病	見熱病	見熱病	見熱病	For CMV infection Induction:5mg/kg Q12H*14 days Maintain:5mg/kg QD	
Acyclovir (250mg/amp)	Zovirax	5-12.5mg/kg QD	5-12.5mg/kg Q12-24H	2.5-6.25mg/kg QD	2.5-6.25mg/kg QD (AD)	5-10mg/kg QD	2.5-6.25mg/kg QD	No data	For HSV/VZV	
Peramivir (300mg/amp)	Rapiacta	600mg QD	CCr30-50, 200mg QD CCr10-29, 100mg QD	L/D:100mg, then 15mg QD	100mg QD (2 hr AD on HD day)	No data	No data	No data	For Influenza A/B	

※本表為抗生素成人劑量表，小朋友請依照體重和年齡調整
※本表係依照嘉基藥物給予時間做調整，故給藥時間上可能和熱病原文有所不同
※部分抗生素因調整複雜，請參照熱病適應症及對應之腎功能，給予適當劑量
※本表中載明"No data"者，乃因熱病中顯示"無參考數據/No data"，故以原意呈現
※劑量相關描述 → L/D：Loading Dosage(負荷劑量)；M/D：Maintanence Dosage(維持劑量)；I/D：Induction Dosage(引導劑量)
※洗腎相關描述 → AD：After Dialysis(洗腎後)；BD：Before Dialysis(洗腎前)