

PENGUNAAN TURUNAN

JUMLAH PERTEMUAN : 1 PERTEMUAN

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :

Menerapkan konsep dasar turunan fungsi dalam menentukan karakteristik grafik fungsi dan menggambarkan grafik

Materi :

6.1 Kemotongan dan Kecekungan

Definisi

Andaikan f terdefinisi pada selang I (terbuka, tertutup, atau tak satupun). Kita katakan bahwa:

1. f adalah **naik** pada I jika untuk setiap bilangan x_1 dan x_2 dalam I .

$$x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

2. f adalah **turun** pada I jika untuk setiap pasangan bilangan x_1 dan x_2 dalam I .

$$x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

3. f **monoton murni** pada I jika ia naik pada I atau turun pada I .

Turunan pertama dan kemonotonan



Teorema

(Teorema Kemonotonan). Andaikan f kontinu pada selang I dan dapat dideferensialkan pada setiap titik dalam dari I .

1. Jika $f'(x) > 0$ untuk semua titik dalam x dari I , maka f naik pada I
2. Jika $f'(x) < 0$ untuk semua titik dalam x dari I , maka f turun pada I .


Contoh

Jika $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7$, cari di mana f naik dan di mana turun.

Jawab:

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x + 1)(x - 2)$$

Kita perlu menentukan dimana $(x + 1)(x - 2) > 0$ dan juga di mana $(x + 1)(x - 2) < 0$.



Sumbu terbagi menjadi 3 selang yaitu $(-\infty, -1)$, $(-1, 2)$, dan $(2, \infty)$.

Turunan Kedua dan Kecekungan.

Definisi



Andaikan f terdiferensial pada selang terbuka $I = (a, b)$. Jika f' naik pada I , f (dan grafiknya) **cekung ke atas** di sana; jika f' turun pada I , f **cekung ke bawah** pada I .

Teorema

(Kecekungan). Andaikan f terdiferensialkan dua kali pada selang terbuka (a, b)



1. Jika $f''(x) > 0$ untuk semua x dalam (a, b) , maka f **cekung ke atas** pada (a, b) .
2. Jika $f''(x) < 0$ untuk semua x dalam (a, b) , maka f **cekung ke bawah** pada (a, b) .

Contoh

Di mana $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 4$ naik, turun, cekung ke atas, dan cekung ke bawah?

Jawab

$$f'(x) = x^2 - 2x - 3$$



Maka untuk selang $(-\infty, -1]$ dan $[3, \infty)$ f naik dan untuk selang $[-1, 3]$ f turun. Pada selang $(-\infty, 1]$ f cekung ke bawah dan pada selang $[1, \infty)$ f cekung ke atas. Dapat dilihat gambar disamping.



6.2 Titik Balik

Andaikan f kontinu di c . Misal $(c, f(c))$ suatu **titik balik** dari grafik f jika f cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya dari c . Titik-titik di mana $f''(x) = 0$ atau $f''(x)$ tidak ada merupakan calon-calon untuk titik balik.

6.3 Asimtot

Garis $x = c$ adalah **asimtot vertikal** dari grafik $y = f(x)$ jika salah satu dari pernyataan-pernyataan berikut benar.

1. $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$
2. $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty$
3. $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \infty$
4. $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = -\infty$

Garis $y = b$ adalah **asimtot horisontal** dari grafik $y = f(x)$ jika

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b \text{ atau } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$$

6.4 Penggambaran Grafik Canggih

Contoh:



Sketsa grafik $f(x) = \frac{3x^5 - 20x^3}{32}$

Jawab:

1. Karena $f(-x) = -f(x)$, maka $f(x)$ adalah fungsi ganjil, maka grafik simetri terhadap titik asal

2. Mencari titik potong

$$\frac{3x^5 - 20x^3}{32} = 0$$

Akar fungsi diatas: $x = 0, \pm \sqrt{\frac{20}{3}}$


3. Menentukan kemonotonan

$$f'(x) = \frac{15}{32}x^4 - \frac{60}{32}x^2$$

Maka stasioner $f'(x) = 0$

$$\frac{15}{32}x^4 - \frac{60}{32}x^2 = 0$$

Maka $x = 0, \pm 2$



4. Menentukan cekung/cembung


$$f''(x) = \frac{15}{8}x^3 - \frac{60}{16}x$$

Maka titik balik $f''(x) = 0$



$$\frac{15}{8}x^3 - \frac{60}{16}x = 0$$

Maka $x = 0, \pm\sqrt{2}$



5. Asimtot jika ada

Tidak ada

Maka sketsa fungsi $f(x)$



Ringkasan metode:

1. Periksa daerah asal dan daerah hasil fungsi untuk melihat apakah ada daerah di bidang yang dikecualikan
2. Uji kesimetrian terhadap sumbu y dan titik asal.
3. Cari perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat



4. Gunakan turunan pertama untuk mencari titik-titik kritis dan untuk mengetahui tempat-tempat grafik naik dan turun.
5. Uji titik-titik kritis untuk maksimum dan minimum lokal
6. Gunakan turunan kedua untuk mengetahui tempat-tempat grafik cekung ke atas dan cekung ke bawah dan untuk melokasikan titik-titik balik
7. Cari asimtot-asimtot
8. Tentukan beberapa pasangan koordinat dari nilai titik kritis, asimtot
9. Sketsa grafik.

Pada grafik :

1. Titik potong , 2. Titik kritis, 3. Asimtot

Asimtot

6.6 Latihan

1. Diketahui:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

- a. Tentukan selang kemonotonan dan ekstrim fungsi
- b. Tentukan selang kecekungan dan titik belok
- c. Tentukan semua asimtot



d. Gambarkan grafik $f(x)$