

M/CS 375 Project 2

Isaac Boaz, Cole Yamamura

March 6, 2023

Problem 1

(a) $f(x) = 2x^3 - 6x - 1$ can be rewritten as:

$$\begin{aligned}f_1(x) &= \sqrt[3]{3x + \frac{1}{2}} \\f_2(x) &= \frac{1}{2x^2 - 6} \\f_3(x) &= \sqrt[3]{3x + \frac{1}{2}} = f_1\end{aligned}$$

(b) Taking the derivatives of these $f(x)$'s to show they all converge:

$$\begin{aligned}f'_1(x) &= -\frac{2}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{2} + 3x} \\f'_1(r_1) &= -0.18549\dots - 0.3212\dots i \\|f'_1(r_1)| &\approx 0.37099 \\|f'_1(r_1)| &< 1 \checkmark\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f'_2(x) &= -\frac{x}{(x^2 - 3)^2} \\f'_2(r_2) &= 0.0190528213703384 \\|f'_2(r_2)| &= 0.0190528213703384 \\|f'_2(r_2)| &< 1 \checkmark\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f'_3(x) &= -\frac{2}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{2} + 3x} = f'_1 \\f'_3(r_3) &= 0.06924771700019839 \\|f'_3(r_3)| &= 0.06924771700019839 \\|f'_3(r_3)| &< 1 \checkmark\end{aligned}$$

i	xi	g(xi)	error	error/lastError
0	-2.000000000	-1.765174168	0.358216473	
1	-1.765174168	-1.686340658	0.123390640	0.344458308
2	-1.686340658	-1.658150305	0.044557131	0.361106244
3	-1.658150305	-1.647833203	0.016366778	0.367321176
4	-1.647833203	-1.644024866	0.006049676	0.369631435
5	-1.644024866	-1.642614632	0.002241339	0.370489116
6	-1.642614632	-1.642091805	0.000831105	0.370807391
7	-1.642091805	-1.641897889	0.000308278	0.370925480
8	-1.641897889	-1.641825954	0.000114362	0.370969292
9	-1.641825954	-1.641799267	0.000042427	0.370985546
10	-1.641799267	-1.641789367	0.000015740	0.370991576
11	-1.641789367	-1.641785694	0.000005839	0.370993813
12	-1.641785694	-1.641784331	0.000002166	0.370994643
13	-1.641784331	-1.641783826	0.000000804	0.370994951
14	-1.641783826	-1.641783638	0.000000298	0.370995065
15	-1.641783638	-1.641783568	0.000000111	0.370995108
16	-1.641783568	-1.641783543	0.000000041	0.370995122
17	-1.641783543	-1.641783533	0.000000015	0.370995124

ans =

-1.6418

i	xi	g(xi)	error	error/lastError
0	-1.000000000	-0.250000000	0.831745598	
1	-0.250000000	-0.170212766	0.081745598	0.098281973
2	-0.170212766	-0.168291940	0.001958364	0.023956815
3	-0.168291940	-0.168255117	0.000037538	0.019167986
4	-0.168255117	-0.168254415	0.000000715	0.019055470
5	-0.168254415	-0.168254402	0.000000014	0.019076087

ans =

-0.1683

i	xi	g(xi)	error	error/lastError
0	3.000000000	2.117911792	1.189962071	
1	2.117911792	1.899513761	0.307873863	0.258725778
2	1.899513761	1.836946464	0.089475832	0.290624968
3	1.836946464	1.818214183	0.026908534	0.300735226
4	1.818214183	1.812530120	0.008176254	0.303853569
5	1.812530120	1.810798297	0.002492190	0.304808320
6	1.810798297	1.810269985	0.000760367	0.305100009
7	1.810269985	1.810108756	0.000232056	0.305189064
8	1.810108756	1.810059547	0.000070827	0.305216244
9	1.810059547	1.810044528	0.000021618	0.305224523
10	1.810044528	1.810039943	0.000006598	0.305226995
11	1.810039943	1.810038544	0.000002014	0.305227568
12	1.810038544	1.810038117	0.000000615	0.305227149
13	1.810038117	1.810037987	0.000000188	0.305225076
14	1.810037987	1.810037947	0.000000057	0.305218069
15	1.810037947	1.810037935	0.000000017	0.305195048

ans =

1.8100

Problem 2

- (a) To find the rate of convergence using Newton's Method, first find the multiplicity of $f(x)$ at $r = 0$

$$\begin{aligned}
 f(x) &= e^{\sin^3 x} + x^6 - 2x^4 - x^3 - 1 \\
 f'(x) &= (6x^3 - 8x - 3)x^2 + 3e^{\sin^3 x} \sin^2(x) \cos(x) \\
 f'(0) &= 0 \\
 f''(x) &= 6x(5x^3 - 4x - 1) - 3e^{\sin^3(x)} \sin^3(x) + 3e^{\sin^3(x)} (3\sin^3(x) + 2)\sin(x)\cos^2(x) \\
 f''(0) &= 0 \\
 f^{(3)}(x) &= 3(40x^3 - 16x + e^{\sin^3(x)}(9\sin^6(x) + 18\sin^3(x) + 2)\cos^3(x) - e^{\sin^3(x)}\sin^2(x)(9\sin^3(x) + 7)\cos(x) - 2) \\
 f^{(3)}(0) &= 0 \\
 f^{(4)}(x) &= \dots \\
 f^{(4)}(0) &= -48 \rightarrow m = 4
 \end{aligned}$$

Since $m = 4$, we know that Newton's method would have linear convergence (more precisely, $e_i \approx \frac{3}{4}e_{i-1}$)

- (b) f has another root in $[1, 2]$ because $f(1) < 0$ and $f(2) > 0$.
- (c) Plotting f and looking between $[1, 2]$, we see that the slope grows exponentially, indicating it has a low multiplicity (ie likely it is a simple root).

i	xi	error	error/lastError^2
0	2.000000000	0.469866492	
1	1.785128336	0.254994828	1.155001163
2	1.638833023	0.108699515	1.671725109
3	1.557786334	0.027652826	2.340368801
4	1.532097594	0.001964086	2.568511006
5	1.530105426	0.000028082	7.279586801
6	1.530134118	0.000000610	773.296975370
7	1.530133495	0.000000013	35433.350581781
8	1.530133508	0.000000000	1639978.902695282

ans =

1.5301

Problem 3

- (a)
1. Inner for loop is run $(m + 100 - 50) + 1 = m + 51$ times
 2. Outer for loop changes m , so we simply sum $\sum_{m=1}^n$

$$\sum_{m=1}^N m + 51 = \frac{N(N + 103)}{2}$$

- (b)
1. Inner for loop is run $(m - 10) + 1 = m - 9$ times
 2. Second loop modifies m , so sum $\sum_{m=11}^{100}$
 3. Outmost loop simply runs N times.

$$N \cdot \sum_{m=11}^{100} m - 9 = 4185N$$

- (c)
1. Inner for loop is run $(m - 1) + 1 = m$ times
 2. Second loop doesn't modify m , so multiply inner by $(m + 1 - 1) + 1 = m + 1$
 3. Outmost loop modifies m , so sum $\sum_{m=1}^N$

$$\sum_{m=1}^N (m + 1)m = \frac{N(N + 1)(N + 2)}{3}$$