



# 1. Complex Exponentials

## 1.2 Plotting complex exponentials



MatLab code:


```
for s = -0.2:0.2:0.2
    for r = -1:1
        scatter(s, r);
        xlabel("real");
        ylabel("imag");
        hold on;
    end
end
```




MatLab code:

```
for re = -0.2:0.2:0.2
    for im = -1:1
        c = re + im*j;
        t = 0:0.01:20;
        x = exp(c*t);
        plot(t, real(x), t, imag(x)), grid;
        hold on;
    end
end
```


This graph represents all graphs below together




$$s = -0.2-j1$$




$$s = 0-j1$$




$$s = 0.2 - j1$$



$$s = -0.2 + j0$$




$$s = 0+j0$$




$$s = 0.2 + j0$$






$$s = -0.2 + j1$$




$$s = 0+j1$$



$$s = 0+j1$$

## 2. The Wien Bridge Circuit

### 2.1 Introduction



$$Z_s(s) = R + 1/Cs$$

$$Y_p(s) = 1/R + 1/(1/Cs) = 1/R + Cs$$

$$H(s) = \frac{1}{1 + (R + \frac{1}{Cs})(\frac{1}{R} + Cs)}$$

$$H(s) = \frac{1}{1 + (1 + RCs + \frac{1}{RCs} + 1)}$$

$$H(s) = \frac{1}{3 + RCs + \frac{1}{RCs}}$$

$$RC = 1$$

=>

$$H(s) = \frac{1}{3 + s + \frac{1}{s}}$$

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + 3s + 1}$$

### 2.2 Impulse response

$$D = b^2 - 4ac = 9 - 4 = 5$$

$$S_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$H(s) = \frac{s}{\left(s + \frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right)\left(s + \frac{3 - \sqrt{5}}{2}\right)}$$

$$H(s) = \frac{s}{\left(s - \frac{-3 - \sqrt{5}}{2}\right)\left(s - \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}\right)}$$

Poles:


$$\frac{-3 - \sqrt{5}}{2} = -2.62$$

$$\frac{-3 + \sqrt{5}}{2} = -0.38$$

One zero:

$$Z = 0$$

Plot:



Code:

```
z = 0;
p1 = (-3-sqrt(5))/2;
p2 = (-3+sqrt(5))/2;
scatter(0, z, "b", "o");
hold on;
scatter(p1, 0, "r", "x");
hold on;
scatter(p2, 0, "r", "x");
hold on;
```

Partial fractions:

$$H(s) = \frac{\frac{3\sqrt{5}+5}{10}}{s - \frac{-3-\sqrt{5}}{2}} + \frac{\frac{5-3\sqrt{5}}{10}}{s - \frac{-3+\sqrt{5}}{2}}$$


$$H(s) = \frac{1.17}{s - (-2.62)} + \frac{4.33}{s - (-0.38)}$$

Inverse Laplace transform of  $H(s)$ :

$$h(t) = \frac{3+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} e^{-\frac{(3+\sqrt{5})}{2}t} + \frac{\sqrt{5}-3}{2\sqrt{5}} e^{\frac{\sqrt{5}-3}{2}t}$$

### 3. The Wien Bridge with Feedback

#### 3.1 The closed-loop transfer function



Transfer function of The Wien Bridge with Feedback:

$$H(s)/(1-G(s)H(s))$$

$$G(s) = \frac{H(s)}{K/s + H(s)}$$

$$G(s) = \frac{1}{\frac{K/s}{H(s)} + 1}$$

$$G(s) = \frac{1}{\frac{\frac{K}{s}}{\frac{s}{s}} + 1} = \frac{1}{\frac{K}{s^2 + 3s + 1} + 1}$$

$$G(s) = \frac{1}{K(s^2 + 3s + 1) + 1}$$

i)K = 1

$$G_{(s)} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$$

$$G_{(s)} = \frac{1}{(s - (-2))(s - (1))}$$

Poles:

-1

-2

ii)K = 2

$$G_{(s)} = \frac{1}{2s^2 + 6s + 3}$$

$$G_{(s)} = \frac{1}{(s - \frac{3 + \sqrt{3}}{2})(s - \frac{3 - \sqrt{3}}{2})}$$

Poles:

$$\frac{3 + \sqrt{3}}{2} = 2.37$$

$$\frac{3 - \sqrt{3}}{2} = 0.634$$

iii)K=3

$$G_{(s)} = \frac{1}{3s^2 + 9s + 4}$$

$$G_{(s)} = \frac{1}{(s - \frac{9 + \sqrt{33}}{6})(s - \frac{9 - \sqrt{33}}{6})}$$

Poles:

$$\frac{9 + \sqrt{33}}{6} = 2.46$$

$$\frac{9 - \sqrt{33}}{6} = 0.543$$

iv)K=4



$$G(s) = \frac{1}{4s^2 + 12s + 5}$$

$$G(s) = \frac{1}{(s - \frac{5}{2})(s - \frac{1}{2})}$$

Poles:

$$\frac{5}{2} = 2.5$$

$$\frac{1}{2} = 0.5$$

### 3.2 Impulse response of the closed-loop system

Couldn't relate this exercise with what we have learned in the class.  
 Couldn't solve it neither.