

	Studies	Screens	Dir. cons.	I^2	q
Rotatable bonds	**41**	**52**	**83%**	**88%**	**<0.001**
logP	**41**	**52**	**67%**	**87%**	**<0.001**
sp3 carbons	**41**	**52**	**77%**	**87%**	**<0.001**
Molecular weight	**41**	**52**	**77%**	**88%**	**<0.001**
Bertz complexity	**41**	**52**	**67%**	**89%**	**<0.001**
H-bond acceptors	41	51	63%	91%	<0.001
TPSA	41	52	63%	92%	0.001
Double bonds	40	51	63%	89%	<0.001
Nitrogen count	36	46	61%	91%	0.002
Carbon fraction	41	52	63%	86%	0.009
logP per 100 MW	41	52	60%	88%	0.049
Balaban J	41	52	63%	87%	0.040
H-bond donors	38	49	41%	92%	0.462
Aliphatic heterocycles	36	44	45%	83%	0.507
Fraction sp3 carbons	40	51	47%	77%	0.768
N:O ratio	41	52	50%	79%	0.253
Aromatic rings	25	33	70%	86%	0.388
Oxygen fraction	41	52	56%	84%	0.253
TPSA per MW	41	52	54%	85%	0.173
TPSA per heavy atom	41	52	58%	85%	0.159
Nitrogen fraction	**41**	**52**	**69%**	**86%**	**0.014**
Heteroatom fraction	41	52	63%	86%	0.009
Aromatic heterocycles	**17**	**23**	**74%**	**73%**	**0.005**
Hall-Kier alpha	41	52	60%	86%	0.003

Robust, FDR < 0.05 & ≥67% directional consistency
FDR < 0.05
FDR ≥ 0.05