


¿SABIAS QUÉ?

El venado cola blanca se distribuye en Colombia desde los 0 hasta los 4000 m de altura, en las regiones Andina, Caribe, Orinoquía y Amazonía. En los departamentos de Casanare y Vichada se habían identificado poblaciones numerosas de la especie.



Fauna de Boyacá

La fauna de Boyacá es muy diversa y única, debido a la gran variedad de ecosistemas presentes en la región, que van desde los páramos hasta los bosques andinos y los ríos y lagos. Sin embargo, algunas especies se encuentran en peligro de extinción debido a la deforestación, la caza ilegal y la contaminación de sus hábitats. Por lo tanto, es importante promover la conservación de la fauna de Boyacá para garantizar su supervivencia a largo plazo.

Fauna de Boyacá

En el departamento de Boyacá, en Colombia, se pueden encontrar una gran variedad de especies de fauna, tanto terrestres como acuáticas.

Mamíferos



Venado



Puma



Oso anteojos



Zorro

Aves



Condor



Colibri



Aguila



Pájaro

Anfibios y reptiles



Tortuga



serpiente



Rana

peces



Bagre



Trucha



Mojarra

REPÚBLICA DE COLOMBIA

BIODIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

DIETA

CARROÑERA

ESPECIE

CASI AMENAZADA

MORFOLOGÍA

SON DE COLOR NEGRO, CON PLUMAS BLANCAS EN EL DORSO DE LAS ALAS Y OSENTAN UN COLLAR DE PLUMÓN BLANCO. TIENEN LA CABEZA Y UNA PARTE DEL CUELLO, DESPROVISTAS DE PLUMAS



El Cóndor Andino es considerado el ave voladora más grande y pesada que existe en el mundo, alcanza hasta 3.3 metros de envergadura (distancia medida de extremo a extremo, con las alas extendidas), 1.1 -1.3 metros de altura (distancia medida del pico a la base de la cola), y llega a pesar

Boyacá
y su diversidad



En el departamento de Boyacá, en Colombia, se pueden encontrar una gran variedad de especies de fauna, tanto terrestres como acuáticas.


Boyacá
y su insectos



En este departamento también se pueden encontrar una gran variedad de insectos, como mariposas, escarabajos, hormigas y libélulas.

El venado de cola blanca se caracteriza por presentar una cornamenta ramificada (astas) en los machos, la cual, en los adultos, tiene forma de racimo con varias puntas que surgen del eje principal.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BIODIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
DIETA
RUMINANTE Y HERBIVORO
ESPECIE
AMENAZADA
MORFOLOGÍA
FRENTE DORSO Y COLA COLOR MARRÓN GRISáceO MARRÓN ROJIZO
OSCURO, VIENTRE COLA CORTA PARTE DEL MUSLO BLANCO. PELAJE:
CORTO (CUERPO), LARGO (COLA FRENTE). CERVATILLO COLOR PARDO-
ROJIZO, MOTEADO DE BLANCO



una longitud total cabeza- cola que oscila entre 1,1 y 2,3 m; los machos pesan 50 kg y las hembras 30 kg

Más sobre la fauna de Boyacá

Anfibios y reptiles: En Boyacá se pueden encontrar diversas especies de anfibios y reptiles, como la rana de cristal colombiana, la boa constrictora, la anaconda verde y la tortuga charapa



Peces: En los ríos y lagos de Boyacá se pueden encontrar especies de peces como el bocachico, la trucha arco iris, el bagre de montaña y la palometa.

