


# Objetivo Descrever ações de Higienização correta das mãos para prevenção de infecções relacionadas a assistência à saúde (IRAS). Siglas e definições IRAS- Infecções relacionadas a assistência à saúde (IRAS). Materiais e instrumentos Não há. Abrangência Todos os processos assistenciais.

A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde e engloba a higienização simples, a higienização antisséptica (com sabonete antisséptico), a fricção antisséptica (com preparação alcoólica) e a antissepsia cirúrgica das mãos como prevenção de infecção do sítio cirúrgico.

Descrição da atividade

<u>MOMENTOS</u>: As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais para prevenção de IRAS causadas por transmissão cruzada pelas mãos: "Meus cinco momentos para a higiene das mãos"

# QUANDO? Seus 5 momentos para a higiene das mãos






1. Higienização simples das mãos com água e sabão (duração do procedimento: 40-60 seg):




# 2. Higienização antisséptica (com água e sabonete antisséptico):

A técnica de higienização antisséptica é igual àquela utilizada para a higienização simples das mãos, substituindo-se o sabonete líquido comum por um associado à antisséptico, como antisséptico degermante.


3. Fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica (duração do procedimento: 20- 30 seg):



Aplique uma quantidade suficiente de preparação alcoólica em uma mão em forma de concha para cobrir todas as superfícies das mãos.




Friccione as palmas das mãos entre si.



Friccione a palma direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa.



Friccione a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados.



Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa.



Friccione o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita utilizando-se de movimento circular e vice-versa.



Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo um movimento circular e vice-versa.



Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras,



4. Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos (duração do procedimento 3 a 5 min na primeira cirurgia, nas subsequentes de 2 a 3 min):





### 4. Indicadores

Os seguintes indicadores de desempenho devem ser utilizados pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) para a mensuração da melhoria da adesão às práticas de higiene das mãos. Indicadores obrigatórios:

- 1. Consumo de preparação alcoólica para as mãos:
- -Monitoramento do volume de preparação alcoólica para as mãos utilizado para cada 1.000 pacientes-dia.

consumo de preparação alcoólica líquida ou gel (mL) na unidade, por mês

número de paciente - dia na unidade, no mês

### 2. Consumo de sabonete:

-Monitoramento do volume de sabonete líquido associado ou não a antisséptico utilizado para cada 1.000 pacientes-dia.

consumo de sabonete líquido (mL) na unidade, por mês

número de paciente - dia na unidade, no mês

3. Taxa de adesão às práticas de higienização das mãos pelos profissionais de saúde (com água e sabonete ou utilização de preparação alcoólica:

Número de episódios de higienização das mãos realizados pelos profissionais de saúde/ número de oportunidades havidas (unidades abertas e UTI).

### **Cuidados Especiais**

Uso de luvas: O uso de luvas não altera nem substitui a higienização das mãos; seu uso por profissionais de saúde não deve ser adotado indiscriminadamente, devendo ser restrito às indicações a seguir:

- Utilizá-las para proteção individual, nos casos de contato com sangue e líquidos corporais e contato com mucosas e pele não íntegra de todos os pacientes;
- Utilizá-las para reduzir a possibilidade de os micro-organismos das mãos do profissional contaminarem o campo operatório (luvas cirúrgicas);



- Utilizá-las para reduzir a possibilidade de transmissão de micro-organismos de um paciente para outro nas situações de precaução de contato;
- Trocar de luvas sempre que entrar em contato com outro paciente;
- Trocar de luvas durante o contato com o paciente se for mudar de um sítio corporal, contaminado para outro, limpo;
- Trocar de luvas quando estas estiverem danificadas;
- Nunca tocar desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) quando estiver com luvas;
- Higienizar as mãos antes e após o uso de luvas.

# Referências/documentos complementares/registros

SEGURANÇA DO PACIENTE Higienização das mãos Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/paciente\_hig\_maos.pdf. Acessado em:10/08/2021.

### Controle histórico

Versão	Data da aprovação	Elaborador (es)	Verificador (es)	Aprovador (es)
02	10/08/2021	Hélida Karla Rodrigues	Giulianna Carla Marçal Lourenço	Dra Waneska Lucena
Modificação realizada				