



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Página 1/7	
Título do Documento	Protocolo de reação a alergia a Quimioterapia	Emissão: 01/08/2026	Próxima revisão: 01/08/2028
		Versão: 1	

1. CONCEITO:

1.1 Responsável pela prescrição Médico	1.2 Responsáveis pela execução Enfermeiros
1.3 Finalidades Padronizar a identificação precoce, a avaliação e a conduta multiprofissional frente às reações de hipersensibilidade relacionadas à administração de medicamentos quimioterápicos, garantindo atendimento rápido e seguro ao paciente, minimizando complicações, promovendo a continuidade do tratamento quando clinicamente possível e assegurando a qualidade da assistência, a segurança do paciente e o registro adequado do evento adverso.	1.5 Contraindicações/Restrições Este protocolo não apresenta contraindicações para sua aplicação, uma vez que se destina ao atendimento de pacientes que apresentem suspeita ou confirmação de reação de hipersensibilidade durante a administração de medicamentos quimioterápicos.

2. MATERIAIS

- Carrinho de emergência completo e revisado;
- Oxigênio medicinal com fluxômetro e máscara facial;
- Aspirador de secreções;
- Monitor multiparamétrico;
- Esfigmomanômetro, estetoscópio e oxímetro de pulso;
- Bomba de infusão;
- Cateter venoso pérvio (preferencialmente exclusivo para a infusão);
- Equipos para infusão e equipo de soro;
- Solução fisiológica 0,9%;
- Seringas e agulhas de diversos calibres;
- Luvas de procedimento e demais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);
- Material para suporte ventilatório (cânula de Guedel, bolsa-válvula-máscara – AMBU);
- Desfibrilador com monitor cardíaco

Medicamentos de emergência:

- Adrenalina (Epinefrina);
- Hidrocortisona;
- Dexametasona;
- Prometazina ou Dexclorfeniramina;
- Salbutamol aerossol (spray) ou solução para nebulização;
- Dipirona e/ou Paracetamol;
- Soluções cristaloides (SF 0,9% ou Ringer Lactato);
- Etomidato
- Outros medicamentos conforme protocolo institucional e prescrição médica.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Página 2/7	
Título do Documento	Protocolo de reação a alergia a Quimioterapia	Emissão: 01/08/2026	Próxima revisão: 01/08/2028
		Versão: 1	

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Antes da administração da quimioterapia

- Confirmar a identificação do paciente utilizando, no mínimo, dois identificadores drogas vesicantes ou irritantes
- Conferir a prescrição médica, protocolo quimioterápico, dose, via, tempo de infusão e pré-medicações prescritas.
- Verificar antecedentes de reações alérgicas ou de hipersensibilidade a medicamentos quimioterápicos.
- Avaliar sinais vitais antes do início da infusão.
- Certificar-se de que o acesso venoso está pérvio e em condições adequadas.
- Garantir que o carrinho de emergência esteja disponível e revisado.

3.2 Identificação da reação

Durante toda a infusão, monitorar continuamente o paciente quanto ao aparecimento de sinais e sintomas, tais como:

- Prurido, Eritema ou urticária;
- Rubor facial, Edema de face, lábios ou língua;
- Tosse, dispneia, sibilância ou broncoespasmo;
- Dor torácica, dor local, dor no sitio de aplicação
- Náuseas ou vômitos;
- Hipotensão, taquicardia ou alterações do nível de consciência.

3.3 Conduta imediata diante da reação

Ao identificar qualquer sinal de reação de hipersensibilidade:

1. Interromper imediatamente a infusão do quimioterápico.
2. Manter o acesso venoso pérvio com solução fisiológica 0,9%, utilizando equipo exclusivo.
3. Acionar imediatamente o médico oncologista ou plantonista.
4. Avaliar sinais vitais e monitorar continuamente o paciente.
5. Administrar oxigênio, quando indicado.
6. Administrar os medicamentos prescritos para tratamento da reação (anti-histamínicos, corticosteroides, broncodilatadores, adrenalina ou outros, conforme gravidade e prescrição médica).
7. Manter o paciente sob observação até estabilização clínica.

3.4 Após o atendimento


- Registrar detalhadamente a ocorrência no prontuário eletrônico ou físico, incluindo sinais e sintomas, horário, condutas realizadas, medicamentos administrados e evolução clínica.
- Comunicar o evento ao médico responsável e registrar a decisão sobre continuidade ou suspensão do tratamento.
- Notificar o evento adverso conforme rotina institucional e ao Núcleo de Segurança do Paciente, quando aplicável.
- Orientar o paciente e seus familiares sobre a reação ocorrida e os cuidados para os próximos ciclos de tratamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Página 3/7	
Título do Documento	Protocolo de reação a alergia a Quimioterapia	Emissão: 01/08/2026	Próxima revisão: 01/08/2028
		Versão: 1	

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- O paciente deverá permanecer sob monitorização clínica até completa estabilização dos sinais e sintomas.
- Não reiniciar a infusão do quimioterápico sem avaliação e autorização do médico oncologista.
- Em casos de reação grave (graus 3 e 4) ou anafilaxia, seguir o Protocolo Institucional de Atendimento à Anafilaxia e acionar a equipe de emergência, quando necessário.
- Registrar no prontuário todas as informações relacionadas ao evento, incluindo: horário de início da reação, sinais e sintomas apresentados, medicamento suspeito, condutas adotadas, medicamentos administrados, resposta ao tratamento e evolução clínica.
- Notificar o evento adverso conforme o fluxo institucional e ao Núcleo de Segurança do Paciente, quando aplicável.
- Informar o farmacêutico e a equipe multiprofissional sobre a ocorrência para reavaliação do tratamento e planejamento dos ciclos subsequentes.
- Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre a reação ocorrida, os sinais de alerta e a importância de comunicar imediatamente qualquer sintoma em futuras infusões.
- Identificar claramente no prontuário e nos registros assistenciais o histórico de reação de hipersensibilidade ao quimioterápico.
- Avaliar a necessidade de pré-medicação, redução da velocidade de infusão ou protocolo de dessensibilização nos próximos ciclos, conforme indicação do médico oncologista.
- Garantir que o carrinho de emergência permaneça abastecido e revisado antes do início de cada sessão de quimioterapia.

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS



ATENÇÃO: Em caso de anafilaxia, acionar imediatamente o protocolo de emergência e a equipe médica.

Anexo II – Classificação da Gravidade da Reação

Grau	Características	Conduta
Grau 1 (Leve)	Prurido, rash, eritema localizado	Suspender temporariamente, medicar e reavaliar.
Grau 2 (Moderada)	Urticária difusa, edema leve, dispneia leve	Suspender a infusão, monitorizar e tratar conforme prescrição médica.
Grau 3 (Grave)	Broncoespasmo, hipotensão, angioedema importante	Suspender definitivamente, iniciar tratamento de emergência e considerar transferência para unidade de maior complexidade.
Grau 4 (Anafilaxia)	Parada respiratória ou circulatória, choque anafilático	Acionar equipe de emergência, iniciar protocolo de anafilaxia e suporte avançado de vida.

Anexo III – Checklist da Enfermagem

- Confirmar identificação do paciente.
- Conferir prescrição e protocolo quimioterápico.
- Verificar sinais vitais antes da infusão.
- Garantir cateter venoso pérvio.
- Confirmar disponibilidade do carrinho de emergência.
- Monitorar continuamente durante a infusão.
- Registrar toda intercorrência em prontuário.
- Notificar evento adverso conforme protocolo institucional.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Página 6/7	
Título do Documento	Protocolo de reação a alergia a Quimioterapia	Emissão: 01/08/2026	Próxima revisão: 01/08/2028
		Versão: 1	

6. REFERÊNCIAS

1. **BRASIL. Ministério da Saúde.** Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). *Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Eventos Adversos e Monitoramento*. Brasília: ANVISA.
2. **BRASIL. Ministério da Saúde.** Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). *Ações de Enfermagem para o Controle do Câncer: uma proposta de integração ensino-serviço*. Rio de Janeiro: INCA.
3. **Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE).** Version 5.0. National Cancer Institute (NCI), 2017.
4. **Oncology Nursing Society (ONS).** *Chemotherapy and Immunotherapy Guidelines and Recommendations for Practice*. 5th ed. Pittsburgh: Oncology Nursing Society, 2023.
5. **National Comprehensive Cancer Network (NCCN).** *NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Management of Immunotherapy-Related Toxicities*. Versão vigente.
6. **American Society of Clinical Oncology (ASCO).** *Management of Infusion Reactions in Patients Receiving Systemic Therapy*. Journal of Clinical Oncology.
7. **Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).** Diretrizes e recomendações para o tratamento oncológico e segurança na administração de antineoplásicos.
8. **Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).** Resolução nº 736/2024. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o Processo de Enfermagem.
9. **Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Oncologia (SBEO).** Recomendações para a prática da enfermagem oncológica e administração segura de quimioterapia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Página 7/7	
Título do Documento	Protocolo de reação a alergia a Quimioterapia	Emissão: 01/08/2026	Próxima revisão: 01/08/2028
		Versão: 1	

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/08/2026	Elaboração

Versão 1 - Elaboração Giulianna Carla Marçal Lourenço	Data: 01/07/2026
Versão 2 – Revisão Andrea Maria da Silva Validação Maria Jose da Silva Registro, análise e revisão final Nilson Alves Lima Filho Aprovação Sonia da Silva Delgado	Data:01/08/2026