

第十三讲： 弱序贯均衡的应用（二）

廉价话语 (Cheap Talk)


廉价话语 (Cheap Talk)

- 上一节课的信号博弈中，要实现信息传递，需要不同类型的博弈者在发送信号时有足够的成本的差异
- 当每种类型发送消息都是零成本时，能否实现信息的传递呢？
- 如果双方的利益有一定的重叠，那么有可能实现部分的信息传递

例一

- 两位朋友A和B先后进京“北漂”。A已住在朝阳区多年。B刚刚在海淀区找到工作，需要选择住在哪里。B首先希望上班路上不要花太多时间，其次离A比较近；A首先希望B住的离自己比较近，其次B上班不要花太多时间。B不了解北京的交通拥堵情况，询问A。A了解北京交通拥堵的真实情况。现在A要向B发一个消息 m ，B收到消息后选取居住地 y 。
- 具体而言：B可选的居住地 y 有五种可能 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ （1代表海淀区，5代表朝阳区，数值越大越远离海淀并靠近朝阳）
- 交通状况 t 有三种可能 $\{1, 3, 5\}$ （1代表极差，5代表极好）
- 公共前提：三种 t 的概率各是 $1/3$ ；私人信息：A知道 t 的真实值，B不知
- B的效用是 $u_B = -(y-t)^2$ （给定 t ，他最希望的是 $y = t$ ， y 离 t 越近收益越高）
- A的效用是 $u_A = -(y-t-b)^2$ （给定 t ，他最希望的是 $y = t + b$ ， y 离 $t+b$ 越近越好）
– b 代表了A的“bias”或者A和B利益的差距，这里为具体起见，不妨令 $b=1.1$

博弈树示意图



两个极端：讲真话和讲废话

- A讲真话无法构成均衡

- 如果A的策略是讲真话：发送 $m=t$ （即A的每个类型发送自己的真实类型）
- 那么均衡中B的信念为 $t=m$ ，最优反应是 $y=m$
- 但是如果B的策略是选 $y=m$ ，A的最优策略不是 $m=t$ ，而是令 m 最接近 $t+b$ （例如当 $t=1$ 时，A宁可发送 $m=3$ 而不是 $m=1$ ）

- A讲废话(babbling)的均衡

- A可以选择无论真实的 t 的取值，总是发送某一个固定的消息 m 或随机发送 m （例如以同样的概率随机发送1, 3, 5）
- 给定A这样的策略，B的最优反应是忽略这个消息，总是根据公共前提概率来形成信念，并做出最优选择
- 给定B的策略（忽略 m ），A的任何类型改变消息都无法改变自己的收益
- 这是一个混同型的均衡，且无论 b 的取值，总是成立


实现部分的信息传递的均衡是否可能？

- 考虑以下策略组合和信念系统
 - A的策略：如果 $t=1$ ，发送 $m=1$ ；如果 $t=3$ or $t=5$ ，以同等概率($1/2$)随机发送 $m=3$ or 5
 - B的信念：如果 $m=1$ ，相信 $t=1$ ；如果 $m=3$ or 5 ，相信 $t=3$ 和 $t=5$ 的概率各为 $1/2$
 - B的策略：如果 $m=1$ ，选择 $y=1$ ；如果 $m=3$ or 5 ，选择 $y=4$ （因为 t 的期望是 4 ）
- 是否构成弱序贯均衡？
 - 信念是否合理：是的
 - 给定B的信念，B的策略是否最优：是的
 - 给定B的策略，A的每一个类型的策略是否最优
 - $t=1$ ：他最希望的是 $y=2.1$ ；现策略导致 $y=1$ ，发送其他导致 $y=4$ ，现策略更好
 - $t=3$ ：他最希望的是 $y=4.1$ ；现策略导致 $y=4$ ，发送 $m=1$ 导致 $y=1$ ，现策略更好
 - $t=5$ ：他最希望的是 $y=6.1$ ；现策略导致 $y=4$ ，发送 $m=1$ 导致 $y=1$ ，现策略更好

- 在刚才的均衡中，A把某些情况（ $t=1$ ）单列出来，发送一种信息，把他的情况（ $t=3$ ， $t=5$ ）混在一起，发送另一种信息，他发送的消息传递了部分信息
 - 如果A把 $t=5$ 单列，而把 $t=3$ 和 $t=1$ 混在一起，这样能构成弱序贯均衡吗？（课下验证：不能）
- A之所以在某些情况下愿意发送真实的信息，是因为A的利益与B是有一定的一致性的，所以在“极端”情况下，A宁愿讲真话
- 如果A的偏好与B差别太大，那“廉价话语”无法传递哪怕是有限的信息
 - 本例中，如果 $b=3$ ，那么即使在 $t=1$ 的情况下，A也不愿意发送 $m=1$ （因为现在他最希望的是 $y=4$ ），刚才的均衡不成立
- 廉价话语模型可应用于有某种利益一致性的博弈者间的互动
 - 咨询专家：例如领导与参谋，病人与医生，等等
 - 家人、朋友间

更一般的“廉价话语”模型（连续型）

- 博弈设定与前面相似，A了解客观状况 t ，可发送消息 m ，B接到 m 后采取行动 y ；这里 m 和 y 是 $[0, 1]$ 上的实数
- 公共前提： t 是均匀分布在 $[0, 1]$ 区间上的随机变量
- B的收益是： $u_B = -(y - t)^2$
 - 对于B而言， y 离 t 越近，收益越高
- A的收益是： $u_A = -(y - t - b)^2$
 - 对于A而言， y 离 $t+b$ 越近，收益越高




讲真话与讲废话


- A讲真话的均衡不存在
 - 给定A讲真话，发送 $m=t$ ，那么B相信 $t=m$ ，最优反应是 $y=m$
 - 但如果B的策略是 $y=m$ ，A的最优策略就不是 $m=t$ ，而是 $m=t+b$
- A讲废话的均衡总是存在
 - 无论A了解到 t 的真实值是多少，他总是随机发送 $m \in [1, 0]$
 - B总是忽略 m ，根据前提概率相信 $E(t)=1/2$ ，从而选择 $y=1/2$
 - 最小化 $E[(y-t)^2]$ 的一阶条件是 $y=E(t)$ ，课后可自己核查
 - 无论 b 的取值，讲废话的均衡总是存在

有着部分信息传递的均衡

- A根据某个阈值 t^* 发送（两种）消息：如果 $t \leq t^*$ ，发送 $m=0$ ，如果 $t > t^*$ ，发送 $m=1$




- B的信念
 - 如果收到 $m=0$ ，认为 t 均匀分布在 $[0, t^*]$ 上
 - 如果 $m=1$ ，认为 t 均匀分布在 $(t^*, 1]$ 上
 - 收到任何其他 m ，认为 $t=t^*/2$ （也可规定此时持 $m=0$ 时或 $m=1$ 时的信念）
- B的策略
 - 如果收到 $m=0$ ，选择 $y = t^*/2$
 - 如果 $m=1$ ，选择 $y = (1+t^*)/2$
 - 任何其他 m ，选择 $y = t^*/2$ （若持其他信念，可相应选择）




- 给定A的策略，B的信念和B的策略没有问题
- 给定B的策略，A的策略是否是他的最优选择？(需要 $t^*=?$)
- A的策略要是他的最优选择，意味着
 - 当 $t \leq t^*$ 时，他偏好 $y = t^*/2$ 超过（大于等于）他偏好 $y = (1+t^*)/2$
 - 当 $t > t^*$ 时，他偏好 $y = (1+t^*)/2$ 超过（大于等于）他偏好 $y = t^*/2$

- 对于A
 - 当 $t \leq t^*$ 时，他偏好 $y = t^*/2$ 超过(\geq)他偏好 $y = (1+t^*)/2$
 - 当 $t > t^*$ 时，他偏好 $y = (1+t^*)/2$ 超过(\geq)他偏好 $y = t^*/2$
- 我们知道A的收益在 $t+b$ 处最大，离 $t+b$ 越近收益越大，越远越小
- 以上就意味着： $t \leq t^*$ 时， $t+b$ 离 $t^*/2$ 更近； $t > t^*$ 时， $t+b$ 离 $(1+t^*)/2$ 更近
- 那么当 $t=t^*$ 时， $t+b$ 正好处在两者中间



- 即是说 $t^* + b = \frac{1}{2} \left(\frac{t^*}{2} + \frac{1+t^*}{2} \right)$, 可解出 $t^* = 1/2 - 2b$


- 意味着，A可以采用阈限值 $t^* = 1/2 - 2b$ ，根据 t 在 t^* 左边或右边，发送两个不同信号




- 具体的 t^* 值取决于 b 的值
 - 当 $b=1/16$ ， $t^*=3/8$ ；当 $b=1/8$ 时， $t^*=1/4$ ；等等
- 可以看到，要保证 $t^*>0$ ， b 必须 $< 1/4$ ，即A和B的利益不能相差太远，这样的（实现了部分信息传递的）均衡才能成立

发送K个消息

- 是否还可以发送更多（更精确的）消息？
- A采用K-1个阈限值 $t_1 < t_2 < \dots < t_{K-1}$ 将区间 $[0, 1]$ 划分成K个区域



- A: 当 $t_{r-1} \leq t < t_r$, 发送 m_r , ($r = 1, \dots, K$)
- B: 当收到 m_r , 相信 t 均匀分布在 $[t_{r-1}, t_r)$ 上, 选择 $y = \frac{1}{2}(t_{r-1} + t_r)$
- 能否构成均衡? K 可以取多大?
- B 的信念和策略没有问题, A 的策略成立的条件?



A: 当 $t_{r-1} \leq t < t_r$, 发送 m_r

B: 当收到 m_r , 相信 t 均匀分布在 $[t_{r-1}, t_r)$ 上, 选择 $y = \frac{1}{2}(t_{r-1} + t_r)$

- A的以上策略要为最优, 意味着当 t 在第 r 个区间上他宁愿发送 m_r , 而当 t 在第 $r+1$ 个区间上他宁愿发送 m_{r+1} , 也就是说
 - 当 $t_{r-1} \leq t < t_r$, 他偏好 $y = \frac{1}{2}(t_{r-1} + t_r)$ 超过 (\geq) 他偏好 $y = \frac{1}{2}(t_r + t_{r+1})$; 意味着 $t+b$ 离前者更近
 - 当 $t_r \leq t < t_{r+1}$, 他偏好 $y = \frac{1}{2}(t_{r-1} + t_r)$ 不如 (\leq) 他偏好 $y = \frac{1}{2}(t_r + t_{r+1})$; 意味着 $t+b$ 离后者更近
 - 可知, 当 $t = t_r$, $t+b$ 正好在两者中间, $t_r + b = \frac{1}{2}[\frac{1}{2}(t_{r-1} + t_r) + \frac{1}{2}(t_r + t_{r+1})]$
- 可以解出: $t_{r+1} - t_r = t_r - t_{r-1} + 4b$

- $t_{r+1} - t_r = t_r - t_{r-1} + 4b$ ，意味着第 $r+1$ 个区间比第 r 个区间长 $4b$
- 由所有区间总长度之和为1，可知

$$t_1 + (t_1 + 4b) + (t_1 + 8b) \dots + (t_1 + (K - 1)4b) = 1$$

$$Kt_1 + 4b(1 + 2 + \dots + K - 1) = 1$$

$$Kt_1 + 2bK(K - 1) = 1 \quad \rightarrow \quad t_1 = \frac{1 - 2bK(K - 1)}{K}$$

- 显然，给定 b ，任何整数 K 只要满足 $2bK(K - 1) < 1$ ，都可以建立起传送 K 个信息的均衡
- b 越小，可以支持的 K 越大，可以传递的信息越精确
 - 要建立 $K=3$ 的均衡，需要 $b < 1/12$,
 - 想要构建 $K=6$ 的均衡，需要 $b < 1/60$...
- 即：双方的利益的一致性越高，可传递的信息越多（越精确）