

# 空间广义线性混合模型及其在预测流行病中的应用

Spatial Generalized Linear Mixed Models with Application to Prevalence Mapping

---

黄湘云 李再兴

2018 年 5 月

理学院  
中国矿业大学（北京）

## 1 引言

- 研究意义
- 文献综述
- 主要内容

## 2 模型 (SGLMM)

- 模型结构
- 计算方法
- 数据分析

## 3 结论与展望

## Examples

- 1 radionuclide concentrations on Rongelap Island
- 2 childhood malaria in the gambia
- 3 Loa loa prevalence in Cameroon and surrounding areas

Diggle *et al.* (2002)


- the effects of child level covariates (age and bed net use)
- village level covariates (the primary health care and greenness of surrounding vegetation)
- separate components for residual spatial
- non-spatial extrabinomial variation

$\mathbb{R}^n$


$$\log\{p_{ij}/(1 - p_{ij})\} = \alpha + \beta'z_{ij} + U_i + S(x_i)$$



## 疟疾流行度与植被关系




谢谢!



**MERKE: Steine sind Perfektionisten!**





**MERKE: Steine sind Perfektionisten!**

Diggle, Peter, Moyeed, Rana, Rowlingson, Barry, & Thomson, Madeleine. 2002. Childhood malaria in the Gambia: a case-study in model-based geostatistics. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, **51**(4), 493–506.