8 kg

LE SQUAT

Fessiers + quadriceps

OBJECTIF Renforcer les jambes et les fessiers en gardant le tronc stable et une amplitude que tu contrôles.



DÉPART
Pieds bien ancrés

DESCENTE
Hanches vers l'arrière et le bas

RETOUR
Debout, bassin sous les côtes

3 s	1 à 2 s	1 s
descendre	remonter	serrer les fessiers

1 Place tes appuis

Pieds un peu plus larges que le bassin, pointes ouvertes de 15 à 30° selon ton confort. Garde le **talon, la base du gros et du petit orteil au sol** ; ne soulève pas les orteils.

2 Prépare le tronc

Haltère près de la poitrine, prise sûre à deux mains. Gaine les abdos, garde les côtes au-dessus du bassin et les épaules détendues, sans tirer exagérément en arrière.

3 Descends en contrôle

Recule et abaisse les hanches en pliant les genoux. Ceux-ci suivent la direction des 2e orteils. Vise les cuisses proches de l'horizontale, **ou arrête plus haut si le dos ou les appuis changent**.

4 Remonte et termine

Pousse dans tout le pied, talons au sol. Expire en remontant. En haut, serre les fessiers 1 seconde, sans avancer le bassin ni te pencher en arrière.

À SURVEILLER

Genoux qui rentrent, talons qui décollent, dos qui s'arrondit ou se creuse : réduis l'amplitude ou la charge.


Confort d'abord : adapte la charge et l'amplitude ; arrête si le mouvement provoque une douleur.

Repères : NASM, Goblet Squat et Biomechanics of the Squat.

LE SQUAT

Repérer les zones qui produisent et contrôlent le mouvement

Cibles principales **Assistance / stabilité**



VUE DE FACE VUE DE DOS

1 Quadriceps

À l’avant des cuisses. Ils étendent les genoux pour te faire remonter.

2 Grands fessiers

À l’arrière du bassin. Ils participent au redressement des hanches.

3 Abdominaux

Droit de l’abdomen et obliques : ils stabilisent le tronc pendant le mouvement.

4 Muscles du dos

Les érecteurs du rachis aident à maintenir la colonne stable, sans creuser davantage le dos.

Les cuisses et les fessiers produisent la remontée ; le tronc maintient la posture. Ne cherche pas à provoquer une sensation dans les lombaires.

Localisation schématique, non exhaustive ; les couleurs ne mesurent pas l’intensité du travail.

NASM : Goblet Squat ; Biomechanics of the Squat.

6 kg*

TIRÉ-POUSSÉ ÉPAULES

Montée aux épaules + développé

OBJECTIF Utiliser une impulsion des jambes pour amener les poids aux épaules, puis pousser sans creuser le bas du dos.



IMPULSION
Petite flexion des jambes

AUX ÉPAULES
Stabilise le bassin et le tronc

POUSSÉE
Poids au-dessus du corps

Dynamique monter aux épaules

Stable avant de pousser

Contrôlé redescendre

1 Installe-toi

Pieds largeur d’épaules, haltères près des cuisses, mains bien fermées et poignets droits. Fléchis légèrement les hanches et les genoux ; garde les pieds au sol.

2 Amène aux épaules

Pousse dans le sol et redresse les jambes pour donner l’impulsion. Guide les haltères près du corps jusqu’aux épaules. Stabilise-les ; ne donne pas de coup de reins.

3 Gaine puis pousse

Contracte abdos et fessiers en continuant à respirer. Pousse vers le haut, coudes légèrement en avant. Laisse les omoplates accompagner les bras ; ne les bloque pas vers le bas.

4 Reviens sans lâcher

Redescends aux épaules, puis aux cuisses. Garde les côtes au-dessus du bassin. **Pas d’angle de 85° imposé** : réduis charge ou amplitude si tu dois te cambrer.

DEUX PRÉCISIONS

Le geste décrit est un épaulé-développé, distinct du thruster classique. *Les 6 kg sont à préciser : au total ou par haltère.


Confort d’abord : adapte la charge et l’amplitude ; arrête si le mouvement provoque une douleur.

Repères : ACE, Muscle Mechanics: The Shoulders ; NASM, Shoulder Mobility.

TIRÉ-POUSSÉ ÉPAULES

Repérer les zones qui produisent et contrôlent le mouvement

Cibles principales **Assistance / stabilité**



VUE DE FACE VUE DE DOS

1 Deltoïdes

Surtout l’avant et le côté des épaules : ils élèvent les bras lors de la poussée.

2 Triceps

À l’arrière des bras. Ils tendent les coudes pour pousser les haltères.

3 Cuisses et fessiers

Quadriceps et grands fessiers donnent l’impulsion pour amener les poids aux épaules.

4 Tronc et omoplates

Abdominaux : bassin stable. Trapèzes et dentelé antérieur : accompagnement des omoplates.

Le rôle change selon la phase : les jambes donnent l’impulsion, puis épaules et triceps poussent. Le gainage limite la cambrure.

Localisation schématique, non exhaustive ; les couleurs ne mesurent pas l’intensité du travail.

ACE : Smart Shoulder Solutions ; Muscle Mechanics: The Shoulders.

6 kg

ROWING « TONDEUSE »

Tirage unilatéral avec appui

OBJECTIF Faire travailler le grand dorsal et les muscles autour des omoplates, avec un buste stable. Le biceps participe normalement au tirage.





BRAS ALLONGÉ

Main + genou sur le banc, pied au sol

COUDE VERS LA HANCHE

Le buste reste immobile

Sans à-coup	Buste fixe	3 s
tirer	en haut	redescendre

1 Crée trois appuis

Pose main et genou gauches sur un banc stable ; pied droit au sol, légèrement en arrière. Main sous l'épaule, genou sous la hanche. Buste presque horizontal, nuque dans son prolongement.

2 Tiens et prépare

Prends l'haltère dans la main droite, **doigts et pouce refermés autour du manche**, sans crispation inutile. Gaine le tronc. Regarde le sol devant le banc, sans relever la tête.

3 Conduis le coude

Amorce avec l'omoplate puis tire le coude vers la hanche droite, près du flanc. Arrête avant que le buste tourne ou que l'épaule monte. Ne cherche pas à supprimer le travail du biceps.

4 Redescends lentement

Allonge le bras en 3 secondes, sans laisser tomber la charge ni vriller le dos. Termine les répétitions d'un côté, puis inverse main, genou et pied d'appui pour l'autre côté.

LE REPÈRE CLÉ

Le coude se déplace ; le bassin et le buste ne tournent pas. Si tu dois donner de l'élan, allège la charge.


Confort d'abord : adapte la charge et l'amplitude ; arrête si le mouvement provoque une douleur.

Repère : ACE Exercise Library, Single-arm Row.

ROWING « TONDEUSE »

Repérer les zones qui produisent et contrôlent le mouvement

Cibles principales **Assistance / stabilité**



VUE DE FACE VUE DE DOS

1 Grand dorsal

Sur les côtés du dos. Il ramène le bras vers le tronc et le coude vers la hanche.

2 Autour des omoplates

Trapèzes moyens et inférieurs, avec les rhomboïdes situés dessous : ils contrôlent les omoplates.

3 Bras et arrière d’épaule

Les biceps plient le coude ; les deltoïdes postérieurs aident à ramener le bras en arrière.

4 Abdominaux

Ils aident à résister à la rotation et à garder le bassin et le buste stables.

Les deux côtés sont dessinés pour les repérer. Dans le rowing unilatéral, tu tires d’un côté à la fois. Le biceps aide normalement : inutile de l’exclure.

Localisation schématique, non exhaustive ; les couleurs ne mesurent pas l’intensité du travail.

ACE : Single-arm Row ; Shoulder Stabilization. NASM : Row Close Grip.

8 kg

MONTÉES SUR POINTES

Mollets + contrôle des chevilles

OBJECTIF Renforcer les mollets et contrôler la montée comme la descente, sans rebond ni bascule des chevilles.



DÉPART
Pieds parallèles, largeur du bassin

EN HAUT
Talons levés, corps vertical

DÉTAIL
Chevilles dans l’axe

1 s	2 s	3 s
monter	tenir en haut	redescendre

1 Grandis-toi

Tiens un haltère de 4 kg dans chaque main, bras le long du corps. Fixe un point devant toi. Garde le tronc droit et les épaules détendues, sans gonfler exagérément la poitrine.

2 Monte verticalement

Pousse sur l’avant des pieds, en gardant la base du gros orteil en appui. Monte les talons en 1 seconde. Genoux presque tendus ; les chevilles ne basculent ni dehors ni dedans.

3 Tiens deux secondes

Maintiens la position haute pendant 2 secondes complètes. Contracte les mollets tout en gardant l’équilibre et en respirant. Le corps reste dans son axe, sans se balancer.

4 Repose en douceur

Redescends en 3 secondes jusqu’à effleurer le sol avec les talons. Repars sans rebond. Si l’équilibre est difficile, commence sans poids près d’un appui stable.

LE REPÈRE CLÉ

Ce sont les talons qui montent : garde l’avant du pied au sol. Une petite amplitude maîtrisée vaut mieux qu’un mouvement instable.


Confort d’abord : adapte la charge et l’amplitude ; arrête si le mouvement provoque une douleur.

Repère : Mayo Clinic, Calf raise with dumbbell.

MONTÉES SUR POINTES

Repérer les zones qui produisent et contrôlent le mouvement

Cibles principales — Couches montrées séparément



VUE ARRIÈRE : COUCHE SUPERFICIELLE — COUCHE PROFONDE

1 Gastrocnémiens

Les deux reliefs visibles du mollet. Très sollicités quand tu montes sur pointes avec les genoux presque tendus.

2 Soléaire

Sous les gastrocnémiens, retirés sur la vue de droite. Il participe lui aussi à la montée des talons.

Les deux forment le triceps sural

Ils transmettent leur force au pied par le tendon d’Achille. Le tendon, laissé en gris, n’est pas un muscle.

Le travail vient de l’arrière des jambes. Garde la montée et la descente contrôlées ; ne cherche pas le rebond du tendon.

Localisation schématique, non exhaustive ; les couleurs ne mesurent pas l’intensité du travail.

Mayo Clinic : Calf raise with dumbbell ; NASM : Calf Training.

Sans charge

LE DEADBUG

Gainage : contrôler le creux lombaire

OBJECTIF Bouger un bras et la jambe opposée tout en gardant le bassin stable et le bas du dos au contact du sol.





POSITION DE DÉPART

Hanches et genoux à 90°, bras vers le plafond

BRAS + JAMBE OPPOSÉS

En orange : le couple de membres qui s’allonge

Lent	En expirant	Alterné
allonger	garder le dos posé	revenir puis changer

1 Installe-toi sur le dos

Pose la tête et les épaules au sol. Place les genoux au-dessus des hanches, pliés à 90°, tibias parallèles au sol. Tends les bras vers le plafond.

2 Pose le bas du dos

Expire doucement et engage les abdos pour garder un contact lombaire confortable avec le tapis. **Ne force pas l’écrasement du dos** et ne bloque pas ta respiration.

3 Allonge en opposition

Éloigne lentement la jambe droite et le bras gauche. L’autre genou reste au-dessus de la hanche et l’autre bras vers le plafond. Le bassin ne roule pas ; les membres restent au-dessus du sol.

4 Reviens puis alterne

Reprends la position de départ, puis allonge jambe gauche et bras droit. Si le dos se creuse ou décolle, réduis la descente. Plus facile : garde le genou plié et approche seulement le talon du sol.

LE REPÈRE CLÉ

Arrête l’allongement dès que le bas du dos perd son contact. L’amplitude vient après la stabilité, jamais l’inverse.


Confort d’abord : adapte la charge et l’amplitude ; arrête si le mouvement provoque une douleur.

Repère : NASM Exercise Library, Dead Bug.

LE DEADBUG

Repérer les zones qui produisent et contrôlent le mouvement

Cibles principales — Couches montrées séparément



COUCHE SUPERFICIELLE — COUCHE PROFONDE

1 Droit de l’abdomen

Sur l’avant du ventre. Il aide à empêcher le bas du dos de se creuser pendant l’allongement.

2 Obliques

Sur les côtés du ventre. Ils participent au gainage et limitent la rotation du bassin.

3 Transverse

Couche profonde, représentée à droite. Ses fibres entourent le ventre et participent à sa stabilisation.

Le rôle des membres

Bras et jambes créent la difficulté ; l’objectif principal reste de maintenir le tronc stable.

Ici, les abdominaux travaillent surtout pour empêcher un mouvement du tronc. Il n’est pas nécessaire de relever la tête ou de faire un crunch.

Localisation schématique, non exhaustive ; les couleurs ne mesurent pas l’intensité du travail.

NASM Exercise Library : Dead Bug.

Sans charge

LE « W » AU SOL

Contrôle des omoplates

OBJECTIF Renforcer les muscles qui contrôlent les omoplates, sans soulever le buste ni crisper la nuque.





VUE DU DESSUS

Bras pliés en W, front sur la serviette

PETIT DÉCOLLEMENT

Mains et coudes ensemble ; buste au sol

Quelques cm	2 s	Doucement
soulever	maintenir	reposer

1 Allonge-toi à plat ventre

Place le front sur une serviette pliée pour garder la nuque dans le prolongement du dos. Laisse le ventre, le bassin et les jambes posés sur le tapis.

2 Dessine un W

Écarte un peu les bras du tronc et plie les coudes. Les mains se placent de part et d'autre de la tête. Garde les poignets droits et les épaules détendues.

3 Soulève très peu

Rapproche doucement les omoplates et décolle mains et coudes ensemble de quelques centimètres, **jusqu'à 3 à 5 cm si confortable**. Le front et le buste restent posés ; ne cambre pas.

4 Tiens puis repose

Maintiens 2 secondes en respirant, puis redescends lentement. Inutile de serrer au maximum ni de chercher à monter haut. Réduis le décollement si tu crispes le cou ou sens une gêne.

LE REPÈRE CLÉ

Un petit mouvement des bras, sans mouvement du dos. Garde le front posé et le cou relâché pendant toute la répétition.


Confort d'abord : adapte la charge et l'amplitude ; arrête si le mouvement provoque une douleur.

Repères : NASM, Shoulder Mobility (Y-T-W) ; descriptif fourni adapté.

LE « W » AU SOL

Repérer les zones qui produisent et contrôlent le mouvement

Cibles principales **Assistance / stabilité**



COUCHE SUPERFICIELLE COUCHE PROFONDE

1 Trapèzes moyens / inférieurs

Entre les omoplates et vers le milieu du dos. Ils participent au rapprochement et au contrôle des omoplates.

2 Rhomboïdes

Sous les trapèzes, visibles à droite. Ils relient les omoplates à la colonne et aident à les rapprocher.

3 Deltoïdes postérieurs

À l’arrière des épaules. Ils assistent le petit décollement des bras.

4 Coiffe des rotateurs

Notamment infra-épineux et petit rond, derrière l’épaule : ils aident à stabiliser et à orienter le bras.

Cherche un travail contrôlé entre les omoplates et derrière les épaules. Le cou reste relâché et le buste reste posé au sol.

Localisation schématique, non exhaustive ; les couleurs ne mesurent pas l’intensité du travail.

Aurora Health Care : Prone Scapular Stabilization Series ; ACE : Shoulder Stabilization.