






a
b
c
d
e
BICc
440
435
430
425
0.25
0.50
0.75
1.00
Ω_λ
0.5
1.0
Ω_p
5
6
7
8
β_{pop}
0.3
0.6
0.9
Ω_β
1.25
1.50
1.75
2.00
$t_{a,\,pop}$
0.5
1.0
1.5
2.0
Ω_{ta}
100
200
300
400
m_{pop}
2
3
4
Ω_m
5
6
7
8
9
10
$N_{p,\,pop}$
1.5
2.0
2.5
Ω_{NP}



f
Regime
Immune control
Reduced reservoir
30
100
300
1000
λ



g
5
7
10
β (x 10^{-7})



h
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
t_a



i
10^{-4}
10^{0}
10^{4}
10^{8}
m



j
1
3
10
p



k
10^{3}
10^{5}
10^{7}
10^{9}
N_p



l
Control
TLR7
15
19
λ EBE in immune control regime
λ EBE in reduced reservoir regime
100
200
300
400



m
15
19
β EBE in immune control regime (x10^{-7})
β EBE in reduced reservoir regime (x10^{-7})
5
6
7
8
9
10



n
19
15
t_a EBE in immune control regime
t_a EBE in reduced reservoir regime
0.1
1
10
100


o
15
19
m EBE in immune control regime
m EBE in reduced reservoir regime
10^{-2}
10^{0}
10^{2}
10^{4}
10^{6}


p
15
19
p EBE in immune control regime
p EBE in reduced reservoir regime
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0


q
15
19
N_p EBE in immune control regime
N_p EBE in reduced reservoir regime
10^{5}
10^{6}
10^{7}


r
15
19
Viral load (copies/ml)
10^{6}
10^{4}
10^{2}
10^{0}
0
30
60
90
Time after ART stop (days)


s
15
19
Precursor Immune Cells
10^{8}
10^{6}
10^{4}
10^{2}
0
30
60
90
Time after ART stop (days)