

Analisi II

Università di Verona Imbriani Paolo - VR500437 Professor Zivcovich Franco 26 marzo 2025

Indice

1	Equ	Equazioni differenziali			
	1.1	Model	li differenziali	3	
	1.2	Equaz	ioni differenziali di primo ordine	6	
		1.2.1	Generalità	6	
		1.2.2	Equazioni a variabili separabili	7	
	1.3	Equaz	ioni lineari del primo ordine	9	
	1.4	Equaz	ioni differenziali del secondo ordine	11	
		1.4.1	Generalità	11	
		1.4.2	La struttura dell'integrale generale	14	
		1.4.3	Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti	15	
		1.4.4	Equazioni lineari del secondo ordine non omogenee: Metodo di somiglianza $$.	16	
2	Cal	colo in	finitesimale per le curve	19	
	2.1	Richia	ami di calcolo vettoriale	19	
	2.2	Funzio	oni a valore vettoriale, alcune definizioni	20	
	2.3	Calcol	o differenziale e integrale per funzioni a valori vettoriali	20	
	2.4	Curve	regolari	21	
	2.5	Lungh	nezza di un arco di curva	23	
	2.6		ametro arco	24	
	2.7	Integr	ali di linea	25	

1 Equazioni differenziali

1.1 Modelli differenziali

I fisici, per descrivere dei fenomeni, usano la matematica come strumento per formalizzare dei modelli naturali e in particolare vorrei concentrarmi sull'uso delle equazioni differenziali. Per esempio, si denota x(t) lo spostamento nel tempo. Con la derivata prima x'(t) si denota la velocità della particella in quell'istante e con la derivata seconda x''(t) l'accelerazione. Quindi quando andiamo a tradurre matematicamente le leggi che governano modelli naturali può essere naturale dover lavorare con equazioni che coinvolgono una funzione incognita e qualcuna delle sue derivate.

Esempio 1.1

La seconda legge del moto di Newton F=ma, che stabilisce la posizione x(t) al tempo t di un corpo di massa m costante, soggetto a una forza F(t), deve soddisfare l'equazione differenziale:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = F(t)$$
 equazione del moto

Quindi le equazioni differenziali nascono per descrivere fenomeni fisici e naturali. Possono essere classificate in modi diversi. Abbiamo infatti:

1. Equazioni differenziali ordinarie (ODE) se vengono coinvolte solo le derivate rispetto ad una sola variabile oppure equazioni differenziali parziali (PDE) se vengono coinvolte derivate parziali dell'incognita rispetto a più variabili.

Esempio 1.2

L'equazione:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

rappresenta l'equazione delle onde che modellizza lo spostamento trasversale u(x,t) nel punto x al tempo t di una corda tesa che può vibrare.

2. Classificazione in base all'ordine: l'ordine di una ED è l'ordine massimo di derivazione che compare nell'equazione.

Esempio 1.3

L'equazione:

$$\frac{dy^2}{dt^2} + ty^3 - \cos y = \sin t \quad \text{è di ordine 2}$$

$$\frac{d^3y}{dt^3} - 2t \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = y \frac{dy^2}{dt^2} - e^t \quad \ \, \text{\`e di ordine 3}$$

Possiamo dunque formalizzare i concetti finora introdotti attraverso la seguente definizione:

☼ Definizione 1.1: Equazione differenziale

Si dice equazione differenziale di ordine n un'equazione del tipo

$$F(t, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 (1.1.1)$$

dove y(t) è la funzione incognita e F è una funzione assegnata delle n+2 variabili $t,y,y',\ldots,y(n)$ a valori reali.

Si dice **ordine** di un'equazione differenziale il massimo ordine di derivazione che compare nell'equazione.

Si dice soluzione (o curva integrale) di (1.1.1) nell'intervallo $I \subset \mathbb{R}$ una funzione φ , definita almeno in I e a valori reali per cui risulti:

$$F(t, \varphi'(t), \varphi''(t), \dots, \varphi^{(n)}(t)) = 0 \quad \forall t \in I$$

Infine si dice integrale generale dell'equazione (1.1.1) una formula che rappresenti la famiglia di tutte le soluzioni dell'equazione (1.1.1), eventualmente al variare di uno o più parametri in essa contenuti.

Esempio 1.4

Consideriamo una popolazione di individui, animali o vegetali che siano, e sia N(t) il numero degli individui. Osserviamo che N è funzione di del tempo t, assume solo valori interi ed è a priori una funzione discontinua di t; tuttavia può essere approssimata da una funzione continua e derivabile purché il numero degli individui sia abbastanza grande. Supponiamo che la popolazione sia isolata e che la proporzione degli individui in età riproduttiva e la fecondità siano costanti. Se escludiamo i casi di morte, immigrazione, emigrazione, allora il tasso di accrescimento coincide con quello di natalità e se indichiamo con λ il tasso specifico di natalità (i.e. il numero di nati per unità di tempo) l'equazione che descrive il modello diventa:

$$\frac{dN}{dt} = \lambda N(t)$$

Questo processo risulta realistico solo in popolazioni che crescono in situazioni ideali e sono assenti tutti i fattori che ne impediscono la crescita.

La stessa equazione compare anche in altri modelli relativi a sistemi fisiologici ed ecologici.

Esempio 1.5

Studiamo ora il modello di crescita (dovuto a Malthus, 1978) relativo all'evoluzione di una popolazione isolata in presenza di risorse limitate ed in assenza di predatori o antagonisti

all'utilizzo delle risorse. In questo caso l'equazione che si ottiene è la seguente:

$$\frac{dN}{dt} = \lambda N(t) - \mu N(t)$$

dove come prima λ è il tasso di natalità mentre μ è il tasso di mortalità (cioè rispettivamente il numero di nati e morti nell'unità di tempo). Il numero $\varepsilon = \lambda - \mu$ è detto **potenziale** biologico.

Ci chiediamo ora come possiamo trovare una soluzione del problema studiato nell'Esempio 1.5. Supponiamo per il momento che sia $N \neq 0$. Allora:

$$N = \varepsilon N = \frac{N}{N} = \varepsilon \Longrightarrow \frac{d}{dt}(\log |N|) = \varepsilon,$$

da cui otteniamo:

$$\log |N(t)| = \varepsilon t + c_1 \Longrightarrow |N(t)| = e^{c_1} e^{\varepsilon t} =: k^2 e^{\varepsilon t}$$

dove abbiamo posto $e^{c_1} =: k^2 > 0$ costante positiva e arbitraria. A questo punto allora:

$$N(t) = \pm k^2 e^{\varepsilon t}$$

Quindi possiamo dire sicuramente che:

$$N(t) = Ce^{\varepsilon t} \quad C \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Tutto questo vale se $N \neq 0$; ma è banale verificare che anche N = 0 soddisfa l'equazione di partenza, quindi possiamo dire che l'integrale generale è:

$$N(t) = Ce^{\varepsilon t} = Ce^{(\lambda - \mu)t} \quad C \in \mathbb{R}$$

In particolare dall'ultima riga leggiamo che:

- 1. Se $\lambda > \mu$ allora N(t) è una funzione che cresce in maniera esponenziale.
- 2. Se $\lambda < \mu$ allora N(t) è una funzione che decresce fino ad estinguersi.
- 3. Se $\lambda = \mu$ allora N(t) è una funzione stabile nel tempo.

Osserviamo in particolare che non abbiamo trovato solo una soluzione, ma infinite soluzioni, dipendenti da una costante arbitraria.

1.2 Equazioni differenziali di primo ordine

1.2.1 Generalità

Le equazioni differenziali di primo ordine sono le più semplici da trattare e sono di fondamentale importanza in quanto sono alla base di molte applicazioni pratiche. Esse sono della forma:

$$F(t, y, y') = 0 (1.2.1)$$

con F funzione assegnata delle tre variabili t, y, y' a valori reali.

Esempio 1.6

La ricerca delle primitive di una funzione f continua su un intervallo I equivale a risolvere l'equazione differenziale y'(t) = f(t) che ammette infinite soluzioni del tipo

$$y(t) = \int f(t) dt + C \qquad C \in \mathbb{R}$$

Si dimostra che l'insieme delle soluzioni di una EDO del primo ordine è costituito da una famiglia di funzioni dipendenti da un parametro $C: t \mapsto \varphi(t; c)$. Tale famiglia prende il nome di **integrale generale** dell'equazione differenziale. La condizione supplementare $y(t_0) = y_0$ permette di selezionare una soluzione specifica.

🗘 Definizione 1.2: Problema di Cauchy

Il problema di risolvere il seguente sistema di equazioni:

$$\begin{cases} F(t, y, y') = 0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$
 (1.2.2)

prende il nome di problema di Cauchy.

☼ Definizione 1.3: Forma Normale

Un'equazione differenziale ordinaria del primo ordine si dice in **forma normale** se è scritta nella forma:

$$y'(t) = f(t, y)$$
 (1.2.3)

Per equazioni di questo tipo si può assicurare, sotto larghe ipotesi, che il problema di Cauchy (1.2.2) ammette un'unica soluzione almeno localmente (cioè per valori di t in un intorno di t_0).

Le soluzioni dell'ED espresse dall'integrale generale potrebbero talvolta essere definite su insiemi diversi a seconda del valore della costante o anche su insiemi più complicati di un intervallo (es. $t \neq 0$). Tuttavia quando parleremo di soluzione del problema di Cauchy andremo sempre a intendere una funzione che:

- a) è definita su un intervallo I contenente t_0 in cui è assegnata la condizione iniziale.
- b) è derivabile in ogni punto di I e soddisfa l'equazione in ogni punto di I.

Esempio 1.7

Il problema di Cauchy

$$\begin{cases} N'(t) = 3N(t) \\ N(0) = 7 \end{cases}$$

ammette un'unica soluzione data da $N(t)=ce^{3t}$. Imponendo il dato iniziale otteniamo $N(t)=7e^{3t}, \forall t\in\mathbb{R}$ (o \mathbb{R}^+ se si sta parlando di problema di Cauchy che modellizza un fenomeno fisico).

1.2.2 Equazioni a variabili separabili

Le equazioni a variabili separabili sono una particolare clase di ED ordinarie del primo ordine del tipo (1.2.3) che sono caratterizzate dalla presenza di una funzione f prodotto di due funzioni, una della sola variabile t e l'altra solo dell'incognita y. Più nel dettaglio, sono equazioni del tipo:

$$y'(t) = a(t)b(y) \tag{1.2.4}$$

con a funzione continua su un intervallo $I \subset \mathbb{R}$ e b funzione continua su un intervallo $J \subset \mathbb{R}$. Cerchiamo di capire come determinare l'integrale generale di questo tipo di equazioni. Distinguiamo due casi:

- Se \overline{y} è soluzione dell'equazione $b'(\overline{y}) = 0$ allora $y(t) = \overline{y}$ è soluzione dell'ED (1.2.4). Infatti in tal caso si annulla il secondo membro della (1.2.4) e di conseguenza anche il primo membro (perchè la derivata della funzione costante è zero).
- Supponiamo ora che $b(y) \neq 0$. Allora la (1.2.4) può essere riscritta come:

$$\frac{y'}{b(y)} = a(t)$$

Quindi un'ipotetica soluzione soddisfa l'identità:

$$\int \frac{y'(t)}{b(y(t))} dt = \int a(t) dt + C$$

Con C costante arbitraria. Ora si può effettuare il cambio di variabile dove y'(t)dt = dy:

$$\int \frac{dy}{b(y)} = \int a(t) \ dt + C$$

Quindi questo è l'integrale generale dell'equazione (1.2.4). Se B(y) è una primitiva di $\frac{1}{b(y)}$ e A(t) è una primitiva di a(t), allora l'integrale generale della ED è assegnato dall'equazione (in

forma implicita):

$$B(y) = A(t) + C$$
 con C costante arbitraria

Osserviamo che non è detto che si riesca a ricavare y esplicitamente o a ridurre la precedente equazione in forma normale. In generale, per le equazioni a variabili separabili, vale il seguente:

Teorema 1.2.1

Si consideri il seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = a(t)b(y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

con a continua in un intorno I di t_0 e b continua in un intorno J di y_0 . Allora esiste un intorno di t_0 che denoteremo con $I' \subset I$ e una funzione continua y definita su I' con derivata anch'essa continua su I' tale che y sia soluzione del problema di Cauchy. Inoltre se anche b' è continua su J (o b ha un rapporto incrementale limitato in J anche se non è derivabile) allora tale soluzione è anche unica.

Esempio 1.8

Consideriamo il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = ty^3 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Prima di tutto si osserva che y=0 è integrale singolare per l'equazione data. Quindi se $y \neq 0$, separando le variabili e integrando si ottiene:

$$\int \frac{dy}{y^3} = \int tdt + C$$
$$-\frac{1}{2y^2} = \frac{t^2}{2} + C$$
$$y = \pm \frac{1}{\sqrt{C - t^2}}$$

Imponendo il dato di Cauchy si osserva che l'unica soluzione è quella che si ottiene per k=1 e considerando il segno positivo davanti alla radice, cioè

$$y = \frac{1}{\sqrt{1 - t^2}}$$

Esempio 1.9

Risolvere il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} yy' = 2\\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Integrando ambo i membri della ED proposta si ottiene:

$$\int y \, dy = \int 2 \, dt \Longrightarrow \frac{y^2}{2} = 2t + C \Longrightarrow y = \pm \sqrt{4t + 2C}$$

quindi per ogni $C \in \mathbb{R}$ esistono due soluzioni (corrispondenti ai due segni davanti alla radice) definite solo per $t \geq -\frac{C}{2}$. Imponendo il dato di Cauchy si ottiene $y(0) = \pm \sqrt{2C = 1}$, quindi per compatibilità occorre scegliere il segno positivo davanti alla radice. La soluzione del problema proposto è dunque y = 4t + 1, definita solo per $t \geq -\frac{1}{4}$. Andiamo a controllare se sono soddisfatte le condizioni del teorema: a(t) = 2 che è dunque una funzione continua e derivabile ovunque; b(t) = 1/y che è continua e derivabile se $y \neq 0$. Quindi il problema di Cauchy per questa equazione ha una e una sola soluzione purché la condizione iniziale non sia del tipo $y(t_0) = 0$. Infatti l'equazione non è soddisfatta in questo punto perché si otterrebbe 0 = 2. Quindi il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} yy' = 2\\ y(0) = 1 \end{cases}$$

non ha soluzione. Quindi abbiamo trovato un esempio di problema di Cauchy in cui viene a mancare l'esistenza di soluzioni. In altre situazioni potrebbe venire a mancare l'unicità delle soluzioni, come mostra l'esempio successivo.

1.3 Equazioni lineari del primo ordine

In questa sezione andremo a trattare un caso particolare di ED ordinarie del primo ordine, il caso in cui F sia una funzione lineare rispetto a y e y'. In questo caso tali equazioni si possono scrivere nella forma:

$$a_1(t)y'(t) + a_0(t)y(t) = g(t)$$

con a_1, a_0, g funzioni continue su un intervallo $I \subset \mathbb{R}$. Se il coefficiente $a_1(t)$ non si annulla, allora l'ED lineare si può scrivere nella forma:

$$y'(t) + a(t)y(t) = f(t) (1.3.1)$$

Anche in questo caso supporremo a e f sia funzioni continue su un intervallo $I \subset \mathbb{R}$. Se f non è identicamente nulla, la (1.3.1) è detta **equazione completa**. Se $f \equiv 0$ invece, l'equazione si dice **omogenea** e di solito, vista l'importanza che riveste tale equazione nella struttura dell'integrale generale, si è soliti indicare con una lettera usualmente la z, la soluzione di tale equazione, che

diventa perciò:

$$z'(t) + a(t)z(t) = 0 (1.3.2)$$

Vale il seguente teorema:

Teorema 1.3.1

L'integrale generale dell'equazione completa si ottiene aggiungendo all'integrale generale dell'equazione omogenea una particolare soluzione dell'equazione completa.

Dal teorema 1.3.1 sappiamo dunque che dobbiamo occuparci prima dello studio dell'equazione omogenea e poi alla ricerca di una soluzione particolare dell'equazione completa.

Ricerca dell'integrale generale dell'equazione omeogenea: Sia A(t) una primitiva di a(t) (tale per cui si abbia A'(t) = a(t)). Moltiplichiamo entrambi i membri di (1.3.2) per $e^{A(t)}$; si ottiene:

$$e^{A(t)}z'(t) + a(t)e^{A(t)}z(t) = 0$$

da cui:

$$\frac{d}{dt}[z(t)e^{A(t)}] = 0$$

e cioè se $z(t)e^{A(t)}=C$ che si riscrive come:

$$z(t) = Ce^{-\int a(t) \, dt} \tag{1.3.3}$$

Ricerca di una soluzione particolare dell'equazione completa: Si utilizza il metodo delle variazioni delle costanti. L'idea è di ricercare una soluzione simile alla (1.3.3); stavolta però C non è più una costante, ma una funzione C(t) da determinare. Cerchiamo dunque una soluzione della forma:

$$\overline{y}(t) = C(t)e^{-A(t)}$$

La C(t) deve essere determinata in modo tale che \overline{y} così strutturata sia la soluzione dell'equazione completa (1.3.1). Quindi osserviamo che:

$$\overline{y}'(t) = C'(t)e^{-A(t)} - C(t)a(t)e^{-A(t)}$$

si deduce inserendo le corrispondenti informazioni all'interno dell'equazione completa (1.3.1)

$$e^{-A(t)}[C'(t)-C(t)a(t)]+a(t)C(t)e^{-A(t)}=f(t)$$

cioè

$$e^{-A(t)}C'(t) = f(t)$$

da cui $C'(t) = e^{-A(t)} f(t)$ e dunque:

$$C(t) = \int e^{A(s)} f(s) \ ds$$

Quindi la soluzione particolare dell'equazione completa (1.3.1) è:

$$\overline{y}(t) = e^{-A(t)} \int f(s)e^{A(s)} ds$$

Quindi riassumendo l'integrale generale dell'equazione completa (1.3.1) ha la forma:

$$y(t) = ce^{-A(t)} + e^{-A(t)} \int f(s)e^{A(s)} ds$$
 (1.3.4)

Risoluzione del problema di Cauchy: la costante arbitraria nella (1.3.4) è determinata dalla condizione iniziale $y(t_0) = y_0$. Scegliendo una primitiva tale per cui $A(t_0) = 0$ (cioè $A(t) = \int_{t_0}^{t_1} a(s) \ ds$) l'integrale generale che soddisfa il dato di Cauchy è:

$$y(t) = e^{-A(t)} \left[y_0 + \int_{t_0}^t f(s)e^{A(s)} ds \right]$$
 (1.3.5)

Vale il seguente teorema:

Teorema 1.3.2 Problema di Cauchy per un'equazione differenziale lineare del primo ordine

Siano a, f funzioni continue su un intervallo $I \ni t_0$ e sia $y_0 \in \mathbb{R}$. Il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y'(t) + a(t)y(t) = f(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

ha una e una sola soluzione $y \in C^1(I)$ (dove $C^k(I)$ è l'insieme delle funzioni continue derivabili fino all'ordine k e con tutte le derivate fino all'ordine k continue); tale soluzione è assegnata alla (1.3.5).

1.4 Equazioni differenziali del secondo ordine

1.4.1 Generalità

♦ Definizione 1.4

Un'equazione differenziale ordinaria del secondo ordine è un'equazione lineare se è del tipo:

$$y''(t) + a(t)y'(t) + b(t)y(t) = g(t)$$
(1.4.1)

dove i coefficienti a_i e il termine noto g sono funzioni definite in un certo intervallo I e continue nello stesso intervallo. L'equazione si dice omogenea se g è identicamente nullo; in caso contrario si dice

completa. L'equazione si dice a coefficienti costanti se i coefficienti a_i sono costanti (per inciso, il termine noto può invece dipendere da t); in caso contrario si dice a coefficienti variabili. Infine se a_1 non si annulla mai, l'equazione si può riscrivere in forma nornmale come:

$$y''(t) + a(t)y(t) + b(t)y = f(t)$$
(1.4.2)

Osservazione: consideriamo il seguente operatore

$$L: C^2(I) \to C^0(I)$$

$$L: y \mapsto Ly$$

dove gli spazi $C^k(I)$, sono gli spazi delle funzioni continue derivabili fino all'ordine k e con tutte le derivate fino all'ordine k continue e dove abbiamo indicato con Ly il primo membro dell'equazione (1.4.1). Prima di tutto l'operatore è ben definito, perché se $y \in C^2$ si ha che $Ly \in C^0(I)$ e questo grazie alla continuità dei coefficienti a_i . Inoltre è facile dimostrare che L è un operatore lineare, nel senso che per ogni $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, per ogni $y_1, y_2 \in C^2(I)$ si ha:

$$L(\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) = \lambda_1 L y_1 + \lambda_2 L y_2$$

Questa proprietà dell'operatore L giustifica il motivo per cui l'equazione (1.4.1) è detta lineare.

Esempio 1.10

Il più semplice esempio di equazione differenziale del secondo ordine:


$$y''(t) = 0$$

Essa naturalmente equivale a dire $y'(t) = C_1$ e da cui $Y(t) = C_1t + C_2$, con C_1, C_2 costanti arbitrarie. Quindi le soluzioni di questa equazione sono tutte e soli polinomi di primo grado.

ℰ Esempio 1.11 (Oscillatore armonico)

Consideriamo un punto materiale di massa n che rimane libero di muoversi in linea orizzontale, attaccato a una molla che esercita una forza di richiamo di tipo elastico. Denotiamo con y(t) la posizione del punto sulla retta (rispetto alla configurazione di riposo). Allora si può dimostrare che y soddisfa l'equazione:

$$my'' = -ky$$



dove k > 0 denota la costante elastica del sistema. Siccome ovviamente $m \neq 0$, allora si può riscrivere l'equazione in forma normale come:

$$y'' + \omega^2 y = 0 (1.4.3)$$

dove $\omega^2 = \frac{k}{m} > 0$. L'equazione prende il nome dell'oscillatore armonico. L'equazione (1.4.3) è un'equazione differenziale lineare del secondo ordine omogenea e a coefficienti costanti. Se sul punto agisce una forza esterna (dipendente solo dal tempo t) l'equazione si riscrive come:

$$y'' + \omega^2 y = f(t)$$

nel caso venga presa in considerazione lo smorzamento dovuto all'attrito, l'equazione si trasforma in

$$y'' + hy' + \omega^2 y = 0$$

con h > 0. Sarà chiaro in seguito che l'integrale generale di una qualunque equazione lineare del secondo ordine dipende da due parametri arbitrarie. Quindi per determinare una soluzione specifica è necessario conoscere due condizioni iniziali.

♦ Definizione 1.5

Si dice **problema di Cauchy** per un'equazione differenziale lineare del secondo ordine (per semplicità la consideriamo espressa in forma normale), il problema

$$\begin{cases} y''(t) + a(t)y'(t) + b(t)y(t) = g(t) \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y'_0 \end{cases}$$
 (1.4.4)

Teorema 1.4.1 Esistenza e unicità per il problema di Cauchy (1.4.4)

Siano a, b, f funzioni continue in un intervallo $I \ni t_0$. Allora per ogni $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$ il problema di Cauchy (1.4.4) ha una e una sola soluzione $y \in C^2(I)$.

Questo risultato è analogo al corrispondente enunciato per le equazioni differnziali lineari del primo

ordine. Anche in questo caso, la soluzione sarà ottenuta imponendo le condizioni iniziali nell'espressione che individua l'integrale generale dell'equazione (1.4.1). Quindi il problema si riduce a comprendere come si possa determinare l'integrale generale dell'equazione differenziale lineare del secondo ordine (1.4.1).

1.4.2 La struttura dell'integrale generale

L'equazione Lz = 0 si dice equazione omogenea associata all' equazione completa Ly = f. Il seguente teorema permette di determinare facilmente la struttura dell'integrale generale dell'equazione (1.4.1). Questo risultato non usa il fatto che Ly = f sia un'equazione differenziale e non dipende dall'ordine dell'equazione, sfrutta solamente il fatto che L sia un operatore lineare.

Teorema 1.4.2 Struttura dell'integrale generale dell'equazione linaere completa

Si può dimostrare che:

- 1. L'insieme delle soluzioni all'equazione omogenea Lz = 0 in un dato intervallo I è uno spazio vettoriale di dimensione 2 (sottospazio di $C^2(I)$).
- 2. L'integrale generale dell'equazione completa si ottiene sommando l'integrale generale dell'equazione omeogene e una soluzione particolare dell'equazione completa.

Esempio 1.12

Si consideri l'equazione $t^2z'' - 3tz' + 3z = 0$. Sia $z_1 = t$. Allora $z_1'(t) = 1, z_2''(t) = 0$ da cui $t^20 - 3t + 3t = -3t + 3t = 0$; quindi z_1 è una soluzione dellì'equazione data. Sia ora $z_2 = t^3$. Allora $z_2'(t) = 3t^2, z_2''(t) = 6t$ da cui inserendo le informazioni nell'equazione si ottiene $t^26t - 3t3t^2 + 3t^3 = 6t^3 - 9t^3 + 3t^3 = 0$; quindi z_2 è una soluzione dell'equazione data. Le due soluzioni sono linearmente indipendenti, quindi l'integrale generale dell'equazione data è:

$$z(t) = C_1 t + C_2 t^3$$

al variare di $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Nel caso precendente è particolarmente facile vedere che le due soluzioni proposte sono linearmente indipendenti; In generale può non essere così immediato. Il seguente critico generale permette di decidere qualora due soluzioni proposte siano o meno linearmente indipendenti.

Teorema 1.4.3 Determinante wroskiano e indipendenza

Siano z_1, z_2 due funzioni $C^2(I)$ soluzioni dell'equazione lineare omogenea:

$$Lz \equiv z'' + a(t)z' + b(t) = 0$$

nell'intervallo I. Allora esse sono linearmente indipendenti in $C^2(I)$ se e soltanto se la seguente

matrice:

$$W(t) = \begin{pmatrix} z_1(t) & z_2(t) \\ z'_1(t) & z'_2(t) \end{pmatrix}$$

detta matrice Wronskiana ha determinante diverso da zero per ogni $t \in I$ (dalla regolarità delle soluzioni, è sufficiente che il determinante di tale matrice sia diverso da zero in un punto $t_0 \in I$).

Quindi per determinare l'integrale generale dell'equazione lineare completa occorre:

- 1. Determinare l'integrale generale dell'equazione omogenea, quindi serve determinare due soluzioni $z_1(t), z_2(t)$ dell'equazione omogenea linearmente indipendenti;
- 2. Determinare una soluzione particolare dell'equazione completa. A questo punto l'integrale generale dell'equazione completa è dato da:

$$\overline{y}(t) + C_1 z_1(t) + C_2 z_2(t)$$

al variare di $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

1.4.3 Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti

Consideriamo l'equazione differenziale lineare omogenea del secondo ordine a coefficienti costanti:

$$z''(t) + az'(t) + bz(t) = 0$$
 con a, b costanti

In analogia con il caso delle equazioni differenziali del primo ordine, che ammette gli esponenziali come soluzioni, si cerca anche qui una soluzione del tipo $t\mapsto e^{rt}$ con $r\in\mathbb{C}$. Sostituendo tale soluzione nell'equazione omogenea si ottiene:

$$z'(t) = re^{rt} \qquad z''(t) = r^2 e^{rt}$$

$$e^{rt}(r^2 + ar + b) = 0$$

Siccome l'esponenziale è sempre positiva, affinché l'equazione precedente abbia soluzione è necessario che la costante r sia una radice dell'equazione di secondo grado:

$$r^2 + ar + b = 0$$

che viene detta equazioen caratteristica dell'equazione differenziale. Si possono avere tre casi in base al segno del discriminante:

Discriminante	Soluzione 1	Soluzione 2
$\Delta > 0$	e^{r_1t}	e^{r_2t}
$\Delta = 0$	e^{rt}	te^{rt}
$\Delta < 0$	$e^{\alpha t}\cos\beta t$	$e^{\alpha t}\sin\beta t$

Esempio 1.13

Risolvere il seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} z'' - 2z' - 3z = 0 \\ z(0) = 1 \\ z'(0) = 2 \end{cases}$$

L'equazione proposta è differenziale ordinaria del secondo ordine lineare, a coefficienti costanti e omogenea. La sua equazione caratteristica è:

$$r^2 - 2r - 3 = 0$$

che ha soluzioni $r_1 = 3, r_2 = -1$. Quindi l'integrale generale dell'equazione omogenea è:

$$z(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-t}$$

al variare di $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$. Imponendo le condizioni iniziali si ottiene:

$$z(0) = C_1 + C_2 = 1$$

$$z'(0) = 3C_1 - C_2 = 2$$

da cui

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -C_1 + 3C_2 = 2 \end{cases} \implies \begin{cases} C_1 = \frac{1}{4} \\ C_2 = \frac{3}{4} \end{cases}$$

Quindi la soluzione del problema di Cauchy proposto è:

$$z(t) = \frac{1}{4}e^{3t} + \frac{3}{4}e^{-t}$$

1.4.4 Equazioni lineari del secondo ordine non omogenee: Metodo di somiglianza

Consideriamo l'equazione differenziale lineare del secondo ordine a coefficienti costanti:

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = f(t)$$
 con a, b costanti

nel caso in cui il termine noto f abbia una forma particolare. Un metodo più generale si basa sul metodo di variazione delle costanti, che permette di determinare una soluzione particolare dell'equazione completa. Quando f è semplice si cerca una soluzione che assomiglia nel senso che andremo a specificare:

• Se $f(t) = p_r(t)$ è un polinomio di grado r, si cerca una soluzione che sia anch'essa un polinomio, con le seguenti caratteristiche:

- Se $f(t) = Ae^{\lambda t}$ con $\lambda \in \mathbb{C}$. In tal caso, si cerca una soluzione del tipo: $y(t) = e^{\lambda t} \gamma(t)$ con $\gamma(t)$ polinomio di grado opportuno.
- Se infine $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ e $2\lambda + a = 0$ allora si ha $\gamma(t) = A$ da cui:

$$\gamma(t) = \frac{A}{2}t^2 \qquad \overline{y}(t) = \frac{A}{2}t^2e^{\lambda t}$$

Quindi si ha una soluzione particolare:

$$\overline{y}(t) = Ct^2 e^{\lambda t}$$

con $C \in \mathbb{R}$. Osserviamo che in questa classe particolare di termini noti del tipo $Ae^{\lambda t}$ con $\lambda \in \mathbb{C}$ rientrano anche in casi:

$$\cos \omega t, \sin \omega t, e^{\mu t} \cos \omega t, e^{\mu t} \sin \omega t \quad \text{con } \omega \in \mathbb{R}$$

Esempio 1.14

Si trovi una soluzione particolare dell'equazione differenziale:

$$y'' + 3y = t + 2\cos t$$

Per trovare una soluzione particolare dell'equazione non omogenea dobbiamo cercare una funzione f(t) tale che:

$$f(t) = t + 2\cos t$$

Questo termine è la somma di due funzioni:

- t, un polinomio di primo grado
- $2\cos t$, una funzione trigonometrica

Per questo motivo cerchiamo una soluzione particolare come la somma di due soluzioni, ciascuna ciascuna associata a uno dei due termini:

$$y_p = y_{p1} + y_{p2}$$

Quindi andiamo per step e cerchiamo di trovare una soluzione per il termine t e un'altra per il termine $2\cos t$.

• Per il termine t che è un polinomio di primo grado, si cerca una funzione del tipo:

$$y_{A_1}(t) = C_1 t + C_0$$

dove A, B sono coefficienti da determinare. Calcoliamo le derivate:

$$y'_{\Delta 1}(t) = C_1$$

$$y_{A1}^{\prime\prime}(t) = 0$$

Ora sostituiamo le derivate nell'equazione differenziale:

$$y'' + 3y = t$$
$$0 + 3(C_1t + C_0) = t$$
$$3C_1 + 3C_0 = t$$

Quindi $C_1 = 1/3$ e $C_0 = 0$. Quindi la soluzione per il termine t è:

$$y_{p1}(t) = \frac{1}{3}t$$

• Procediamo ora per $2\cos t$ che è una funzione trigonometrica. Si cerca una soluzione del tipo:

$$y_{A2}(t) = A\gamma(t)e^{\lambda t}$$

dove $\gamma(t)$ è ancora sconosciuta, $\lambda = i$ e A = 2. Quindi:

$$y_{A2}(t) = 2\gamma(t)e^{it}$$

Troviamo $\gamma(t)$, dato a=0 e b=3, si ha:

$$\gamma'' + (2\lambda + a)\gamma' + (\lambda^2 + \lambda a + b)\gamma = A$$
$$\gamma'' + 2i\gamma' + 2\gamma = 2$$
$$2\gamma = 2 \Longrightarrow \gamma = 1$$

Quindi la soluzione per il termine $2\cos t$ è:

$$y_{p2}(t) = 2e^{it}$$

Di conseguenza sommando le due soluzioni particolari si ottiene la soluzione particolare dell'equazione non omogenea:

$$y_p(t) = \frac{1}{3}t + 2e^{it}$$

2 Calcolo infinitesimale per le curve

2.1 Richiami di calcolo vettoriale

Per lo studio del calcolo infinitesimale in più variabili occorre un certo uso del calcolo vettoriale. In questo paragrafo andiamo a richiamare le nozioni di base che verranno incontrate nel seguito. Ambientiamo tutto in \mathbb{R}^n ; gli elementi di \mathbb{R}^n li chiamano vettori e vengono indicati con $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Gli x_i , $i = 1, \dots n$ si dicono componenti del vettore. Il modulo di un vettore è definito come:

$$|x| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

mentre si dice un versore un vettore di modulo unitario e si indica con:

$$vers(x) = \frac{x}{|x|}$$

 \mathbb{R}^n è dotato della base canonica:

$$e_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

e ogni vettore $x \in \mathbb{R}^n$ si può scrivere come combinazione lineare della base canonica:

$$x = x_1e_1 + x_2e_2 + \dots + x_ne_n = \sum_{i=1}^n x_je_j$$

I versori della base canonica sono soliti indicati con i, j, k (in \mathbb{R}). Per due vettori $x, y \in \mathbb{R}^n$ si definisce il prodotto scalare:

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

Il risultato di un prodotto scalare è uno scalare. Se $x \cdot y = 0$ allora i due vettori si dicono ortogonali. Si usa la notazione $x \cdot y = |x||y|\cos\theta$, dove θ è l'angolo tra i due vettori.

$$\cos\theta = \frac{u\cdot v}{|u||v|}$$

Infinite introduciamo anche un'altra operazione che agisce tra due vettori di \mathbb{R}^3 e che da come risultato un vettore. Questa operazione è il prodotto vettoriale. Si indica con $u \times v$.

2.2 Funzioni a valore vettoriale, alcune definizioni

♣ Definizione 2.1

Sia $f: A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con A dominio e f la legge che ad ogni elemento di A associa un solo elemento di f(A) (chiamata immagine di A tramite f) anch'esso reale.

- Si dice *funzione ad una variabile* una funzione definita su $A \in \mathbb{R}$.
- Si dice *funzioni di più variabili* una funzione definita su $A \subset \mathbb{R}^n$ con n > 1.
- Si dice **funzioni** a valori reali una funzione che ha immagine $f(A) \subseteq \mathbb{R}$.
- Si dice **funzioni a valori vettoriali** una funzione che ha immagine $f(A) \subseteq \mathbb{R}^n$.

2.3 Calcolo differenziale e integrale per funzioni a valori vettoriali

Concentriamoci ora su elementi del tipo $f:A\subset\mathbb{R}\mapsto\mathbb{R}^m, m>1$. Questo è il caso più semplice di funzioni a valori vettoriali. Nel caso m=2,3 vedremo che le funzioni hanno il significato geometrico di curve nel piano o nello spazio. Sia dunque $r:I\mapsto\mathbb{R}^m$ con $I\subset\mathbb{R}$ un intervallo. Sia $t_0\in I$ e sia $I\in\mathbb{R}^m$.

♦ Definizione 2.2

Si dice che:

$$\lim_{t \to t_0} r(t) = l$$

se

$$\lim_{t \to t_0} |r(t) - l| = 0 \tag{2.3.1}$$

Geometricamente la (2.3.1) significa che la distanza tra r(t) e l tende a zero per t che tende a t_0 e questo è possibile solo se le distanze tra le componenti di r(t) e l tendono a zero rispettivamente. Quindi se $r(t) = (r_1(t), r_2(t), \ldots, r_m(t))$ con $r_i(t)$ funzioni a valori reali, si ha:

$$\lim_{t \to t_0} r(t) = l \iff \lim_{t \to t_0} r_i(t) = l_i \quad i = 1, \dots, m$$
(2.3.2)

Esempio 2.1

Sia $r: I \to \mathbb{R}^3$ definita da $r(t) = (\cos t + \pi, e^t - 1, \sin t^2)$. Calcoliamo $\lim_{t\to 0} r(t)$. Dalla (2.3.2) si ha che:

$$\lim_{t \to 0} r(t) = \lim_{t \to 0} (r_1(t), r_2(t), r_3(t)) = \left(\lim_{t \to 0} (\cos t + \pi), \lim_{t \to 0} (e^t - 1), \lim_{t \to 0} (\sin t^2)\right) = (1 + \pi, 0, 0)$$

♪ Definizione 2.3

Sia $r: I \mapsto \mathbb{R}^m$ e sia $t_0 \in I$. Si dice che r è derivabile in t_0 se esiste finito:

$$r'(t) = \lim_{t \to t_0} \frac{r(t_0 + h) - r(t_0)}{h}$$

$$= \left(\lim_{h \to 0} \frac{r_1(t_0 + h) - r_1(t)}{h}, \dots, \lim_{h \to 0} \frac{r_m(t_0 + h) - r_m(t)}{h}\right)$$

$$\stackrel{(2.3.2)}{=} (r'_1(t_0), \dots, r'_m(t_0))$$

I limiti di funzioni a valori vettoriali si fanno componente per componente. Quindi anche la derivata di una funzione a valori vettoriali si calcola si fa componente per componente: il vettore derivata è il vettore delle derivate delle componenti.

♦ Definizione 2.4

Se r è derivabile in tutto I e inoltre la funzione r' è continua in I, si dice che r è di classe $C^1(I)$ e si scrive $r \in C^1(I)$. Analogamente si definiscono le derivate di ordine successivo e le funzioni di classe $C^k(I)$ per k > 1.

Teorema 2.3.1 Teorema fondamentale del calcolo integrale

Se $r:[a,b]\mapsto \mathbb{R}^m$ è di classe $C^1([a,b])$ allora:

$$\int_{b}^{a} r'(t)dt = r(b) - r(a)$$

Un altro risultato importante è il seguente:

$$\left| \int_{a}^{b} r(t)dt \right| \le \int_{a}^{b} |r(t)|dt$$

Osserviamo che il primo membro è l'integrale di una funzione a valori vettoriali, mentre il secondo è l'integrale di una funzione a valori scalari, cioè |r(t)|. In entrambi i casi, i moduli che compaiono nella formula sono moduli di vettori e non valori assoluti.

2.4 Curve regolari

Consideriamo un punto materiale che si muove nello spazio tridimensionale lungo una certa traiettoria; le sue coordinate sono funzioni del tempo, quindi la sua posizione all'istante t può essere descritta come da una funzione di questo tipo:

$$r:[t_1,t_2]\mapsto \mathbb{R}^3$$

dove r = (x, y, z) e

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

con $t \in [t_1, t_2]$. Quindi si può riscrivere:

$$r(t) = x(t)i + y(t)j + z(t)k$$


usando la notazione vettoriale che abbiamo usato in precedenza:

$$r(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

♦ Definizione 2.5:

Sia $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo. Si dice arco di curva continua o cammino in \mathbb{R}^m una funzione $r: I \to \mathbb{R}^m$ che sia continua, nel senso che le sue componenti sono funzioni continue.

Se si pensa alla variabile t come al tempo, allora r(t) è la posizione del punto materiale al tempo t.



♦ Definizione 2.6

Un arco di curva continua si dice **chiusa** se r(a) = r(b) con I = [a, b] (cioè punto iniziale e punto finale coincidono). Si dice **semplice** se non ripassa mai dallo stesso punto. Si dice **piana** se esiste un piano che contiene il suo sostegno.

Si dice **regolare** se l'arco di una curva $r: I \mapsto \mathbb{R}^m$ tale che $r \in C^1(I)$ e $r'(t) \neq 0$ per ogni $t \in I$.

Quindi il vettore derivato esiste in ogni punto, varia con continuità e non è mai nullo. Di

conseguenza, per le curve regolari è ben definito il versore tangente:

$$T(t) = \frac{r'(t)}{|r'(t)|}$$

che inoltre dipende con continuità da t.

2.5 Lunghezza di un arco di curva

Sia $r:[a,b]\mapsto\mathbb{R}^m$ la parametrizzazione di un arco di curva γ continuo e consideriamo una partizione:

$$\mathcal{P} = \{a = t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n_1}, t_n = b\}$$

dell'intervallo [a, b] con $t_0 < t_1 < \cdots < t_n$ non necessariamente equispaziati. Alla partizione \mathcal{P} risulta associata la poligonale inscritta in γ costituita da n segmenti di estremi $R(t_{i-1})$ e $R(t_i)$. Sia $\mathcal{L}(P)$ la lunghezza di tale poligonale, da cui si ha:

$$\mathcal{L}(P) = \sum_{i=1}^{n} |r(t_i) - r(t_{i-1})|$$

Siccome intuitivamente il segmento è la linea più breve che congiunge due punti, l'idea è che $\mathcal{L}(\mathcal{P})$ approssimi la lunghezza di γ ; per cui facendo variare in tutti i modi possibili la partizione \mathcal{P} e prendendo l'estremo superiore delle $\mathcal{L}(\mathcal{P})$ si ottenga la lunghezza dell'arco di curva γ . Si ha perciò la seguente definizione:

♣ Definizione 2.7

Si dice che γ è **rettificabile** se

$$\sup \mathcal{L}(\mathcal{P}) = \mathcal{L}(\gamma) < \infty$$

dove il sup è preso su tutte le partizioni \mathcal{P} dell'intervallo [a,b]. In tal caso si dice **lunghezza** di γ .

Teorema 2.5.1

Sia $r:[a,b]\mapsto \mathbb{R}^m$ la parametrizzazione di un arco di curva γ regolare. Allora γ è rettificabile e:

$$\mathcal{L}(\gamma) = \int_{a}^{b} |r'(t)| dt$$

Una classe particolare di curve piane è data dalle curve che si ottengono come grafici di funzioni di una variabile, ossia y = f(x) per $x \in [a, b]$. In tal caso la curva può essere scritta in forma

parametrica ponendo:

$$\begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases}$$

per $t \in [a, b]$. Una curva espressa come grafico di una funzione f ha le seguenti proprietà:

- 1. è continua se e solo se f è continua in [a, b];
- 2. è regolare se e solo se f è derivabile in [a, b].
- 3. è regolare a tratti se e solo se f è a tratti derivabile in [a, b].
- 4. non è mai chiusa
- 5. è sempre semplice

Nel caso di una curva espressa come grafico di una funzione, per calcolare la lunghezza della curva si usa la formula:

$$\mathcal{L}(\gamma) = \int_{a}^{b} \sqrt{1 + f'(t)^{2}} dt = \int_{a}^{b} ||(1, f'(t))|| dt$$

Curve piane in forma polare: una forma alternativa per descrivere una curva piana è data dalle curve in forma polare. Una curva in forma polare è data da un'equazione del tipo:

$$\rho = f(\theta), \qquad \theta \in [\theta_1, \theta_2]$$

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

da cui possiamo osservare che:

$$r'(\theta) = (f'(\theta)\cos\theta - f(\theta)\sin\theta, f'(\theta)\sin\theta - f(\theta)\cos\theta)$$

da cui

$$|r'(\theta)| = \sqrt{f'(\theta)^2 + f(\theta)^2}$$

2.6 Il parametro arco

Si osserva che la lunghezza di un arco di una curva $r(\tau)$ per $\tau \in [t_0, t]$ è una funzione di t e si ha

$$s(t) = \int_{a}^{t} |r'(\tau)| d\tau$$

se si è in grado di calcolare esplicitamente tale funzione e poi invertirla, esprimendo t in funzione di s, allora è possibile riparametrizzare la curva in funzione del parametro s detto **parametro arco** o ascissa curvilinea. Il vantaggio è che s è esattamente lo spazio percorso dal punto mobile quando il parametro passa da 0 a s.

2.7 Integrali di linea

🗘 Definizione 2.8: Integrale di linea

Sia $r:[a,b]\mapsto \mathbb{R}^m$ un arco di curva regolare di sostegno γ e sia f una funzione a valori reali, definita su un sottoinsieme $A\subset \mathbb{R}^m$ contenente γ , cioè $f:\mathbb{R}^m\mapsto \mathbb{R}$ con $\gamma\subset A$. Allora si dice integrale di linea (di prima specie) di f lungo γ :

$$\int_{\gamma} f \, ds = \int_{a}^{b} f(r(t))|r'(t)|dt$$

Significato geometrico dell'integrale di linea di prima specie: se m=2, f è positiva e continua e γ è parametrizzata con il parametro arco, il precedente integrale ha un'interessante interpretazione geometrica. Infatti sia S la superficie in \mathbb{R}^3 formata dai segmenti che congiungono i punti di γ con il grafico di f. Visto che γ è parametrizzata con il parametro arco, se pensiamo di sviluppare in un piano (x,y) la superficie S in modo da far coincidere γ con l'asse delle x allora il parametro arco coincide con l'ascissa x e l'integrale $\int_{\gamma} f ds$ rappresenta l'area della superficie sviluppata e quindi l'area della superficie originale.

L'integrale di f di prima specie lungo γ è invariante per parametrizzazioni equivalenti ed anche per cambiamento di orientazione su γ .