

Числовые последовательности и их пределы

Ученик 10-4 класса Паньков М.А. по лекции к.ф.-м.н. Протопоповой Т.В.

от 12 мая 2021 г.

1 Лекция №27

Покажем, что $x_n \rightarrow a$, т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 : \forall n, m > N_0, |x_n - x_m| < \varepsilon$

Имеем:

$\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 : \forall n, m > N_0, |x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$ и

$x_{nk} \rightarrow a$, т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists K_0 : \forall k > K_0, |x_{nk} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$

$|x_n - a| = |x_n - x_{nk} + x_{nk} - a| \leq |x_n - x_{nk}| + |x_{nk} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

$n_k > N_0$

$k > K_0 \Rightarrow n_k > n_{K_0}$

$N = \max(N_0, n_{K_0})$

↓

Пример. $x_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \dots + \frac{\sin n}{2^n}$ — доказать сходимость

Замечание. Другая форма условия Коши: $\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 : \forall n > N_0; \forall p > 0, |x_n - x_{n+p}| < \varepsilon$

$$\begin{aligned} |x_n - x_{n+p}| &= \left| \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \dots + \frac{\sin n}{2^n} - \left(\frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \dots + \frac{\sin n}{2^n} + \dots + \frac{\sin n+p}{2^{n+p}} \right) \right| = \left| \frac{\sin n}{2^n} + \frac{\sin n+1}{2^{n+1}} + \dots + \frac{\sin n+p}{2^{n+p}} \right| \leq \\ &\frac{|\sin n+1|}{2^{n+1}} + \frac{|\sin n+2|}{2^{n+2}} + \dots + \frac{|\sin n+p|}{2^{n+p}} \leq \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+2}} + \dots + \frac{1}{2^{n+p}} = \frac{\frac{1}{2^{n+p+1}} - \frac{1}{2^{n+1}}}{\frac{1}{2} - 1} = \frac{\frac{1}{2^{n+1}}(1 - \frac{1}{2^p})}{\frac{1}{2}} < \frac{1}{2^n} < \frac{1}{n} < \varepsilon \end{aligned}$$

1. Теорема Вейерштрасса

↓

2. Принцип вложенных промежутков

↓

3. Теорема Больцано-Вейерштрасса

↓

4. Критерий Коши