

**Московский научно-исследовательский онкологический  
институт имени П.А. Герцена –  
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения  
«Национальный медицинский исследовательский радиологический центр»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
Российский Центр информационных технологий и  
эпидемиологических исследований в области онкологии**  
***125284 Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 3, (495) 945-11-57, rzto@mail.ru***

---

**Г.В. Петрова, А.Д. Каприн,  
О.П. Грецова, В.В. Старинский**

## **ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ**

**обзор статистической информации за 1993-2013 гг.**

**Под общей редакцией  
чл.-корр. РАН, проф. А.Д. Каприна, проф. В.В. Старинского**

**Москва 2015**

**УДК 616 - 006.04:312.6 (470) «1993-2013»**

**ББК 55.6**

**C59**

Г.В. Петрова, А.Д. Каприн, О.П. Грецова, В.В. Старинский  
Злокачественные новообразования в России  
обзор статистической информации за 1993-2013 гг./ под общей редакцией  
чл.-корр. РАН, проф.А.Д. Каприна, проф.В.В. Старинского  
– М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава  
России, 2015. – 511 с. ISBN 978-5-85502-215-5

В книге в 190 аналитических таблицах представлены данные государственной статистики о среднегодовой численности населения и основных тенденциях динамики среднероссийских показателей заболеваемости, смертности и онкологической помощи больным со злокачественными новообразованиями.

Рассчитаны “грубые” и стандартизованные по полу и возрасту показатели заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований основных нозологических групп в динамике за 20-летний период (1993-2013 гг.). Представлена динамика основных показателей диагностики и сведений о контингенте больных, состоящем на учете онкологических учреждений России, медианы возрастного распределения, среднего возраста, кумулятивного риска заболеть (умереть). Данные представлены по 25 нозологическим формам.

Книга предназначена для врачей-онкологов, эпидемиологов, специалистов раковых регистров и организаторов здравоохранения.

Издается по решению редакционно-издательского совета  
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

Ответственный за издание проф. В.В. Старинский

**ISBN 978-5-85502-215-5 © Коллектив авторов, 2015 г.**

**© МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал  
ФГБУ «НМИРЦ»  
Минздрава России,  
Москва, 2015 г.**

**Уважаемые коллеги!**

*Предлагаемая Вам книга обобщает статистическую информацию по онкологии в массиве населения России за 20-летний период (1993-2013 гг.). В табличной форме представлены сводные данные государственной статистики по онкологии по формам годовой отчетности, собираемой по линиям Минздрава и Росстата.*

*Сотрудники Российского Центра информационных технологий и эпидемиологических исследований в области онкологии в составе МНИОИ им. П.А. Герцена много лет, по поручению Минздрава, осуществляют разработку отчетных форм, инструкций, условий контроля и обеспечение медицинского компонента при приеме отчетов онкологических территориальных учреждений по основным формам государственной онкологической статистики; формирование сводных отчетов по Российской Федерации в целом; расчет и анализ показателей заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований, диагностики, распространенности и лечения; выявление основных тенденций динамики показателей состояния онкологической помощи населению территорий Российской Федерации.*

*Позвольте выразить признательность и благодарность сотрудникам организационно-методических отделов онкологических учреждений России, осуществляющих трудоемкую и сложную работу по регистрации и учету больных со злокачественными новообразованиями, а также разработчикам программного обеспечения Простову М.Ю. и Простову Ю.И.*

*Особую благодарность выражаем коллегам, в разное время занимавшимся в МНИОИ им. П.А. Герцена вопросами учета и мониторинга злокачественных новообразований в России, Харченко Н.В., Мокиной В.Д., Грецовой В.И.*

*Представленный в данном издании анализ показателей онкологической помощи, можно рассматривать как продолжение анализа, изложенного в монографии, подготовленной в МНИОИ им. П.А. Герцена в 1998 г. «Злокачественные новообразования в России в 19080-1995 годах» под редакцией В.И. Чиссова, В.В. Старинского, Л.В. Ременник.*

**Коллектив авторов**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Введение .....</b>	5
<b>Таблицы 1-14. Злокачественные новообразования <i>все (C00-96)</i> .....</b>	9
<b>Таблицы 15-30. Злокачественные новообразования <i>губы, полости рта, глотки (C00-13,46.2)</i> .....</b>	45
<b>Таблицы 31-38. Злокачественные новообразования <i>пищевода (C15)</i> .....</b>	93
<b>Таблицы 39-46. Злокачественные новообразования <i>желудка (C16)</i> .....</b>	117
<b>Таблицы 47-54. Злокачественные новообразования <i>ободочной кишки (C18)</i> .....</b>	141
<b>Таблицы 55-62. Злокачественные новообразования <i>прямой кишки (C19-21)</i> .....</b>	165
<b>Таблицы 63-69. Злокачественные новообразования <i>печени и внутривеночных желчных протоков (C22)</i> .....</b>	189
<b>Таблицы 70-76. Злокачественные новообразования <i>поджелудочной железы (C25)</i> .....</b>	212
<b>Таблицы 77-84. Злокачественные новообразования <i>горлани (C32)</i> .....</b>	235
<b>Таблицы 85-92. Злокачественные новообразования <i>трахеи, бронхов, легкого (C33,34)</i> .....</b>	259
<b>Таблицы 93-99. Злокачественные новообразования <i>костей и суставных хрящей (C40,41)</i> .....</b>	283
<b>Таблицы 100-107. Меланома кожи (C43) .....</b>	306
<b>Таблицы 108-114. Злокачественные новообразования <i>соединительной и других мягких тканей (C46.1,3,7-9;47;49)</i> .....</b>	339
<b>Таблицы 115-122. Злокачественные новообразования <i>женской молочной железы (C50)</i> .....</b>	353
<b>Таблицы 123-130. Злокачественные новообразования <i>шейки матки (C53)</i> .....</b>	363
<b>Таблицы 131-138. Злокачественные новообразования <i>тела матки (C54)</i> .....</b>	373
<b>Таблицы 139-146. Злокачественные новообразования <i>яичника (C56)</i> .....</b>	383
<b>Таблицы 147-154. Злокачественные новообразования <i>предстательной железы (C61)</i> .....</b>	393
<b>Таблицы 155-161. Злокачественные новообразования <i>почки (C64)</i> .....</b>	403
<b>Таблицы 162-169. Злокачественные новообразования <i>мочевого пузыря (C67)</i> .....</b>	426
<b>Таблицы 170-175. Злокачественные новообразования <i>головного мозга (C70-72)</i> .....</b>	450
<b>Таблицы 176-183. Злокачественные новообразования <i>щитовидной железы (C73)</i> .....</b>	464
<b>Таблицы 184-190. Злокачественные новообразования <i>лимфатической и кроветворной ткани (C81-96)</i> .....</b>	480

## **ВВЕДЕНИЕ**

Злокачественные новообразования (ЗНО) – проблема высокой социальной значимости. Они являются одной из основных причин смерти и инвалидизации населения развитых, а в последние годы и развивающихся стран, ведут к значительной утрате трудоспособной части общества. В России более 35% больных с впервые выявленным диагнозом ЗНО находятся в трудоспособном возрасте (15-59 лет). Ежегодно 190 тыс. человек впервые признаются инвалидами по онкологическому заболеванию, из них около 55 тыс. инвалидами I группы. Для 40% больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО документально подтверждается факт стойкой (в большинстве случаев — необратимой) утраты трудоспособности. Доля ЗНО в структуре причин инвалидности составляет 22% (2008 г. – 17,6%). При этом доля онкологических больных среди впервые признанных инвалидами I группы составляет более 41% (2008 г. – 38,6%), II группы – 29% (2008 г. – 21,7%), III группы – 8% (2008 г. – 6%) (данные Единого портала Росстата [fedstat.ru](http://fedstat.ru)).

С 2009 г. Минздрав России в рамках национального проекта «Здоровье» реализует Национальную онкологическую программу, направленную на совершенствование организации оказания медицинской помощи онкологическим больным.

Цель программы – качественно преобразовать систему оказания первичной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; усилить роль первичного медико-санитарного звена для раннего выявления ЗНО и повысить профессионализм медицинских работников.

Данные государственной статистической отчетности являются ос-

новной базой для разработки и оценки результатов общегосударственных противораковых программ, используются при сравнительном анализе показателей онкологической помощи в различных популяциях на международном уровне и среди регионов России, в научных разработках.

Система обязательного учета и пожизненного наблюдения онкологических больных начала функционировать в России с 1953 г. На протяжении десятилетий накоплен богатый опыт регистрации рака в огромном популяционном массиве. Такой опыт при наличии высококвалифицированных кадров, развитии современных информационных технологий и принятии соответствующих нормативных документов явился предпосылкой для создания системы популяционных раковых регистров, соответствующих стандартам ВОЗ по объему и качеству информации. В настоящее время государственная статистическая отчетность Минздрава по онкологии практически во всех регионах России формируется на базе регистров.

В настоящем исследовании в 190 аналитических таблицах представлены основные тенденции динамики среднероссийских показателей заболеваемости, смертности и онкологической помощи больным с ЗНО.

Использованы сводные данные формы 7 «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями», формы 35 «Сведения о больных со злокачественными новообразованиями», формы 5 (таблица С51) «Распределение умерших по полу, возрастным группам и причинам смерти», таблицы 2РН «Численность населения по полу и возрасту».

Представленные статистические данные проанализированы в рамках единой информационной модели. В России сбор статистической информации по онкологии осуществляется двумя ведомствами: сведения о заболеваниях ЗНО и больных с ЗНО – данные статистических отчетов учреждений системы Минздрава России, а информация о причинах смерти и численности населения – составная часть демографической базы данных Рос-

стата. Следует подчеркнуть, что собираемая онкологическая информация о заболеваемости и смертности различается полнотой перечня локализаций. За рассматриваемый период отчетная форма по заболеваемости ЗНО изменилась один раз (в 2011 г.), а справочник причин смерти расширялся 2 раза (в 1999 г. и 2011 гг.). Также в 2011 г. кардинально расширился справочник локализаций в отчетной форме, отражающей сведения о диагностике ЗНО и контингенте больных, состоящем на учете. К сожалению, внесенные изменения не привели к совпадению справочников локализаций всех отчетных форм, что значительно затрудняет проведение сравнительного анализа или делает его невозможным в разрезе некоторых нозологий. Таким образом, для создания единой информационной модели потребовалось проведение структуризации и формализации материалов государственной статистической отчетности.

Исследование проведено с использованием информационно-аналитического программного обеспечения базы данных по онкологии на основе государственной статистической отчетности, созданного в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А. Герцена (МНИОИ им. П.А. Герцена). Представлена среднегодовая численность населения России, рассчитаны “грубые” и стандартизованные по полу и возрасту показатели заболеваемости и смертности от ЗНО основных нозологических групп в динамике за 20-летний период (1993-2013 гг.). Использован мировой стандарт возрастного распределения.

Представлена динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении (смерти) – медиана возрастного распределения, средний возраст, кумулятивный риск заболеть (умереть) в возрасте до 75 лет.

Представлена динамика основных показателей диагностики и сведений о контингенте больных, состоящем на учете онкологических учреждений России.

С целью максимально наглядно отразить тенденции происходящих процессов и сопоставить их между собой оценивались прирост/убыль показателей, расчет которых проводился с предварительным выравниванием динамических рядов по трем периодам: 1993-2013, 2003-2013, 2008-2003 гг., что позволило исключить влияние отдельных случайных факторов, вызывающих колебание чисел динамического ряда.

Данные представлены по 25 нозологическим формам. По ряду локализаций рассматриваемый период составил менее 20 лет. По ним проанализированы максимально возможные периоды в зависимости от включения данных локализаций в отчетные формы.

Все приводимые показатели статистически достоверны ( $p < 0,01$ ).

В целом динамика представленных показателей достаточно консервативна, что свидетельствует об относительной стабильности состояния системы учета ЗНО на протяжении рассматриваемого периода.

Несомненно, нужно и далее проводить комплекс эпидемиологических исследований дескриптивного и аналитического характера, осуществлять мониторинг ЗНО.

**Таблица 1****Динамика среднегодовой численности населения в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

<b>Возраст</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>148145911</b>	<b>147967813</b>	<b>147773657</b>	<b>147373009</b>	<b>146938319</b>	<b>146533492</b>	<b>145943393</b>	<b>145189166</b>	<b>143769727</b>	<b>142902918</b>	<b>143452532</b>	<b>142689824</b>
<b>0-4</b>	9299953	8516468	7886464	7337772	6919573	6690710	6521243	6356604	6248221	6312027	6432671	6627867
<b>5-9</b>	12141940	11959349	11653397	11120340	10346676	9449922	8624225	7951571	7331259	6898113	6689733	6517245
<b>10-14</b>	11269831	11580762	11822429	12055721	12272450	12285018	12073276	11727011	11096142	10308227	9598774	8733612
<b>15-19</b>	10532870	10690270	10829347	10923971	11069056	11346297	11640353	11857721	12001814	12200109	12565508	12285153
<b>20-24</b>	9816052	10043725	10241502	10396774	10501662	10589283	10694954	10793529	10815991	10939863	11632719	11985706
<b>25-29</b>	9886834	9582798	9518320	9569074	9729367	9952233	10132910	10263212	10330522	10387834	10633454	10752152
<b>30-34</b>	12649279	12243647	11687622	11055573	10456389	9939879	9601516	9490369	9480811	9607107	9884691	10041910
<b>35-39</b>	12596068	12753689	12829740	12887236	12819448	12571506	12142415	11554565	10868801	10250888	9815403	9466107
<b>40-44</b>	11345741	11596391	11798915	11994023	12154612	12365057	12503481	12553205	12546431	12447080	12251459	11837288
<b>45-49</b>	6798010	8080991	9345513	10137325	10594146	10969822	11209888	11391311	11524194	11644827	11707432	11815086
<b>50-54</b>	8430501	6954827	5799511	5286156	5568824	6455952	7681472	8875424	9583627	9973558	10257521	10419301
<b>55-59</b>	8607707	9315780	9708424	9686347	9057686	7802724	6440897	5371079	4887267	5140091	5944306	7025844
<b>60-64</b>	8050875	7398144	6953815	6887806	7176589	7754122	8409982	8761389	8694697	8084335	7013738	5754095
<b>65-69</b>	7095574	7446492	7618502	7560426	7311202	6890789	6341925	5969814	5899168	6138113	6683598	7230640
<b>70-74</b>	3667114	3962802	4357326	4839276	5339533	5756432	6028319	6148685	6055963	5821848	5522524	5068911
<b>75-79</b>	2757791	2587135	2450327	2433593	2521517	2698541	2941515	3228317	3565452	3910954	4123568	4307792
<b>80-84</b>	2097463	2125446	2105620	1986319	1823760	1687430	1589627	1522563	1514794	1554467	1630350	1771990
<b>85 и ст.</b>	1102308	1129097	1166883	1215277	1275829	1327775	1365395	1372797	1324572	1283481	1065086	1049131

**Продолжение таблицы 1**

**Динамика среднегодовой численности населения в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>141961804</b>	<b>142487260</b>	<b>142114903</b>	<b>141956409</b>	<b>141909244</b>	<b>141914509</b>	<b>142960908</b>	<b>143201721</b>	<b>143506996</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,3**</b>	<b>1,3</b>
<b>0-4</b>	6825915	7129807	7335948	7570470	7823818	7955703	8215031	8533211	8793034	6,9**	37,2	16,4
<b>5-9</b>	6358743	6396686	6428434	6562372	6762064	6880863	7188938	7350837	7551503	-48,3	16,7	15,6
<b>10-14</b>	8009350	7536088	7088298	6825483	6660638	6564046	6584214	6628124	6755921	-53,8	-30,2	-0,9**
<b>15-19</b>	11900074	11456442	10647273	9733903	8878303	8495662	7934448	7391861	7053781	-27,6	-46,0	-26,8
<b>20-24</b>	12220120	12537733	12717558	12668284	12414341	12256143	11860159	11223741	10409830	20,9	-8,2**	-16,6
<b>25-29</b>	10874577	11107188	11320025	11684146	12075173	12257349	12170051	12442003	12539042	35,2	20,2	6,4
<b>30-34</b>	10177658	10368547	10467497	10586354	10739393	10798991	11066319	11231148	11503330	-3,5**	15,5	8,7
<b>35-39</b>	9342231	9438140	9580812	9777927	9961143	10068892	10295658	10419381	10536323	-27,1	11,7	7,9
<b>40-44</b>	11230752	10658532	10085891	9602502	9297130	9193316	9295349	9451486	9656787	-25,4	-24,6	1,3**
<b>45-49</b>	11899555	12060316	12010748	11818519	11464822	11247260	10292119	9784092	9365914	19,2**	-19,4	-21,3
<b>50-54</b>	10530800	10725067	10876146	11072372	11228912	11260733	11534872	11498438	11310283	100,2	12,4	2,9**
<b>55-59</b>	8098219	8787636	9167420	9474872	9674034	9747960	10138879	10298417	10508049	26,0**	59,7	11,4
<b>60-64</b>	4776480	4371640	4617240	5335494	6334905	6896925	8180878	8534862	8819230	-9,7**	74,0	69,8
<b>65-69</b>	7535753	7533440	7029897	6041418	4980315	4479576	3904416	4174508	4861127	-36,4	-46,6	-23,1**
<b>70-74</b>	4780019	4767071	5015011	5458231	5943660	6169297	6377043	5965076	5138050	27,1	18,7**	-3,2**
<b>75-79</b>	4409609	4403656	4274946	4038498	3740058	3616578	3625723	3888855	4302600	70,7	-11,0**	6,8**
<b>80-84</b>	1968734	2188094	2405105	2596119	2725099	2763382	2856750	2795955	2661663	65,1	70,5	3,4**
<b>85 и ст.</b>	1023220	1021187	1046659	1109449	1205440	1261833	1440064	1580433	1740539	19,0**	78,0	63,2

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

**Продолжение таблицы 1**

**Динамика среднегодовой численности населения в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>69528088</b>	<b>69479594</b>	<b>69387481</b>	<b>69158893</b>	<b>68926337</b>	<b>68717053</b>	<b>68405752</b>	<b>67990345</b>	<b>67256436</b>	<b>66759899</b>	<b>66719986</b>	<b>66267306</b>
<b>0-4</b>	4765198	4369440	4047325	3765155	3550013	3431484	3345256	3263077	3209804	3243908	3298080	3399967
<b>5-9</b>	6181399	6096195	5949649	5684430	5295250	4843320	4423897	4077714	3759301	3536490	3422357	3334676
<b>10-14</b>	5719732	5880698	6007464	6129435	6243125	6253830	6152074	5983149	5669579	5273584	4906024	4466024
<b>15-19</b>	5334736	5420061	5493675	5538923	5610759	5752116	5903004	6015926	6093644	6198969	6384237	6243875
<b>20-24</b>	5081182	5188129	5254686	5303123	5333224	5359978	5403032	5446421	5454000	5515783	5871775	6054924
<b>25-29</b>	4996908	4864378	4872946	4929968	5031986	5154364	5223463	5240527	5231952	5230449	5322196	5376557
<b>30-34</b>	6363718	6161664	5885518	5565658	5257446	4993501	4839812	4819001	4846092	4925837	4938438	5009583
<b>35-39</b>	6271523	6347427	6380945	6404641	6371358	6249352	6036862	5746038	5405921	5088978	4829501	4655536
<b>40-44</b>	5582556	5696677	5785316	5869956	5944718	6046292	6112856	6133058	6127602	6073825	5937561	5730201
<b>45-49</b>	3288501	3901547	4499834	4870761	5083106	5257354	5366036	5443706	5498771	5547421	5531272	5571874
<b>50-54</b>	3881094	3198503	2667863	2441528	2590651	3012070	3578859	4124549	4444127	4610311	4709012	4763366
<b>55-59</b>	3857255	4151589	4296680	4260579	3962823	3401968	2807088	2343908	2146333	2274757	2622745	3089561
<b>60-64</b>	3377445	3097324	2909878	2882629	3005906	3249308	3506323	3626026	3570708	3289283	2840853	2320717
<b>65-69</b>	2496999	2722555	2859230	2881608	2800402	2636387	2423364	2284098	2260074	2350314	2558274	2741247
<b>70-74</b>	1015563	1092084	1209717	1381256	1599368	1809593	1968872	2058758	2053418	1977736	1898981	1738722
<b>75-79</b>	675798	637575	609267	607038	622053	656286	713392	787799	894021	1027948	1128810	1222623
<b>80-84</b>	448286	455540	447604	418593	386463	358727	340138	331775	332980	337774	336677	364555
<b>85 и ст.</b>	190195	198208	209884	223612	237686	251123	261424	264815	258109	256536	183197	183300

**Продолжение таблицы 1**

**Динамика среднегодовой численности населения в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>65827019</b>	<b>66006266</b>	<b>65783032</b>	<b>65679355</b>	<b>65640507</b>	<b>65639380</b>	<b>66113278</b>	<b>66264905</b>	<b>66450208</b>	<b>-6,2</b>	<b>-0,2**</b>	<b>1,4</b>
<b>0-4</b>	3502489	3658850	3767123	3888308	4017672	4085316	4212100	4377528	4513291	<b>7,0**</b>	<b>37,3</b>	<b>16,2</b>
<b>5-9</b>	3254903	3273099	3289584	3360294	3465122	3526812	3679607	3762805	3865465	<b>-48,1</b>	<b>16,8</b>	<b>15,4</b>
<b>10-14</b>	4095773	3850888	3621800	3487875	3404713	3355989	3373146	3396364	3462421	<b>-53,3</b>	<b>-30,0</b>	<b>-0,6**</b>
<b>15-19</b>	6053586	5835459	5428425	4966747	4532696	4338040	4048449	3776022	3608296	<b>-27,0</b>	<b>-45,7</b>	<b>-26,7</b>
<b>20-24</b>	6174825	6339471	6433704	6410352	6286997	6212084	6022390	5708195	5300630	<b>19,6</b>	<b>-7,3</b>	<b>-16,1</b>
<b>25-29</b>	5434704	5547352	5660255	5856723	6063965	6158595	6111524	6262376	6323820	<b>31,7</b>	<b>21,3</b>	<b>7,0</b>
<b>30-34</b>	5065471	5144043	5183021	5234654	5309762	5341307	5486677	5583513	5734091	<b>-5,6**</b>	<b>15,0</b>	<b>9,6</b>
<b>35-39</b>	4596731	4645260	4718551	4814722	4900871	4951679	5029273	5087564	5145843	<b>-28,6</b>	<b>10,7</b>	<b>6,8</b>
<b>40-44</b>	5425235	5137054	4860050	4630085	4489162	4444165	4507655	4589503	4689062	<b>-26,7</b>	<b>-24,4</b>	<b>2,1**</b>
<b>45-49</b>	5609321	5685938	5660133	5570736	5409116	5308734	4864341	4632279	4444476	<b>16,5**</b>	<b>-19,1</b>	<b>-20,9</b>
<b>50-54</b>	4793794	4868054	4935139	5026432	5102408	5121251	5283641	5279361	5204737	<b>96,6</b>	<b>13,0</b>	<b>4,5</b>
<b>55-59</b>	3549614	3843018	4000921	4125582	4204735	4235095	4402542	4480858	4587152	<b>23,1</b>	<b>57,9</b>	<b>11,6</b>
<b>60-64</b>	1924755	1773963	1894077	2196722	2605097	2833901	3382732	3523994	3635352	<b>-11,7**</b>	<b>79,4</b>	<b>70,4</b>
<b>65-69</b>	2830491	2805793	2597674	2219267	1826881	1644173	1473505	1602836	1877878	<b>-35,7</b>	<b>-46,5</b>	<b>-18,3**</b>
<b>70-74</b>	1636508	1631379	1716807	1861634	2008528	2075235	2142250	1989729	1708215	<b>50,3</b>	<b>14,5**</b>	<b>-5,3**</b>
<b>75-79</b>	1286956	1308578	1276123	1205604	1117140	1080449	1093467	1179475	1305068	<b>129,4</b>	<b>-3,6**</b>	<b>9,0*</b>
<b>80-84</b>	409641	472034	546725	617537	668637	686972	732688	722150	690463	<b>116,5</b>	<b>129,3</b>	<b>12,8**</b>
<b>85 и ст.</b>	182227	186037	192925	206085	227010	239583	267296	308393	353953	<b>27,9**</b>	<b>111,7</b>	<b>80,1</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

**Продолжение таблицы 1**

**Динамика среднегодовой численности населения в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>78617823</b>	<b>78488219</b>	<b>78386176</b>	<b>78214116</b>	<b>78011982</b>	<b>77816439</b>	<b>77537641</b>	<b>77198821</b>	<b>76513291</b>	<b>76143019</b>	<b>76732546</b>	<b>76422518</b>
<b>0-4</b>	4534755	4147028	3839139	3572617	3369560	3259226	3175987	3093527	3038417	3068119	3134592	3227900
<b>5-9</b>	5960541	5863154	5703748	5435910	5051426	4606602	4200328	3873857	3571958	3361623	3267376	3182569
<b>10-14</b>	5550099	5700064	5814965	5926286	6029325	6031188	5921202	5743862	5426563	5034643	4692750	4267588
<b>15-19</b>	5198134	5270209	5335672	5385048	5458297	5594181	5737349	5841795	5908170	6001140	6181272	6041278
<b>20-24</b>	4734870	4855596	4986816	5093651	5168438	5229305	5291922	5347108	5361991	5424080	5760944	5930782
<b>25-29</b>	4889926	4718420	4645374	4639106	4697381	4797869	4909447	5022685	5098570	5157386	5311258	5375595
<b>30-34</b>	6285561	6081983	5802104	5489915	5198943	4946378	4761704	4671368	4634719	4681270	4946253	5032327
<b>35-39</b>	6324545	6406262	6448795	6482595	6448090	6322154	6105553	5808527	5462880	5161910	4985902	4810571
<b>40-44</b>	5763185	5899714	6013599	6124067	6209894	6318765	6390625	6420147	6418829	6373256	6313898	6107087
<b>45-49</b>	3509509	4179444	4845679	5266564	5511040	5712468	5843852	5947605	6025423	6097407	6176161	6243212
<b>50-54</b>	4549407	3756324	3131648	2844628	2978173	3443882	4102613	4750875	5139500	5363248	5548509	5655935
<b>55-59</b>	4750452	5164191	5411744	5425768	5094863	4400756	3633809	3027171	2740934	2865334	3321561	3936283
<b>60-64</b>	4673430	4300820	4043937	4005177	4170683	4504814	4903659	5135363	5123989	4795052	4172885	3433378
<b>65-69</b>	4598575	4723937	4759272	4678818	4510800	4254402	3918561	3685716	3639094	3787799	4125324	4489393
<b>70-74</b>	2651551	2870718	3147609	3458020	3740165	3946839	4059447	4089927	4002545	3844112	3623544	3330189
<b>75-79</b>	2081993	1949560	1841060	1826555	1899464	2042255	2228123	2440518	2671431	2883006	2994758	3085169
<b>80-84</b>	1649177	1669906	1658016	1567726	1437297	1328703	1249489	1190788	1181814	1216693	1293673	1407435
<b>85 и ст.</b>	912113	930889	956999	991665	1038143	1076652	1103971	1107982	1066463	1026946	881890	865831

**Продолжение таблицы 1**

**Динамика среднегодовой численности населения в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>76134785</b>	<b>76480994</b>	<b>76331872</b>	<b>76277054</b>	<b>76268737</b>	<b>76275129</b>	<b>76847631</b>	<b>76936816</b>	<b>77056788</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,6**</b>	<b>1,2</b>
<b>0-4</b>	3323426	3470957	3568826	3682162	3806146	3870387	4002932	4155683	4279743	<b>6,8**</b>	<b>37,2</b>	<b>16,5</b>
<b>5-9</b>	3103840	3123587	3138850	3202078	3296942	3354051	3509332	3588032	3686038	<b>-48,6</b>	<b>16,6</b>	<b>15,7</b>
<b>10-14</b>	3913578	3685200	3466498	3337609	3255926	3208057	3211068	3231760	3293500	<b>-54,3</b>	<b>-30,4</b>	<b>-1,3**</b>
<b>15-19</b>	5846488	5620983	5218848	4767156	4345607	4157622	3885999	3615839	3445485	<b>-28,3</b>	<b>-46,4</b>	<b>-26,9</b>
<b>20-24</b>	6045296	6198262	6283854	6257932	6127344	6044059	5837769	5515546	5109200	<b>22,2</b>	<b>-8,8**</b>	<b>-17,2</b>
<b>25-29</b>	5439873	5559836	5659770	5827423	6011208	6098754	6058527	6179628	6215222	<b>38,9</b>	<b>19,1</b>	<b>5,9</b>
<b>30-34</b>	5112187	5224504	5284477	5351700	5429631	5457684	5579642	5647636	5769239	<b>-1,3**</b>	<b>15,9</b>	<b>7,7</b>
<b>35-39</b>	4745500	4792880	4862262	4963205	5060272	5117213	5266385	5331817	5390480	<b>-25,6</b>	<b>12,6</b>	<b>9,0</b>
<b>40-44</b>	5805517	5521478	5225841	4972418	4807968	4749151	4787695	4861983	4967725	<b>-24,1</b>	<b>-24,9</b>	<b>0,5**</b>
<b>45-49</b>	6290234	6374378	6350615	6247783	6055706	5938526	5427779	5151813	4921438	<b>21,7</b>	<b>-19,7</b>	<b>-21,8</b>
<b>50-54</b>	5737006	5857013	5941007	6045940	6126504	6139482	6251232	6219077	6105546	<b>103,3</b>	<b>11,9</b>	<b>1,6**</b>
<b>55-59</b>	4548605	4944618	5166500	5349291	5469299	5512865	5736338	5817559	5920897	<b>28,3**</b>	<b>61,2</b>	<b>11,2</b>
<b>60-64</b>	2851726	2597677	2723164	3138773	3729809	4063024	4798146	5010868	5183878	<b>-8,2**</b>	<b>70,3</b>	<b>69,3</b>
<b>65-69</b>	4705262	4727647	4432223	3822151	3153434	2835403	2430911	2571672	2983249	<b>-36,8</b>	<b>-46,6</b>	<b>-25,8**</b>
<b>70-74</b>	3143511	3135692	3298204	3596598	3935133	4094062	4234793	3975347	3429835	<b>17,5**</b>	<b>20,8**</b>	<b>-2,1**</b>
<b>75-79</b>	3122653	3095078	2998823	2832894	2622918	2536129	2532256	2709381	2997532	<b>53,6</b>	<b>-13,9</b>	<b>5,9**</b>
<b>80-84</b>	1559094	1716060	1858380	1978583	2056462	2076410	2124063	2073805	1971200	<b>53,1</b>	<b>56,5</b>	<b>0,4**</b>
<b>85 и ст.</b>	840993	835150	853734	903364	978430	1022250	1172768	1008625	1386586	<b>10,2**</b>	<b>55,8</b>	<b>44,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

**Таблица 2**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных злокачественных новообразований (ЗНО)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

<b>Возраст</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>409312</b>	<b>411848</b>	<b>412545</b>	<b>422050</b>	<b>430635</b>	<b>440721</b>	<b>441438</b>	<b>448602</b>	<b>451299</b>	<b>453256</b>	<b>455375</b>	<b>468029</b>
<b>0-4</b>	1028	969	889	876	858	889	900	872	841	836	869	1016
<b>5-9</b>	1100	1102	1113	1049	983	926	889	787	687	649	679	676
<b>10-14</b>	1019	1053	1069	1100	1085	1112	1113	1143	1043	939	917	843
<b>15-19</b>	1470	1560	1692	1651	1861	1792	1897	1976	1820	1875	1763	1905
<b>20-24</b>	1800	1972	2000	2306	2188	2186	2211	2310	2375	2342	2436	2499
<b>25-29</b>	2740	2623	2615	2861	3269	3036	3181	3352	3395	3361	3268	3457
<b>30-34</b>	5997	5779	5582	5654	5678	5066	4905	4828	5180	5106	5095	5269
<b>35-39</b>	10830	10682	10864	11504	11345	10726	10367	10082	9579	8975	8536	8343
<b>40-44</b>	18651	18945	18952	19877	19935	19668	20081	20230	20355	19964	18797	18482
<b>45-49</b>	20731	24348	27573	30625	30890	32134	31862	32427	32432	32349	32324	32605
<b>50-54</b>	36771	30659	26305	25251	27191	31664	37275	41969	44956	45825	47365	47680
<b>55-59</b>	54662	59390	59610	60294	55315	48094	39834	34430	32567	35105	40887	49566
<b>60-64</b>	67771	63057	58286	59221	62208	68415	73418	76293	75820	68655	59406	49929
<b>65-69</b>	75989	79632	80696	79655	77748	74275	67268	65223	65392	69030	74441	83234
<b>70-74</b>	44647	48651	53758	59903	67557	74913	77150	79334	77313	74652	69765	65548
<b>75-79</b>	35603	31495	30610	30537	33519	36066	39524	44248	48680	53787	57793	61958
<b>80-84</b>	20099	21448	21510	20227	18918	19046	18212	17601	18186	19448	20713	24063
<b>85 и ст.</b>	8404	8483	9421	9459	10087	10713	11351	11497	10678	10358	10321	10956

**Продолжение таблицы 2**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных злокачественных новообразований (ЗНО)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>469195</b>	<b>475432</b>	<b>485387</b>	<b>490734</b>	<b>504975</b>	<b>516874</b>	<b>522410</b>	<b>525931</b>	<b>535887</b>	<b>31,5</b>	<b>18,1</b>	<b>8,6</b>
<b>0-4</b>	992	1011	1074	1151	1278	1257	1326	1368	1522	<b>68,3</b>	<b>68,1</b>	<b>27,8</b>
<b>5-9</b>	634	676	659	739	777	774	739	762	752	<b>-38,1</b>	<b>18,8</b>	<b>-0,3**</b>
<b>10-14</b>	756	783	660	687	651	732	629	621	613	<b>-48,8</b>	<b>-30,6</b>	<b>-11,4**</b>
<b>15-19</b>	1725	1661	1507	1437	1240	1201	1070	1070	1004	<b>-34,2</b>	<b>-48,4</b>	<b>-28,4</b>
<b>20-24</b>	2580	2646	2528	2627	2440	2517	2392	2221	1984	<b>18,8</b>	<b>-14,7</b>	<b>-21,1</b>
<b>25-29</b>	3596	3566	3707	3847	4082	4300	4214	4315	4471	<b>68,4</b>	<b>36,9</b>	<b>13,7</b>
<b>30-34</b>	5513	5914	5870	6133	6460	6384	6825	6849	7053	<b>27,4</b>	<b>38,9</b>	<b>14,6</b>
<b>35-39</b>	8189	8536	8857	9135	9809	9868	10439	10643	10835	<b>-11,4**</b>	<b>36,1</b>	<b>18,1</b>
<b>40-44</b>	17359	16661	15945	15294	14967	14894	15386	15731	16007	<b>-25,7</b>	<b>-17,8</b>	<b>6,1</b>
<b>45-49</b>	32436	33006	33002	32016	30814	29774	27453	26480	25479	<b>5,8*</b>	<b>-21,6</b>	<b>-20,9</b>
<b>50-54</b>	46707	48414	49017	49741	50279	51225	51185	50797	49123	<b>88,6</b>	<b>8,0</b>	<b>-0,5**</b>
<b>55-59</b>	56150	60829	63241	66415	67531	68562	69177	69112	71640	<b>46,1</b>	<b>55,6</b>	<b>6,8</b>
<b>60-64</b>	42244	40192	45458	53729	65392	76174	81244	83263	87203	<b>13,7**</b>	<b>114,7</b>	<b>58,6</b>
<b>65-69</b>	85672	85054	79352	67465	58025	50612	48643	52927	62730	<b>-26,1</b>	<b>-39,8</b>	<b>-9,7**</b>
<b>70-74</b>	63452	63970	69632	75921	85383	89739	89888	84042	72429	<b>50,8</b>	<b>33,4</b>	<b>-3,6**</b>
<b>75-79</b>	63772	61751	60369	56063	53551	52626	54962	58808	66323	<b>107,1</b>	<b>-3,3*</b>	<b>19,4**</b>
<b>80-84</b>	26720	29684	33187	35789	37834	39914	39130	38020	36215	<b>166,0</b>	<b>77,1</b>	<b>0,7**</b>
<b>85 и ст.</b>	10698	11078	11322	12545	14462	16321	17708	18902	20504	<b>131,3</b>	<b>130,0</b>	<b>64,5</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

**Продолжение таблицы 2**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных злокачественных новообразований (ЗНО)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>207477</b>	<b>206618</b>	<b>206434</b>	<b>208675</b>	<b>211491</b>	<b>215190</b>	<b>213625</b>	<b>215911</b>	<b>216797</b>	<b>216230</b>	<b>216247</b>	<b>219414</b>
<b>0-4</b>	566	537	489	470	452	482	520	485	426	453	460	533
<b>5-9</b>	623	650	620	629	589	525	504	450	402	381	360	386
<b>10-14</b>	550	557	572	604	585	590	571	579	564	510	531	450
<b>15-19</b>	765	797	883	887	974	992	971	1067	962	999	917	1036
<b>20-24</b>	809	899	922	1060	1036	928	974	1052	1123	1086	1104	1155
<b>25-29</b>	1081	1094	1068	1151	1339	1189	1247	1223	1237	1200	1175	1212
<b>30-34</b>	2154	2054	2017	1988	2107	1843	1616	1611	1805	1752	1679	1692
<b>35-39</b>	4048	3881	3992	4112	4069	3721	3559	3517	3160	3096	2816	2737
<b>40-44</b>	8009	7973	7861	8006	7978	7539	7556	7493	7489	7186	6717	6527
<b>45-49</b>	10002	11604	12967	14097	14176	14309	14019	13945	13858	13547	13353	13267
<b>50-54</b>	20501	17076	14274	13267	13927	15837	18419	20957	22097	22454	22968	22779
<b>55-59</b>	32406	34425	34205	34243	31120	26771	21772	18566	17301	18345	21491	25606
<b>60-64</b>	40123	36761	33794	33889	35110	38505	40769	41938	41318	36919	31750	26214
<b>65-69</b>	41086	43625	45067	44349	42872	40961	36918	35605	35419	37053	39515	43498
<b>70-74</b>	19881	21588	24185	27261	32064	36414	38494	39937	39448	37903	35345	32939
<b>75-79</b>	14761	12667	12773	12487	13186	14206	15426	17444	19919	22941	25261	27536
<b>80-84</b>	7390	7659	7686	7226	6748	6954	6655	6453	6762	6944	7429	8304
<b>85 и ст.</b>	2722	2771	3059	2949	3159	3424	3635	3589	3507	3461	3376	3543

**Продолжение таблицы 2**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных злокачественных новообразований (ЗНО)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>219093</b>	<b>220817</b>	<b>226204</b>	<b>228198</b>	<b>235093</b>	<b>237982</b>	<b>240107</b>	<b>240938</b>	<b>245180</b>	<b>18,5</b>	<b>14,4</b>	<b>6,5</b>
<b>0-4</b>	530	565	583	641	670	705	699	740	825	<b>65,9</b>	<b>70,4</b>	<b>26,0</b>
<b>5-9</b>	372	370	393	418	440	449	415	425	452	<b>-38,8</b>	<b>24,0</b>	<b>3,1**</b>
<b>10-14</b>	399	419	340	391	377	411	317	351	317	<b>-47,6</b>	<b>-32,3</b>	<b>-19,0**</b>
<b>15-19</b>	920	858	758	770	645	596	576	579	506	<b>-34,9</b>	<b>-49,5</b>	<b>-29,5</b>
<b>20-24</b>	1223	1172	1165	1193	1092	1134	1067	976	900	<b>17,1</b>	<b>-17,5</b>	<b>-22,0</b>
<b>25-29</b>	1298	1243	1302	1331	1475	1545	1507	1496	1532	<b>40,0</b>	<b>34,0</b>	<b>10,6**</b>
<b>30-34</b>	1740	1849	1850	1918	2010	2048	2288	2090	2178	<b>6,2**</b>	<b>35,2</b>	<b>13,1**</b>
<b>35-39</b>	2565	2743	2845	2942	3007	2977	3206	3272	3204	<b>-29,9</b>	<b>23,1</b>	<b>11,5</b>
<b>40-44</b>	6114	5779	5521	5304	5054	5085	5104	5084	5281	<b>-43,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0**</b>
<b>45-49</b>	12914	12904	12948	12453	11939	11535	10582	9958	9673	<b>-16,5</b>	<b>-27,4</b>	<b>-23,2</b>
<b>50-54</b>	21984	22372	22627	22744	23113	23007	22796	22527	21696	<b>49,6</b>	<b>-1,3**</b>	<b>-4,4**</b>
<b>55-59</b>	28748	31119	32023	33310	34060	34410	34512	34281	35364	<b>18,6**</b>	<b>47,5</b>	<b>4,7</b>
<b>60-64</b>	22177	20891	23736	28072	34401	39490	41750	43218	45090	<b>-1,9**</b>	<b>107,7</b>	<b>56,2</b>
<b>65-69</b>	44449	44242	40983	35238	30039	26032	25103	27453	32417	<b>-32,0</b>	<b>-40,9</b>	<b>-10,4**</b>
<b>70-74</b>	31667	31875	34966	37951	42654	43827	43746	40670	34934	<b>59,8</b>	<b>27,1</b>	<b>-7,1**</b>
<b>75-79</b>	29116	27968	27722	25613	24288	23677	24933	26499	29888	<b>145,8</b>	<b>-1,9**</b>	<b>17,9**</b>
<b>80-84</b>	9336	10764	12762	13958	15253	15913	15618	15034	14172	<b>216,6</b>	<b>105,1</b>	<b>0,1**</b>
<b>85 и ст.</b>	3541	3684	3680	3951	4576	5141	5888	6285	6751	<b>138,6</b>	<b>132,8</b>	<b>76,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

**Продолжение таблицы 2**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных злокачественных новообразований (ЗНО)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>201835</b>	<b>205230</b>	<b>206111</b>	<b>213375</b>	<b>219144</b>	<b>225531</b>	<b>227813</b>	<b>232691</b>	<b>234502</b>	<b>237026</b>	<b>239128</b>	<b>248615</b>
<b>0-4</b>	462	432	400	406	406	407	380	387	415	383	409	483
<b>5-9</b>	477	452	493	420	394	401	385	337	285	268	319	290
<b>10-14</b>	469	496	497	496	500	522	542	564	479	429	386	393
<b>15-19</b>	705	763	809	764	887	800	926	909	858	876	846	869
<b>20-24</b>	991	1073	1078	1246	1152	1258	1237	1258	1252	1256	1332	1344
<b>25-29</b>	1659	1529	1547	1710	1930	1847	1934	2129	2158	2161	2093	2245
<b>30-34</b>	3843	3725	3565	3666	3571	3223	3289	3217	3375	3354	3416	3577
<b>35-39</b>	6782	6801	6872	7392	7276	7005	6808	6565	6419	5879	5720	5606
<b>40-44</b>	10642	10972	11091	11871	11957	12129	12525	12737	12866	12778	12080	11955
<b>45-49</b>	10729	12744	14606	16528	16714	17825	17843	18482	18574	18802	18971	19338
<b>50-54</b>	16270	13583	12031	11984	13264	15827	18856	21012	22859	23371	24397	24901
<b>55-59</b>	22256	24965	25405	26051	24195	21323	18062	15864	15266	16760	19396	23960
<b>60-64</b>	27648	26296	24492	25332	27098	29910	32649	34355	34502	31736	27656	23715
<b>65-69</b>	34903	36007	35629	35306	34876	33314	30350	29618	29973	31977	34926	39736
<b>70-74</b>	24766	27063	29573	32642	35493	38499	38656	39397	37865	36749	34420	32609
<b>75-79</b>	20842	18828	17837	18050	20333	21860	24098	26804	28761	30846	32532	34422
<b>80-84</b>	12709	13789	13824	13001	12170	12092	11557	11148	11424	12504	13284	15759
<b>85 и ст.</b>	5682	5712	6362	6510	6928	7289	7716	7908	7171	6897	6945	7413

**Продолжение таблицы 2**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных злокачественных новообразований (ЗНО)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>250102</b>	<b>254615</b>	<b>259183</b>	<b>262536</b>	<b>269882</b>	<b>278892</b>	<b>282303</b>	<b>284993</b>	<b>290707</b>	<b>44,7</b>	<b>21,4</b>	<b>10,3</b>
<b>0-4</b>	462	446	491	510	608	552	627	628	697	<b>71,2</b>	<b>65,4</b>	<b>29,9</b>
<b>5-9</b>	262	306	266	321	337	325	324	337	300	<b>-37,1</b>	<b>12,2**</b>	<b>-4,6**</b>
<b>10-14</b>	357	364	320	296	274	321	312	270	296	<b>-50,2</b>	<b>-28,4</b>	<b>-1,0**</b>
<b>15-19</b>	805	803	749	667	595	605	494	491	498	<b>-33,5</b>	<b>-47,2</b>	<b>-27,2</b>
<b>20-24</b>	1357	1474	1363	1434	1348	1383	1325	1245	1084	<b>20,3</b>	<b>-12,3**</b>	<b>-20,4</b>
<b>25-29</b>	2298	2323	2405	2516	2607	2755	2707	2819	2939	<b>88,4</b>	<b>38,6</b>	<b>15,5</b>
<b>30-34</b>	3773	4065	4020	4215	4450	4336	4537	4759	4875	<b>39,8</b>	<b>40,6</b>	<b>15,3</b>
<b>35-39</b>	5624	5793	6012	6193	6802	6891	7233	7371	7631	<b>-0,5**</b>	<b>42,5</b>	<b>21,2</b>
<b>40-44</b>	11245	10882	10424	9990	9913	9809	10282	10647	10726	<b>-13,6</b>	<b>-13,8</b>	<b>9,4</b>
<b>45-49</b>	19522	20102	20054	19563	18875	18239	16871	16522	15806	<b>25,8</b>	<b>-17,7</b>	<b>-19,5</b>
<b>50-54</b>	24723	26042	26390	26997	27166	28218	28389	28270	27427	<b>138,1</b>	<b>16,7</b>	<b>3,0**</b>
<b>55-59</b>	27402	29710	31218	33105	33471	34152	34665	34831	36276	<b>86,9</b>	<b>64,4</b>	<b>8,9</b>
<b>60-64</b>	20067	19301	21722	25657	30991	36684	39494	40045	42113	<b>35,9**</b>	<b>122,7</b>	<b>61,2</b>
<b>65-69</b>	41223	40812	38369	32227	27986	24580	23540	25474	30313	<b>-18,7**</b>	<b>-38,6</b>	<b>-9,0**</b>
<b>70-74</b>	31785	32095	34666	37970	42729	45912	46142	43372	37495	<b>42,7</b>	<b>39,9</b>	<b>-0,1**</b>
<b>75-79</b>	34656	33783	32647	30450	29263	28949	30029	32309	36435	<b>82,9</b>	<b>-4,4**</b>	<b>20,6**</b>
<b>80-84</b>	17384	18920	20425	21831	22581	24001	23512	22986	22043	<b>141,2</b>	<b>62,4</b>	<b>1,1**</b>
<b>85 и ст.</b>	7157	7394	7642	8594	9886	11180	11820	12617	13753	<b>127,9</b>	<b>128,7</b>	<b>59,3</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

**Таблица 3**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО, Россия, 1993-2013 гг.**

*(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)*

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>0-14</b>	9,62	9,75	9,79	9,91	9,91	10,30	10,66	10,76	10,42	10,31	10,85	11,59
<b>20-29</b>	23,04	23,41	23,36	25,88	26,97	25,42	25,89	26,89	27,29	26,74	25,62	26,19
<b>30-39</b>	66,65	65,85	67,08	71,66	73,14	70,15	70,24	70,85	72,53	70,91	69,19	69,78
<b>40-49</b>	217,06	220,01	220,03	228,19	223,42	221,99	219,05	219,91	219,30	217,14	213,37	215,99
<b>50-59</b>	536,64	553,45	554,01	571,35	564,09	559,36	546,01	536,26	535,72	535,48	544,70	557,44
<b>60-69</b>	949,13	961,22	953,74	961,20	966,03	974,33	953,68	960,65	967,61	968,08	977,18	1025,53
<b>70 и ст.</b>	1129,94	1122,72	1143,82	1146,85	1186,80	1226,99	1226,32	1244,10	1242,76	1258,84	1285,03	1332,41
<b>15-59</b>	169,48	170,89	169,13	174,06	171,47	167,80	164,71	164,52	165,86	167,30	169,47	177,57
<b>«Грубый» показатель</b>	276,29	278,34	279,17	286,38	293,07	300,76	302,47	308,98	313,90	317,18	317,44	328,00
<b>Стандарт. показатель</b>	203,02	203,16	202,43	206,29	208,16	210,08	208,69	210,75	211,80	211,46	211,35	216,34
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-14</b>	11,24	11,73	11,48	12,30	12,74	12,91	12,25	12,22	12,50	<b>35,5</b>	<b>14,3</b>	<b>-1,4**</b>
<b>20-29</b>	26,74	26,27	25,94	26,58	26,63	27,81	27,49	27,62	28,13	<b>14,5</b>	<b>8,6</b>	<b>5,6</b>
<b>30-39</b>	70,20	72,96	73,46	74,97	78,59	77,88	80,82	80,79	81,16	<b>19,8</b>	<b>20,2</b>	<b>7,7</b>
<b>40-49</b>	215,28	218,62	221,51	220,86	220,50	218,53	218,71	219,44	218,09	<b>-1,2**</b>	<b>2,0**</b>	<b>-1,1</b>
<b>50-59</b>	552,13	559,86	560,07	565,31	563,60	570,18	555,34	550,12	553,49	<b>1,7**</b>	<b>0,8**</b>	<b>-2,9</b>
<b>60-69</b>	1038,93	1052,04	1071,59	1065,26	1090,72	1114,46	1074,75	1071,57	1095,97	<b>18,7</b>	<b>9,3</b>	<b>0,8**</b>
<b>70 и ст.</b>	1351,57	1344,77	1369,60	1365,81	1404,63	1437,97	1410,45	1403,85	1412,07	<b>29,6</b>	<b>9,2</b>	<b>2,1**</b>
<b>15-59</b>	181,00	186,57	189,60	193,58	195,98	197,98	198,91	199,72	201,97	<b>23,9</b>	<b>17,5</b>	<b>4,0</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	330,51	333,67	341,55	345,69	355,84	364,22	365,42	367,27	373,42	<b>37,4</b>	<b>17,7</b>	<b>7,2</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	215,79	217,88	221,56	222,90	227,37	231,06	228,07	227,55	229,22	<b>14,6</b>	<b>8,7</b>	<b>1,9**</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

**Продолжение таблицы 3**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО, Россия, 1993-2013 гг.**

*(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)*

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>0-14</b>	10,43	10,67	10,50	10,93	10,78	10,99	11,46	11,36	11,01	11,15	11,62	12,22
<b>20-29</b>	18,75	19,83	19,65	21,61	22,91	20,13	20,90	21,29	22,09	21,27	20,36	20,71
<b>30-39</b>	49,08	47,45	48,99	50,96	53,11	49,49	47,58	48,54	48,43	48,41	46,02	45,82
<b>40-49</b>	203,03	203,96	202,51	205,79	200,89	193,28	187,95	185,18	183,61	178,41	175,00	175,14
<b>50-59</b>	683,70	700,69	696,08	708,88	687,38	664,29	629,37	611,01	597,80	592,57	606,39	616,14
<b>60-69</b>	1382,41	1381,23	1366,95	1357,30	1343,06	1350,15	1310,14	1312,04	1316,07	1311,65	1319,94	1377,17
<b>70 и ст.</b>	1920,90	1874,84	1926,25	1897,85	1938,35	1983,20	1955,34	1958,18	1967,94	1979,14	2012,90	2060,93
<b>15-59</b>	178,64	177,62	173,22	174,42	169,80	161,69	154,92	153,22	152,56	153,22	156,50	163,48
<b>«Грубый» показатель</b>	298,41	297,38	297,51	301,73	306,84	313,15	312,29	317,56	322,34	323,89	324,11	331,10
<b>Стандарт. показатель</b>	273,65	270,02	268,36	267,73	267,36	268,18	263,74	264,70	264,77	262,49	263,13	266,76
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-14</b>	11,99	12,56	12,32	13,51	13,66	14,27	12,70	13,14	13,46	<b>34,3</b>	<b>15,1</b>	<b>-3,5**</b>
<b>20-29</b>	21,71	20,32	20,40	20,58	20,78	21,66	21,21	20,65	20,92	<b>3,2**</b>	<b>1,8**</b>	<b>0,6**</b>
<b>30-39</b>	44,56	46,91	47,42	48,36	49,14	48,82	52,24	50,25	49,47	<b>-0,3**</b>	<b>12,9</b>	<b>3,6**</b>
<b>40-49</b>	172,44	172,62	175,56	174,07	171,68	170,41	167,37	163,11	163,73	<b>-21,2</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>
<b>50-59</b>	608,05	614,06	611,57	612,48	614,29	613,67	591,65	582,04	582,73	<b>-16,2</b>	<b>-4,4</b>	<b>-6,1</b>
<b>60-69</b>	1401,11	1422,19	1440,84	1433,65	1453,98	1463,17	1376,64	1378,45	1405,84	<b>6,2</b>	<b>3,0**</b>	<b>-4,4**</b>
<b>70 и ст.</b>	2095,39	2064,77	2119,98	2093,96	2157,78	2169,35	2129,16	2106,98	2113,14	<b>14,8</b>	<b>4,6</b>	<b>-0,7**</b>
<b>15-59</b>	165,95	170,13	172,86	175,75	177,96	178,56	178,42	176,79	178,37	<b>5,4**</b>	<b>12,5</b>	<b>0,8**</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	332,83	334,54	343,86	347,44	358,15	362,56	363,18	363,60	368,97	<b>26,4</b>	<b>14,5</b>	<b>5,1</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	265,64	266,16	270,81	271,66	277,73	279,62	273,53	270,72	271,26	<b>2,2**</b>	<b>3,9</b>	<b>-1,5</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

**Продолжение таблицы 3**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО, Россия, 1993-2013 гг.**

*(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)*

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>0-14</b>	8,78	8,78	9,05	8,85	9,00	9,57	9,83	10,13	9,79	9,42	10,04	10,92
<b>20-29</b>	27,53	27,18	27,25	30,37	31,24	30,97	31,08	32,66	32,60	32,29	30,93	31,74
<b>30-39</b>	84,26	84,29	85,19	92,36	93,13	90,77	92,91	93,34	96,99	93,80	91,98	93,30
<b>40-49</b>	230,47	235,30	236,64	249,32	244,61	248,97	248,22	252,42	252,65	253,23	248,61	253,38
<b>50-59</b>	414,26	432,13	438,19	459,89	464,00	473,57	477,20	474,10	483,79	487,70	493,72	509,38
<b>60-69</b>	674,62	690,36	682,94	698,27	713,86	721,80	714,09	725,23	735,76	742,33	754,16	800,87
<b>70 и ст.</b>	877,32	881,17	888,99	894,99	923,27	949,91	949,27	965,62	955,15	969,77	991,38	1038,17
<b>15-59</b>	160,58	164,37	165,17	173,71	173,09	173,71	174,19	175,44	178,72	180,87	181,79	190,90
<b>«Грубый» показатель</b>	256,73	261,48	262,94	272,81	280,91	289,82	293,81	301,42	306,49	311,29	311,64	325,32
<b>Стандарт. показатель</b>	166,63	168,42	168,52	174,78	177,85	180,79	181,27	183,83	185,78	186,54	186,64	192,73
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-14</b>	10,45	10,86	10,59	11,03	11,77	11,48	11,78	11,25	11,48	<b>36,8</b>	<b>13,2</b>	<b>1,2**</b>
<b>20-29</b>	31,82	32,29	31,55	32,68	32,58	34,08	33,89	34,75	35,52	<b>22,2</b>	<b>13,6</b>	<b>9,1</b>
<b>30-39</b>	95,33	98,41	98,87	100,90	107,27	106,17	108,52	110,48	112,06	<b>30,1</b>	<b>23,4</b>	<b>9,5</b>
<b>40-49</b>	254,36	260,46	263,28	263,39	264,99	262,43	265,80	271,32	268,29	<b>14,4</b>	<b>7,6</b>	<b>2,6**</b>
<b>50-59</b>	506,78	516,14	518,64	527,43	522,92	535,26	525,99	524,24	529,69	<b>25,1</b>	<b>6,2</b>	<b>0,2**</b>
<b>60-69</b>	811,04	820,62	839,80	831,56	856,82	888,09	871,95	864,08	886,80	<b>35,4</b>	<b>14,7</b>	<b>4,8**</b>
<b>70 и ст.</b>	1049,84	1049,79	1058,70	1061,54	1088,92	1131,09	1107,95	1109,45	1121,35	<b>31,4</b>	<b>11,7</b>	<b>4,5**</b>
<b>15-59</b>	195,17	202,01	205,30	210,27	212,87	216,17	218,10	221,25	224,19	<b>42,3</b>	<b>21,5</b>	<b>6,6</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	328,50	332,91	339,55	344,19	353,86	365,64	367,35	370,42	377,26	<b>48,5</b>	<b>20,6</b>	<b>9,0</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	192,75	195,82	198,79	200,27	204,14	208,98	207,94	208,52	210,66	<b>27,2</b>	<b>12,6</b>	<b>4,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

Таблица 4

## Динамика структуры заболеваемости ЗНО, Россия, 1993-2013 гг., %

Локализация опухоли	Код МКБ 10	Оба пола				Мужчины				Женщины			
		1993	2003	2008	2013	1993	2003	2008	2013	1993	2003	2008	2013
Пищевод	C15	2,3	1,6	1,5	1,4	3,2	2,6	2,5	2,4	1,2	0,7	0,6	0,5
Желудок	C16	13,5	9,9	8,3	7,0	15,2	12,0	10,0	8,6	11,7	8,0	6,8	5,5
Ободочная кишка	C18	5,2	6,2	6,5	6,5	4,2	5,4	5,7	5,9	6,2	6,9	7,2	7,0
Прямая кишка	C19-21	4,4	4,9	4,9	4,9	4,0	5,0	5,1	5,2	4,8	4,9	4,7	4,7
Поджелудочная железа	C25	3,1	2,9	2,9	2,9	3,2	3,2	3,1	3,2	3,0	2,6	2,7	2,6
Трахея, бронхи, легкое	C33,34	17,1	12,9	11,6	10,5	28,6	22,8	20,4	18,4	5,4	4,0	3,9	3,8
Меланома кожи	C43	1,1	1,5	1,6	1,7	0,8	1,2	1,3	1,4	1,4	1,8	1,8	1,9
Кожа (кроме меланомы)	C44,46.0	9,0	11,1	11,7	12,3	7,0	8,9	9,6	10,0	11,1	13,0	13,6	14,3
Молочная железа	C50	8,8	10,2	10,7	11,3	-	-	-	-	17,9	19,4	20,0	20,9
Шейка матки	C53	2,9	2,7	2,8	2,9	-	-	-	-	5,8	5,1	5,3	5,3
Тело матки	C54	2,9	3,6	3,8	4,2	-	-	-	-	5,9	6,8	7,2	7,7
Яичник	C56	2,6	2,6	2,6	2,5	-	-	-	-	5,3	5,0	4,9	4,6
Предстательная железа	C61	1,7	3,0	4,5	5,9	3,3	6,4	9,7	12,9	-	-	-	-
Почка	C64	2,4	3,3	3,6	3,9	2,6	3,9	4,3	4,7	2,1	2,7	2,9	3,3
Мочевой пузырь	C67	2,4	2,7	2,6	2,7	3,8	4,6	4,5	4,5	1,0	1,1	1,1	1,1
Щитовидная железа	C73	1,1	1,8	1,8	1,8	0,3	0,5	0,6	0,6	1,8	2,9	2,9	2,8
Лимфатическая и кроветворная ткань	C81-96	4,3	4,6	4,8	4,6	4,3	4,7	5,1	4,8	4,2	4,4	4,6	4,5

Таблица 5

## Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО, Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	63,5	63,7	64,1	64,1	64,4	64,6	64,5	64,6	64,6	65,1	65,4	65,7
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	62,0	62,0	62,2	62,0	62,2	62,6	62,6	62,7	62,8	63,0	63,1	63,3
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	21,70	21,79	21,65	21,95	22,10	22,34	22,12	22,34	22,44	22,42	22,28	22,71
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	65,9	65,8	65,7	65,2	64,8	64,4	64,3	64,4	64,4	1,5	-2,5	-1,1
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,8	63,9	63,9	64,0	3,5	1,3	0,7
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	22,73	22,95	23,37	23,48	23,94	24,19	23,94	23,93	24,09	12,3	8,4	1,7**
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	62,8	63,0	63,5	63,5	63,9	64,3	64,3	64,4	64,6	65,0	65,4	65,7
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	61,5	61,6	61,8	61,8	62,0	62,5	62,6	62,7	62,9	63,1	63,3	63,4
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	28,78	28,64	28,38	28,30	28,25	28,28	27,76	27,84	27,79	27,61	27,27	27,60

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

**Продолжение таблицы 5**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	66,0	65,9	65,9	65,4	64,9	64,4	64,4	64,5	64,5	2,9	-2,4	-1,2
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	63,6	63,6	63,8	63,8	63,9	63,9	64,1	64,2	64,2	4,7	1,4	0,7
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	27,58	27,77	28,31	28,46	29,11	29,11	28,56	28,46	28,55	1,0**	5,4	-1,0**
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Женщины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	64,6	64,8	65,0	64,8	65,0	65,0	64,8	64,8	64,7	65,1	65,4	65,7
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	62,5	62,5	62,5	62,3	62,5	62,7	62,6	62,7	62,7	62,9	63,0	63,1
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	17,57	17,78	17,71	18,22	18,44	18,75	18,70	18,96	19,16	19,29	19,23	19,78
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	65,9	65,7	65,5	65,0	64,6	64,3	64,2	64,3	64,4	-0,4**	-2,7	-0,9**
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	63,2	63,1	63,3	63,3	63,4	63,6	63,6	63,7	63,8	2,4	1,2	0,8
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	19,87	20,14	20,50	20,59	20,97	21,39	21,33	21,38	21,58	24,0	12,0	4,2

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

**Таблица 6****Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

<b>Возраст</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>301288</b>	<b>300566</b>	<b>295651</b>	<b>291210</b>	<b>292848</b>	<b>293199</b>	<b>295665</b>	<b>295325</b>	<b>291540</b>	<b>290316</b>	<b>288219</b>	<b>287002</b>
<b>0-4</b>	735	632	614	486	510	460	477	443	422	402	364	419
<b>5-9</b>	715	679	634	546	513	465	424	377	329	316	291	278
<b>10-14</b>	629	577	564	594	533	539	550	509	491	466	381	342
<b>15-19</b>	802	828	831	768	811	815	800	833	773	805	725	719
<b>20-24</b>	888	934	927	950	943	972	962	943	949	934	914	951
<b>25-29</b>	1361	1315	1259	1325	1245	1343	1364	1295	1367	1306	1319	1411
<b>30-34</b>	2886	2799	2720	2515	2351	2187	2202	2005	1964	2100	2061	2071
<b>35-39</b>	5684	5530	5734	5348	5330	5014	4903	4590	4089	3924	3671	3528
<b>40-44</b>	10437	10574	10334	10170	9894	9852	9863	9521	9331	8965	8958	8191
<b>45-49</b>	11366	13902	15854	17069	17138	17422	17585	17151	16955	16482	16508	16298
<b>50-54</b>	26575	21854	17593	14893	14656	16876	20863	23765	25757	26030	26885	26148
<b>55-59</b>	38786	43233	43763	42444	39887	34321	28161	23559	20235	20491	23098	28310
<b>60-64</b>	53530	48836	43827	41832	43069	45286	49796	51795	50880	47535	40283	32692
<b>65-69</b>	58645	61477	62745	61274	58796	54930	49752	45915	44484	45857	48616	52657
<b>70-74</b>	33633	35475	38438	42585	48199	53099	56022	57464	55859	53453	49319	44783
<b>75-79</b>	27666	25421	23633	23257	24473	25657	27938	31512	34476	38123	41206	42961
<b>80-84</b>	19052	18753	18294	17220	15945	15010	14541	13845	13790	14410	15231	16774
<b>85 и ст.</b>	7898	7747	7887	7934	8555	8951	9462	9803	9389	8717	8276	8475

**Продолжение таблицы 6**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>284830</b>	<b>283732</b>	<b>285921</b>	<b>286628</b>	<b>290737</b>	<b>290136</b>	<b>289535</b>	<b>287789</b>	<b>288636</b>	<b>-3,8</b>	<b>1,2**</b>	<b>0,0**</b>
<b>0-4</b>	398	411	393	375	411	402	402	382	407	<b>-41,5</b>	<b>1,8**</b>	<b>2,7**</b>
<b>5-9</b>	259	218	231	231	255	232	236	260	247	<b>-76,1</b>	<b>-10,6**</b>	<b>6,0**</b>
<b>10-14</b>	317	278	266	212	243	203	216	188	195	<b>-75,6</b>	<b>-51,2</b>	<b>-14,7**</b>
<b>15-19</b>	693	666	553	540	518	375	371	347	292	<b>-57,1</b>	<b>-60,3</b>	<b>-45,0</b>
<b>20-24</b>	950	897	888	875	814	817	728	634	668	<b>-23,5</b>	<b>-30,9</b>	<b>-26,5</b>
<b>25-29</b>	1383	1346	1268	1270	1370	1307	1302	1279	1239	<b>-2,0**</b>	<b>-7,6</b>	<b>-4,7**</b>
<b>30-34</b>	2062	2062	2207	2131	2204	2240	2134	2230	2180	<b>-20,2</b>	<b>8,0</b>	<b>1,4**</b>
<b>35-39</b>	3288	3290	3372	3415	3336	3524	3648	3582	3582	<b>-46,6</b>	<b>3,4**</b>	<b>7,2</b>
<b>40-44</b>	7837	7177	6628	6229	5901	5816	5787	5785	5894	<b>-51,0</b>	<b>-37,1</b>	<b>-4,8**</b>
<b>45-49</b>	15741	15143	15190	14472	13801	12887	11829	11048	10325	<b>-23,0</b>	<b>-36,3</b>	<b>-28,7</b>
<b>50-54</b>	25791	25377	25179	25241	25428	24924	24432	23591	22992	<b>30,5</b>	<b>-11,7</b>	<b>-9,5</b>
<b>55-59</b>	31804	34481	35036	36748	36548	36210	36248	35848	35739	<b>-8,7**</b>	<b>36,2</b>	<b>-2,8</b>
<b>60-64</b>	26487	23392	24786	28673	35182	40665	43934	44352	45792	<b>-27,3</b>	<b>58,7</b>	<b>55,8</b>
<b>65-69</b>	54603	53753	50906	43485	35841	29784	26687	27708	32460	<b>-49,1</b>	<b>-51,4</b>	<b>-29,7**</b>
<b>70-74</b>	41700	41047	43217	46986	52672	54453	53803	50544	43104	<b>17,7**</b>	<b>13,3**</b>	<b>-7,2**</b>
<b>75-79</b>	44073	44046	43028	39944	37117	35139	35058	36969	40521	<b>69,8</b>	<b>-16,2</b>	<b>0,9**</b>
<b>80-84</b>	18899	21473	23973	26174	27931	28826	28791	27881	26135	<b>103,2</b>	<b>81,3</b>	<b>-0,2**</b>
<b>85 и ст.</b>	8545	8675	8800	9627	11165	12332	13929	15161	16864	<b>97,8</b>	<b>137,8</b>	<b>79,8</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

**Продолжение таблицы 6**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>170630</b>	<b>169430</b>	<b>165793</b>	<b>162705</b>	<b>163006</b>	<b>162700</b>	<b>163874</b>	<b>162853</b>	<b>160284</b>	<b>159648</b>	<b>157433</b>	<b>155999</b>
<b>0-4</b>	398	351	346	263	278	254	258	231	238	203	193	233
<b>5-9</b>	405	392	359	321	303	266	259	216	184	183	148	158
<b>10-14</b>	347	313	310	324	319	301	322	283	269	250	223	191
<b>15-19</b>	469	507	469	430	471	504	476	485	452	457	436	434
<b>20-24</b>	490	531	515	560	521	535	538	529	527	521	486	534
<b>25-29</b>	704	691	642	676	629	697	697	655	699	665	623	698
<b>30-34</b>	1340	1312	1271	1124	1096	1013	1031	883	868	985	926	874
<b>35-39</b>	2832	2653	2735	2501	2447	2237	2208	2155	1887	1813	1642	1568
<b>40-44</b>	5885	5885	5610	5424	5206	5076	5043	4811	4686	4434	4422	3989
<b>45-49</b>	6930	8467	9409	10043	9970	10199	10184	9822	9579	9211	9202	8958
<b>50-54</b>	17573	14127	11342	9424	9140	10434	12862	14662	15704	15896	16296	15555
<b>55-59</b>	26162	28725	28908	27680	25900	22162	18079	15205	12827	12927	14338	17590
<b>60-64</b>	35754	32204	28760	27364	27782	29322	31948	33127	32007	29933	25131	20095
<b>65-69</b>	34511	36982	38355	37982	36368	33737	30455	27997	27180	28011	29481	31707
<b>70-74</b>	15870	16718	18003	20308	24188	27628	30135	31309	30920	29719	27337	24834
<b>75-79</b>	11669	10565	10075	9790	10110	10294	11177	12594	14450	16600	18639	20338
<b>80-84</b>	6946	6658	6382	6102	5632	5309	5228	5022	4956	5161	5287	5677
<b>85 и ст.</b>	2345	2349	2302	2389	2646	2732	2974	2867	2851	2679	2536	2567

**Продолжение таблицы 6**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>154408</b>	<b>152828</b>	<b>153865</b>	<b>153682</b>	<b>155646</b>	<b>155006</b>	<b>154882</b>	<b>153291</b>	<b>153668</b>	<b>-9,8</b>	<b>-1,3**</b>	<b>-0,7**</b>
<b>0-4</b>	218	219	201	210	205	237	215	190	212	<b>-44,4</b>	<b>-2,0**</b>	<b>-3,8**</b>
<b>5-9</b>	145	118	134	119	146	119	128	151	140	<b>-78,1</b>	<b>-6,7</b>	<b>15,0**</b>
<b>10-14</b>	182	165	154	122	135	109	133	116	114	<b>-73,5</b>	<b>-49,7</b>	<b>-8,2**</b>
<b>15-19</b>	385	405	317	310	298	223	222	209	164	<b>-57,3</b>	<b>-61,1</b>	<b>-44,1</b>
<b>20-24</b>	549	502	509	492	473	451	424	365	403	<b>-20,9</b>	<b>-26,4</b>	<b>-22,6</b>
<b>25-29</b>	645	656	635	603	678	660	616	626	611	<b>-8,8</b>	<b>-5,3**</b>	<b>-3,5**</b>
<b>30-34</b>	904	896	978	932	955	977	980	965	916	<b>-26,9</b>	<b>6,9**</b>	<b>-0,7**</b>
<b>35-39</b>	1432	1394	1473	1487	1405	1456	1541	1510	1496	<b>-55,3</b>	<b>-3,5**</b>	<b>4,4**</b>
<b>40-44</b>	3794	3441	3121	2903	2771	2676	2718	2657	2730	<b>-60,7</b>	<b>-41,4</b>	<b>-5,9**</b>
<b>45-49</b>	8511	8227	8098	7705	7232	6827	6137	5719	5434	<b>-33,9</b>	<b>-40,4</b>	<b>-29,9</b>
<b>50-54</b>	15329	15088	14742	14796	14837	14366	14021	13511	13195	<b>14,1**</b>	<b>-16,3</b>	<b>-11,6</b>
<b>55-59</b>	19754	21377	21531	22501	22416	22251	22431	21930	21840	<b>-18,0**</b>	<b>34,2</b>	<b>-2,9</b>
<b>60-64</b>	16394	14216	15234	17619	21700	24999	27050	27253	28306	<b>-33,6</b>	<b>57,9</b>	<b>56,3</b>
<b>65-69</b>	32616	31732	30104	25420	21053	17523	15721	16460	19182	<b>-51,1</b>	<b>-52,6</b>	<b>-28,8**</b>
<b>70-74</b>	23199	22920	23988	25992	28866	29547	29179	27232	22996	<b>32,4</b>	<b>8,8**</b>	<b>-10,0**</b>
<b>75-79</b>	21175	21226	21064	19377	17868	17024	17180	18077	19756	<b>114,1</b>	<b>-11,9**</b>	<b>2,1**</b>
<b>80-84</b>	6513	7605	8910	10307	11314	11916	11986	11487	10803	<b>158,8</b>	<b>133,2</b>	<b>4,0**</b>
<b>85 и ст.</b>	2663	2641	2672	2787	3294	3645	4200	4833	5370	<b>104,5</b>	<b>149,1</b>	<b>104,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

**Продолжение таблицы 6**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>130658</b>	<b>131136</b>	<b>129858</b>	<b>128505</b>	<b>129842</b>	<b>130499</b>	<b>131791</b>	<b>132472</b>	<b>131256</b>	<b>130668</b>	<b>130786</b>	<b>131003</b>
<b>0-4</b>	337	281	268	223	232	206	219	212	184	199	171	186
<b>5-9</b>	310	287	275	225	210	199	165	161	145	133	143	120
<b>10-14</b>	282	264	254	270	214	238	228	226	222	216	158	151
<b>15-19</b>	333	321	362	338	340	311	324	348	321	348	289	285
<b>20-24</b>	398	403	412	390	422	437	424	414	422	413	428	417
<b>25-29</b>	657	624	617	649	616	646	667	640	668	641	696	713
<b>30-34</b>	1546	1487	1449	1391	1255	1174	1171	1122	1096	1115	1135	1197
<b>35-39</b>	2852	2877	2999	2847	2883	2777	2695	2435	2202	2111	2029	1960
<b>40-44</b>	4552	4689	4724	4746	4688	4776	4820	4710	4645	4531	4536	4202
<b>45-49</b>	4436	5435	6445	7026	7168	7223	7401	7329	7376	7271	7306	7340
<b>50-54</b>	9002	7727	6251	5469	5516	6442	8001	9103	10053	10134	10589	10593
<b>55-59</b>	12624	14508	14855	14764	13987	12159	10082	8354	7408	7564	8760	10720
<b>60-64</b>	17776	16632	15067	14468	15287	15964	17848	18668	18873	17602	15152	12597
<b>65-69</b>	24134	24495	24390	23292	22428	21193	19297	17918	17304	17846	19135	20950
<b>70-74</b>	17763	18757	20435	22277	24011	25471	25887	26155	24939	23734	21982	19949
<b>75-79</b>	15997	14856	13558	13467	14363	15363	16761	18918	20026	21523	22567	22623
<b>80-84</b>	12106	12095	11912	11118	10313	9701	9313	8823	8834	9249	9944	11097
<b>85 и ст.</b>	5553	5398	5585	5545	5909	6219	6488	6936	6538	6038	5740	5908

**Продолжение таблицы 6**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>130422</b>	<b>130904</b>	<b>132056</b>	<b>132946</b>	<b>135091</b>	<b>135130</b>	<b>134653</b>	<b>134498</b>	<b>134968</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>	<b>0,8**</b>
<b>0-4</b>	180	192	192	165	206	165	187	192	195	<b>-38,0</b>	<b>6,4**</b>	<b>10,7**</b>
<b>5-9</b>	114	100	97	112	109	113	108	109	107	<b>-73,4</b>	<b>-15,2**</b>	<b>-3,8**</b>
<b>10-14</b>	135	113	112	90	108	94	83	72	81	<b>-78,1</b>	<b>-53,2</b>	<b>-23,0**</b>
<b>15-19</b>	308	261	236	230	220	152	149	138	128	<b>-56,9</b>	<b>-59,2</b>	<b>-46,2</b>
<b>20-24</b>	401	395	379	383	341	366	304	269	265	<b>-26,7</b>	<b>-36,4</b>	<b>-31,3</b>
<b>25-29</b>	738	690	633	667	692	647	686	653	628	<b>5,2**</b>	<b>-9,7</b>	<b>-5,7**</b>
<b>30-34</b>	1158	1166	1229	1199	1249	1263	1154	1265	1264	<b>-14,3</b>	<b>8,8</b>	<b>3,1**</b>
<b>35-39</b>	1856	1896	1899	1928	1931	2068	2107	2072	2086	<b>-38,6</b>	<b>9,0</b>	<b>9,3</b>
<b>40-44</b>	4043	3736	3507	3326	3130	3140	3069	3128	3164	<b>-39,6</b>	<b>-32,9</b>	<b>-3,9**</b>
<b>45-49</b>	7230	6916	7092	6767	6569	6060	5692	5329	4891	<b>-6,8</b>	<b>-31,4</b>	<b>-27,3</b>
<b>50-54</b>	10462	10289	10437	10445	10591	10558	10411	10080	9797	<b>61,2</b>	<b>-4,7</b>	<b>-6,6</b>
<b>55-59</b>	12050	13104	13505	14247	14132	13959	13817	13918	13899	<b>10,0**</b>	<b>39,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>60-64</b>	10093	9176	9552	11054	13482	15666	16884	17099	17486	<b>-15,1**</b>	<b>60,1</b>	<b>55,0</b>
<b>65-69</b>	21987	22021	20802	18065	14788	12261	10966	11248	13278	<b>-46,1</b>	<b>-49,6</b>	<b>-31,0**</b>
<b>70-74</b>	18501	18127	19229	20994	23806	24906	24624	23312	20108	<b>3,0**</b>	<b>19,0**</b>	<b>-3,8**</b>
<b>75-79</b>	22898	22820	21964	20567	19249	18115	17878	18892	20765	<b>41,5</b>	<b>-19,9</b>	<b>-0,2**</b>
<b>80-84</b>	12386	13868	15063	15867	16617	16910	16805	16394	15332	<b>77,5</b>	<b>56,4</b>	<b>-3,0**</b>
<b>85 и ст.</b>	5882	6034	6128	6840	7871	8687	9729	10328	11494	<b>94,9</b>	<b>133,1</b>	<b>70,3</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

Таблица 7

## Динамика показателей смертности от ЗНО, Россия, 1993-2013 гг.

(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>0-14</b>	6,36	5,89	5,78	5,33	5,27	5,15	5,33	5,10	5,03	5,03	4,56	4,75
<b>20-29</b>	11,41	11,46	11,06	11,39	10,82	11,27	11,17	10,63	10,95	10,50	10,03	10,39
<b>30-39</b>	33,95	33,32	34,48	32,84	33,00	31,99	32,68	31,34	29,75	30,34	29,10	28,70
<b>40-49</b>	120,17	124,39	123,85	123,08	118,83	116,88	115,75	111,39	109,20	105,62	106,29	103,54
<b>50-59</b>	383,61	400,03	395,64	382,95	372,91	359,06	347,14	332,18	317,82	307,81	308,50	312,17
<b>60-69</b>	740,60	743,12	731,33	713,62	703,11	684,31	674,81	663,29	653,45	656,65	649,02	657,30
<b>70 и ст.</b>	916,90	891,39	875,50	868,74	886,55	895,51	905,36	917,70	910,97	912,46	923,97	926,34
<b>15-59</b>	108,96	110,64	107,91	103,86	100,33	96,53	94,19	90,79	88,46	87,52	88,85	91,63
<b>«Грубый» показатель</b>	203,37	203,13	200,07	197,60	199,30	200,09	202,59	203,41	202,78	203,16	200,88	201,14
<b>Стандарт. показатель</b>	145,85	145,23	142,02	138,22	136,99	135,91	136,55	135,50	133,03	131,40	129,81	129,30
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-14</b>	4,60	4,31	4,27	3,90	4,28	3,91	3,88	3,69	3,68	<b>-39,6</b>	<b>-22,2</b>	<b>-10,0**</b>
<b>20-29</b>	10,10	9,49	8,97	8,81	8,92	8,66	8,45	8,08	8,31	<b>-30,3</b>	<b>-21,6</b>	<b>-8,3</b>
<b>30-39</b>	27,41	27,02	27,83	27,23	26,76	27,62	27,07	26,84	26,14	<b>-25,2</b>	<b>-7,4</b>	<b>-3,0</b>
<b>40-49</b>	101,94	98,24	98,74	96,64	94,89	91,50	89,94	87,51	85,26	<b>-31,6</b>	<b>-18,9</b>	<b>-11,8</b>
<b>50-59</b>	309,17	306,76	300,42	301,69	296,49	290,99	279,97	272,70	269,18	<b>-32,3</b>	<b>-13,6</b>	<b>-11,4</b>
<b>60-69</b>	658,61	648,00	649,88	634,25	627,68	619,25	584,35	566,98	572,00	<b>-20,9</b>	<b>-14,1</b>	<b>-11,7</b>
<b>70 и ст.</b>	929,41	930,86	934,08	929,62	946,69	946,70	920,17	917,44	914,72	<b>5,4</b>	<b>-1,0**</b>	<b>-5,7</b>
<b>15-59</b>	93,01	93,10	93,24	94,30	93,93	92,42	91,43	89,98	89,26	<b>-15,7</b>	<b>-0,6**</b>	<b>-2,9**</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	200,64	199,13	201,19	201,91	204,88	204,44	202,53	200,98	201,13	<b>0,6**</b>	<b>0,9**</b>	<b>-1,2**</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	127,37	125,00	124,72	124,18	125,21	123,95	120,19	117,66	116,79	<b>-18,6</b>	<b>-9,4</b>	<b>-7,1</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

**Продолжение таблицы 7**

**Динамика показателей смертности от ЗНО, Россия, 1993-2013 гг.**

*(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)*

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>0-14</b>	6,90	6,46	6,34	5,83	5,96	5,65	6,03	5,48	5,47	5,28	4,85	5,20
<b>20-29</b>	11,85	12,16	11,42	12,08	11,09	11,72	11,62	11,08	11,47	11,04	9,91	10,78
<b>30-39</b>	33,02	31,70	32,66	30,28	30,47	28,91	29,78	28,76	26,87	27,94	26,29	25,27
<b>40-49</b>	144,46	149,53	146,03	144,00	137,62	135,13	132,65	126,40	122,70	117,41	118,79	114,55
<b>50-59</b>	565,17	583,01	577,93	553,62	534,68	508,20	484,52	461,73	432,91	418,63	417,83	422,07
<b>60-69</b>	1196,11	1188,79	1163,35	1133,65	1104,83	1071,39	1052,38	1034,23	1015,08	1027,45	1011,50	1023,36
<b>70 и ст.</b>	1580,79	1522,61	1484,45	1466,98	1496,22	1494,38	1507,81	1504,21	1502,80	1504,42	1516,46	1522,17
<b>15-59</b>	139,70	139,99	134,92	128,06	122,56	116,87	112,92	108,59	104,38	103,17	104,82	107,97
<b>«Грубый» показатель</b>	245,41	243,86	238,94	235,26	236,49	236,77	239,56	239,52	238,32	239,14	235,90	235,41
<b>Стандарт. показатель</b>	223,84	220,41	213,79	206,95	204,15	201,51	201,91	199,61	195,28	193,00	190,58	189,37
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-14</b>	5,02	4,66	4,58	4,20	4,46	4,24	4,23	3,96	3,94	<b>-41,4</b>	<b>-22,8</b>	<b>-9,1**</b>
<b>20-29</b>	10,28	9,74	9,46	8,93	9,32	8,98	8,57	8,28	8,72	<b>-31,4</b>	<b>-19,7</b>	<b>-7,1**</b>
<b>30-39</b>	24,18	23,39	24,75	24,07	23,11	23,64	23,97	23,19	22,17	<b>-33,1</b>	<b>-10,9</b>	<b>-5,3**</b>
<b>40-49</b>	111,51	107,81	106,64	103,99	101,06	97,44	94,48	90,83	89,38	<b>-40,9</b>	<b>-24,3</b>	<b>-14,5</b>
<b>50-59</b>	420,49	418,61	405,92	407,53	400,26	391,36	376,33	363,12	357,80	<b>-39,1</b>	<b>-15,2</b>	<b>-12,9</b>
<b>60-69</b>	1030,65	1003,28	1009,36	974,62	964,65	949,56	880,74	852,63	861,35	<b>-25,2</b>	<b>-17,4</b>	<b>-13,9</b>
<b>70 и ст.</b>	1523,33	1511,72	1517,29	1502,57	1525,42	1522,01	1476,62	1467,45	1452,18	<b>-1,9**</b>	<b>-3,9</b>	<b>-4,4</b>
<b>15-59</b>	109,85	110,50	109,65	110,92	110,29	108,19	107,29	104,61	103,89	<b>-22,7</b>	<b>-2,5**</b>	<b>-6,8</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	234,57	231,54	233,90	233,99	237,12	236,15	234,27	231,34	231,25	<b>-3,8</b>	<b>-1,1**</b>	<b>-2,0**</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	187,01	182,42	181,85	180,38	182,21	180,23	173,91	169,34	167,52	<b>-22,8</b>	<b>-11,3</b>	<b>-8,4</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

**Продолжение таблицы 7**

**Динамика показателей смертности от ЗНО, Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>0-14</b>	5,79	5,30	5,19	4,81	4,54	4,63	4,60	4,71	4,58	4,78	4,25	4,28
<b>20-29</b>	10,96	10,73	10,68	10,68	10,52	10,8	10,69	10,16	10,42	9,96	10,15	9,99
<b>30-39</b>	34,88	34,94	36,31	35,4	35,53	35,06	35,57	33,94	32,66	32,77	31,86	32,07
<b>40-49</b>	96,93	100,44	102,85	103,35	101,15	99,73	99,89	97,34	96,6	94,64	94,81	93,46
<b>50-59</b>	232,54	249,26	247,04	244,64	241,58	237,12	233,74	224,44	221,57	215,08	218,14	222,19
<b>60-69</b>	452,01	455,71	448,21	434,82	434,43	424,20	421,04	414,76	412,83	413,01	413,19	423,43
<b>70 и ст.</b>	704,87	688,66	677,17	668,12	672,77	676,09	676,41	688,99	676,25	674,90	684,94	685,69
<b>15-59</b>	79,12	82,17	81,75	80,47	78,85	76,86	76,07	73,56	73,07	72,42	73,68	76,17
<b>«Грубый» показатель</b>	166,19	167,08	165,66	164,30	166,44	167,70	169,97	171,60	171,55	171,61	170,43	171,43
<b>Стандарт. показатель</b>	99,98	100,48	99,13	97,16	96,94	96,47	97,17	96,64	95,54	94,37	93,98	94,09
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-14</b>	4,15	3,94	3,94	3,59	4,08	3,57	3,53	3,40	3,40	<b>-37,2</b>	<b>-21,4</b>	<b>-11,2</b>
<b>20-29</b>	9,92	9,23	8,47	8,69	8,51	8,34	8,32	7,88	7,89	<b>-28,9</b>	<b>-23,5</b>	<b>-9,6</b>
<b>30-39</b>	30,58	30,57	30,83	30,32	30,31	31,5	30,07	30,39	30,02	<b>-18,4</b>	<b>-4,6</b>	<b>-1,3**</b>
<b>40-49</b>	93,20	89,54	91,56	89,95	89,28	86,08	85,76	84,45	81,45	<b>-18,5</b>	<b>-12,8</b>	<b>-9,0</b>
<b>50-59</b>	218,87	216,57	215,55	216,69	213,21	210,40	202,11	199,37	197,03	<b>-18,6</b>	<b>-10,6</b>	<b>-9,7</b>
<b>60-69</b>	424,51	425,88	424,21	418,32	410,71	404,83	385,25	373,85	376,68	<b>-13,3</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,4</b>
<b>70 и ст.</b>	688,50	692,88	692,45	690,20	704,09	705,30	685,98	687,16	691,85	<b>2,1**</b>	<b>0,9**</b>	<b>-1,3</b>
<b>15-59</b>	77,15	76,76	77,84	78,73	78,60	77,64	76,57	76,23	75,50	<b>-3,8**</b>	<b>1,2**</b>	<b>-4,4</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	171,30	171,16	173,00	174,29	177,12	177,16	175,22	174,83	175,15	<b>6,8</b>	<b>3,5</b>	<b>-0,4**</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	92,66	91,54	91,47	91,44	92,19	91,43	88,91	87,54	86,98	<b>-12,1</b>	<b>-6,9</b>	<b>-6,0</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

Таблица 8

## Динамика структуры смертности от ЗНО, Россия, 1993-2013 гг., %

Локализация опухоли	Код МКБ 10	Оба пола				Мужчины				Женщины			
		1993	2003	2008	2013	1993	2003	2008	2013	1993	2003	2008	2013
Губа, полость рта и глотка	C00-14	2,9	3,0	3,0	3,3	4,2	4,5	4,6	5,0	1,1	1,2	1,2	1,4
Пищевод	C15	3,0	2,4	2,2	2,3	4,0	3,4	3,3	3,4	1,8	1,2	1,0	1,0
Желудок	C16	17,4	14,1	12,6	10,9	17,5	14,9	13,3	11,7	17,1	13,1	11,7	10,0
Ободочная кишка	C18	5,5	6,8	7,4	7,6	4,0	5,1	5,6	5,9	7,5	8,8	9,5	9,5
Прямая кишка	C19-21	4,9	5,7	5,8	5,8	4,0	5,1	5,3	5,5	6,1	6,4	6,4	6,2
Гортань	C32	2,5	1,9	1,6	1,5	4,1	3,3	2,8	2,6	0,3	0,2	0,2	0,2
Трахея, бронхи, легкое	C33,34	22,1	18,8	17,9	17,3	33,2	29,2	27,8	26,8	7,7	6,3	6,5	6,6
Кожа	C43,44	1,1	1,6	1,7	1,7	0,8	1,3	1,4	1,5	1,4	1,9	2,0	2,0
Молочная железа	C50	6,1	7,8	8,0	7,9	-	-	-	-	14,1	17,1	17,3	17,0
Шейка матки	C53	2,1	2,2	2,1	2,3	-	-	-	-	4,8	4,7	4,6	4,8
Тело матки	C54	2,1	2,1	2,2	2,3	-	-	-	-	4,9	4,7	4,8	4,9
Предстательная железа	C61	1,7	2,6	3,3	3,8	3,0	4,7	6,2	7,2	-	-	-	-
Мочевые органы	C64-68	4,5	5,4	5,4	5,4	5,6	6,9	7,1	6,9	3,0	3,5	3,5	3,6
Лимфатическая и кроветворная ткань	C81-96	4,8	4,9	5,0	5,0	4,5	4,6	4,7	4,7	5,2	5,4	5,4	5,2

Удельный вес и ранговое место ЗНО в структуре смертности от всех причин в 2003-2013 гг.

Оба пола			Мужчины			Женщины		
2003	2008	2013	2003	2008	2013	2003	2008	2013
12,2 (3)	13,8 (2)	15,4 (2)	12,4 (3)	14,1 (3)	16,1 (2)	12,0 (2)	13,5 (2)	14,7 (2)

Таблица 9

## Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО, Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	64,7	64,9	65,3	65,5	65,8	66,0	66,0	66,2	66,4	66,7	66,9	67,1
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	63,6	63,5	63,6	63,8	64,1	64,3	64,4	64,6	64,8	64,9	65,0	65,2
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	16,27	16,21	15,90	15,56	15,48	15,43	15,46	15,35	15,08	14,91	14,61	14,53
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	67,3	67,5	67,7	67,6	67,7	67,6	67,5	67,6	67,3	4,6	0,6**	-0,5
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	65,4	65,6	65,8	65,9	66,1	66,2	66,3	66,5	66,6	5,1	2,4	1,1
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	14,30	14,03	14,02	13,98	14,10	13,92	13,49	13,25	13,17	-18,4	-9,2	-7,1
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	63,1	63,2	63,7	64,1	64,5	64,7	64,7	64,8	65,0	65,4	65,8	66,1
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	62,1	62,2	62,3	62,6	62,9	63,1	63,3	63,5	63,7	64,0	64,1	64,2
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	24,31	24,04	23,42	22,82	22,64	22,47	22,44	22,22	21,76	21,56	20,96	20,84

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

**Продолжение таблицы 9**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
	1993-2013	2003-2013	2008-2013									
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	66,4	66,5	66,6	66,4	66,1	65,6	65,3	65,4	65,3	4,1	-1,5	-1,6
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	64,4	64,6	64,9	64,9	65,1	65,2	65,3	65,5	65,5	5,8	2,3	0,9
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	20,59	20,16	20,12	20,03	20,26	19,95	19,24	18,85	18,68	-21,8	-10,2	-8,1
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	67,1	67,1	67,2	67,5	67,7	68,0	68,1	68,5	68,5	68,7	68,7	68,6
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	65,5	65,3	65,3	65,4	65,6	65,7	65,7	66,0	66,0	66,1	66,2	66,3
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	11,13	11,17	11,02	10,82	10,78	10,74	10,77	10,69	10,56	10,44	10,33	10,33
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	68,7	69,0	69,1	69,4	70,0	70,2	70,4	70,4	70,1	5,1	3,0	0,9**
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	66,5	66,8	66,9	67,0	67,2	67,3	67,5	67,7	67,8	4,0	2,5	1,2
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	10,15	10,02	10,03	10,04	10,13	10,03	9,75	9,63	9,59	-13,5	-6,6	-5,6

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

\*\* статистически достоверного изменения за рассматриваемый период не наблюдается

**Таблица 10**

**Динамика индекса достоверности учета (ИДУ), Россия, 1993-2013 гг.**  
*(отношение числа умерших от ЗНО к числу впервые выявленных ЗНО)*

Возраст	Оба пола				Мужчины				Женщины			
	1993	2003	2008	2013	1993	2003	2008	2013	1993	2003	2008	2013
<b>Всего</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>0-14</b>	0,7	0,4	0,3	0,3	0,7	0,4	0,3	0,3	0,7	0,4	0,3	0,3
<b>20-29</b>	0,5	0,4	0,3	0,3	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2
<b>30-39</b>	0,5	0,4	0,4	0,3	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
<b>40-49</b>	0,6	0,5	0,4	0,4	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3
<b>50-59</b>	0,7	0,6	0,5	0,5	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4
<b>60-69</b>	0,8	0,7	0,6	0,5	0,9	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,5	0,4
<b>70 и ст.</b>	0,8	0,7	0,7	0,6	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,6
<b>15-59</b>	0,7	0,6	0,6	0,5	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5

**Продолжение таблицы 10**

**Динамика индекса достоверности учета (ИДУ), Россия, 1993-2013 гг.**  
*(отношение числа умерших от ЗНО к числу впервые выявленных ЗНО)*

Локализация опухоли	Код МКБ 10	Оба пола				Мужчины				Женщины			
		1993	2003	2008	2013	1993	2003	2008	2013	1993	2003	2008	2013
<b>Все ЗНО</b>	<b>C00-96</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Губа, полость рта и глотка	C00-14	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5
Пищевод	C15	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Желудок	C16	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8
Ободочная кишка	C18	0,8	0,7	0,7	0,6	0,8	0,7	0,7	0,6	0,8	0,7	0,7	0,6
Прямая кишка	C19-21	0,8	0,7	0,7	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,6
Гортань	C32	0,9	0,8	0,7	0,6	0,9	0,8	0,7	0,6	0,9	0,7	0,5	0,6
Трахея, бронхи, легкое	C33,34	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
Кожа	C43,44	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Молочная железа	C50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,4	0,4
Шейка матки	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,4	0,4
Тело матки	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,3	0,3
Предстательная железа	C61	-	-	-	-	0,8	0,5	0,4	0,4	-	-	-	-
Головной мозг	C70-72	-	1,1	1,0	0,9	-	1,1	1,0	0,9	-	1,1	0,9	0,9
Мочевые органы	C64-68	0,7	0,6	0,5	0,4	0,7	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4
Лимфатическая и кроветв. ткань	C81-96	0,8	0,7	0,6	0,6	0,8	0,7	0,6	0,6	0,8	0,7	0,6	0,5

**Таблица 11****Динамика показателей диагностики ЗНО, Россия, 1993-2013 гг.**

<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	393320	396841	397210	404985	413061	422773	421989	428252	430893	431343	431995
из них доля выявленных активно, %	8,3	8,3	8,1	8,4	8,7	9,0	9,2	9,6	9,9	10,7	10,5
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	69,8	70,9	72,2	73,5	74,2	75,1	75,8	76,6	77,5	78,2	79,1
*I-II ст., %	35,0	36,0	36,2	36,4	37,2	37,9	38,6	39,8	40,9	41,5	42,2
*III ст., %	29,8	29,3	29,0	28,6	27,9	27,8	27,2	26,9	26,1	25,7	25,4
*IV ст., %	24,3	24,3	25,0	24,9	25,0	24,7	24,7	24,4	24,0	23,9	23,6
Показатель одногодичной летальности (летальность больных в течение года с момента установления диагноза ЗНО из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	39,0	38,1	37,7	37,0	36,7	36,3	36,2	35,7	34,5	33,9	33,8
Доля больных с I-II ст. ЗНО, выявлен- ных активно, от числа всех больных с I-II ст. ЗНО, %	12,5	11,8	11,4	11,8	12,3	12,5	12,8	12,6	12,9	13,9	13,7
Доля больных с I-II ст. ЗНО, выявлен- ных активно, от общего числа больных, выявленных активно, %	52,7	51,5	50,7	51,0	52,5	52,6	53,7	52,5	53,4	54,0	55,2
Доля больных с ЗНО визуальных лока- лизаций от числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом, выяв- ленных активно в I-II ст. ЗНО, %	66,4	67,6	65,0	64,6	67,7	67,4	70,7	69,4	68,1	66,0	65,7

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

**Продолжение таблицы 11**

**Динамика показателей диагностики ЗНО, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	442677	442933	448279	455502	458121	469836	479513	481581	480028	484354
из них доля выявленных активно, %	11,3	11,8	11,9	12,1	12,2	12,9	13,2	14,9	15,6	17,3
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	80,0	80,7	81,8	82,9	83,2	84,5	85,3	85,8	86,7	87,7
*I-II ст., %	43,3	43,9	44,7	45,4	46,0	46,7	47,8	49,7	50,5	50,8
*III ст., %	24,8	24,5	24,2	23,8	23,5	23,2	22,9	21,8	21,5	21,2
*IV ст., %	23,3	23,3	23,0	22,8	22,8	22,5	22,3	21,3	21,2	21,1
Показатель одногодичной летальности (летальность больных в течение года с момента установления диагноза ЗНО из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	33,2	31,6	31,0	30,2	29,9	29,2	28,6	27,4	26,1	25,3
Доля больных с I-II ст. ЗНО, выявлен- ных активно, от числа всех больных с I-II ст. ЗНО, %	15,1	15,3	15,3	15,8	16,1	16,7	17,3	19,2	21,3	22,4
Доля больных с I-II ст. ЗНО, выявлен- ных активно, от общего числа больных, выявленных активно, %	58,1	57,0	57,5	59,3	60,9	60,4	62,5	67,2	73,1	69,9
Доля больных с ЗНО визуальных лока- лизаций от числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом, выяв- ленных активно в I-II ст. ЗНО, %	64,6	65,7	66,9	65,5	64,6	64,9	65,2	64,8	63,8	64,7

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 12

## Динамика сведений о контингенте больных, состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных, состоящих на учете на конец года	1788944	1822739	1870276	1913858	1969787	2005743	2039762	2102702	2164770	2212869	2262278
из них доля сельских жителей, %	24,8	24,1	22,6	23,1	22,9	22,5	22,3	22,0	21,5	21,5	21,3
доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	50,2	50,4	50,0	50,1	49,7	49,1	49,4	49,5	49,3	49,5	49,9
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад (за исключением не-меланомного рака кожи)</b> , %	-	61,3	59,4	59,5	59,3	58,1	58,5	58,7	59,0	58,7	59,7
Показатель распространенности на 100 000 населения	1207,6	1231,9	1265,6	1298,7	1340,6	1368,8	1397,6	1448,3	1505,7	1548,5	1577,0
Индекс накопления контингента	4,6	4,6	4,7	4,7	4,8	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2
Число умерших от неонкологического заболевания из состоявших на учете	37033	39447	39922	41501	39764	45377	48101	44687	46362	49089	50321
на 100 умерших больных	11,6	12,4	12,6	13,1	12,4	13,8	14,5	13,6	14,3	14,8	15,3
Число умерших от ЗНО, не состоявших на учете	9749	9158	9394	9670	10262	11302	12175	12822	12100	13269	13893
на 100 первичных больных	2,5	2,3	2,4	2,4	2,5	2,7	2,9	3,0	2,8	3,1	3,2
из них число умерших с диагнозом установленным посмертно	6015	5171	5883	5942	6634	7571	8774	9043	8869	8929	9381
на 100 первичных больных	1,5	1,3	1,5	1,5	1,6	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2
из них доля вскрытий, %	73,0	83,6	82,7	84,2	86,7	80,7	74,7	81,9	82,4	85,0	84,6

**Продолжение таблицы 12**

**Динамика сведений о контингенте больных, состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Число больных, состоящих на учете на конец года	2319740	2386766	2466276	2535114	2607223	2691985	2794189	2900629	2995566	3098855
из них										
доля сельских жителей, %	21,2	20,8	21,0	19,8	20,4	20,5	20,4	19,8	20,4	20,0
доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	50,0	50,4	50,4	50,8	50,4	50,7	51,0	51,3	51,1	51,7
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад (за исключением немеланомного рака кожи)</b> , %	60,4	61,0	61,1	61,9	61,9	62,9	63,8	64,7	64,5	65,5
Показатель распространенности на 100 000 населения	1625,7	1681,3	1730,9	1783,9	1836,6	1897,0	1968,9	2029,0	2091,9	2159,4
Индекс накопления контингента	5,2	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,8	6,0	6,2	6,4
Число умерших от неонкологического заболевания из состоявших на учете	53288	50599	51876	52545	51771	53721	56043	54674	57039	57053
на 100 умерших больных	16,1	15,7	16,0	16,0	15,9	16,4	17,0	17,0	17,9	17,9
Число умерших от ЗНО, не состоявших на учете	14071	13670	13732	14863	15794	16523	17400	17780	18476	20706
на 100 первичных больных	3,2	3,1	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,3
из них число умерших с диагнозом установленным посмертно	10316	9355	10787	12310	13292	14140	15418	15644	17138	19041
на 100 первичных больных	2,3	2,1	2,4	2,7	2,9	3,0	3,2	3,2	3,6	3,9
из них доля вскрытий, %	86,9	85,7	89,8	88,1	84,5	88,3	85,4	87,3	88,2	94,3

**Таблица 13****Структура посмертно учтенных больных в России в 2012-2013 гг.**

Локализация опухоли	Удельный вес, %	
	2012	2013
Трахея, бронхи, легкое	16,3	18,1
Желудок	9,5	10,2
Ободочная кишка	9,2	8,9
Поджелудочная железа	7,7	8,7
Печень	6,4	7,2
Лимфатическая и кроветворная ткань	5,5	6,3
Прямая кишка	4,0	4,2
Почка	3,1	3,3
Молочная железа	2,5	2,9
Предстательная железа	2,8	2,7
Тело матки	2,2	2,0

**Таблица 14****Первично-множественные ЗНО (ПМ ЗНО) и новообразования *in situ* в России в 2011-2013 гг. \***

Показатель	2011	2012	2013
Число ПМ ЗНО, выявленных в отчетном году	24 774	29 763	32 841
доля от числа впервые выявленных ЗНО, %	4,7	5,7	6,1
на 100 000 населения	17,3	20,8	22,9
Из числа ПМ ЗНО, выявленных в отчетном году, выявлены у больных, взятых на учет в отчетном году с впервые в жизни установленным диагнозом, %	34,1	30,1	30,8
Число <b>больных</b> с ПМ ЗНО, состоящих на учете на конец отчетного года	105 157	117 084	124 817
доля от числа больных, состоящих на учете на конец отчетного года, %	3,6	3,9	4,0
Выявлено <i>cr in situ</i> всего	5070	5397	6766
на 100 впервые выявленных ЗНО	1,0	1,0	1,3
из них <i>cr in situ</i> шейки матки	3144	3585	4248
на 100 впервые выявленных ЗНО шейки матки	21,2	23,8	27,5
<i>cr in situ</i> молочной железы	516	446	1024
на 100 впервые выявленных ЗНО молочной железы	0,9	0,7	1,7

\* введены в отчетные формы 7 и 35 с 2011 г.

**Таблица 15**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО губы (С00)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>6646</b>	<b>6531</b>	<b>6067</b>	<b>6156</b>	<b>6003</b>	<b>5643</b>	<b>5372</b>	<b>5105</b>	<b>4848</b>	<b>4652</b>	<b>4342</b>	<b>4226</b>
<b>20-24</b>	3	2	3	3	4	2	2	2	2	6	3	1
<b>25-29</b>	11	14	5	10	10	9	8	6	5	8	5	2
<b>30-34</b>	61	46	46	35	42	26	21	30	25	12	16	10
<b>35-39</b>	132	111	94	82	81	70	57	52	47	36	42	33
<b>40-44</b>	202	238	194	178	152	166	190	139	130	129	106	94
<b>45-49</b>	239	243	238	296	289	255	262	278	247	229	197	190
<b>50-54</b>	562	449	306	304	261	256	318	316	337	353	361	312
<b>55-59</b>	1013	1009	918	879	785	619	443	324	255	302	280	348
<b>60-64</b>	1306	1159	955	1017	1058	1036	958	992	898	740	598	447
<b>65-69</b>	1244	1356	1381	1375	1339	1228	1030	892	857	864	854	871
<b>70-74</b>	636	718	802	878	948	1017	1052	1148	1073	978	845	779
<b>75-79</b>	635	523	488	477	472	424	526	481	541	596	647	720
<b>80-84</b>	424	441	409	375	330	332	278	250	241	216	235	276
<b>85 и ст.</b>	178	220	226	244	227	202	222	195	188	183	153	141

**Продолжение таблицы 15**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО губы (С00)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>4018</b>	<b>3854</b>	<b>3569</b>	<b>3538</b>	<b>3435</b>	<b>3356</b>	<b>2954</b>	<b>2818</b>	<b>2711</b>	<b>-60,6</b>	<b>-37,1</b>	<b>-24,8</b>
<b>20-24</b>	2	1	2	2	2	1	0	0	1	-	-	-
<b>25-29</b>	8	5	6	4	4	7	3	4	2	-	-	-
<b>30-34</b>	6	9	6	13	11	11	15	10	11	<b>-96,4</b>	-	-
<b>35-39</b>	25	29	29	27	18	19	23	16	19	<b>-97,5</b>	<b>-54,9</b>	-
<b>40-44</b>	94	82	73	65	71	58	30	53	30	<b>-87,1</b>	<b>-66,1</b>	<b>-50,2</b>
<b>45-49</b>	198	191	180	161	146	132	103	100	63	<b>-63,1</b>	<b>-59,4</b>	<b>-54,0</b>
<b>50-54</b>	318	312	275	304	277	277	234	215	164	<b>-43,7</b>	<b>-42,5</b>	<b>-40,9</b>
<b>55-59</b>	356	368	362	389	427	405	328	326	365	<b>-75,2</b>	-	-
<b>60-64</b>	367	304	260	300	369	412	363	375	371	<b>-84,1</b>	-	-
<b>65-69</b>	865	776	648	563	417	301	243	246	278	<b>-82,5</b>	<b>-78,8</b>	<b>-55,7</b>
<b>70-74</b>	671	650	669	643	667	672	616	508	452	<b>-37,9</b>	<b>-35,6</b>	<b>-29,5</b>
<b>75-79</b>	728	688	642	612	524	480	448	464	482	-	<b>-39,3</b>	<b>-21,4</b>
<b>80-84</b>	245	303	301	342	353	409	387	339	315	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	135	136	113	112	149	171	160	160	157	<b>-40,6</b>	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 15**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО губы (С00)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>5151</b>	<b>5055</b>	<b>4610</b>	<b>4671</b>	<b>4557</b>	<b>4319</b>	<b>4133</b>	<b>3880</b>	<b>3659</b>	<b>3520</b>	<b>3310</b>	<b>3201</b>
<b>20-24</b>	3	1	3	2	3	1	2	1	2	5	3	1
<b>25-29</b>	10	12	4	6	8	9	8	6	3	6	5	2
<b>30-34</b>	58	43	45	28	38	24	21	28	20	10	14	8
<b>35-39</b>	129	101	78	75	72	68	55	43	45	35	39	30
<b>40-44</b>	193	231	180	164	139	154	171	126	120	120	99	86
<b>45-49</b>	231	228	208	271	266	237	242	252	232	211	183	179
<b>50-54</b>	512	407	263	268	235	230	295	288	297	320	332	283
<b>55-59</b>	890	903	818	781	699	538	395	296	225	279	256	300
<b>60-64</b>	1100	977	809	842	910	885	817	839	766	628	514	381
<b>65-69</b>	947	1049	1086	1081	1057	961	830	711	676	701	692	716
<b>70-74</b>	425	470	543	616	622	715	766	827	788	704	622	580
<b>75-79</b>	352	302	276	262	250	253	301	268	297	346	385	440
<b>80-84</b>	227	217	197	181	165	169	134	123	115	89	106	137
<b>85 и ст.</b>	74	112	98	91	90	75	93	72	73	66	60	57

**Продолжение таблицы 15**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО губы (С00)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>3010</b>	<b>2845</b>	<b>2652</b>	<b>2649</b>	<b>2545</b>	<b>2469</b>	<b>2106</b>	<b>2124</b>	<b>2028</b>	<b>-62,7</b>	<b>-38,8</b>	<b>-24,8</b>
<b>20-24</b>	1	0	2	1	1	0	0	0	1	-	-	-
<b>25-29</b>	7	2	6	4	3	5	3	4	2	-	-	-
<b>30-34</b>	5	8	6	10	9	11	15	10	10	<b>-97,2</b>	-	-
<b>35-39</b>	17	27	27	25	16	17	20	16	16	<b>-98,2</b>	<b>-54,2</b>	-
<b>40-44</b>	91	80	67	63	66	54	29	50	26	<b>-87,3</b>	<b>-66,6</b>	<b>-52,6</b>
<b>45-49</b>	188	183	164	143	135	115	96	89	57	<b>-63,8</b>	<b>-61,7</b>	<b>-53,7</b>
<b>50-54</b>	288	287	254	275	244	242	209	199	152	<b>-43,2</b>	<b>-43,3</b>	<b>-38,9</b>
<b>55-59</b>	315	328	307	340	380	355	289	296	328	<b>-75,3</b>	-	-
<b>60-64</b>	319	247	230	248	315	344	310	339	326	<b>-83,3</b>	-	-
<b>65-69</b>	682	611	522	461	323	237	188	205	223	<b>-81,4</b>	<b>-79,2</b>	<b>-55,6</b>
<b>70-74</b>	474	444	472	474	463	486	428	354	333	<b>-34,7</b>	<b>-37,4</b>	<b>-30,2</b>
<b>75-79</b>	443	430	415	394	335	315	275	283	310	-	<b>-36,2</b>	-
<b>80-84</b>	120	147	143	170	193	220	185	212	179	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	60	51	37	41	62	68	58	67	64	<b>-46,3</b>	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 15**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО губы (С00)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1495</b>	<b>1476</b>	<b>1457</b>	<b>1485</b>	<b>1446</b>	<b>1324</b>	<b>1239</b>	<b>1225</b>	<b>1189</b>	<b>1132</b>	<b>1032</b>	<b>1025</b>
<b>20-24</b>	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
<b>25-29</b>	1	2	1	4	2	0	0	0	2	2	0	0
<b>30-34</b>	3	3	1	7	4	2	0	2	5	2	2	2
<b>35-39</b>	3	10	16	7	9	2	2	9	2	1	3	3
<b>40-44</b>	9	7	14	14	13	12	19	13	10	9	7	8
<b>45-49</b>	8	15	30	25	23	18	20	26	15	18	14	11
<b>50-54</b>	50	42	43	36	26	26	23	28	40	33	29	29
<b>55-59</b>	123	106	100	98	86	81	48	28	30	23	24	48
<b>60-64</b>	206	182	146	175	148	151	141	153	132	112	84	66
<b>65-69</b>	297	307	295	294	282	267	200	181	181	163	162	155
<b>70-74</b>	211	248	259	262	326	302	286	321	285	274	223	199
<b>75-79</b>	283	221	212	215	222	171	225	213	244	250	262	280
<b>80-84</b>	197	224	212	194	165	163	144	127	126	127	129	139
<b>85 и ст.</b>	104	108	128	153	137	127	129	123	115	117	93	84

**Продолжение таблицы 15**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО губы (С00)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1008</b>	<b>1009</b>	<b>917</b>	<b>889</b>	<b>890</b>	<b>887</b>	<b>848</b>	<b>694</b>	<b>683</b>	<b>-53,8</b>	<b>-31,9</b>	<b>-24,7</b>
<b>20-24</b>	1	1	0	1	1	1	0	0	0	-	-	-
<b>25-29</b>	1	3	0	0	1	2	0	0	0	-	-	-
<b>30-34</b>	1	1	0	3	2	0	0	0	1	-	-	-
<b>35-39</b>	8	2	2	2	2	2	3	0	3	-	-	-
<b>40-44</b>	3	2	6	2	5	4	1	3	4	-	-	-
<b>45-49</b>	10	8	16	18	11	17	7	11	6	-	-	-
<b>50-54</b>	30	25	21	29	33	35	25	16	12	<b>-48,3</b>	-	<b>-55,6</b>
<b>55-59</b>	41	40	55	49	47	50	39	30	37	<b>-74,5</b>	-	<b>-33,2</b>
<b>60-64</b>	48	57	30	52	54	68	53	36	45	<b>-88,1</b>	-	-
<b>65-69</b>	183	165	126	102	94	64	55	41	55	<b>-86,4</b>	<b>-77,1</b>	<b>-55,9</b>
<b>70-74</b>	197	206	197	169	204	186	188	154	119	<b>-45,1</b>	<b>-30,9</b>	-
<b>75-79</b>	285	258	227	218	189	165	173	181	172	-	<b>-44,2</b>	-
<b>80-84</b>	125	156	158	172	160	189	202	127	136	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	75	85	76	71	87	103	102	93	93	<b>-36,5</b>	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 16

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО губы (С00), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,07	0,08	0,04	0,07	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03	0,07	0,04	0,01
<b>30-39</b>	0,76	0,63	0,57	0,49	0,53	0,43	0,36	0,39	0,35	0,24	0,29	0,22
<b>40-49</b>	2,43	2,44	2,04	2,14	1,94	1,80	1,91	1,74	1,57	1,49	1,26	1,20
<b>50-59</b>	9,24	8,96	7,89	7,90	7,15	6,14	5,39	4,49	4,09	4,33	3,96	3,78
<b>60-69</b>	16,84	16,94	16,03	16,56	16,54	15,46	13,48	12,79	12,03	11,28	10,60	10,15
<b>70-79</b>	19,78	18,95	18,95	18,63	18,06	17,04	17,59	17,37	16,78	16,17	15,47	15,99
<b>80 и ст.</b>	18,81	20,31	19,40	19,33	17,97	17,71	16,92	15,37	15,11	14,06	14,39	14,78
<b>15-59</b>	2,45	2,32	1,97	1,95	1,77	1,53	1,42	1,24	1,14	1,16	1,07	1,04
<b>«Грубый» показатель</b>	4,49	4,41	4,11	4,18	4,09	3,85	3,68	3,52	3,37	3,26	3,03	2,96
<b>Стандарт. показатель</b>	3,16	3,09	2,82	2,87	2,76	2,55	2,41	2,26	2,13	2,05	1,89	1,82
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,01	0,02	0,01	-	-	-
<b>30-39</b>	0,16	0,19	0,17	0,20	0,14	0,14	0,18	0,12	0,14	<b>-91,5</b>	<b>-46,6</b>	-
<b>40-49</b>	1,26	1,20	1,14	1,06	1,05	0,93	0,68	0,80	0,49	<b>-74,2</b>	<b>-50,9</b>	<b>-47,2</b>
<b>50-59</b>	3,62	3,48	3,18	3,37	3,37	3,25	2,59	2,48	2,42	<b>-79,2</b>	<b>-36,6</b>	<b>-32,0</b>
<b>60-69</b>	10,01	9,07	7,80	7,59	6,95	6,27	5,01	4,89	4,74	<b>-75,1</b>	<b>-58,6</b>	<b>-39,9</b>
<b>70-79</b>	15,22	14,59	14,11	13,22	12,30	11,77	10,64	9,86	9,89	<b>-47,5</b>	<b>-40,1</b>	<b>-26,7</b>
<b>80 и ст.</b>	12,70	13,68	11,99	12,25	12,77	14,41	12,73	11,40	10,72	<b>-44,4</b>	<b>-18,7</b>	-
<b>15-59</b>	1,05	1,03	0,97	1,00	1,00	0,96	0,78	0,77	0,71	<b>-71,9</b>	<b>-30,5</b>	<b>-31,0</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	2,83	2,70	2,51	2,49	2,42	2,36	2,07	1,97	1,89	<b>-58,5</b>	<b>-37,1</b>	<b>-25,5</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	1,73	1,63	1,48	1,46	1,42	1,35	1,14	1,09	1,02	<b>-69,0</b>	<b>-45,3</b>	<b>-31,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 16**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО губы (С00), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,13	0,13	0,07	0,08	0,11	0,10	0,09	0,07	0,05	0,10	0,07	0,03
<b>30-39</b>	1,48	1,15	1,00	0,86	0,95	0,82	0,70	0,67	0,63	0,45	0,54	0,39
<b>40-49</b>	4,78	4,78	3,77	4,05	3,67	3,46	3,60	3,27	3,03	2,85	2,46	2,34
<b>50-59</b>	18,12	17,82	15,52	15,65	14,25	11,97	10,80	9,03	7,92	8,70	8,02	7,42
<b>60-69</b>	34,85	34,81	32,85	33,36	33,88	31,36	27,78	26,23	24,73	23,57	22,34	21,67
<b>70-79</b>	45,94	44,63	45,03	44,16	39,25	39,26	39,78	38,47	36,81	34,93	33,26	34,44
<b>80 и ст.</b>	47,14	50,33	44,87	42,35	40,86	40,01	37,74	32,69	31,81	26,08	31,93	35,41
<b>15-59</b>	4,54	4,29	3,54	3,54	3,24	2,79	2,63	2,30	2,09	2,17	2,02	1,91
<b>«Грубый» показатель</b>	7,41	7,28	6,64	6,75	6,61	6,29	6,04	5,71	5,44	5,27	4,96	4,83
<b>Стандарт. показатель</b>	6,66	6,53	5,91	5,94	5,67	5,29	5,05	4,67	4,38	4,22	3,97	3,84
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,07	0,02	0,07	0,04	0,03	0,04	0,02	0,03	0,03	-	-	-
<b>30-39</b>	0,23	0,36	0,33	0,35	0,24	0,27	0,33	0,24	0,24	<b>-92,1</b>	<b>-44,4</b>	-
<b>40-49</b>	2,53	2,43	2,20	2,02	2,03	1,73	1,33	1,51	0,91	<b>-74,1</b>	<b>-53,4</b>	<b>-48,1</b>
<b>50-59</b>	7,23	7,06	6,28	6,72	6,70	6,38	5,14	5,07	4,90	<b>-78,7</b>	<b>-36,3</b>	<b>-30,5</b>
<b>60-69</b>	21,05	18,73	16,74	16,06	14,40	12,97	10,25	10,61	9,96	<b>-73,9</b>	<b>-58,9</b>	<b>-39,3</b>
<b>70-79</b>	31,37	29,73	29,64	28,30	25,53	25,38	21,73	20,10	21,34	<b>-54,8</b>	<b>-40,9</b>	<b>-27,5</b>
<b>80 и ст.</b>	30,41	30,09	24,34	25,62	28,47	31,08	24,30	27,07	23,27	<b>-50,6</b>	<b>-24,6</b>	-
<b>15-59</b>	1,95	1,94	1,78	1,85	1,84	1,73	1,45	1,46	1,32	<b>-71,3</b>	<b>-30,9</b>	<b>-29,7</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	4,57	4,31	4,03	4,03	3,88	3,76	3,19	3,21	3,05	<b>-59,7</b>	<b>-38,5</b>	<b>-25,7</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	3,62	3,35	3,06	3,04	2,93	2,79	2,30	2,29	2,14	<b>-69,5</b>	<b>-46,1</b>	<b>-31,1</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 16**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО губы (С00), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,01	0,03	0,01	0,05	0,03	0,01	0,00	0,01	0,02	0,03	0,00	0,00
<b>30-39</b>	0,05	0,10	0,14	0,12	0,11	0,04	0,02	0,10	0,07	0,03	0,05	0,05
<b>40-49</b>	0,18	0,22	0,41	0,34	0,31	0,25	0,32	0,32	0,20	0,22	0,17	0,15
<b>50-59</b>	1,86	1,66	1,67	1,62	1,39	1,36	0,92	0,72	0,89	0,68	0,60	0,80
<b>60-69</b>	5,42	5,42	5,01	5,40	4,95	4,77	3,87	3,79	3,57	3,20	2,96	2,79
<b>70-79</b>	10,44	9,73	9,44	9,03	9,72	7,90	8,13	8,18	7,93	7,79	7,33	7,47
<b>80 и ст.</b>	11,75	12,77	13,00	13,56	12,20	12,06	11,60	10,88	10,72	10,88	10,20	9,81
<b>15-59</b>	0,43	0,40	0,44	0,41	0,35	0,30	0,24	0,23	0,22	0,19	0,16	0,21
<b>«Грубый» показатель</b>	1,90	1,88	1,86	1,90	1,85	1,70	1,60	1,59	1,55	1,49	1,34	1,34
<b>Стандарт. показатель</b>	0,97	0,96	0,95	0,97	0,91	0,83	0,75	0,74	0,72	0,66	0,59	0,59
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,02	0,03	0,00	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>30-39</b>	0,09	0,03	0,02	0,05	0,04	0,02	0,03	0,00	0,04	-	-	-
<b>40-49</b>	0,11	0,08	0,19	0,18	0,15	0,20	0,08	0,14	0,10	<b>-65,7</b>	-	-
<b>50-59</b>	0,69	0,60	0,68	0,68	0,69	0,73	0,53	0,38	0,41	<b>-81,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-45,3</b>
<b>60-69</b>	3,06	3,03	2,18	2,21	2,15	1,91	1,49	1,02	1,22	<b>-79,7</b>	<b>-62,3</b>	<b>-51,8</b>
<b>70-79</b>	7,69	7,45	6,73	6,02	5,99	5,29	5,33	5,01	4,53	<b>-51,1</b>	<b>-40,6</b>	<b>-23,7</b>
<b>80 и ст.</b>	8,33	9,45	8,63	8,43	8,14	9,42	9,22	6,58	6,82	<b>-44,6</b>	<b>-25,1</b>	-
<b>15-59</b>	0,19	0,16	0,21	0,21	0,21	0,23	0,15	0,12	0,13	<b>-71,0</b>	-	<b>-44,8</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	1,32	1,32	1,20	1,17	1,17	1,16	1,10	0,90	0,89	<b>-52,3</b>	<b>-32,0</b>	<b>-25,8</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	0,57	0,58	0,50	0,49	0,49	0,48	0,42	0,34	0,34	<b>-66,0</b>	<b>-41,6</b>	<b>-33,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 17

## Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО губы (C00), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	64,2	65,0	66,0	66,0	66,2	66,6	67,1	67,3	67,8	68,0	68,3	68,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	64,2	64,6	65,3	65,3	65,4	65,8	66,0	66,2	66,5	66,6	66,9	67,5
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,38	0,38	0,35	0,36	0,35	0,33	0,30	0,29	0,28	0,26	0,24	0,23
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	68,7	69,0	69,5	69,5	69,7	70,4	71,1	70,6	70,6	9,6	3,8	1,8
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	67,3	67,6	67,6	67,6	67,7	68,1	68,8	68,4	68,9	6,7	2,7	2,0
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,22	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,14	0,13	0,12	-69,8	-49,3	-33,5
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	62,5	63,1	64,4	64,4	64,5	65,1	65,4	65,4	65,9	66,0	66,5	67,3
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	62,2	62,6	63,4	63,4	63,5	64,0	64,2	64,4	64,7	64,6	64,9	65,7
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,81	0,80	0,74	0,75	0,71	0,68	0,64	0,61	0,57	0,55	0,50	0,48

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 17**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО губы (C00), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	67,0	67,1	67,5	67,3	66,6	66,9	67,2	66,4	67,1	<b>6,5</b>	-	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	65,4	65,4	65,6	65,7	65,7	66,1	66,2	66,3	66,9	<b>6,4</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,45	0,41	0,39	0,38	0,36	0,33	0,28	0,27	0,26	<b>-70,3</b>	<b>-48,8</b>	<b>-33,5</b>
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Женщины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	71,1	71,3	71,6	71,6	72,0	71,7	72,9	72,7	73,1	73,7	74,3	74,8
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	71,0	71,1	71,1	71,2	71,4	71,6	72,2	71,9	72,1	72,8	73,1	73,1
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	74,5	74,9	75,1	75,4	74,8	75,4	76,5	76,5	76,7	<b>8,2</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	72,9	73,6	73,4	73,3	73,4	73,6	75,1	75,0	75,0	<b>5,7</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,07	0,07	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	-	-	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 18

## Динамика показателей диагностики ЗНО губы (C00), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	6503	6360	5891	6010	5864	5480	5228	4900	4705	4531	4210
из них доля выявленных активно, %	17,2	15,1	14,9	15,6	17,9	18,0	18,7	18,6	18,0	20,8	20,7
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	96,5	95,9	95,9	96,7	96,9	96,6	97,3	97,3	97,0	96,8	97,8
*I-II ст., %	87,3	85,5	84,5	84,2	83,1	82,9	83,0	83,3	83,0	83,0	84,9
*III ст., %	10,3	11,2	11,5	11,8	12,4	13,0	12,4	12,4	12,3	12,4	10,6
*IV ст., %	1,9	2,5	3,1	3,2	3,6	3,0	3,4	3,6	3,6	3,6	3,9
Показатель одногодичной летальности, %	3,2	4,0	5,1	5,1	4,9	4,8	5,4	4,3	5,1	4,6	4,4
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	4095	3838	3712	3435	3371	3241	3192	2757	2615	2471	
из них доля выявленных активно, %	21,9	19,9	21,7	20,4	18,8	21,8	22,1	26,3	25,4	31,2	
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	97,3	97,2	97,4	96,4	96,8	96,9	96,2	97,7	98,5	98,3	
*I-II ст., %	82,8	84,2	82,8	81,5	81,4	83,5	82,3	84,0	84,8	85,5	
*III ст., %	11,4	11,2	11,6	12,0	12,1	10,2	11,8	10,4	10,4	10,1	
*IV ст., %	4,4	3,8	4,9	5,6	5,4	5,6	5,3	4,4	3,9	3,5	
Показатель одногодичной летальности, %	4,8	5,2	4,7	6,2	5,2	5,1	5,3	4,2	5,2	4,9	

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 19

**Динамика сведений о контингенте больных с ЗНО губы (С00), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных, состоящих на учете на конец года	109359	106724	105522	102346	99527	97770	94323	92019	89455	86607	82150
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	72,3	72,5	72,1	72,6	72,1	71,6	71,6	72,4	71,1	71,9	73,2
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	68,9	68,3	67,6	66,4	64,5	64,0	63,3	63,1	62,1	62,6	61,5
Показатель распространенности на 100 000 населения	73,8	72,1	71,4	69,5	67,7	66,7	64,6	63,4	62,2	60,6	57,3
Индекс накопления контингента	16,8	16,8	17,9	17,0	17,0	17,8	18,0	18,8	19,0	19,1	19,5
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных, состоящих на учете на конец года	78654	76075	73549	69680	67157	64688	62599	59890	57547	54135	
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	73,5	73,3	73,8	74,7	75,1	74,2	74,1	75,1	74,7	74,9	
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	61,3	60,6	60,7	60,1	61,4	61,0	60,9	61,1	61,7	60,4	
Показатель распространенности на 100 000 населения	55,1	53,6	51,6	49,0	47,3	45,6	44,1	41,9	40,2	37,7	
Индекс накопления контингента	19,2	19,8	19,8	20,3	19,9	20,0	19,6	21,7	22,0	21,9	

**Таблица 20**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО полости рта (C01-09)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>6386</b>	<b>6036</b>	<b>6397</b>	<b>6279</b>	<b>6301</b>	<b>6197</b>	<b>6630</b>	<b>6590</b>	<b>6469</b>	<b>6261</b>	<b>6367</b>	<b>6467</b>
<b>20-24</b>	9	23	27	35	24	20	29	21	22	23	18	17
<b>25-29</b>	31	38	27	36	35	31	48	21	39	27	26	39
<b>30-34</b>	97	75	65	56	68	66	58	53	59	53	59	59
<b>35-39</b>	174	177	185	163	126	130	143	129	123	113	95	104
<b>40-44</b>	411	385	397	383	374	323	391	305	328	294	302	311
<b>45-49</b>	554	603	665	700	673	680	745	716	657	644	614	627
<b>50-54</b>	887	697	605	596	634	744	927	1017	1036	968	1024	1049
<b>55-59</b>	1145	1124	1197	1171	1133	911	874	712	696	735	913	1023
<b>60-64</b>	1065	948	1001	998	1028	1112	1221	1315	1270	1100	900	728
<b>65-69</b>	951	974	1066	999	950	909	817	843	823	845	931	1058
<b>70-74</b>	452	469	555	571	681	683	808	814	759	737	714	641
<b>75-79</b>	314	238	268	271	281	277	294	361	399	453	479	494
<b>80-84</b>	173	172	201	171	159	158	138	154	132	156	157	191
<b>85 и ст.</b>	100	82	107	112	105	126	115	100	102	96	115	98

**Продолжение таблицы 20**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО полости рта (C01-09)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>6379</b>	<b>6479</b>	<b>6798</b>	<b>6942</b>	<b>7209</b>	<b>7357</b>	<b>7674</b>	<b>7679</b>	<b>7970</b>	<b>25,4</b>	<b>28,3</b>	<b>14,3</b>
<b>20-24</b>	22	20	23	25	18	29	20	20	26	-	-	-
<b>25-29</b>	41	46	40	32	27	42	45	48	50	<b>41,7</b>	-	<b>81,7</b>
<b>30-34</b>	56	76	61	75	88	78	99	87	107	<b>38,6</b>	<b>90,9</b>	<b>34,5</b>
<b>35-39</b>	107	94	125	123	133	147	182	148	190	-	<b>109,6</b>	<b>50,1</b>
<b>40-44</b>	257	274	246	275	234	279	300	302	326	<b>-33,4</b>		<b>28,0</b>
<b>45-49</b>	602	597	653	603	616	623	544	543	572	<b>-13,2</b>	<b>-10,1</b>	-
<b>50-54</b>	1001	983	1014	1008	1028	1116	1175	1122	1130	<b>69,2</b>	<b>15,1</b>	<b>13,4</b>
<b>55-59</b>	1161	1210	1279	1340	1399	1395	1449	1479	1524	<b>54,9</b>	<b>58,0</b>	<b>13,1</b>
<b>60-64</b>	691	667	809	968	1211	1323	1409	1506	1541	-	<b>165,6</b>	<b>54,9</b>
<b>65-69</b>	1033	1041	943	845	750	653	677	731	847	<b>-22,1</b>	<b>-32,5</b>	-
<b>70-74</b>	591	613	716	743	790	809	850	755	648	<b>36,6</b>	-	-
<b>75-79</b>	499	484	503	447	446	369	436	461	536	<b>93,3</b>	-	-
<b>80-84</b>	220	217	263	306	282	310	305	282	272	<b>126,7</b>	<b>68,7</b>	-
<b>85 и ст.</b>	88	126	93	113	132	145	171	182	183	<b>78,3</b>	<b>112,0</b>	<b>68,8</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 20**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО полости рта (C01-09)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>4898</b>	<b>4592</b>	<b>4919</b>	<b>4852</b>	<b>4767</b>	<b>4760</b>	<b>5028</b>	<b>5048</b>	<b>4890</b>	<b>4677</b>	<b>4774</b>	<b>4748</b>
<b>20-24</b>	4	10	14	12	12	5	13	11	14	9	10	8
<b>25-29</b>	10	16	15	18	18	14	20	12	24	19	18	19
<b>30-34</b>	53	44	34	33	38	32	25	25	35	27	33	35
<b>35-39</b>	125	120	116	101	79	84	83	87	74	62	58	63
<b>40-44</b>	334	324	311	300	289	259	309	231	238	213	213	229
<b>45-49</b>	492	521	562	613	568	577	624	603	546	533	491	507
<b>50-54</b>	755	598	517	509	539	652	777	878	889	808	855	879
<b>55-59</b>	995	932	1049	1014	961	795	736	600	585	611	762	852
<b>60-64</b>	873	777	845	824	856	921	1005	1086	1032	880	737	578
<b>65-69</b>	707	734	806	809	722	703	639	655	647	663	719	814
<b>70-74</b>	279	295	347	367	438	457	547	553	511	533	496	407
<b>75-79</b>	157	123	149	132	136	136	144	184	202	230	263	258
<b>80-84</b>	70	62	104	66	62	69	60	77	40	55	76	67
<b>85 и ст.</b>	30	20	31	45	35	41	36	31	42	23	36	24

**Продолжение таблицы 20**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО полости рта (C01-09)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>4663</b>	<b>4819</b>	<b>4860</b>	<b>5067</b>	<b>5236</b>	<b>5251</b>	<b>5469</b>	<b>5448</b>	<b>5728</b>	<b>14,5</b>	<b>22,5</b>	<b>11,9</b>
<b>20-24</b>	11	13	8	11	9	14	8	12	13	-	-	-
<b>25-29</b>	16	31	17	12	13	18	23	27	31	<b>68,7</b>	-	<b>238,8</b>
<b>30-34</b>	34	48	36	43	48	42	60	53	70	<b>65,3</b>	<b>105,4</b>	<b>62,7</b>
<b>35-39</b>	71	57	80	87	85	84	121	97	126	-	<b>124,0</b>	-
<b>40-44</b>	172	204	173	200	176	200	206	222	231	<b>-43,5</b>	-	<b>23,7</b>
<b>45-49</b>	478	464	498	469	462	470	421	397	426	<b>-26,9</b>	<b>-17,1</b>	<b>-13,7</b>
<b>50-54</b>	817	810	799	832	804	860	910	853	881	<b>48,3</b>	-	-
<b>55-59</b>	964	1018	1021	1098	1138	1111	1166	1154	1221	<b>39,4</b>	<b>48,6</b>	<b>9,4</b>
<b>60-64</b>	555	533	623	757	958	1032	1079	1172	1210	-	<b>152,1</b>	<b>54,0</b>
<b>65-69</b>	772	814	694	620	562	474	519	546	615	<b>-25,1</b>	<b>-35,6</b>	-
<b>70-74</b>	407	424	479	494	515	533	517	473	429	<b>36,0</b>	-	-
<b>75-79</b>	272	273	275	253	261	210	248	259	290	<b>125,7</b>	-	-
<b>80-84</b>	72	73	112	136	125	142	130	114	120	<b>138,5</b>	<b>96,0</b>	-
<b>85 и ст.</b>	19	37	27	36	48	36	52	63	55	<b>71,6</b>	<b>160,4</b>	<b>63,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 20**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО полости рта (C01-09)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>1488</b>	<b>1444</b>	<b>1478</b>	<b>1427</b>	<b>1534</b>	<b>1437</b>	<b>1602</b>	<b>1542</b>	<b>1579</b>	<b>1584</b>	<b>1593</b>	<b>1719</b>
<b>20-24</b>	5	13	13	23	12	15	16	10	8	14	8	9
<b>25-29</b>	21	22	12	18	17	17	28	9	15	8	8	20
<b>30-34</b>	44	31	31	23	30	34	33	28	24	26	26	24
<b>35-39</b>	49	57	69	62	47	46	60	42	49	51	37	41
<b>40-44</b>	77	61	86	83	85	64	82	74	90	81	89	82
<b>45-49</b>	62	82	103	87	105	103	121	113	111	111	123	120
<b>50-54</b>	132	99	88	87	95	92	150	139	147	160	169	170
<b>55-59</b>	150	192	148	157	172	116	138	112	111	124	151	171
<b>60-64</b>	192	171	156	174	172	191	216	229	238	220	163	150
<b>65-69</b>	244	240	260	190	228	206	178	188	176	182	212	244
<b>70-74</b>	173	174	208	204	243	226	261	261	248	204	218	234
<b>75-79</b>	157	115	119	139	145	141	150	177	197	223	216	236
<b>80-84</b>	103	110	97	105	97	89	78	77	92	101	81	124
<b>85 и ст.</b>	70	62	76	67	70	85	79	69	60	73	79	74

**Продолжение таблицы 20**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО полости рта (С01-09)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1716</b>	<b>1660</b>	<b>1938</b>	<b>1875</b>	<b>1973</b>	<b>2106</b>	<b>2205</b>	<b>2231</b>	<b>2242</b>	<b>64,5</b>	<b>45,1</b>	<b>20,7</b>
<b>20-24</b>	11	7	15	14	9	15	12	8	13	-	-	-
<b>25-29</b>	25	15	23	20	14	24	22	21	19	-	-	-
<b>30-34</b>	22	28	25	32	40	36	39	34	37	-	<b>72,1</b>	-
<b>35-39</b>	36	37	45	36	48	63	61	51	64	-	<b>86,8</b>	-
<b>40-44</b>	85	70	73	75	58	79	94	80	95	-	-	-
<b>45-49</b>	124	133	155	134	154	153	123	146	146	<b>85,7</b>	-	-
<b>50-54</b>	184	173	215	176	224	256	265	269	249	<b>243,9</b>	<b>72,2</b>	<b>37,1</b>
<b>55-59</b>	197	192	258	242	261	284	283	325	303	<b>173,3</b>	<b>109,3</b>	<b>29,5</b>
<b>60-64</b>	136	134	186	211	253	291	330	334	331	<b>88,9</b>	<b>226,2</b>	<b>58,3</b>
<b>65-69</b>	261	227	249	225	188	179	158	185	232	-	-	-
<b>70-74</b>	184	189	237	249	275	276	333	282	219	<b>37,8</b>	-	-
<b>75-79</b>	227	211	228	194	185	159	188	202	246	<b>63,3</b>	-	-
<b>80-84</b>	148	144	151	170	157	168	175	168	152	<b>118,8</b>	<b>52,4</b>	-
<b>85 и ст.</b>	69	89	66	77	84	109	119	119	128	<b>81,4</b>	<b>95,2</b>	<b>71,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 21

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО полости рта (С01-09), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,20	0,31	0,27	0,36	0,29	0,25	0,37	0,20	0,29	0,23	0,20	0,25
<b>30-39</b>	1,07	1,01	1,02	0,91	0,83	0,87	0,92	0,86	0,89	0,84	0,78	0,84
<b>40-49</b>	5,32	5,02	5,02	4,89	4,60	4,30	4,79	4,26	4,09	3,89	3,82	3,97
<b>50-59</b>	11,93	11,19	11,62	11,80	12,08	11,61	12,75	12,14	11,97	11,27	11,96	11,88
<b>60-69</b>	13,31	12,95	14,18	13,82	13,65	13,80	13,82	14,65	14,34	13,68	13,37	13,75
<b>70-79</b>	11,92	10,79	12,09	11,58	12,24	11,35	12,29	12,53	12,04	12,23	12,37	12,10
<b>80 и ст.</b>	8,53	7,80	9,41	8,84	8,52	9,42	8,56	8,77	8,24	8,88	10,09	10,24
<b>15-59</b>	3,66	3,44	3,48	3,43	3,36	3,17	3,51	3,24	3,23	3,09	3,23	3,40
<b>«Грубый» показатель</b>	4,31	4,08	4,33	4,26	4,29	4,23	4,54	4,54	4,50	4,38	4,44	4,53
<b>Стандарт. показатель</b>	3,32	3,14	3,29	3,24	3,22	3,14	3,34	3,27	3,23	3,10	3,13	3,14
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,27	0,28	0,26	0,23	0,18	0,29	0,27	0,29	0,33	-	<b>30,8</b>	<b>59,2</b>
<b>30-39</b>	0,84	0,86	0,93	0,97	1,07	1,08	1,32	1,09	1,35	-	-	-
<b>40-49</b>	3,71	3,83	4,07	4,10	4,09	4,41	4,31	4,39	4,72	<b>-16,1</b>	<b>22,7</b>	<b>13,9</b>
<b>50-59</b>	11,61	11,24	11,44	11,43	11,61	11,95	12,11	11,93	12,16	-	-	<b>6,0</b>
<b>60-69</b>	14,00	14,35	15,04	15,94	17,33	17,37	17,26	17,60	17,46	<b>35,0</b>	<b>37,5</b>	-
<b>70-79</b>	11,86	11,96	13,12	12,53	12,76	12,04	12,86	12,34	12,54	<b>8,9</b>	-	-
<b>80 и ст.</b>	10,29	10,69	10,31	11,31	10,53	11,30	11,08	10,60	10,34	<b>36,2</b>	-	-
<b>15-59</b>	3,37	3,41	3,57	3,62	3,72	3,90	4,04	4,01	4,24	<b>19,9</b>	<b>30,7</b>	<b>16,5</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	4,49	4,55	4,78	4,89	5,08	5,18	5,37	5,36	5,55	<b>31,1</b>	<b>27,8</b>	<b>12,7</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	3,10	3,15	3,29	3,34	3,45	3,49	3,52	3,49	3,59	<b>9,2</b>	<b>17,3</b>	<b>6,0</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 21**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО полости рта (С01-09), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,14	0,26	0,29	0,29	0,29	0,18	0,31	0,22	0,36	0,26	0,25	0,24
<b>30-39</b>	1,41	1,31	1,22	1,12	1,01	1,03	0,99	1,06	1,06	0,89	0,93	1,01
<b>40-49</b>	9,31	8,80	8,49	8,50	7,77	7,40	8,13	7,20	6,74	6,42	6,14	6,51
<b>50-59</b>	22,61	20,82	22,49	22,72	22,89	22,56	23,69	22,85	22,37	20,61	22,05	22,04
<b>60-69</b>	26,90	25,96	28,62	28,33	27,18	27,59	27,72	29,46	28,80	27,36	26,97	27,50
<b>70-79</b>	25,78	24,17	27,27	25,10	25,84	24,05	25,76	25,89	24,19	25,39	25,07	22,46
<b>80 и ст.</b>	15,66	12,54	20,53	17,28	15,54	18,04	15,96	18,10	13,87	13,12	21,54	16,61
<b>15-59</b>	6,21	5,73	5,83	5,77	5,56	5,36	5,72	5,42	5,33	5,03	5,30	5,59
<b>«Грубый» показатель</b>	7,04	6,61	7,09	7,02	6,92	6,93	7,35	7,42	7,27	7,01	7,16	7,16
<b>Стандарт. показатель</b>	6,30	5,86	6,25	6,16	6,00	5,93	6,17	6,17	6,00	5,71	5,83	5,71
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,23	0,37	0,21	0,19	0,18	0,26	0,26	0,33	0,38	-	-	<b>136,4</b>
<b>30-39</b>	1,09	1,07	1,17	1,29	1,30	1,22	1,72	1,41	1,80	-	-	-
<b>40-49</b>	5,89	6,17	6,38	6,56	6,45	6,87	6,69	6,71	7,19	<b>-27,8</b>	<b>15,0</b>	<b>8,3</b>
<b>50-59</b>	21,35	20,98	20,37	21,09	20,87	21,07	21,43	20,56	21,47	<b>-8,3</b>	-	-
<b>60-69</b>	27,91	29,41	29,32	31,18	34,30	33,63	32,91	33,51	33,10	<b>26,9</b>	<b>28,3</b>	-
<b>70-79</b>	23,23	23,71	25,19	24,35	24,83	23,54	23,64	23,10	23,86	<b>-8,8</b>	-	-
<b>80 и ст.</b>	15,38	16,72	18,79	20,88	19,32	19,21	18,20	17,18	16,76	-	-	<b>-19,1</b>
<b>15-59</b>	5,49	5,64	5,63	5,91	5,93	6,09	6,38	6,21	6,67	<b>10,3</b>	<b>22,9</b>	<b>12,2</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	7,08	7,30	7,39	7,71	7,98	8,00	8,27	8,22	8,62	<b>22,1</b>	<b>22,7</b>	<b>10,3</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	5,64	5,83	5,86	6,05	6,23	6,15	6,22	6,11	6,29	-	<b>10,7</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 21**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО полости рта (С01-09), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,27	0,37	0,26	0,42	0,29	0,32	0,43	0,18	0,22	0,21	0,14	0,26
<b>30-39</b>	0,74	0,70	0,82	0,71	0,66	0,71	0,86	0,67	0,72	0,78	0,63	0,66
<b>40-49</b>	1,50	1,42	1,74	1,49	1,62	1,39	1,66	1,51	1,62	1,54	1,70	1,64
<b>50-59</b>	3,03	3,26	2,76	2,95	3,31	2,65	3,72	3,23	3,27	3,45	3,61	3,55
<b>60-69</b>	4,70	4,55	4,73	4,19	4,61	4,53	4,47	4,73	4,72	4,68	4,52	4,97
<b>70-79</b>	6,97	6,00	6,55	6,49	6,88	6,13	6,54	6,71	6,67	6,35	6,56	7,33
<b>80 и ст.</b>	6,75	6,61	6,62	6,72	6,75	7,23	6,67	6,35	6,76	7,76	7,35	8,71
<b>15-59</b>	1,18	1,21	1,19	1,17	1,23	1,05	1,36	1,13	1,20	1,22	1,27	1,32
<b>«Грубый» показатель</b>	1,89	1,84	1,89	1,82	1,97	1,85	2,07	2,00	2,06	2,08	2,08	2,25
<b>Стандарт. показатель</b>	1,20	1,19	1,21	1,17	1,23	1,14	1,30	1,21	1,24	1,24	1,24	1,32
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,31	0,19	0,32	0,28	0,19	0,32	0,29	0,25	0,28	-	-	-
<b>30-39</b>	0,59	0,65	0,69	0,66	0,84	0,94	0,92	0,77	0,91	-	-	-
<b>40-49</b>	1,73	1,71	1,97	1,86	1,95	2,17	2,12	2,26	2,44	<b>60,7</b>	<b>48,5</b>	<b>29,9</b>
<b>50-59</b>	3,70	3,38	4,26	3,67	4,18	4,63	4,57	4,93	4,59	<b>68,4</b>	<b>42,2</b>	<b>25,2</b>
<b>60-69</b>	5,25	4,93	6,08	6,26	6,41	6,81	6,75	6,84	6,89	<b>70,1</b>	<b>55,5</b>	<b>10,0</b>
<b>70-79</b>	6,56	6,42	7,38	6,89	7,01	6,56	7,70	7,24	7,23	<b>12,8</b>	-	-
<b>80 и ст.</b>	9,04	9,13	8,00	8,57	7,94	8,94	8,92	8,58	8,34	<b>41,3</b>	-	-
<b>15-59</b>	1,38	1,32	1,64	1,48	1,65	1,86	1,85	1,94	1,95	<b>82,4</b>	<b>64,2</b>	<b>30,3</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	2,25	2,17	2,54	2,46	2,59	2,76	2,87	2,90	2,91	<b>69,0</b>	<b>44,0</b>	<b>19,1</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	1,31	1,27	1,51	1,46	1,53	1,64	1,62	1,65	1,66	<b>48,1</b>	<b>38,1</b>	<b>13,0</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 22

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО полости рта (C01-09),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	59,4	59,4	60,0	59,9	60,3	60,8	60,3	61,1	61,0	61,2	60,6	59,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	59,2	59,0	59,6	59,6	59,8	60,0	59,5	60,2	60,1	60,6	60,6	60,4
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,39	0,37	0,39	0,38	0,38	0,37	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	59,7	59,6	59,7	59,8	60,0	59,8	60,0	60,3	60,1	-	-	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	60,6	60,5	60,6	60,6	60,5	60,2	60,6	60,7	60,4	2,2	-	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,37	0,37	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	-	17,7	
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	58,3	58,5	59,2	59,1	59,3	59,7	59,4	60,3	60,1	60,3	59,6	58,7
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	58,1	58,0	58,8	58,7	58,9	59,1	58,8	59,3	59,2	59,6	59,8	59,3
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,75	0,71	0,75	0,74	0,73	0,71	0,75	0,75	0,73	0,71	0,71	0,70

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 22**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО полости рта (С01-09),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	58,8	58,7	58,9	58,9	59,4	59,1	59,2	59,6	59,4	-	-	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	59,6	59,4	59,7	59,6	59,7	59,4	59,5	59,7	59,4	2,3	-	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,70	0,72	0,72	0,74	0,76	0,75	0,76	0,75	0,77	-	10,2	-
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	65,1	64,4	65,4	64,8	65,4	65,7	63,7	65,0	64,7	64,8	65,22	66,1
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	62,9	62,2	62,5	62,5	62,8	63,2	61,9	63,2	63,0	63,4	63,2	63,5
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,14	0,13	0,14	0,13	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	65,6	65,6	64,0	64,5	63,1	62,2	63,0	62,6	62,8	-3,5	-5,7	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	63,4	63,8	62,8	63,2	62,6	62,3	63,2	63,1	62,9	-	-	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,15	0,14	0,17	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,19	-	40,6	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 23**

**Динамика сведений о диагностике и контингенте больных  
с ЗНО полости рта (C01-09), состоящем на учете  
онкологических учреждений, Россия, 2011-2013 гг.**

Показатель	2011	2012	2013
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	7092	7136	7362
из них доля выявленных активно, %	11,3	10,8	14,5
Число впервые выявленных ЗНО (без учтенных посмертно)	7411	7544	7790
из них *доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	97,0	96,1	96,5
*I ст., %	10,0	10,9	10,5
*II ст., %	24,8	25,5	25,9
*III ст., %	34,6	33,6	33,2
*IV ст., %	28,8	28,1	28,4
Показатель одногодичной летальности, %	-	37,0	35,0
Число больных, состоящих на учете на конец года	33079	33410	34969
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	49,6	48,9	48,2
Показатель распространенности на 100 000 населения	23,1	23,3	24,4
Индекс накопления контингента	4,7	4,7	4,8

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

**Таблица 24**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО глотки (C10-13))  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>4058</b>	<b>4196</b>	<b>3929</b>	<b>4084</b>	<b>4083</b>	<b>4285</b>	<b>3733</b>	<b>3943</b>	<b>3900</b>	<b>3954</b>	<b>3861</b>	<b>4086</b>
<b>20-24</b>	15	10	12	26	26	14	13	19	32	11	17	14
<b>25-29</b>	13	14	22	22	19	11	17	19	9	15	15	11
<b>30-34</b>	51	45	28	36	32	28	13	20	24	29	26	21
<b>35-39</b>	79	89	83	93	81	68	50	59	58	32	41	42
<b>40-44</b>	264	263	259	207	240	212	203	173	158	184	176	169
<b>45-49</b>	405	469	459	455	471	524	411	430	388	404	406	374
<b>50-54</b>	613	539	397	438	400	556	583	668	716	745	715	731
<b>55-59</b>	824	858	855	897	798	681	512	469	459	507	593	739
<b>60-64</b>	672	695	610	673	684	812	794	827	803	743	649	609
<b>65-69</b>	593	655	635	665	646	615	488	545	532	567	551	620
<b>70-74</b>	260	265	316	317	403	444	416	438	414	408	397	398
<b>75-79</b>	143	142	126	114	136	177	127	157	190	206	174	241
<b>80-84</b>	60	66	61	59	60	74	39	50	52	50	57	58
<b>85 и ст.</b>	32	43	31	30	40	32	36	29	34	26	24	34

**Продолжение таблицы 24**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО глотки (C10-13)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>4032</b>	<b>4137</b>	<b>4290</b>	<b>4297</b>	<b>4571</b>	<b>4569</b>	<b>4390</b>	<b>4649</b>	<b>4714</b>	<b>16,1</b>	<b>20,4</b>	<b>-</b>
<b>20-24</b>	25	19	17	40	21	20	12	14	16	-	-	<b>-64,0</b>
<b>25-29</b>	15	18	20	29	32	26	19	20	17	-	-	<b>-45,1</b>
<b>30-34</b>	26	36	21	58	47	24	36	30	33	-	-	-
<b>35-39</b>	46	59	61	65	92	88	65	67	66	-	<b>76,0</b>	
<b>40-44</b>	163	130	140	139	149	160	133	151	190	<b>-46,7</b>	-	-
<b>45-49</b>	382	391	396	348	356	333	337	319	294	<b>-32,9</b>	<b>-23,7</b>	<b>-14,8</b>
<b>50-54</b>	720	728	719	695	702	758	680	688	694	<b>50,6</b>	-	-
<b>55-59</b>	821	828	922	950	967	1003	971	1068	1065	<b>49,0</b>	<b>60,8</b>	<b>13,0</b>
<b>60-64</b>	453	484	548	651	811	869	919	1011	1046	-	<b>127,2</b>	<b>56,9</b>
<b>65-69</b>	677	675	695	539	487	420	410	458	508	<b>-23,6</b>	<b>-32,4</b>	
<b>70-74</b>	360	361	417	399	509	476	477	469	383	<b>44,8</b>	-	-
<b>75-79</b>	208	222	203	205	196	195	188	209	245	<b>75,1</b>	-	-
<b>80-84</b>	78	93	71	67	102	104	93	89	106	<b>98,5</b>	<b>70,6</b>	-
<b>85 и ст.</b>	29	35	23	37	39	54	33	40	26	-	-	

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 24**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО глотки (C10-13)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>3452</b>	<b>3563</b>	<b>3390</b>	<b>3493</b>	<b>3492</b>	<b>3679</b>	<b>3240</b>	<b>3448</b>	<b>3398</b>	<b>3474</b>	<b>3385</b>	<b>3581</b>
<b>20-24</b>	7	7	7	17	13	8	9	10	21	8	11	6
<b>25-29</b>	11	11	17	19	14	5	13	9	7	10	12	10
<b>30-34</b>	32	33	20	21	21	17	6	17	17	19	17	12
<b>35-39</b>	60	62	57	69	54	53	38	49	41	29	29	31
<b>40-44</b>	224	238	227	166	205	190	173	145	135	146	142	131
<b>45-49</b>	364	421	414	410	422	462	379	372	338	367	356	320
<b>50-54</b>	556	490	370	390	359	498	526	611	663	683	653	664
<b>55-59</b>	754	768	762	814	740	624	472	439	419	460	558	687
<b>60-64</b>	608	599	559	605	611	738	719	756	736	676	598	559
<b>65-69</b>	490	559	563	578	561	532	439	482	472	514	498	568
<b>70-74</b>	191	198	242	244	316	355	332	375	347	351	330	350
<b>75-79</b>	95	96	82	76	95	119	85	106	135	156	123	183
<b>80-84</b>	29	34	33	30	34	44	20	34	28	24	31	30
<b>85 и ст.</b>	13	21	19	19	19	11	8	14	20	12	14	17

**Продолжение таблицы 24**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО глотки (C10-13)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>3518</b>	<b>3592</b>	<b>3729</b>	<b>3709</b>	<b>3929</b>	<b>3925</b>	<b>3782</b>	<b>4004</b>	<b>4057</b>	<b>17,0</b>	<b>17,9</b>	<b>-</b>
<b>20-24</b>	19	11	10	27	15	14	7	10	12	-	-	-
<b>25-29</b>	9	8	15	18	20	13	9	11	15	-	-	
<b>30-34</b>	19	25	13	45	24	19	25	17	23	-	-	-
<b>35-39</b>	29	44	40	48	60	62	41	52	42	-	<b>69,8</b>	-
<b>40-44</b>	114	110	114	115	122	130	107	117	159	<b>-52,1</b>	-	
<b>45-49</b>	324	344	333	303	294	287	276	267	244	<b>-38,5</b>	<b>-27,2</b>	<b>-17,7</b>
<b>50-54</b>	662	654	639	609	627	633	596	591	595	<b>41,4</b>	<b>-11,3</b>	-
<b>55-59</b>	757	756	849	854	870	915	878	945	943	<b>46,2</b>	<b>52,3</b>	<b>10,7</b>
<b>60-64</b>	415	443	491	591	735	779	833	919	942	-	<b>121,9</b>	<b>56,5</b>
<b>65-69</b>	613	604	627	483	432	368	362	391	453	<b>-20,8</b>	<b>-35,2</b>	-
<b>70-74</b>	307	307	362	354	453	423	406	419	333	<b>70,9</b>	-	-
<b>75-79</b>	167	183	160	159	156	162	149	172	192	<b>126,9</b>	-	
<b>80-84</b>	47	50	45	47	69	74	66	58	74	<b>211,4</b>	<b>134,0</b>	-
<b>85 и ст.</b>	15	21	6	18	21	19	16	25	15	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 24**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО глотки (C10-13)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>606</b>	<b>633</b>	<b>539</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>606</b>	<b>493</b>	<b>495</b>	<b>502</b>	<b>480</b>	<b>476</b>	<b>505</b>
<b>20-24</b>	8	3	5	9	13	6	4	9	11	3	6	8
<b>25-29</b>	2	3	5	3	5	6	4	10	2	5	3	1
<b>30-34</b>	19	12	8	15	11	11	7	3	7	10	9	9
<b>35-39</b>	19	27	26	24	27	15	12	10	17	3	12	11
<b>40-44</b>	40	25	32	41	35	22	30	28	23	38	34	38
<b>45-49</b>	41	48	45	45	49	62	32	58	50	37	50	54
<b>50-54</b>	57	49	27	48	41	58	57	57	53	62	62	67
<b>55-59</b>	70	90	93	83	58	57	40	30	40	47	35	52
<b>60-64</b>	64	96	51	68	73	74	75	71	67	67	51	50
<b>65-69</b>	103	96	72	87	85	83	49	63	60	53	53	52
<b>70-74</b>	69	67	74	73	87	89	84	63	67	57	67	48
<b>75-79</b>	48	46	44	38	41	58	42	51	55	50	51	58
<b>80-84</b>	31	32	28	29	26	30	19	16	24	26	26	28
<b>85 и ст.</b>	19	22	12	11	21	21	28	15	14	14	10	17

**Продолжение таблицы 24**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО глотки (C10-13)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>514</b>	<b>545</b>	<b>561</b>	<b>588</b>	<b>642</b>	<b>644</b>	<b>608</b>	<b>645</b>	<b>657</b>	-	<b>38,4</b>	-
<b>20-24</b>	6	8	7	13	6	6	5	4	4	-	-	-
<b>25-29</b>	6	10	5	11	12	13	10	9	2	-	-	-
<b>30-34</b>	7	11	8	13	23	5	11	13	10	-		-
<b>35-39</b>	17	15	21	17	32	26	24	15	24	-	<b>91,2</b>	-
<b>40-44</b>	49	20	26	24	27	30	26	34	31	-	-	-
<b>45-49</b>	58	47	63	45	62	46	61	52	50	-	-	
<b>50-54</b>	58	74	80	86	75	125	84	97	99	<b>172,4</b>	<b>74,7</b>	-
<b>55-59</b>	64	72	73	96	97	88	93	123	122	<b>81,4</b>	<b>195,5</b>	-
<b>60-64</b>	38	41	57	60	76	90	86	92	104	-	<b>191,0</b>	<b>60,8</b>
<b>65-69</b>	64	71	68	56	55	52	48	67	55	<b>-42,3</b>	-	-
<b>70-74</b>	53	54	55	45	56	53	71	50	50	<b>-36,2</b>	-	-
<b>75-79</b>	41	39	43	46	40	33	39	37	53	-	-	-
<b>80-84</b>	31	43	26	20	33	30	27	31	32	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	14	14	17	19	18	35	17	15	11	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 25

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО глотки (C10-13), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,14	0,12	0,17	0,24	0,22	0,12	0,14	0,18	0,19	0,12	0,14	0,11
<b>30-39</b>	0,51	0,54	0,45	0,54	0,49	0,43	0,29	0,38	0,40	0,31	0,34	0,32
<b>40-49</b>	3,69	3,72	3,40	2,99	3,13	3,15	2,59	2,52	2,27	2,44	2,43	2,30
<b>50-59</b>	8,43	8,59	8,07	8,92	8,19	8,68	7,75	7,98	8,12	8,28	8,07	8,43
<b>60-69</b>	8,35	9,09	8,54	9,26	9,18	9,74	8,69	9,31	9,15	9,21	8,76	9,46
<b>70-79</b>	6,27	6,21	6,49	5,93	6,86	7,34	6,05	6,35	6,28	6,31	5,92	6,81
<b>80 и ст.</b>	2,88	3,35	2,81	2,78	3,23	3,52	2,54	2,73	3,03	2,68	3,01	3,26
<b>15-59</b>	2,51	2,53	2,32	2,40	2,28	2,30	1,97	2,04	2,02	2,09	2,11	2,21
<b>«Грубый» показатель</b>	2,74	2,84	2,66	2,77	2,78	2,92	2,56	2,72	2,71	2,77	2,69	2,86
<b>Стандарт. показатель</b>	2,16	2,22	2,06	2,16	2,11	2,21	1,92	2,01	2,00	2,01	1,96	2,05
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,17	0,16	0,15	0,28	0,22	0,19	0,13	0,14	0,14	-	-	<b>-53,1</b>
<b>30-39</b>	0,37	0,48	0,41	0,60	0,67	0,54	0,47	0,45	0,45	-	-	<b>-32,2</b>
<b>40-49</b>	2,36	2,29	2,43	2,27	2,43	2,41	2,40	2,44	2,54	<b>-35,5</b>	-	<b>8,5</b>
<b>50-59</b>	8,27	7,97	8,19	8,01	7,98	8,38	7,62	8,06	8,06	-	-	-
<b>60-69</b>	9,18	9,74	10,67	10,46	11,47	11,33	11,00	11,56	11,36	<b>35,7</b>	<b>31,5</b>	-
<b>70-79</b>	6,18	6,36	6,67	6,36	7,28	6,86	6,65	6,88	6,65	-	-	-
<b>80 и ст.</b>	3,58	3,99	2,72	2,81	3,59	3,93	2,93	2,95	3,00	-	-	-
<b>15-59</b>	2,30	2,29	2,39	2,44	2,48	2,54	2,39	2,53	2,57	-	<b>18,7</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	2,84	2,90	3,02	3,03	3,22	3,22	3,07	3,25	3,28	<b>21,4</b>	<b>20,1</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	2,01	2,09	2,14	2,17	2,26	2,21	2,05	2,15	2,15	-	<b>8,2</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 25**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО глотки (C10-13), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,18	0,18	0,24	0,35	0,26	0,12	0,21	0,18	0,26	0,17	0,21	0,14
<b>30-39</b>	0,73	0,76	0,63	0,75	0,64	0,62	0,40	0,62	0,57	0,48	0,47	0,44
<b>40-49</b>	6,63	6,87	6,23	5,36	5,69	5,77	4,81	4,47	4,07	4,41	4,34	3,99
<b>50-59</b>	16,93	17,12	16,25	17,96	16,77	17,49	15,63	16,23	16,42	16,60	16,52	17,20
<b>60-69</b>	18,69	19,90	19,45	20,52	20,18	21,58	19,53	20,95	20,72	21,10	20,30	22,26
<b>70-79</b>	16,91	17,00	17,81	16,09	18,50	19,22	15,55	16,90	16,35	16,87	14,96	18,00
<b>80 и ст.</b>	6,58	8,41	7,91	7,63	8,49	9,02	4,65	8,05	8,12	6,06	8,66	8,58
<b>15-59</b>	4,51	4,55	4,17	4,26	4,09	4,13	3,59	3,68	3,64	3,81	3,87	4,02
<b>«Грубый» показатель</b>	4,96	5,13	4,89	5,05	5,07	5,35	4,74	5,07	5,05	5,20	5,07	5,40
<b>Стандарт. показатель</b>	4,44	4,56	4,31	4,44	4,35	4,57	3,99	4,24	4,19	4,25	4,16	4,39
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,24	0,16	0,21	0,37	0,28	0,22	0,13	0,18	0,23	-	-	-
<b>30-39</b>	0,50	0,70	0,54	0,93	0,82	0,79	0,63	0,65	0,60	-	-	<b>-35,4</b>
<b>40-49</b>	3,97	4,19	4,25	4,10	4,20	4,28	4,09	4,16	4,41	<b>-39,7</b>	-	-
<b>50-59</b>	17,01	16,19	16,65	15,99	16,08	16,54	15,22	15,74	15,71	<b>-7,4</b>	<b>-8,1</b>	-
<b>60-69</b>	21,62	22,86	24,89	24,32	26,33	25,61	24,61	25,55	25,30	<b>38,6</b>	<b>23,1</b>	-
<b>70-79</b>	16,21	16,67	17,44	16,73	19,48	18,54	17,15	18,65	17,42	-	-	-
<b>80 и ст.</b>	10,48	10,79	6,90	7,89	10,05	10,04	8,20	8,05	8,52	-	-	-
<b>15-59</b>	4,17	4,17	4,33	4,35	4,40	4,51	4,25	4,44	4,53	-	<b>13,6</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	5,34	5,44	5,67	5,65	5,99	5,98	5,72	6,04	6,11	<b>24,8</b>	<b>18,2</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	4,27	4,41	4,51	4,50	4,69	4,61	4,28	4,46	4,45	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 25**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО глотки (C10-13), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,10	0,06	0,10	0,12	0,18	0,12	0,08	0,18	0,12	0,08	0,08	0,08
<b>30-39</b>	0,30	0,31	0,28	0,33	0,33	0,23	0,17	0,12	0,24	0,13	0,21	0,20
<b>40-49</b>	0,87	0,72	0,71	0,76	0,72	0,70	0,51	0,70	0,59	0,60	0,67	0,74
<b>50-59</b>	1,37	1,56	1,40	1,58	1,23	1,47	1,25	1,12	1,18	1,32	1,09	1,24
<b>60-69</b>	1,80	2,13	1,40	1,78	1,82	1,79	1,41	1,52	1,45	1,40	1,25	1,29
<b>70-79</b>	2,47	2,34	2,37	2,10	2,27	2,45	2,00	1,75	1,83	1,59	1,78	1,65
<b>80 и ст.</b>	1,95	2,08	1,53	1,56	1,90	2,12	2,00	1,35	1,69	1,78	1,65	1,98
<b>15-59</b>	0,57	0,58	0,54	0,59	0,53	0,52	0,41	0,45	0,45	0,44	0,45	0,50
<b>«Грубый» показатель</b>	0,77	0,81	0,69	0,76	0,76	0,78	0,64	0,64	0,66	0,63	0,62	0,66
<b>Стандарт. показатель</b>	0,53	0,55	0,46	0,53	0,51	0,51	0,41	0,42	0,43	0,40	0,38	0,42
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,10	0,15	0,10	0,20	0,15	0,16	0,13	0,11	0,05	-	-	-
<b>30-39</b>	0,24	0,26	0,29	0,29	0,52	0,29	0,32	0,26	0,30	-	-	-
<b>40-49</b>	0,88	0,56	0,77	0,61	0,82	0,71	0,85	0,86	0,82	-	-	-
<b>50-59</b>	1,19	1,35	1,38	1,60	1,48	1,83	1,48	1,83	1,84	<b>26,8</b>	<b>67,6</b>	-
<b>60-69</b>	1,35	1,53	1,75	1,67	1,90	2,06	1,85	2,10	1,95	-	<b>70,0</b>	-
<b>70-79</b>	1,50	1,49	1,56	1,42	1,46	1,30	1,63	1,30	1,60	<b>-46,5</b>	-	-
<b>80 и ст.</b>	1,87	2,23	1,59	1,35	1,68	2,10	1,33	1,37	1,28	-	-	-
<b>15-59</b>	0,54	0,53	0,58	0,65	0,69	0,69	0,65	0,73	0,72	<b>40,3</b>	<b>59,8</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	0,68	0,71	0,73	0,77	0,84	0,84	0,79	0,84	0,85	-	<b>37,2</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	0,44	0,49	0,49	0,55	0,59	0,55	0,50	0,53	0,53	-	<b>34,6</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 26**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО глотки (C10-13),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	58,4	58,7	58,9	59,0	59,6	60,1	60,2	60,5	60,5	60,2	59,3	59,4
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	58,0	58,2	58,4	58,2	58,8	59,3	59,1	59,2	59,4	59,5	59,2	59,8
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,25	0,26	0,24	0,25	0,25	0,26	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	58,7	58,8	59,0	58,7	59,3	59,2	59,6	59,8	59,8	-	1,7	1,8
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	59,3	59,2	59,4	58,4	59,1	59,4	59,8	60,0	59,8	2,3	-	2,4
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,25	0,27	0,26	-	-	-
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	58,0	58,2	58,7	58,8	59,3	59,7	59,8	60,3	60,3	60,0	59,1	59,4
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	57,7	57,8	58,2	58,1	58,6	58,9	58,7	59,1	59,2	59,3	59,1	59,8
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,54	0,54	0,53	0,54	0,53	0,55	0,49	0,52	0,51	0,53	0,52	0,55

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 26**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО глотки (C10-13),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
	1993-2013	2003-2013	2008-2013									
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	58,7	58,8	59,0	58,8	59,4	59,3	59,7	59,9	59,9	-	2,0	1,8
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	59,4	59,3	59,5	58,8	59,5	59,5	59,9	60,1	59,9	3,4	-	1,9
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,53	0,54	0,58	0,56	0,59	0,58	0,54	0,57	0,56	-	-	-
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	62,4	62,2	61,1	60,8	62,6	63,5	63,4	62,2	62,7	62,0	62,0	60,1
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	59,9	60,6	59,7	58,9	59,5	61,2	61,8	59,8	60,4	60,9	60,4	59,8
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	58,8	59,3	59,0	57,5	57,8	58,4	59,1	58,8	59,0	-7,9	-	2,8
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	59,0	58,4	59,0	56,1	56,5	58,9	59,2	59,1	59,3	-3,7	-	6,2
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 27**

**Динамика сведений о диагностике и контингенте больных  
с ЗНО глотки (C10-13), состоящем на учете  
онкологических учреждений, Россия, 2011-2013 гг.**

Показатель	2011	2012	2013
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	4056	4286	4362
из них доля выявленных активно, %	8,6	5,7	6,2
Число впервые выявленных ЗНО (без учтенных посмертно)	4208	4512	4547
из них *доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	95,1	94,2	95,4
*I ст., %	2,8	3,6	3,3
*II ст., %	14,3	13,5	12,3
*III ст., %	42,0	41,0	41,3
*IV ст., %	38,8	40,1	41,6
Показатель одногодичной летальности, %	-	40,2	42,6
Число больных, состоящих на учете на конец года	14414	14568	15319
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	41,2	39,9	39,8
Показатель распространенности на 100 000 населения	10,1	10,2	10,7
Индекс накопления контингента	3,6	3,4	3,5

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

**Таблица 28**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО губы, полости рта и глотки (C00-13,46.2) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>8587</b>	<b>8790</b>	<b>8326</b>	<b>8399</b>	<b>8407</b>	<b>8340</b>	<b>9023</b>	<b>8980</b>	<b>8748</b>	<b>8929</b>	<b>8681</b>	<b>8591</b>
<b>20-24</b>	11	11	11	8	12	11	14	11	16	19	17	21
<b>25-29</b>	15	18	21	18	15	11	28	18	21	19	19	21
<b>30-34</b>	55	44	57	34	40	35	32	32	31	28	37	35
<b>35-39</b>	152	152	126	125	105	95	109	114	97	92	90	83
<b>40-44</b>	470	464	399	401	366	319	392	348	308	277	306	269
<b>45-49</b>	594	778	801	845	865	799	914	842	787	770	711	735
<b>50-54</b>	1186	1066	780	678	749	813	1068	1263	1302	1391	1336	1270
<b>55-59</b>	1515	1653	1648	1577	1511	1343	1186	1024	889	1005	1141	1342
<b>60-64</b>	1611	1460	1298	1357	1393	1447	1736	1769	1768	1685	1400	1141
<b>65-69</b>	1286	1424	1487	1517	1409	1396	1371	1288	1186	1337	1330	1439
<b>70-74</b>	590	611	672	794	942	1090	1125	1230	1197	1173	1093	1015
<b>75-79</b>	448	422	384	408	392	440	486	517	613	652	713	729
<b>80-84</b>	396	389	381	354	316	272	272	244	280	245	251	277
<b>85 и ст.</b>	221	255	230	257	262	246	260	255	228	204	216	196

**Продолжение таблицы 28**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО губы, полости рта и глотки (C00-13,46.2) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>8301</b>	<b>8235</b>	<b>8246</b>	<b>8736</b>	<b>8778</b>	<b>9019</b>	<b>9176</b>	<b>9232</b>	<b>9445</b>	<b>6,6</b>	<b>12,3</b>	<b>8,4</b>
<b>20-24</b>	13	16	18	15	17	20	16	16	15	-	-	-
<b>25-29</b>	15	29	14	22	18	25	26	19	26	-	-	-
<b>30-34</b>	36	44	33	60	44	43	68	47	44	-	-	-
<b>35-39</b>	81	74	107	91	100	109	121	109	132	-	<b>60,3</b>	<b>39,0</b>
<b>40-44</b>	257	268	189	207	235	220	261	269	281	<b>-52,0</b>	-	<b>36,4</b>
<b>45-49</b>	653	637	633	655	605	590	579	545	531	<b>-32,3</b>	<b>-25,1</b>	<b>-17,7</b>
<b>50-54</b>	1261	1230	1148	1242	1204	1226	1245	1184	1232	<b>38,4</b>	-	-
<b>55-59</b>	1438	1511	1548	1692	1666	1790	1761	1819	1903	-	<b>54,3</b>	<b>12,9</b>
<b>60-64</b>	953	840	930	1159	1457	1626	1798	1886	1917	-	<b>107,4</b>	<b>63,0</b>
<b>65-69</b>	1482	1418	1389	1215	1020	880	838	882	1069	<b>-32,0</b>	<b>-41,2</b>	-
<b>70-74</b>	874	852	914	1051	1145	1165	1101	1145	910	<b>39,0</b>	-	-
<b>75-79</b>	754	764	753	703	626	633	630	616	714	<b>80,3</b>	<b>-14,6</b>	-
<b>80-84</b>	279	347	376	404	430	468	475	423	384	-	<b>72,5</b>	-
<b>85 и ст.</b>	190	186	182	200	196	208	247	263	275	-	<b>41,2</b>	<b>49,1</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 28**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО губы, полости рта и глотки (C00-13,46.2) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>7133</b>	<b>7270</b>	<b>6852</b>	<b>6850</b>	<b>6871</b>	<b>6893</b>	<b>7509</b>	<b>7403</b>	<b>7248</b>	<b>7348</b>	<b>7135</b>	<b>7044</b>
<b>20-24</b>	8	8	7	5	5	8	8	7	12	14	11	15
<b>25-29</b>	11	13	14	15	12	7	22	12	12	15	12	12
<b>30-34</b>	40	31	43	21	29	25	22	20	21	21	24	25
<b>35-39</b>	120	121	97	88	81	74	80	90	74	63	58	63
<b>40-44</b>	428	425	356	350	325	277	344	307	262	238	251	218
<b>45-49</b>	561	731	735	771	793	745	833	739	720	687	618	654
<b>50-54</b>	1122	993	708	628	689	746	990	1142	1197	1265	1213	1137
<b>55-59</b>	1400	1512	1524	1444	1381	1240	1098	930	826	918	1039	1211
<b>60-64</b>	1448	1316	1171	1212	1244	1314	1544	1613	1591	1496	1255	1012
<b>65-69</b>	1064	1198	1239	1285	1185	1199	1199	1091	1021	1138	1154	1243
<b>70-74</b>	403	406	483	571	668	805	881	957	953	928	872	805
<b>75-79</b>	251	238	218	222	233	237	266	300	344	382	440	467
<b>80-84</b>	174	160	172	157	131	110	126	113	119	91	114	111
<b>85 и ст.</b>	81	88	66	64	77	93	82	69	77	69	60	59

**Продолжение таблицы 28**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО губы, полости рта и глотки (C00-13,46.2) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>6828</b>	<b>6727</b>	<b>6678</b>	<b>7101</b>	<b>7160</b>	<b>7310</b>	<b>7428</b>	<b>7467</b>	<b>7622</b>	-	<b>10,2</b>	<b>7,4</b>
<b>20-24</b>	9	11	12	8	9	10	10	10	8	-	-	-
<b>25-29</b>	11	19	9	8	8	15	16	8	19	-	-	-
<b>30-34</b>	28	33	21	41	33	26	47	32	27	-	-	-
<b>35-39</b>	57	52	76	61	73	74	99	77	90	<b>-29,2</b>	<b>67,3</b>	-
<b>40-44</b>	202	218	159	162	182	170	214	218	234	<b>-59,5</b>	-	<b>47,9</b>
<b>45-49</b>	563	547	545	559	513	500	493	451	440	<b>-40,0</b>	<b>-29,1</b>	<b>-20,1</b>
<b>50-54</b>	1148	1098	1029	1101	1064	1071	1061	1022	1042	-	<b>-12,4</b>	<b>-5,6</b>
<b>55-59</b>	1302	1354	1370	1519	1488	1564	1564	1615	1676	-	<b>49,7</b>	<b>11,3</b>
<b>60-64</b>	850	724	818	1018	1289	1422	1574	1625	1669	-	<b>100,2</b>	<b>59,8</b>
<b>65-69</b>	1307	1216	1184	1032	886	750	716	748	912	<b>-30,5</b>	<b>-42,6</b>	-
<b>70-74</b>	686	709	733	848	913	929	859	909	724	<b>57,2</b>	-	-
<b>75-79</b>	487	520	496	472	411	439	438	430	484	<b>140,6</b>	-	-
<b>80-84</b>	115	154	169	205	215	250	253	223	203	<b>78,9</b>	<b>132,9</b>	-
<b>85 и ст.</b>	54	59	53	56	70	80	78	98	86	-	<b>79,6</b>	<b>57,0</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 28**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО губы, полости рта и глотки (C00-13,46.2) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1454</b>	<b>1520</b>	<b>1474</b>	<b>1549</b>	<b>1536</b>	<b>1447</b>	<b>1514</b>	<b>1577</b>	<b>1500</b>	<b>1581</b>	<b>1546</b>	<b>1547</b>
<b>20-24</b>	3	3	4	3	7	3	6	4	4	5	6	6
<b>25-29</b>	4	5	7	3	3	4	6	6	9	4	7	9
<b>30-34</b>	15	13	14	13	11	10	10	12	10	7	13	10
<b>35-39</b>	32	31	29	37	24	21	29	24	23	29	32	20
<b>40-44</b>	42	39	43	51	41	42	48	41	46	39	55	51
<b>45-49</b>	33	47	66	74	72	54	81	103	67	83	93	81
<b>50-54</b>	64	73	72	50	60	67	78	121	105	126	123	133
<b>55-59</b>	115	141	124	133	130	103	88	94	63	87	102	131
<b>60-64</b>	163	144	127	145	149	133	192	156	177	189	145	129
<b>65-69</b>	222	226	248	232	224	197	172	197	165	199	176	196
<b>70-74</b>	187	205	189	223	274	285	244	273	244	245	221	210
<b>75-79</b>	197	184	166	186	159	203	220	217	269	270	273	262
<b>80-84</b>	222	229	209	197	185	162	146	131	161	154	137	166
<b>85 и ст.</b>	140	167	164	193	185	153	178	186	151	135	156	137

**Продолжение таблицы 28**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО губы, полости рта и глотки (C00-13,46.2) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1473</b>	<b>1508</b>	<b>1568</b>	<b>1635</b>	<b>1618</b>	<b>1709</b>	<b>1748</b>	<b>1765</b>	<b>1823</b>	<b>19,2</b>	<b>22,1</b>	<b>12,7</b>
<b>20-24</b>	4	5	6	7	8	10	6	6	7	-	-	-
<b>25-29</b>	4	10	5	14	10	10	10	11	7	-	-	-
<b>30-34</b>	8	11	12	19	11	17	21	15	17	-	<b>86,1</b>	-
<b>35-39</b>	24	22	31	30	27	35	22	32	42	-	-	-
<b>40-44</b>	55	50	30	45	53	50	47	51	47	-	-	-
<b>45-49</b>	90	90	88	96	92	90	86	94	91	<b>74,3</b>	-	-
<b>50-54</b>	113	132	119	141	140	155	184	162	190	<b>248,7</b>	<b>61,4</b>	<b>36,6</b>
<b>55-59</b>	136	157	178	173	178	226	197	204	227	<b>133,5</b>	<b>100,8</b>	-
<b>60-64</b>	103	116	112	141	168	204	224	261	248	<b>52,8</b>	<b>172,4</b>	<b>87,5</b>
<b>65-69</b>	175	202	205	183	134	130	122	134	157	<b>-40,3</b>	<b>-32,5</b>	-
<b>70-74</b>	188	143	181	203	232	236	242	236	186	-	-	-
<b>75-79</b>	267	244	257	231	215	194	192	186	230	-	<b>-29,2</b>	-
<b>80-84</b>	164	193	207	199	215	218	222	200	181	-	<b>33,1</b>	-
<b>85 и ст.</b>	136	127	129	144	126	128	169	165	189	-	-	<b>45,3</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 29

**Динамика показателей смертности от ЗНО губы, полости рта и глотки (С00-13,46.2), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,13	0,15	0,16	0,13	0,13	0,11	0,20	0,14	0,17	0,18	0,16	0,18
<b>30-39</b>	0,82	0,78	0,75	0,66	0,62	0,58	0,65	0,69	0,63	0,60	0,64	0,60
<b>40-49</b>	5,86	6,31	5,68	5,63	5,41	4,79	5,51	4,97	4,55	4,35	4,24	4,24
<b>50-59</b>	15,85	16,71	15,66	15,06	15,45	15,12	15,96	16,05	15,14	15,85	15,29	14,97
<b>60-69</b>	19,13	19,43	19,11	19,89	19,34	19,41	21,06	20,75	20,24	21,25	19,93	19,87
<b>70-79</b>	16,16	15,77	15,51	16,53	16,97	18,10	17,96	18,63	18,81	18,75	18,72	18,60
<b>80 и ст.</b>	19,28	19,79	18,67	19,08	18,65	17,18	18,00	17,23	17,89	15,82	17,33	16,77
<b>15-59</b>	4,42	4,60	4,20	4,02	4,00	3,74	4,08	3,98	3,76	3,91	3,88	3,96
<b>«Грубый» показатель</b>	5,80	5,94	5,63	5,70	5,72	5,69	6,18	6,19	6,08	6,25	6,05	6,02
<b>Стандарт. показатель</b>	4,36	4,49	4,20	4,20	4,18	4,09	4,44	4,40	4,26	4,36	4,20	4,14
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,12	0,19	0,13	0,15	0,14	0,18	0,17	0,15	0,18	-	-	-
<b>30-39</b>	0,60	0,60	0,70	0,74	0,70	0,73	0,88	0,72	0,80	-	<b>37,2</b>	-
<b>40-49</b>	3,93	3,98	3,72	4,02	4,05	3,96	4,29	4,23	4,27	<b>-36,4</b>	-	<b>7,7</b>
<b>50-59</b>	14,49	14,05	13,45	14,28	13,73	14,36	13,87	13,78	14,37	<b>-14,9</b>	-	-
<b>60-69</b>	19,78	18,97	19,91	20,87	21,89	22,03	21,81	21,78	21,83	<b>12,9</b>	<b>14,8</b>	-
<b>70-79</b>	17,72	17,62	17,94	18,47	18,29	18,37	17,31	17,87	17,20	<b>9,4</b>	-	<b>-6,6</b>
<b>80 и ст.</b>	15,68	16,61	16,17	16,30	15,93	16,79	16,80	15,68	14,97	<b>-19,6</b>	-	-
<b>15-59</b>	3,91	3,94	3,81	4,14	4,07	4,23	4,31	4,28	4,49	-	<b>15,3</b>	<b>8,7</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	5,85	5,78	5,80	6,15	6,19	6,36	6,42	6,45	6,58	<b>11,4</b>	<b>12,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	3,97	3,88	3,86	4,07	4,07	4,13	4,10	4,07	4,13	<b>-7,7</b>	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 29**

**Динамика показателей смертности от ЗНО губы, полости рта и глотки (С00-13,46.2), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,19	0,21	0,21	0,20	0,16	0,14	0,28	0,18	0,22	0,27	0,21	0,24
<b>30-39</b>	1,27	1,22	1,14	0,91	0,95	0,88	0,94	1,04	0,93	0,84	0,84	0,91
<b>40-49</b>	11,15	12,04	10,61	10,44	10,14	9,04	10,25	9,04	8,45	7,96	7,58	7,72
<b>50-59</b>	32,59	34,08	32,05	30,92	31,59	30,96	32,70	32,03	30,70	31,71	30,72	29,90
<b>60-69</b>	42,76	43,20	41,77	43,32	41,83	42,70	46,26	45,75	44,80	46,71	44,62	44,55
<b>70-79</b>	38,67	37,23	38,54	39,88	40,56	42,26	42,76	44,16	44,00	43,58	43,33	42,95
<b>80 и ст.</b>	39,94	37,94	36,20	34,41	33,33	33,29	34,58	30,51	33,16	26,92	33,47	31,03
<b>15-59</b>	8,29	8,55	7,75	7,37	7,36	6,92	7,52	7,17	6,92	7,11	7,01	7,18
<b>«Грубый» показатель</b>	10,26	10,46	9,87	9,90	9,97	10,03	10,98	10,89	10,78	11,01	10,69	10,63
<b>Стандарт. показатель</b>	9,17	9,35	8,71	8,66	8,62	8,54	9,26	9,08	8,89	9,00	8,72	8,59
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,17	0,25	0,17	0,13	0,14	0,20	0,21	0,15	0,23	-	-	-
<b>30-39</b>	0,88	0,87	0,98	1,01	1,04	0,97	1,39	1,02	1,08	-	<b>37,7</b>	-
<b>40-49</b>	6,93	7,07	6,69	7,07	7,02	6,87	7,54	7,25	7,38	<b>-43,2</b>	-	-
<b>50-59</b>	29,36	28,15	26,85	28,63	27,42	28,16	27,10	27,02	27,76	<b>-19,2</b>	<b>-9,9</b>	-
<b>60-69</b>	45,36	42,36	44,57	46,42	49,08	48,50	47,16	46,29	46,81	<b>11,8</b>	<b>8,3</b>	-
<b>70-79</b>	40,12	41,80	41,06	43,04	42,36	43,35	40,08	42,25	40,09	-	-	-
<b>80 и ст.</b>	28,55	32,37	30,01	31,69	31,82	35,62	33,10	31,15	27,67	<b>-17,0</b>	-	-
<b>15-59</b>	7,12	7,11	6,87	7,43	7,29	7,45	7,66	7,56	7,86	-	<b>11,2</b>	<b>6,2</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	10,37	10,19	10,15	10,81	10,91	11,14	11,24	11,27	11,47	<b>10,8</b>	<b>10,4</b>	<b>6,0</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	8,30	8,06	7,97	8,40	8,46	8,52	8,38	8,27	8,33	<b>-9,5</b>	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 29**

**Динамика показателей смертности от ЗНО губы, полости рта и глотки (С00-13,46.2), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,07	0,08	0,11	0,06	0,10	0,07	0,12	0,10	0,12	0,09	0,12	0,13
<b>30-39</b>	0,37	0,35	0,35	0,42	0,30	0,28	0,36	0,34	0,33	0,37	0,45	0,30
<b>40-49</b>	0,81	0,85	1,00	1,10	0,96	0,80	1,05	1,16	0,91	0,98	1,18	1,07
<b>50-59</b>	1,92	2,40	2,29	2,21	2,35	2,17	2,15	2,76	2,13	2,59	2,54	2,75
<b>60-69</b>	4,15	4,10	4,26	4,34	4,30	3,77	4,13	4,00	3,90	4,52	3,87	4,10
<b>70-79</b>	8,11	8,07	7,12	7,74	7,68	8,15	7,38	7,50	7,69	7,66	7,46	7,36
<b>80 и ст.</b>	14,13	15,23	14,26	15,24	14,95	13,10	13,77	13,79	13,88	12,88	13,47	13,33
<b>15-59</b>	0,68	0,77	0,77	0,79	0,75	0,66	0,75	0,88	0,70	0,82	0,90	0,90
<b>«Грубый» показатель</b>	1,85	1,94	1,88	1,98	1,97	1,86	1,95	2,04	1,96	2,08	2,01	2,02
<b>Стандарт. показатель</b>	1,02	1,07	1,06	1,08	1,07	0,98	1,06	1,12	1,01	1,10	1,08	1,08
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,07	0,13	0,09	0,17	0,15	0,16	0,13	0,15	0,12	-	-	-
<b>30-39</b>	0,32	0,33	0,42	0,48	0,36	0,49	0,40	0,43	0,53	<b>38,5</b>	-	-
<b>40-49</b>	1,20	1,18	1,02	1,26	1,33	1,31	1,30	1,45	1,40	<b>63,3</b>	<b>29,6</b>	<b>12,0</b>
<b>50-59</b>	2,42	2,68	2,67	2,76	2,74	3,27	3,18	3,04	3,47	<b>56,7</b>	<b>35,4</b>	<b>23,0</b>
<b>60-69</b>	3,68	4,34	4,43	4,65	4,39	4,84	4,79	5,21	4,96	<b>21,5</b>	<b>34,2</b>	-
<b>70-79</b>	7,26	6,21	6,96	6,75	6,82	6,49	6,41	6,31	6,47	<b>-21,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-6,3</b>
<b>80 и ст.</b>	12,50	12,54	12,39	11,90	11,24	11,17	11,86	10,91	11,02	<b>-27,0</b>	<b>-18,8</b>	-
<b>15-59</b>	0,89	0,96	0,94	1,06	1,06	1,21	1,18	1,19	1,31	<b>90,9</b>	<b>52,1</b>	<b>22,3</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	1,93	1,97	2,05	2,14	2,12	2,24	2,27	2,29	2,37	<b>22,2</b>	<b>21,6</b>	<b>11,5</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	1,02	1,06	1,07	1,15	1,12	1,19	1,17	1,21	1,22	<b>15,2</b>	<b>17,6</b>	<b>7,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 30**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО губы, полости рта и глотки (C00-13,46.2), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	60,8	60,6	61,1	61,8	61,8	62,5	62,1	62,3	62,5	62,5	62,4	62,2
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	60,9	60,8	61,3	61,7	61,7	62,2	61,7	61,9	62,2	62,1	62,2	62,2
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,50	0,51	0,49	0,49	0,50	0,49	0,53	0,53	0,51	0,53	0,51	0,51
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	62,0	61,7	62,3	61,6	61,7	61,5	61,4	61,6	61,4	-	-1,5	-
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	62,3	62,3	62,7	62,4	62,4	62,4	62,3	62,5	62,2	2,2	-	-
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,48	0,47	0,47	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	59,5	59,2	59,8	60,4	60,4	61,2	61,1	61,4	61,5	61,4	61,3	60,9
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	59,3	59,2	59,8	60,1	60,2	60,8	60,4	60,6	60,8	60,8	61,1	61,0
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	1,09	1,10	1,05	1,05	1,05	1,06	1,14	1,13	1,10	1,13	1,09	1,08

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 30**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО губы, полости рта и глотки (C00-13,46.2), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	60,5	60,1	60,7	60,4	60,8	60,8	60,7	60,9	60,8	-	-	-
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	61,1	61,2	61,5	61,4	61,5	61,6	61,2	61,6	61,3	3,52	0,7	-
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	1,04	1,00	1,00	1,06	1,07	1,07	1,04	1,05	1,05	-	-	-
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	70,5	70,6	69,8	70,6	70,6	71,4	70,6	70,3	71,5	70,3	70,3	70,0
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	68,7	68,9	68,3	68,7	68,7	69,1	68,0	67,8	68,7	67,9	67,4	67,6
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,12	0,11	0,12	0,11	0,12
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	70,5	68,8	69,8	68,9	69,2	67,0	68,0	66,4	66,0	-5,6	-6,1	-4,5
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	67,8	67,1	67,7	66,7	66,7	66,0	66,8	66,2	66,2	-4,1	-2,3	-
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	-	-	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 31

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО пищевода (C15)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>9221</b>	<b>8794</b>	<b>8251</b>	<b>8322</b>	<b>8185</b>	<b>8043</b>	<b>7846</b>	<b>7562</b>	<b>7478</b>	<b>7124</b>	<b>7463</b>	<b>7231</b>
<b>20-24</b>	1	5	0	5	3	0	0	3	2	2	1	4
<b>25-29</b>	13	5	3	6	10	5	7	5	2	7	4	9
<b>30-34</b>	15	11	26	20	25	10	9	10	11	11	11	12
<b>35-39</b>	56	46	44	50	68	32	34	31	41	39	21	30
<b>40-44</b>	235	191	172	173	164	141	125	155	127	108	141	97
<b>45-49</b>	351	370	397	461	453	416	366	386	372	378	394	341
<b>50-54</b>	901	724	548	500	506	565	670	707	772	729	822	784
<b>55-59</b>	1354	1333	1349	1355	1154	965	848	674	665	666	826	990
<b>60-64</b>	1719	1583	1347	1366	1404	1533	1532	1432	1421	1214	1127	953
<b>65-69</b>	1887	1843	1852	1753	1698	1645	1334	1266	1220	1207	1322	1400
<b>70-74</b>	968	1082	1094	1220	1301	1425	1523	1493	1416	1300	1253	1024
<b>75-79</b>	886	755	634	665	694	635	746	779	857	907	959	1006
<b>80-84</b>	554	591	499	506	446	410	349	335	321	341	362	399
<b>85 и ст.</b>	279	255	285	236	257	258	301	285	251	214	219	180

**Продолжение таблицы 31**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО пищевода (C15)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>7084</b>	<b>7067</b>	<b>7153</b>	<b>7158</b>	<b>7145</b>	<b>7373</b>	<b>7391</b>	<b>7299</b>	<b>7403</b>	<b>-18,6</b>	<b>-</b>	<b>3,4</b>
<b>20-24</b>	1	2	3	1	1	4	1	4	1	-	-	-
<b>25-29</b>	3	5	8	5	3	7	8	1	4	-	-	-
<b>30-34</b>	8	9	11	9	15	10	10	5	13	<b>-51,4</b>	-	-
<b>35-39</b>	18	26	36	29	24	44	57	36	44	-	<b>132,7</b>	-
<b>40-44</b>	97	90	122	94	89	95	100	120	120	<b>-54,7</b>	-	<b>39,0</b>
<b>45-49</b>	326	359	324	334	314	341	302	302	296	<b>-27,1</b>	<b>-18,9</b>	-
<b>50-54</b>	746	755	730	794	757	800	737	737	750	-	-	-
<b>55-59</b>	1043	1104	1199	1218	1198	1251	1213	1203	1256	-	<b>36,6</b>	-
<b>60-64</b>	773	739	834	999	1210	1259	1462	1468	1557	-	<b>94,4</b>	<b>53,7</b>
<b>65-69</b>	1408	1393	1269	1088	893	801	773	799	942	<b>-56,6</b>	<b>-47,5</b>	-
<b>70-74</b>	1047	1063	986	1090	1180	1241	1141	1115	864	-	-	-
<b>75-79</b>	1018	894	942	828	735	702	798	745	822	-	<b>-26,9</b>	-
<b>80-84</b>	420	443	492	507	515	564	541	509	464	-	<b>36,3</b>	-
<b>85 и ст.</b>	176	185	197	160	210	254	247	254	270	-	<b>49,5</b>	<b>55,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 31**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО пищевода (C15)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>6718</b>	<b>6367</b>	<b>6061</b>	<b>6241</b>	<b>6179</b>	<b>6060</b>	<b>5881</b>	<b>5700</b>	<b>5633</b>	<b>5373</b>	<b>5688</b>	<b>5527</b>
<b>20-24</b>	1	5	0	4	3	0	0	2	2	0	0	3
<b>25-29</b>	10	5	0	5	9	4	5	4	1	4	2	4
<b>30-34</b>	12	8	17	13	19	8	5	5	7	11	7	8
<b>35-39</b>	41	39	38	35	54	25	25	25	30	27	17	22
<b>40-44</b>	210	163	158	149	146	126	106	134	107	88	110	83
<b>45-49</b>	315	339	354	426	407	381	323	339	339	341	353	303
<b>50-54</b>	813	639	483	448	456	495	612	648	699	649	749	710
<b>55-59</b>	1198	1165	1205	1205	1039	870	765	603	601	601	757	918
<b>60-64</b>	1421	1321	1124	1178	1216	1289	1337	1254	1237	1061	979	811
<b>65-69</b>	1399	1388	1421	1371	1327	1286	1020	975	962	987	1063	1146
<b>70-74</b>	573	641	668	762	864	971	1052	1043	943	881	878	704
<b>75-79</b>	434	363	302	356	361	339	369	424	474	487	546	580
<b>80-84</b>	201	195	193	192	175	174	149	144	139	164	161	174
<b>85 и ст.</b>	89	96	97	92	101	90	112	99	92	72	66	60

**Продолжение таблицы 31**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО пищевода (C15)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>5388</b>	<b>5407</b>	<b>5550</b>	<b>5601</b>	<b>5556</b>	<b>5671</b>	<b>5817</b>	<b>5706</b>	<b>5855</b>	<b>-12,2</b>	<b>5,6</b>	<b>4,8</b>
<b>20-24</b>	0	2	1	1	1	1	1	3	1	-	-	-
<b>25-29</b>	3	2	4	4	2	5	6	0	1	<b>-62,1</b>	-	-
<b>30-34</b>	5	7	9	7	9	6	6	4	11	<b>-50,7</b>	-	-
<b>35-39</b>	14	18	30	24	12	38	46	29	38	-	<b>167,4</b>	-
<b>40-44</b>	81	71	112	83	70	72	76	97	103	<b>-59,9</b>	-	-
<b>45-49</b>	295	308	280	285	276	284	251	256	243	<b>-33,2</b>	<b>-25,3</b>	<b>-14,8</b>
<b>50-54</b>	655	682	670	698	656	694	639	652	651	-	<b>-9,7</b>	
<b>55-59</b>	933	984	1079	1078	1068	1107	1073	1062	1112	-	<b>31,6</b>	
<b>60-64</b>	654	631	724	886	1054	1112	1289	1254	1351	-	<b>97,7</b>	<b>49,7</b>
<b>65-69</b>	1162	1131	1028	895	741	651	644	673	797	<b>-50,9</b>	<b>-45,5</b>	-
<b>70-74</b>	739	763	731	815	898	943	905	850	667	-	-	-
<b>75-79</b>	606	526	575	522	440	417	491	470	546	<b>49,2</b>	-	-
<b>80-84</b>	182	213	235	241	253	254	288	252	220	<b>56,3</b>	<b>53,7</b>	-
<b>85 и ст.</b>	59	69	72	61	75	87	101	103	114	-	<b>105,0</b>	<b>87,8</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 31**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО пищевода (C15)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>2503</b>	<b>2427</b>	<b>2190</b>	<b>2081</b>	<b>2006</b>	<b>1983</b>	<b>1965</b>	<b>1862</b>	<b>1845</b>	<b>1751</b>	<b>1775</b>	<b>1704</b>
<b>20-24</b>	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	1
<b>25-29</b>	3	0	3	1	1	1	2	1	1	3	2	5
<b>30-34</b>	3	3	9	7	6	2	4	5	4	0	4	4
<b>35-39</b>	15	7	6	15	14	7	9	6	11	12	4	8
<b>40-44</b>	25	28	14	24	18	15	19	21	20	20	31	14
<b>45-49</b>	36	31	43	35	46	35	43	47	33	37	41	38
<b>50-54</b>	88	85	65	52	50	70	58	59	73	80	73	74
<b>55-59</b>	156	168	144	150	115	95	83	71	64	65	69	72
<b>60-64</b>	298	262	223	188	188	244	195	178	184	153	148	142
<b>65-69</b>	488	455	431	382	371	359	314	291	258	220	259	254
<b>70-74</b>	395	441	426	458	437	454	471	450	473	419	375	320
<b>75-79</b>	452	392	332	309	333	296	377	355	383	420	413	426
<b>80-84</b>	353	396	306	314	271	236	200	191	182	177	201	225
<b>85 и ст.</b>	190	159	188	144	156	168	189	186	159	142	153	120

**Продолжение таблицы 31**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО пищевода (C15)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1696</b>	<b>1660</b>	<b>1603</b>	<b>1557</b>	<b>1589</b>	<b>1702</b>	<b>1574</b>	<b>1593</b>	<b>1548</b>	<b>-36,2</b>	<b>-9,9</b>	<b>-</b>
<b>20-24</b>	1	0	2	0	0	3	0	1	0	-	-	-
<b>25-29</b>	0	3	4	1	1	2	2	1	3	-	-	-
<b>30-34</b>	3	2	2	2	6	4	4	1	2	-	-	-
<b>35-39</b>	4	8	6	5	12	6	11	7	6	-	-	-
<b>40-44</b>	16	19	10	11	19	23	24	23	17	-	-	-
<b>45-49</b>	31	51	44	49	38	57	51	46	53	<b>42,0</b>	<b>38,3</b>	<b>-</b>
<b>50-54</b>	91	73	60	96	101	106	98	85	99	<b>54,3</b>	<b>38,2</b>	<b>-</b>
<b>55-59</b>	110	120	120	140	130	144	140	141	144	-	<b>89,7</b>	<b>-</b>
<b>60-64</b>	119	108	110	113	156	147	173	214	206	<b>-40,9</b>	<b>74,4</b>	<b>85,5</b>
<b>65-69</b>	246	262	241	193	152	150	129	126	145	<b>-74,9</b>	<b>-56,0</b>	<b>-</b>
<b>70-74</b>	308	300	255	275	282	298	236	265	197	<b>-51,6</b>	<b>-34,0</b>	<b>-</b>
<b>75-79</b>	412	368	367	306	295	285	307	275	276	<b>-21,6</b>	<b>-38,8</b>	<b>-</b>
<b>80-84</b>	238	230	257	266	262	310	253	257	244	-	<b>22,7</b>	<b>-</b>
<b>85 и ст.</b>	117	116	125	99	135	167	146	151	156	<b>-24,5</b>	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 32

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО пищевода (С15), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,07	0,05	0,02	0,06	0,06	0,02	0,03	0,04	0,02	0,04	0,02	0,06
<b>30-39</b>	0,28	0,23	0,29	0,29	0,40	0,19	0,20	0,19	0,26	0,25	0,16	0,22
<b>40-49</b>	3,23	2,85	2,69	2,86	2,71	2,39	2,07	2,26	2,07	2,02	2,23	1,85
<b>50-59</b>	13,23	12,64	12,23	12,39	11,35	10,73	10,75	9,69	9,93	9,23	10,17	10,17
<b>60-69</b>	23,81	23,08	21,95	21,59	21,41	21,70	19,43	18,31	18,10	17,02	17,88	18,12
<b>70-79</b>	28,86	28,05	25,38	25,92	25,38	24,36	25,30	24,23	23,62	22,68	22,93	21,65
<b>80 и ст.</b>	26,03	25,99	23,96	23,18	22,68	22,15	22,00	21,41	20,15	19,56	21,55	20,52
<b>15-59</b>	3,23	2,94	2,77	2,80	2,59	2,32	2,24	2,14	2,16	2,10	2,34	2,37
<b>«Грубый» показатель</b>	6,22	5,94	5,58	5,65	5,57	5,49	5,38	5,21	5,20	4,99	5,20	5,07
<b>Стандарт. показатель</b>	4,40	4,19	3,91	3,93	3,82	3,71	3,59	3,44	3,42	3,23	3,39	3,28
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,02	0,03	0,05	0,02	0,02	0,04	0,04	0,02	0,02	-	-	-
<b>30-39</b>	0,13	0,18	0,23	0,19	0,19	0,26	0,31	0,19	0,26	-	<b>59,5</b>	-
<b>40-49</b>	1,83	1,98	2,02	2,00	1,94	2,13	2,05	2,19	2,19	<b>-33,0</b>	-	<b>11,9</b>
<b>50-59</b>	9,60	9,53	9,62	9,79	9,35	9,76	9,00	8,90	9,19	<b>-29,6</b>	<b>-10,4</b>	-
<b>60-69</b>	17,71	17,91	18,06	18,34	18,59	18,11	18,49	17,84	18,27	<b>-23,0</b>	-	-
<b>70-79</b>	22,47	21,34	20,75	20,20	19,78	19,86	19,38	18,88	17,86	<b>-34,3</b>	<b>-19,7</b>	<b>-10,3</b>
<b>80 и ст.</b>	19,92	19,57	19,96	18,00	18,45	20,32	18,34	17,43	16,67	<b>-30,8</b>	<b>-17,8</b>	-
<b>15-59</b>	2,33	2,42	2,51	2,58	2,51	2,68	2,57	2,57	2,67	-	<b>14,5</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	4,99	4,96	5,03	5,04	5,03	5,20	5,17	5,10	5,16	<b>-14,7</b>	-	-
<b>Стандарт. показатель</b>	3,17	3,18	3,20	3,19	3,16	3,22	3,15	3,08	3,09	<b>-27,8</b>	<b>-6,4</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 32**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО пищевода (С15), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,11	0,10	0,00	0,09	0,12	0,04	0,05	0,06	0,03	0,04	0,02	0,06
<b>30-39</b>	0,42	0,38	0,45	0,40	0,63	0,29	0,28	0,28	0,36	0,38	0,25	0,31
<b>40-49</b>	5,92	5,23	4,98	5,35	5,01	4,49	3,74	4,09	3,84	3,69	4,04	3,42
<b>50-59</b>	25,99	24,54	24,24	24,66	22,81	21,28	21,56	19,34	19,73	18,16	20,54	20,73
<b>60-69</b>	48,00	46,55	44,11	44,22	43,80	43,75	39,75	37,71	37,71	36,31	37,82	38,66
<b>70-79</b>	59,54	58,05	53,33	56,23	55,14	53,13	52,98	51,54	48,08	45,51	47,03	43,36
<b>80 и ст.</b>	45,42	44,51	44,11	44,22	44,22	43,29	43,39	40,73	39,08	39,71	43,66	42,71
<b>15-59</b>	5,82	5,26	5,00	5,07	4,72	4,22	4,07	3,88	3,95	3,79	4,32	4,41
<b>«Грубый» показатель</b>	9,66	9,16	8,74	9,02	8,96	8,82	8,60	8,38	8,38	8,05	8,53	8,34
<b>Стандарт. показатель</b>	8,75	8,31	7,80	7,98	7,79	7,51	7,26	6,98	6,93	6,57	6,93	6,73
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,03	0,03	0,04	0,04	0,02	0,05	0,06	0,03	0,02	-	-	-
<b>30-39</b>	0,20	0,26	0,39	0,31	0,21	0,43	0,49	0,31	0,45	-	<b>81,4</b>	-
<b>40-49</b>	3,41	3,50	3,73	3,61	3,50	3,65	3,49	3,83	3,79	<b>-37,6</b>	-	-
<b>50-59</b>	19,03	19,13	19,57	19,41	18,52	19,25	17,67	17,56	18,00	<b>-29,4</b>	<b>-13,4</b>	<b>-8,5</b>
<b>60-69</b>	38,19	38,47	39,00	40,33	40,50	39,37	39,80	37,59	38,96	<b>-16,1</b>	-	-
<b>70-79</b>	46,01	43,84	43,64	43,59	42,81	43,10	43,14	41,65	40,26	<b>-31,6</b>	<b>-10,2</b>	<b>-6,5</b>
<b>80 и ст.</b>	40,72	42,85	41,51	36,67	36,62	36,80	38,90	34,45	31,98	<b>-22,1</b>	<b>-23,3</b>	-
<b>15-59</b>	4,25	4,41	4,66	4,68	4,52	4,79	4,59	4,63	4,80	-	<b>10,4</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	8,19	8,19	8,44	8,53	8,46	8,64	8,80	8,61	8,81	<b>-6,2</b>	<b>5,8</b>	<b>3,4</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	6,52	6,55	6,67	6,68	6,57	6,62	6,58	6,35	6,39	<b>-24,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>-4,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 32**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО пищевода (С15), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,03	0,00	0,03	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,05	0,03	0,05
<b>30-39</b>	0,14	0,08	0,12	0,18	0,17	0,08	0,12	0,10	0,15	0,12	0,08	0,12
<b>40-49</b>	0,66	0,59	0,52	0,52	0,55	0,42	0,51	0,55	0,43	0,46	0,58	0,42
<b>50-59</b>	2,62	2,84	2,45	2,44	2,04	2,10	1,82	1,67	1,74	1,76	1,60	1,52
<b>60-69</b>	8,48	7,94	7,43	6,56	6,44	6,88	5,77	5,32	5,04	4,35	4,90	5,00
<b>70-79</b>	17,89	17,28	15,19	14,51	13,65	12,52	13,49	12,33	12,83	12,47	11,91	11,63
<b>80 и ст.</b>	21,20	21,34	18,89	17,89	17,25	16,80	16,53	16,40	15,17	14,22	16,27	15,18
<b>15-59</b>	0,71	0,69	0,61	0,61	0,53	0,48	0,47	0,45	0,44	0,46	0,46	0,44
<b>«Грубый» показатель</b>	3,18	3,09	2,79	2,66	2,57	2,55	2,53	2,41	2,41	2,30	2,31	2,23
<b>Стандарт. показатель</b>	1,64	1,57	1,43	1,33	1,27	1,27	1,21	1,14	1,12	1,05	1,08	1,03
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,01	0,03	0,05	0,01	0,01	0,04	0,02	0,02	0,03	-	-	-
<b>30-39</b>	0,07	0,10	0,08	0,07	0,17	0,09	0,14	0,07	0,07	-	-	-
<b>40-49</b>	0,39	0,59	0,47	0,53	0,52	0,75	0,73	0,69	0,71	<b>26,2</b>	<b>66,9</b>	-
<b>50-59</b>	1,95	1,79	1,62	2,07	1,99	2,15	1,99	1,88	2,02	<b>-23,9</b>	<b>26,4</b>	-
<b>60-69</b>	4,83	5,05	4,91	4,40	4,47	4,31	4,18	4,48	4,30	<b>-50,0</b>	<b>-16,1</b>	-
<b>70-79</b>	11,49	10,72	9,88	9,04	8,80	8,79	8,02	8,08	7,36	<b>-55,4</b>	<b>-38,9</b>	<b>-17,4</b>
<b>80 и ст.</b>	14,79	13,56	14,08	12,67	13,08	15,39	12,10	12,19	11,91	<b>-40,8</b>	<b>-22,7</b>	-
<b>15-59</b>	0,52	0,55	0,50	0,61	0,62	0,70	0,68	0,63	0,68	-	<b>56,7</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	2,23	2,17	2,10	2,04	2,08	2,23	2,05	2,07	2,01	<b>-34,2</b>	<b>-10,4</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	1,03	1,02	0,96	0,94	0,96	1,01	0,94	0,93	0,91	<b>-43,0</b>	<b>-13,2</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 33

## Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО пищевода (C15), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	64,9	65,4	65,6	65,6	65,9	66,1	66,2	66,5	66,3	66,7	66,5	66,4
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	64,9	65,3	65,3	65,2	65,4	65,7	66,0	65,9	65,9	66,0	65,7	65,7
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,54	0,52	0,49	0,49	0,48	0,47	0,45	0,44	0,43	0,41	0,43	0,41
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	66,9	66,6	66,2	65,4	64,8	64,5	64,3	64,2	63,9	-	-	-2,1
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	66,1	65,8	65,7	65,4	65,5	65,4	65,5	65,4	65,1	-	-	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	-27,0	-	-
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	62,7	63,1	63,5	63,5	63,9	64,3	64,1	64,3	64,2	64,6	64,3	64,4
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	62,6	63,0	63,1	63,2	63,4	63,9	64,0	64,0	63,9	64,1	63,9	63,9
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,10	1,06	1,00	1,01	0,98	0,97	0,93	0,89	0,87	0,84	0,88	0,84

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 33**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО пищевода (C15), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	65,2	65,0	64,1	63,5	63,2	62,8	63,1	63,0	62,8	-	-	-0,8
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	64,3	64,1	63,9	63,8	64,0	63,7	64,1	63,9	63,7	1,4	1,4	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,83	0,84	0,84	0,86	0,85	0,86	0,84	0,82	0,82	-23,3	-	-5,1
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Женщины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	71,8	72,0	71,8	72,0	72,2	71,8	72,7	72,8	72,9	73,4	73,4	73,7
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	71,2	71,4	71,4	71,2	71,4	71,3	71,8	71,8	71,7	71,7	71,7	71,8
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,19	0,19	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	73,7	73,1	74,0	73,1	73,2	73,5	73,3	72,9	72,5	2,1	2,1	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	71,8	71,2	71,9	71,0	71,0	71,2	70,7	70,9	70,6	-0,7	-0,7	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,11	0,10	-	-	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 34**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО пищевода (C15) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>9119</b>	<b>8812</b>	<b>8140</b>	<b>7977</b>	<b>7912</b>	<b>7807</b>	<b>7459</b>	<b>7234</b>	<b>7244</b>	<b>6902</b>	<b>7000</b>	<b>6858</b>
<b>20-24</b>	1	1	1	0	6	0	0	2	1	2	0	0
<b>25-29</b>	3	8	3	3	5	5	6	2	2	2	4	5
<b>30-34</b>	8	9	13	8	18	9	6	8	12	8	10	12
<b>35-39</b>	43	43	47	36	39	36	27	24	34	23	24	23
<b>40-44</b>	200	212	160	149	153	151	125	109	121	113	109	80
<b>45-49</b>	319	353	373	446	423	420	364	353	356	349	382	299
<b>50-54</b>	898	692	531	474	430	524	571	686	681	673	783	733
<b>55-59</b>	1360	1349	1350	1368	1135	1031	848	724	623	644	675	919
<b>60-64</b>	1823	1636	1365	1299	1323	1417	1418	1381	1399	1225	1096	912
<b>65-69</b>	1845	1869	1774	1735	1701	1576	1350	1235	1237	1165	1229	1326
<b>70-74</b>	902	982	1058	1101	1311	1352	1434	1383	1383	1277	1199	1013
<b>75-79</b>	811	703	630	621	657	610	655	741	789	858	953	952
<b>80-84</b>	600	660	529	463	445	411	365	321	339	349	318	396
<b>85 и ст.</b>	305	294	305	273	265	262	289	264	264	213	213	187

**Продолжение таблицы 34**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО пищевода (С15) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>6637</b>	<b>6513</b>	<b>6454</b>	<b>6397</b>	<b>6686</b>	<b>6482</b>	<b>6798</b>	<b>6496</b>	<b>6562</b>	<b>-27,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20-24</b>	2	0	1	1	1	2	3	2	0	-	-	-
<b>25-29</b>	3	3	2	1	5	2	4	2	3	-	-	-
<b>30-34</b>	7	5	4	5	8	11	9	7	10	-	-	-
<b>35-39</b>	17	16	30	19	21	28	38	39	28	<b>-38,0</b>	<b>83,6</b>	-
<b>40-44</b>	78	76	98	77	77	65	90	71	98	<b>-67,2</b>	-	-
<b>45-49</b>	283	298	271	260	268	263	267	252	228	<b>-40,4</b>	<b>-29,5</b>	-
<b>50-54</b>	683	691	625	678	703	652	659	626	626	-	<b>-15,7</b>	<b>-9,9</b>
<b>55-59</b>	947	1043	1067	1049	1067	1095	1097	1021	1098	-	<b>32,8</b>	-
<b>60-64</b>	733	644	655	831	1024	1115	1319	1329	1353	<b>-36,2</b>	<b>78,2</b>	<b>63,3</b>
<b>65-69</b>	1335	1285	1197	1039	889	756	687	670	776	<b>-61,8</b>	<b>-52,2</b>	<b>-29,8</b>
<b>70-74</b>	980	967	958	980	1137	1119	1114	1026	871	-	-	-
<b>75-79</b>	974	861	910	759	736	627	690	688	720	-	<b>-34,0</b>	-
<b>80-84</b>	407	428	457	511	520	528	568	512	474	-	<b>49,5</b>	-
<b>85 и ст.</b>	185	194	177	186	227	218	253	251	277	<b>-26,8</b>	<b>46,6</b>	<b>42,9</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 34**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО пищевода (C15) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>6746</b>	<b>6503</b>	<b>5999</b>	<b>6043</b>	<b>5975</b>	<b>5916</b>	<b>5593</b>	<b>5514</b>	<b>5461</b>	<b>5269</b>	<b>5386</b>	<b>5231</b>
<b>20-24</b>	0	1	1	0	4	0	0	1	1	0	0	0
<b>25-29</b>	2	6	1	3	4	3	4	2	1	1	2	3
<b>30-34</b>	7	9	8	4	12	5	4	5	6	8	8	6
<b>35-39</b>	34	38	37	25	33	26	21	18	25	18	19	18
<b>40-44</b>	183	198	146	137	134	135	111	95	106	94	85	69
<b>45-49</b>	296	325	342	411	396	389	317	312	328	316	346	267
<b>50-54</b>	825	633	487	433	397	485	524	629	631	613	720	671
<b>55-59</b>	1234	1196	1220	1255	1032	945	765	668	557	597	626	845
<b>60-64</b>	1553	1403	1165	1124	1158	1230	1238	1235	1236	1068	949	790
<b>65-69</b>	1365	1420	1368	1375	1323	1244	1071	969	989	970	1014	1097
<b>70-74</b>	521	608	633	687	883	870	979	975	944	883	865	683
<b>75-79</b>	412	317	301	318	339	317	325	395	399	460	540	548
<b>80-84</b>	219	253	202	174	168	171	133	121	144	159	137	172
<b>85 и ст.</b>	95	95	87	97	91	94	100	88	91	81	71	61

**Продолжение таблицы 34**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО пищевода (C15) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>5113</b>	<b>5037</b>	<b>5026</b>	<b>5042</b>	<b>5226</b>	<b>5093</b>	<b>5300</b>	<b>5096</b>	<b>5242</b>	<b>-22,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20-24</b>	2	0	1	0	1	1	3	0	0	-	-	-
<b>25-29</b>	3	1	1	1	5	2	4	1	2	-	-	-
<b>30-34</b>	3	5	3	5	5	9	7	4	9	-	-	-
<b>35-39</b>	11	10	21	15	14	20	29	33	23	<b>-41,5</b>	<b>111,2</b>	-
<b>40-44</b>	71	62	87	63	59	53	73	57	83	<b>-72,8</b>	-	-
<b>45-49</b>	264	256	237	230	234	233	229	219	197	<b>-44,4</b>	<b>-32,9</b>	<b>-12,6</b>
<b>50-54</b>	624	630	568	615	625	578	591	553	563	-	<b>-18,7</b>	<b>-10,6</b>
<b>55-59</b>	874	958	948	957	989	984	979	904	984	-	<b>28,0</b>	-
<b>60-64</b>	637	569	582	750	908	1006	1167	1165	1191	<b>-33,6</b>	<b>82,2</b>	<b>58,8</b>
<b>65-69</b>	1114	1056	1012	876	753	631	574	571	667	<b>-55,8</b>	<b>-50,6</b>	-
<b>70-74</b>	699	705	725	737	865	873	858	788	673	-	-	-
<b>75-79</b>	570	520	558	482	453	373	431	447	501	<b>51,9</b>	<b>-22,8</b>	-
<b>80-84</b>	178	195	210	251	240	257	265	259	237	<b>44,9</b>	<b>74,0</b>	-
<b>85 и ст.</b>	62	68	71	59	73	73	90	95	112	-	<b>73,5</b>	<b>92,3</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 34**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО пищевода (C15) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>2373</b>	<b>2309</b>	<b>2141</b>	<b>1934</b>	<b>1937</b>	<b>1891</b>	<b>1866</b>	<b>1720</b>	<b>1783</b>	<b>1633</b>	<b>1614</b>	<b>1627</b>
<b>20-24</b>	1	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0
<b>25-29</b>	1	2	2	0	1	2	2	0	1	1	2	2
<b>30-34</b>	1	0	5	4	6	4	2	3	6	0	2	6
<b>35-39</b>	9	5	10	11	6	10	6	6	9	5	5	5
<b>40-44</b>	17	14	14	12	19	16	14	14	15	19	24	11
<b>45-49</b>	23	28	31	35	27	31	47	41	28	33	36	32
<b>50-54</b>	73	59	44	41	33	39	47	57	50	60	63	62
<b>55-59</b>	126	153	130	113	103	86	83	56	66	47	49	74
<b>60-64</b>	270	233	200	175	165	187	180	146	163	157	147	122
<b>65-69</b>	480	449	406	360	378	332	279	266	248	195	215	229
<b>70-74</b>	381	374	425	414	428	482	455	408	439	394	334	330
<b>75-79</b>	399	386	329	303	318	293	330	346	390	398	413	404
<b>80-84</b>	381	407	327	289	277	240	232	200	195	190	181	224
<b>85 и ст.</b>	210	199	218	176	174	168	189	176	173	132	142	126

**Продолжение таблицы 34**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО пищевода (С15) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>1524</b>	<b>1476</b>	<b>1428</b>	<b>1355</b>	<b>1460</b>	<b>1389</b>	<b>1498</b>	<b>1400</b>	<b>1320</b>	<b>-42,9</b>	<b>-14,8</b>	<b>-</b>
<b>20-24</b>	0	0	0	1	0	1	0	2	0	-	-	-
<b>25-29</b>	0	2	1	0	0	0	0	1	1	-	-	-
<b>30-34</b>	4	0	1	0	3	2	2	3	1	-	-	-
<b>35-39</b>	6	6	9	4	7	8	9	6	5	-	-	-
<b>40-44</b>	7	14	11	14	18	12	17	14	15	-	-	-
<b>45-49</b>	19	42	34	30	34	30	38	33	31	-	-	-
<b>50-54</b>	59	61	57	63	78	74	68	73	63	<b>51,6</b>	-	-
<b>55-59</b>	73	85	119	92	78	111	118	117	114	-	<b>95,1</b>	-
<b>60-64</b>	96	75	73	81	116	109	152	164	162	<b>-52,2</b>	-	<b>105,8</b>
<b>65-69</b>	221	229	185	163	136	125	113	99	109	<b>-81,6</b>	<b>-59,9</b>	<b>-35,6</b>
<b>70-74</b>	281	262	233	243	272	246	256	238	198	<b>-52,5</b>	<b>-31,8</b>	-
<b>75-79</b>	404	341	352	277	283	254	259	241	219	<b>-28,1</b>	<b>-48,8</b>	<b>-20,2</b>
<b>80-84</b>	229	233	247	260	280	271	303	253	237	-	<b>31,4</b>	-
<b>85 и ст.</b>	123	126	106	127	154	145	163	156	165	<b>-32,5</b>	<b>34,2</b>	<b>22,9</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 35

**Динамика показателей смертности от ЗНО пищевода (С15), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,02	0,05	0,02	0,02	0,05	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
<b>30-39</b>	0,20	0,21	0,24	0,18	0,24	0,20	0,15	0,15	0,23	0,16	0,17	0,18
<b>40-49</b>	2,86	2,87	2,52	2,69	2,53	2,45	2,06	1,93	1,98	1,92	2,05	1,60
<b>50-59</b>	13,25	12,54	12,13	12,30	10,70	10,91	10,05	9,90	9,01	8,71	9,00	9,47
<b>60-69</b>	24,22	23,61	21,54	21,00	20,87	20,44	18,76	17,76	18,06	16,80	16,97	17,24
<b>70-79</b>	26,66	25,73	24,80	23,68	25,03	23,21	23,29	22,65	22,57	21,94	22,31	20,96
<b>80 и ст.</b>	28,28	29,31	25,49	22,99	22,91	22,32	22,13	20,20	21,24	19,80	19,70	20,67
<b>15-59</b>	3,12	2,92	2,70	2,70	2,40	2,37	2,12	2,07	1,99	1,96	2,10	2,17
<b>«Грубый» показатель</b>	6,16	5,96	5,51	5,41	5,38	5,33	5,11	4,98	5,04	4,83	4,88	4,81
<b>Стандарт. показатель</b>	4,33	4,17	3,85	3,76	3,65	3,60	3,41	3,32	3,30	3,12	3,15	3,10
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	-	-	-
<b>30-39</b>	0,12	0,11	0,17	0,12	0,14	0,19	0,22	0,21	0,17	-	-	-
<b>40-49</b>	1,56	1,65	1,67	1,57	1,66	1,60	1,82	1,68	1,71	<b>-47,1</b>	-	-
<b>50-59</b>	8,75	8,89	8,44	8,41	8,47	8,32	8,10	7,56	7,90	<b>-40,9</b>	<b>-15,9</b>	<b>-9,1</b>
<b>60-69</b>	16,80	16,20	15,90	16,44	16,91	16,45	16,60	15,73	15,56	<b>-34,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,6</b>
<b>70-79</b>	21,26	19,93	20,11	18,31	19,34	17,84	18,04	17,39	16,85	<b>-34,7</b>	<b>-23,1</b>	<b>-9,7</b>
<b>80 и ст.</b>	19,79	19,38	18,37	18,81	19,01	18,53	19,11	17,43	17,06	<b>-36,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>-9,5</b>
<b>15-59</b>	2,10	2,20	2,17	2,17	2,25	2,22	2,29	2,15	2,25	<b>-22,9</b>	<b>5,8</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	4,68	4,57	4,54	4,51	4,71	4,57	4,76	4,54	4,57	<b>-24,1</b>	-	-
<b>Стандарт. показатель</b>	2,97	2,90	2,82	2,81	2,92	2,82	2,86	2,69	2,69	<b>-36,7</b>	<b>-12,7</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 35**

**Динамика показателей смертности от ЗНО пищевода (С15), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,02	0,07	0,02	0,03	0,08	0,03	0,04	0,03	0,02	0,01	0,02	0,03
<b>30-39</b>	0,32	0,38	0,37	0,24	0,39	0,28	0,23	0,22	0,30	0,26	0,28	0,25
<b>40-49</b>	5,40	5,45	4,74	5,10	4,81	4,64	3,73	3,52	3,73	3,53	3,76	2,97
<b>50-59</b>	26,61	24,88	24,51	25,19	21,81	22,29	20,18	20,05	18,03	17,57	18,36	19,30
<b>60-69</b>	49,67	48,51	43,91	43,35	42,73	42,03	38,94	37,29	38,16	36,14	36,36	37,28
<b>70-79</b>	55,16	53,48	51,35	50,55	55,01	48,14	48,62	48,13	45,56	44,68	46,40	41,57
<b>80 и ст.</b>	49,18	53,23	43,96	42,20	41,50	43,45	38,73	35,03	39,76	40,38	40,01	42,53
<b>15-59</b>	5,78	5,35	4,97	5,02	4,45	4,40	3,86	3,82	3,66	3,62	3,92	4,04
<b>«Грубый» показатель</b>	9,70	9,36	8,65	8,74	8,67	8,61	8,18	8,11	8,12	7,89	8,07	7,89
<b>Стандарт. показатель</b>	8,73	8,41	7,71	7,68	7,49	7,33	6,89	6,80	6,71	6,45	6,53	6,39
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,04	0,01	0,02	0,01	0,05	0,02	0,06	0,01	0,02	-	-	-
<b>30-39</b>	0,14	0,15	0,24	0,20	0,19	0,28	0,34	0,35	0,29	-	-	-
<b>40-49</b>	3,04	2,94	3,08	2,87	2,96	2,93	3,22	2,99	3,07	<b>-50,6</b>	-	-
<b>50-59</b>	17,95	18,23	16,96	17,18	17,34	16,69	16,21	14,93	15,80	<b>-41,0</b>	<b>-18,2</b>	<b>-11,9</b>
<b>60-69</b>	36,82	35,48	35,49	36,82	37,48	36,56	35,85	33,86	33,70	<b>-27,5</b>	<b>-6,3</b>	<b>-10,2</b>
<b>70-79</b>	43,41	41,67	42,87	39,74	42,17	39,48	39,84	38,97	38,96	<b>-30,3</b>	<b>-12,9</b>	-
<b>80 и ст.</b>	40,55	39,97	37,99	37,64	34,95	35,62	35,50	34,35	33,42	<b>-27,5</b>	<b>-20,0</b>	<b>-8,8</b>
<b>15-59</b>	3,97	4,09	3,98	4,05	4,18	4,08	4,19	3,90	4,13	<b>-23,2</b>	-	-
<b>«Грубый» показатель</b>	7,77	7,63	7,64	7,68	7,96	7,76	8,02	7,69	7,89	<b>-16,8</b>	-	-
<b>Стандарт. показатель</b>	6,21	6,07	5,97	5,98	6,16	5,96	5,97	5,63	5,69	<b>-33,0</b>	<b>-11,3</b>	<b>-7,0</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 35**

**Динамика показателей смертности от ЗНО пищевода (С15), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,02	0,02	0,02	0,00	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02
<b>30-39</b>	0,08	0,04	0,12	0,13	0,10	0,12	0,07	0,09	0,15	0,05	0,07	0,11
<b>40-49</b>	0,43	0,42	0,41	0,41	0,39	0,39	0,50	0,44	0,35	0,42	0,48	0,35
<b>50-59</b>	2,14	2,38	2,04	1,86	1,68	1,59	1,68	1,45	1,47	1,30	1,26	1,42
<b>60-69</b>	8,09	7,56	6,88	6,16	6,25	5,93	5,20	4,67	4,69	4,10	4,36	4,43
<b>70-79</b>	16,48	15,77	15,11	13,57	13,23	12,94	12,48	11,55	12,42	11,77	11,29	11,44
<b>80 и ст.</b>	23,07	23,30	20,84	18,17	18,22	16,96	17,89	16,36	16,37	14,35	14,85	15,40
<b>15-59</b>	0,55	0,56	0,51	0,46	0,42	0,40	0,43	0,38	0,37	0,35	0,37	0,39
<b>«Грубый» показатель</b>	3,02	2,94	2,73	2,47	2,48	2,43	2,41	2,23	2,33	2,14	2,10	2,13
<b>Стандарт. показатель</b>	1,51	1,45	1,35	1,22	1,19	1,16	1,13	1,03	1,07	0,95	0,95	0,96
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01	-	-	-
<b>30-39</b>	0,10	0,06	0,10	0,04	0,10	0,09	0,10	0,08	0,05	-	-	-
<b>40-49</b>	0,21	0,47	0,39	0,39	0,48	0,39	0,54	0,47	0,47	-	-	-
<b>50-59</b>	1,28	1,35	1,58	1,36	1,35	1,59	1,55	1,58	1,47	<b>-32,3</b>	<b>19,3</b>	-
<b>60-69</b>	4,19	4,15	3,61	3,51	3,66	3,39	3,67	3,47	3,32	<b>-60,8</b>	<b>-24,9</b>	-
<b>70-79</b>	10,93	9,68	9,29	8,09	8,46	7,54	7,61	7,17	6,49	<b>-57,7</b>	<b>-43,6</b>	<b>-19,7</b>
<b>80 и ст.</b>	14,67	14,07	13,02	13,43	14,30	13,43	14,13	12,22	11,97	<b>-45,3</b>	<b>-17,2</b>	-
<b>15-59</b>	0,34	0,42	0,46	0,41	0,44	0,49	0,52	0,52	0,48	-	<b>44,5</b>	<b>20,9</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	2,00	1,93	1,87	1,78	1,91	1,82	1,95	1,82	1,71	<b>-41,1</b>	<b>-15,3</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	0,89	0,87	0,82	0,77	0,84	0,80	0,84	0,79	0,74	<b>-50,4</b>	<b>-19,3</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 36

## Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО пищевода (C15), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	64,7	65,3	65,6	65,6	66,2	66,08	66,4	66,3	66,6	66,8	66,7	66,7
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	65,1	65,4	65,5	65,3	65,7	65,6	66,0	66,0	66,1	66,2	65,9	66,1
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,53	0,51	0,48	0,47	0,46	0,46	0,43	0,42	0,42	0,40	0,40	0,39
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	67,1	66,9	67,0	66,3	65,9	65,1	64,7	64,6	64,4	-	-4,3	-3,0
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	66,4	66,1	66,2	66,1	66,1	65,9	65,9	66,0	65,8	1,0	-	-0,4
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,37	0,37	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,34	0,34	-34,9	-	-7,3
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	62,6	63,0	63,3	63,4	64,2	63,9	64,2	64,2	64,3	64,6	64,7	64,7
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	62,7	62,9	63,1	63,2	63,7	63,6	64,0	64,0	64,0	64,3	64,0	64,1
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	1,08	1,07	0,98	0,97	0,96	0,93	0,89	0,87	0,86	0,83	0,83	0,80

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 36**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО пищевода (C15), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
	1993-2013	2003-2013	2008-2013									
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	65,3	65,1	65,3	64,2	63,7	63,3	63,2	63,3	63,2	-	-3,4	-1,5
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	64,4	64,3	64,5	64,3	64,3	64,1	64,1	64,4	64,2	2,2	-	-
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,79	0,78	0,77	0,77	0,80	0,78	0,77	0,73	0,73	-31,1	-9,0	-
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	72,4	72,8	72,7	72,6	72,7	72,5	73,0	73,3	73,5	73,8	73,9	74,1
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	72,0	72,3	72,3	72,1	72,2	71,9	72,2	72,4	72,4	72,3	72,2	72,4
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,18	0,17	0,16	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,13	0,11	0,11	0,11
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	74,9	74,3	74,8	74,7	74,8	74,5	74,5	74,0	74,0	3,3	-	-1,1
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	72,9	72,3	72,3	72,7	72,6	72,3	72,3	71,8	72,0	-	-	-1,2
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	-	-	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 37

## Динамика показателей диагностики ЗНО пищевода (C15), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	8904	8437	7926	7999	7890	7714	7494	7239	7088	6776	7056
из них доля выявленных активно, %	2,0	1,9	2,4	2,0	2,3	2,2	2,1	1,9	2,0	2,2	2,9
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	60,3	60,5	62,9	66,4	64,7	66,1	67,7	70,4	72,2	71,6	73,6
*I-II ст., %	18,2	17,8	17,7	19,3	19,2	18,6	19,7	18,7	20,3	20,2	21,8
*III ст., %	45,2	45,5	44,4	42,8	41,3	42,4	41,1	42,8	41,5	42,0	40,9
*IV ст., %	26,9	27,5	28,2	28,8	30,5	29,6	30,9	30,5	29,9	29,2	28,9
Показатель одногодичной летальности, %	64,3	63,7	61,7	64,5	63,8	64,9	66,0	63,8	66,2	65,2	66,7
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	6829	6627	6621	6667	6662	6585	6782	6766	6610	6660	
из них доля выявленных активно, %	2,4	3,2	2,9	2,3	3,0	3,2	3,7	3,8	4,7	5,6	
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	76,1	75,5	77,5	78,2	79,8	81,3	81,7	84,0	86,1	87,9	
*I-II ст., %	22,2	22,7	23,2	24,3	25,5	25,0	26,4	25,7	28,6	27,0	
*III ст., %	39,7	39,0	40,6	39,3	38,7	38,1	37,5	37,8	36,2	37,2	
*IV ст., %	30,3	30,8	29,6	29,0	29,5	30,9	30,5	30,0	29,2	30,4	
Показатель одногодичной летальности, %	64,0	63,2	62,4	63,3	62,3	61,0	63,6	60,4	59,4	58,3	

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 38

**Динамика сведений о контингенте больных с ЗНО пищевода (C15), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных, состоящих на учете на конец года	10254	9953	9949	10129	10356	10315	10302	10120	10313	10205	10292
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	19,5	20,2	23,6	22,8	23,9	24,9	25,6	26,3	26,0	27,4	29,0
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	23,0	22,3	24,8	22,5	23,6	25,0	26,5	26,7	26,5	27,0	28,9
Показатель распространенности на 100 000 населения	6,9	6,7	6,7	6,9	7,1	7,0	7,1	7,0	7,2	7,1	7,2
Индекс накопления контингента	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных, состоящих на учете на конец года	10117	10176	10464	10606	10802	10984	11408	11721	11744	12077	
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	29,1	29,9	30,7	30,6	30,9	31,3	30,4	32,4	31,8	31,9	
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	28,6	30,0	31,1	31,8	32,4	34,0	34,0	36,2	35,2	35,6	
Показатель распространенности на 100 000 населения	7,1	7,2	7,3	7,5	7,6	7,7	8,0	8,2	8,2	8,4	
Индекс накопления контингента	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	

Таблица 39

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО желудка (C16)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>55206</b>	<b>53371</b>	<b>52495</b>	<b>51854</b>	<b>51099</b>	<b>50673</b>	<b>48825</b>	<b>48237</b>	<b>46957</b>	<b>46275</b>	<b>45046</b>	<b>44214</b>
<b>20-24</b>	64,0	61,0	57,0	64,0	77,0	46,0	54,0	45,0	40,0	49,0	47,0	48,0
<b>25-29</b>	183,0	168,0	145,0	135,0	182,0	154,0	118,0	141,0	158,0	127,0	100,0	119,0
<b>30-34</b>	553,0	472,0	449,0	426,0	410,0	343,0	311,0	292,0	339,0	317,0	274,0	261,0
<b>35-39</b>	1114,0	1115,0	1069,0	1071,0	1008,0	917,0	823,0	756,0	712,0	646,0	555,0	528,0
<b>40-44</b>	2028,0	1998,0	2049,0	1976,0	1913,0	1774,0	1747,0	1707,0	1621,0	1609,0	1426,0	1300,0
<b>45-49</b>	2285,0	2577,0	2868,0	3108,0	3025,0	3104,0	2985,0	2802,0	2861,0	2794,0	2526,0	2420,0
<b>50-54</b>	4626	3664	2983	2777	2883	2994	3569	3865	4021	3982	4020	3997
<b>55-59</b>	6856	7284	7250	7098	6444	5324	4257	3489	3099	3210	3659	4134
<b>60-64</b>	9354	8298	7612	7510	7568	7877	8185	8228	8005	7144	5937	4670
<b>65-69</b>	11071	11134	11109	10637	9953	9432	8105	7653	7402	7483	7987	8502
<b>70-74</b>	6697	7030	7735	8434	9088	10046	9745	9907	9343	8892	7987	7264
<b>75-79</b>	5818	4972	4607	4327	4616	4693	5162	5712	5914	6502	6934	7039
<b>80-84</b>	3281	3421	3261	2993	2572	2634	2357	2254	2231	2357	2434	2739
<b>85 и ст.</b>	1260	1162	1276	1277	1325	1308	1377	1363	1182	1142	1141	1178

**Продолжение таблицы 39**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО желудка (C16)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>43377</b>	<b>41930</b>	<b>41941</b>	<b>40615</b>	<b>40323</b>	<b>39775</b>	<b>38318</b>	<b>37369</b>	<b>37293</b>	<b>-32,7</b>	<b>-17,5</b>	<b>-9,3</b>
<b>20-24</b>	58,0	57,0	58,0	33,0	35,0	46,0	41,0	28,0	42,0	<b>-40,9</b>	-	-
<b>25-29</b>	120,0	110,0	108,0	111,0	127,0	116,0	89,0	108,0	115,0	<b>-40,3</b>	-	-
<b>30-34</b>	268,0	253,0	273,0	262,0	264,0	248,0	279,0	251,0	209,0	<b>-55,8</b>	-	-
<b>35-39</b>	508,0	492,0	515,0	457,0	503,0	446,0	503,0	461,0	421,0	<b>-69,9</b>	<b>-17,7</b>	-
<b>40-44</b>	1199,0	1147,0	1028,0	940,0	897,0	858,0	841,0	778,0	766,0	<b>-67,8</b>	<b>-47,4</b>	<b>-18,6</b>
<b>45-49</b>	2405,0	2352,0	2227,0	2062,0	1876,0	1840,0	1595,0	1439,0	1378,0	<b>-46,0</b>	<b>-45,6</b>	<b>-33,5</b>
<b>50-54</b>	3838	3760	3597	3550	3512	3412	3151	3102	2956	-	<b>-25,9</b>	<b>-17,4</b>
<b>55-59</b>	4678	4908	5063	5151	4903	4818	4712	4610	4529	<b>-34,7</b>	-	<b>-11,4</b>
<b>60-64</b>	3905	3433	3622	4168	4976	5651	5900	5764	6070	<b>-48,5</b>	-	<b>39,5</b>
<b>65-69</b>	8486	7985	7545	5999	4993	4114	3636	3805	4427	<b>-63,6</b>	<b>-60,7</b>	-
<b>70-74</b>	6792	6495	6942	7179	7728	8009	7564	6952	5730	<b>-19,4</b>	-	-
<b>75-79</b>	7092	6638	6270	5730	5299	5034	4834	5063	5615	-	<b>-32,0</b>	-
<b>80-84</b>	2960	3219	3590	3735	3797	3742	3629	3394	3216	<b>29,4</b>	<b>31,5</b>	<b>-14,3</b>
<b>85 и ст.</b>	1056	1071	1087	1231	1397	1429	1532	1608	1811	<b>23,5</b>	<b>72,3</b>	<b>43,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 39**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО желудка (C16)**

**в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>31491</b>	<b>30680</b>	<b>30272</b>	<b>29592</b>	<b>29410</b>	<b>28876</b>	<b>27821</b>	<b>27476</b>	<b>26963</b>	<b>26655</b>	<b>25845</b>	<b>25083</b>
<b>20-24</b>	39	31	31	36	32	24	28	12	14	22	18	21
<b>25-29</b>	93	79	76	53	82	81	47	65	67	45	44	55
<b>30-34</b>	285	254	234	212	217	180	138	138	165	154	136	127
<b>35-39</b>	653	641	642	631	579	519	475	426	392	359	305	302
<b>40-44</b>	1321	1311	1304	1192	1225	1122	1095	1024	991	981	857	770
<b>45-49</b>	1547	1757	1919	2033	2045	2021	2006	1876	1836	1841	1601	1557
<b>50-54</b>	3170	2611	2126	1885	1978	2050	2433	2660	2749	2733	2721	2705
<b>55-59</b>	4849	5080	5008	4929	4444	3669	2805	2390	2095	2230	2553	2813
<b>60-64</b>	6155	5404	5031	4851	4994	5173	5379	5350	5175	4716	3824	2951
<b>65-69</b>	6212	6546	6692	6373	5971	5649	4869	4645	4536	4512	4922	5139
<b>70-74</b>	3076	3273	3663	4033	4592	5132	5166	5224	5103	4941	4375	3951
<b>75-79</b>	2411	2033	1943	1833	1876	1860	2027	2354	2522	2837	3173	3290
<b>80-84</b>	1237	1228	1153	1106	941	931	873	853	886	873	925	979
<b>85 и ст.</b>	433	428	436	413	412	452	463	442	414	400	380	416

**Продолжение таблицы 39**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО желудка (C16)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>24710</b>	<b>23739</b>	<b>23810</b>	<b>22876</b>	<b>22936</b>	<b>22464</b>	<b>21846</b>	<b>21193</b>	<b>21179</b>	<b>-33,6</b>	<b>-17,9</b>	<b>-8,8</b>
<b>20-24</b>	26	30	33	17	12	17	14	16	24	<b>-49,7</b>	-	-
<b>25-29</b>	49	49	44	46	62	51	43	44	50	<b>-47,1</b>	-	-
<b>30-34</b>	130	103	145	134	111	126	147	108	103	<b>-60,7</b>	-	-
<b>35-39</b>	276	277	280	254	259	229	253	259	225	<b>-74,3</b>	<b>-22,7</b>	
<b>40-44</b>	721	684	615	579	538	502	514	452	437	<b>-71,5</b>	<b>-48,7</b>	<b>-23,3</b>
<b>45-49</b>	1573	1491	1461	1315	1187	1194	1058	913	861	<b>-49,0</b>	<b>-45,8</b>	<b>-33,8</b>
<b>50-54</b>	2646	2512	2418	2368	2354	2291	2064	2034	1972	<b>-11,9</b>	<b>-28,1</b>	<b>-18,5</b>
<b>55-59</b>	3210	3348	3400	3405	3355	3211	3192	3100	3089	<b>-37,5</b>	-	<b>-9,9</b>
<b>60-64</b>	2467	2238	2367	2705	3307	3731	3903	3748	3967	<b>-48,6</b>	-	<b>38,6</b>
<b>65-69</b>	5104	4789	4444	3608	2931	2441	2197	2390	2760	<b>-62,1</b>	<b>-60,3</b>	-
<b>70-74</b>	3660	3510	3769	3876	4267	4344	4062	3658	3059	-	-	-
<b>75-79</b>	3349	3148	3044	2704	2477	2362	2316	2457	2667	<b>36,3</b>	<b>-29,9</b>	-
<b>80-84</b>	1101	1185	1414	1465	1577	1527	1550	1447	1331	<b>54,9</b>	<b>54,7</b>	-
<b>85 и ст.</b>	393	368	368	397	493	436	527	563	629	<b>24,2</b>	<b>69,4</b>	<b>54,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 39**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО желудка (C16)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>23715</b>	<b>22691</b>	<b>22223</b>	<b>22262</b>	<b>21689</b>	<b>21797</b>	<b>21004</b>	<b>20761</b>	<b>19994</b>	<b>19620</b>	<b>19201</b>	<b>19131</b>
<b>20-24</b>	25	30	26	28	45	22	26	33	26	27	29	27
<b>25-29</b>	90	89	69	82	100	73	71	76	91	82	56	64
<b>30-34</b>	268	218	215	214	193	163	173	154	174	163	138	134
<b>35-39</b>	461	474	427	440	429	398	348	330	320	287	250	226
<b>40-44</b>	707	687	745	784	688	652	652	683	630	628	569	530
<b>45-49</b>	738	820	949	1075	980	1083	979	926	1025	953	925	863
<b>50-54</b>	1456	1053	857	892	905	944	1136	1205	1272	1249	1299	1292
<b>55-59</b>	2007	2204	2242	2169	2000	1655	1452	1099	1004	980	1106	1321
<b>60-64</b>	3199	2894	2581	2659	2574	2704	2806	2878	2830	2428	2113	1719
<b>65-69</b>	4859	4588	4417	4264	3982	3783	3236	3008	2866	2971	3065	3363
<b>70-74</b>	3621	3757	4072	4401	4496	4914	4579	4683	4240	3951	3612	3313
<b>75-79</b>	3407	2939	2664	2494	2740	2833	3135	3358	3392	3665	3761	3749
<b>80-84</b>	2044	2193	2108	1887	1631	1703	1484	1401	1345	1484	1509	1760
<b>85 и ст.</b>	827	734	840	864	913	856	914	921	768	742	761	762

**Продолжение таблицы 39**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО желудка (C16)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	18667	18191	18131	17739	17387	17311	16472	16176	16114	-31,5	-16,9	-10,0
<b>20-24</b>	32	27	25	16	23	29	27	12	18	-31,9	-38,2	-
<b>25-29</b>	71	61	64	65	65	65	46	64	65	-34,3	-	-
<b>30-34</b>	138	150	128	128	153	122	132	143	106	-50,7	-	-
<b>35-39</b>	232	215	235	203	244	217	250	202	196	-63,7	-	-
<b>40-44</b>	478	463	413	361	359	356	327	326	329	-61,3	-45,5	-11,2
<b>45-49</b>	832	861	766	747	689	646	537	526	517	-39,8	-45,4	-32,9
<b>50-54</b>	1192	1248	1179	1182	1158	1121	1087	1068	984	-	-21,1	-15,3
<b>55-59</b>	1468	1560	1663	1746	1548	1607	1520	1510	1440	-28,4	-	-14,5
<b>60-64</b>	1438	1195	1255	1463	1669	1920	1997	2016	2103	-48,3	-	41,4
<b>65-69</b>	3382	3196	3101	2391	2062	1673	1439	1415	1667	-65,9	-61,2	-36,5
<b>70-74</b>	3132	2985	3173	3303	3461	3665	3502	3294	2671	-29,9	-	-
<b>75-79</b>	3743	3490	3226	3026	2822	2672	2518	2606	2948	-	-33,8	-
<b>80-84</b>	1859	2034	2176	2270	2220	2215	2079	1947	1885	-	-	-17,5
<b>85 и ст.</b>	663	703	719	834	904	993	1005	1045	1182	-	73,9	38,5

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 40

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО желудка (С16), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	1,25	1,17	1,02	1,00	1,28	0,97	0,83	0,88	0,94	0,83	0,66	0,73
<b>30-39</b>	6,60	6,35	6,19	6,25	6,09	5,60	5,22	4,98	5,16	4,85	4,21	4,04
<b>40-49</b>	23,77	23,25	23,25	22,97	21,71	20,90	19,95	18,83	18,62	18,28	16,49	15,73
<b>50-59</b>	67,39	67,29	65,99	65,95	63,77	58,34	55,42	51,62	49,20	47,59	47,40	46,61
<b>60-69</b>	134,85	130,90	128,47	125,60	120,94	118,19	110,43	107,81	105,57	102,84	101,65	101,44
<b>70-79</b>	194,79	183,24	181,30	175,46	174,33	174,32	166,19	166,57	158,57	158,17	154,68	152,54
<b>80 и ст.</b>	141,92	140,82	138,64	133,37	125,73	130,74	126,36	124,92	120,20	123,29	132,63	138,85
<b>15-59</b>	19,55	19,01	18,40	18,14	17,37	15,95	15,08	14,23	13,99	13,77	13,33	13,41
<b>«Грубый» показатель</b>	37,26	36,07	35,52	35,19	34,78	34,58	33,45	33,22	32,66	32,38	31,40	30,99
<b>Стандарт. показатель</b>	26,47	25,43	24,86	24,42	23,80	23,11	22,13	21,64	21,06	20,55	19,87	19,39
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,77	0,71	0,69	0,59	0,66	0,66	0,54	0,57	0,68	<b>-54,6</b>	-	-
<b>30-39</b>	3,98	3,76	3,93	3,53	3,71	3,33	3,66	3,29	2,86	<b>-56,1</b>	<b>-25,2</b>	-
<b>40-49</b>	15,58	15,40	14,73	14,01	13,36	13,20	12,44	11,53	11,27	<b>-54,4</b>	<b>-31,3</b>	<b>-19,9</b>
<b>50-59</b>	45,71	44,42	43,21	42,35	40,26	39,17	36,28	35,38	34,31	<b>-51,1</b>	<b>-28,2</b>	<b>-19,2</b>
<b>60-69</b>	100,64	95,91	95,88	89,37	88,10	85,83	78,91	75,29	76,73	<b>-42,8</b>	<b>-27,6</b>	<b>-16,9</b>
<b>70-79</b>	151,08	143,21	142,22	135,93	134,52	133,28	123,95	121,93	120,17	<b>-36,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>-12,9</b>
<b>80 и ст.</b>	134,23	133,67	135,50	134,01	132,14	128,47	120,11	114,30	114,19	<b>-10,2</b>	<b>-15,9</b>	<b>-16,7</b>
<b>15-59</b>	13,59	13,47	13,30	13,04	12,67	12,37	11,86	11,50	11,22	<b>-41,5</b>	<b>-17,0</b>	<b>-14,2</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	30,56	29,43	29,51	28,61	28,41	28,03	26,80	26,10	25,99	<b>-29,5</b>	<b>-17,7</b>	<b>-10,4</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	18,97	18,20	18,05	17,37	17,17	16,82	15,79	15,20	15,00	<b>-43,0</b>	<b>-24,5</b>	<b>-15,1</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 40**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО желудка (C16), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	1,31	1,09	1,06	0,87	1,10	1,00	0,71	0,72	0,76	0,62	0,55	0,66
<b>30-39</b>	7,42	7,15	7,14	7,04	6,85	6,22	5,64	5,34	5,43	5,12	4,51	4,44
<b>40-49</b>	32,33	31,96	31,34	30,03	29,65	27,81	27,01	25,05	24,32	24,28	21,43	20,59
<b>50-59</b>	103,63	104,64	102,43	101,67	97,99	89,16	82,02	78,07	73,50	72,08	71,93	70,27
<b>60-69</b>	210,52	205,33	203,20	194,72	188,85	183,87	172,83	169,12	166,55	163,63	161,99	159,82
<b>70-79</b>	324,41	306,77	308,19	295,03	291,16	283,55	268,17	266,22	258,70	258,78	249,29	244,52
<b>80 и ст.</b>	261,56	253,31	241,68	236,53	216,78	226,78	222,09	217,07	219,93	214,20	251,02	254,63
<b>15-59</b>	26,79	26,19	25,14	24,30	23,51	21,39	19,96	18,99	18,40	18,42	17,87	17,97
<b>«Грубый» показатель</b>	45,29	44,16	43,63	42,79	42,67	42,02	40,67	40,41	40,09	39,93	38,74	37,85
<b>Стандарт. показатель</b>	41,37	39,90	39,10	37,66	36,85	35,54	33,93	33,32	32,51	31,90	31,02	30,05
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,65	0,66	0,64	0,51	0,60	0,55	0,47	0,50	0,64	<b>-59,8</b>	-	-
<b>30-39</b>	4,20	3,88	4,29	3,86	3,62	3,45	3,80	3,44	3,01	<b>-60,8</b>	<b>-28,3</b>	<b>-16,2</b>
<b>40-49</b>	20,79	20,10	19,73	18,57	17,43	17,39	16,77	14,80	14,21	<b>-56,5</b>	<b>-32,2</b>	<b>-22,6</b>
<b>50-59</b>	70,19	67,27	65,11	63,08	61,34	58,81	54,26	52,60	51,69	<b>-52,8</b>	<b>-29,4</b>	<b>-19,4</b>
<b>60-69</b>	159,21	153,44	151,63	142,96	140,75	137,83	125,61	119,72	122,02	<b>-41,3</b>	<b>-27,2</b>	<b>-17,5</b>
<b>70-79</b>	239,75	226,47	227,64	214,53	215,76	212,51	197,11	192,95	190,03	<b>-40,5</b>	<b>-24,1</b>	<b>-13,3</b>
<b>80 и ст.</b>	252,42	235,99	240,92	226,07	231,12	211,86	207,70	195,04	187,66	<b>-14,6</b>	<b>-25,7</b>	<b>-18,4</b>
<b>15-59</b>	18,49	18,07	17,92	17,41	17,02	16,53	15,93	15,26	15,02	<b>-42,7</b>	<b>-17,7</b>	<b>-14,4</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	37,54	35,96	36,19	34,83	34,94	34,22	33,04	31,98	31,87	<b>-29,1</b>	<b>-17,7</b>	<b>-10,0</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	29,52	28,16	27,95	26,74	26,71	25,92	24,44	23,38	23,04	<b>-43,6</b>	<b>-25,4</b>	<b>-15,5</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 40**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО желудка (С16), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	1,19	1,24	0,99	1,13	1,47	0,95	0,95	1,05	1,12	1,03	0,77	0,80
<b>30-39</b>	5,78	5,54	5,24	5,46	5,34	4,98	4,79	4,62	4,89	4,57	3,91	3,66
<b>40-49</b>	15,58	14,95	15,60	16,32	14,23	14,42	13,33	13,01	13,30	12,68	11,96	11,28
<b>50-59</b>	37,24	36,51	36,27	37,01	35,98	33,13	33,45	29,62	28,88	27,09	27,11	27,24
<b>60-69</b>	86,91	82,91	79,49	79,72	75,52	74,06	68,49	66,73	65,00	62,90	62,40	64,14
<b>70-79</b>	148,47	138,91	135,03	130,47	128,31	129,35	122,69	123,13	114,35	113,21	111,40	110,08
<b>80 и ст.</b>	112,09	112,54	112,73	107,49	102,77	106,39	101,89	101,01	93,98	99,21	104,34	110,94
<b>15-59</b>	12,51	12,05	11,88	12,18	11,44	10,69	10,36	9,63	9,72	9,29	9,02	9,09
<b>«Грубый» показатель</b>	30,16	28,91	28,35	28,46	27,80	28,01	27,09	26,89	26,13	25,77	25,02	25,03
<b>Стандарт. показатель</b>	17,53	16,65	16,19	16,34	15,68	15,37	14,78	14,38	13,98	13,46	13,07	12,94
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,90	0,75	0,75	0,67	0,72	0,77	0,61	0,65	0,73	<b>-49,7</b>	<b>-18,4</b>	-
<b>30-39</b>	3,75	3,64	3,58	3,21	3,78	3,21	3,52	3,14	2,71	<b>-50,0</b>	<b>-21,8</b>	-
<b>40-49</b>	10,83	11,13	10,18	9,88	9,65	9,38	8,46	8,51	8,55	<b>-49,3</b>	<b>-29,9</b>	<b>-15,7</b>
<b>50-59</b>	25,86	26,00	25,59	25,69	23,34	23,41	21,75	21,42	20,16	<b>-46,5</b>	<b>-25,1</b>	<b>-19,5</b>
<b>60-69</b>	63,78	59,94	60,88	55,37	54,20	52,08	47,53	45,25	46,16	<b>-45,2</b>	<b>-30,9</b>	<b>-19,5</b>
<b>70-79</b>	109,72	103,92	101,62	98,44	95,81	95,58	88,96	88,26	87,42	<b>-39,7</b>	<b>-23,3</b>	<b>-12,1</b>
<b>80 и ст.</b>	105,08	107,28	106,74	107,71	102,94	103,53	93,54	89,42	91,34	<b>-12,2</b>	<b>-16,0</b>	<b>-17,3</b>
<b>15-59</b>	8,98	9,16	8,96	8,94	8,59	8,48	8,05	7,97	7,65	<b>-37,7</b>	<b>-15,3</b>	<b>-13,8</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	24,52	23,78	23,75	23,26	22,80	22,70	21,43	21,03	20,91	<b>-29,4</b>	<b>-17,4</b>	<b>-11,1</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	12,59	12,12	12,00	11,62	11,39	11,24	10,48	10,16	10,00	<b>-42,3</b>	<b>-23,9</b>	<b>-15,1</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 41

## Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО желудка (С16), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	65,2	65,5	65,8	65,8	66,0	66,5	66,4	66,8	66,8	67,2	67,5	67,7
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	64,3	64,3	64,4	64,4	64,5	64,9	65,0	65,3	65,2	65,5	65,8	66,0
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	3,23	3,12	3,06	3,01	2,92	2,87	2,72	2,67	2,60	2,54	2,43	2,37
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	67,8	67,8	68,0	68,0	68,1	68,0	67,8	67,8	67,4	4,2	-	-0,8
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	66,0	66,1	66,2	66,4	66,5	66,5	66,6	66,7	66,9	4,4	1,5	0,7
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	2,33	2,23	2,23	2,13	2,11	2,06	1,94	1,87	1,84	-43,1	-24,2	-15,0
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	63,1	63,3	63,8	63,9	64,1	64,6	64,5	64,8	65,0	65,3	65,9	66,2
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	62,4	62,5	62,6	62,8	62,8	63,3	63,4	63,7	63,8	64,0	64,4	64,5
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	5,02	4,89	4,82	4,65	4,55	4,42	4,17	4,09	4,00	3,94	3,76	3,64

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 41**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО желудка (С16), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	66,2	66,2	66,3	65,9	65,5	64,8	64,7	64,9	64,8	<b>3,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-1,5</b>
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	64,5	64,5	64,7	64,8	65,0	64,9	65,0	65,2	65,3	<b>4,8</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	3,58	3,44	3,43	3,29	3,29	3,21	2,99	2,88	2,84	<b>-43,6</b>	<b>-23,9</b>	<b>-15,5</b>
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Женщины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	68,0	68,1	68,4	68,3	68,7	69,2	69,4	70,0	69,6	70,0	70,1	70,0
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	66,7	66,7	66,8	66,5	66,7	67,1	67,1	67,4	67,0	67,4	67,7	67,9
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	2,14	2,03	1,98	1,99	1,89	1,88	1,78	1,74	1,69	1,62	1,56	1,55
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	70,1	70,2	70,4	70,9	71,0	71,2	71,2	71,2	71,2	<b>5,0</b>	<b>2,1</b>	-
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	68,0	68,0	68,2	68,5	68,4	68,6	68,6	68,6	69,0	<b>3,7</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,52	1,45	1,46	1,39	1,36	1,34	1,26	1,22	1,19	<b>-43,6</b>	<b>-24,2</b>	<b>-15,1</b>

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 42

## Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО желудка (С16) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>52281</b>	<b>50534</b>	<b>49309</b>	<b>47504</b>	<b>46268</b>	<b>45731</b>	<b>45048</b>	<b>43747</b>	<b>42637</b>	<b>41295</b>	<b>40582</b>	<b>39639</b>
<b>20-24</b>	48	46	38	55	36	40	44	46	37	37	34	38
<b>25-29</b>	132	146	126	108	122	133	91	112	103	111	87	108
<b>30-34</b>	413	406	369	332	288	261	257	217	244	237	207	208
<b>35-39</b>	944	870	889	829	753	742	660	604	551	496	466	431
<b>40-44</b>	1661	1649	1633	1509	1469	1415	1397	1258	1292	1152	1138	1014
<b>45-49</b>	1614	2032	2316	2485	2438	2433	2400	2269	2226	2139	2083	2021
<b>50-54</b>	4197	3338	2584	2064	1999	2185	2813	2997	3209	3252	3257	3228
<b>55-59</b>	6193	6687	6704	6448	5871	4939	3959	3208	2694	2546	2908	3371
<b>60-64</b>	9164	8033	7335	6766	6650	6854	7270	7445	7231	6640	5493	4348
<b>65-69</b>	10558	10677	10734	10256	9631	8867	7947	7132	6842	6582	6980	7474
<b>70-74</b>	6380	6542	7053	7724	8343	9255	9412	9378	8971	8486	7571	6830
<b>75-79</b>	5624	5040	4602	4278	4329	4459	4843	5322	5623	6037	6766	6761
<b>80-84</b>	3963	3726	3569	3311	2886	2712	2477	2236	2228	2300	2413	2544
<b>85 и ст.</b>	1369	1321	1340	1324	1431	1414	1461	1504	1372	1264	1155	1248

**Продолжение таблицы 42**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО желудка (C16) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>38358</b>	<b>37360</b>	<b>37456</b>	<b>36045</b>	<b>35471</b>	<b>34438</b>	<b>33213</b>	<b>31929</b>	<b>31469</b>	<b>-38,8</b>	<b>-22,1</b>	<b>-13,5</b>
<b>20-24</b>	41	39	49	35	24	30	24	20	33	-	-	-
<b>25-29</b>	100	101	83	99	100	98	82	74	91	<b>-37,0</b>	-	--
<b>30-34</b>	223	189	226	194	226	205	185	179	156	<b>-57,9</b>	<b>-18,5</b>	<b>-22,7</b>
<b>35-39</b>	395	382	400	372	373	346	361	350	306	<b>-72,8</b>	<b>-27,0</b>	<b>-14,3</b>
<b>40-44</b>	929	865	815	745	651	650	600	549	589	<b>-70,9</b>	<b>-51,8</b>	<b>-22,3</b>
<b>45-49</b>	1936	1759	1795	1576	1517	1375	1189	1096	1010	<b>-47,2</b>	<b>-51,2</b>	<b>-36,8</b>
<b>50-54</b>	3060	3073	2888	2817	2812	2573	2440	2329	2137	<b>-16,0</b>	<b>-32,5</b>	<b>-24,2</b>
<b>55-59</b>	3789	4125	4078	4197	4029	3808	3745	3568	3493	<b>-47,8</b>	-	<b>-16,8</b>
<b>60-64</b>	3345	2834	2908	3228	3912	4504	4756	4659	4730	<b>-59,4</b>	-	<b>41,5</b>
<b>65-69</b>	7368	7096	6820	5631	4439	3447	3000	2973	3417	<b>-70,0</b>	<b>-64,5</b>	<b>-43,9</b>
<b>70-74</b>	6263	5892	6254	6385	6841	7085	6710	6097	5023	<b>-24,4</b>	-	-
<b>75-79</b>	6892	6678	6319	5718	5258	4918	4635	4604	5011	-	<b>-36,2</b>	-
<b>80-84</b>	2852	3203	3631	3772	3855	3851	3769	3658	3362	-	<b>45,7</b>	<b>-9,9</b>
<b>85 и ст.</b>	1151	1109	1175	1258	1419	1540	1710	1763	2107	-	<b>92,8</b>	<b>66,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 42**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО желудка (C16) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>29892</b>	<b>28773</b>	<b>28158</b>	<b>27128</b>	<b>26434</b>	<b>26032</b>	<b>25898</b>	<b>25035</b>	<b>24473</b>	<b>23812</b>	<b>23471</b>	<b>22664</b>
<b>20-24</b>	27	24	20	28	15	23	22	19	13	16	8	17
<b>25-29</b>	63	67	70	50	48	68	36	58	45	48	44	53
<b>30-34</b>	203	198	189	160	127	139	134	97	110	113	102	94
<b>35-39</b>	559	512	521	467	452	401	357	333	308	276	232	229
<b>40-44</b>	1084	1087	1048	957	941	925	890	779	786	694	715	587
<b>45-49</b>	1128	1412	1583	1671	1647	1610	1631	1550	1464	1438	1379	1319
<b>50-54</b>	2980	2328	1815	1485	1416	1532	1990	2097	2197	2293	2284	2207
<b>55-59</b>	4419	4740	4774	4550	4097	3496	2728	2221	1861	1803	2058	2358
<b>60-64</b>	6238	5408	4895	4606	4484	4638	5037	5023	4831	4447	3701	2851
<b>65-69</b>	6096	6326	6434	6300	5916	5421	4916	4437	4312	4135	4425	4686
<b>70-74</b>	2958	3014	3241	3578	4053	4692	4993	5034	4955	4738	4248	3792
<b>75-79</b>	2269	1964	1942	1745	1725	1700	1816	2099	2320	2569	3026	3169
<b>80-84</b>	1434	1309	1220	1129	1054	947	867	819	807	831	850	885
<b>85 и ст.</b>	420	369	399	394	446	430	470	453	456	403	385	410

**Продолжение таблицы 42**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО желудка (C16) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>22043</b>	<b>21190</b>	<b>21253</b>	<b>20440</b>	<b>20265</b>	<b>19553</b>	<b>19031</b>	<b>18319</b>	<b>17960</b>	<b>-38,9</b>	<b>-22,6</b>	<b>-12,8</b>
<b>20-24</b>	22	24	26	15	14	15	9	9	15	-	-	-
<b>25-29</b>	42	49	45	44	53	48	33	35	47	<b>-35,6</b>	-	-
<b>30-34</b>	111	90	103	81	92	101	90	85	65	<b>-62,8</b>	<b>-23,5</b>	-
<b>35-39</b>	233	224	216	204	209	182	184	191	173	<b>-76,0</b>	<b>-25,8</b>	<b>-14,2</b>
<b>40-44</b>	557	498	497	432	379	395	348	319	349	<b>-75,4</b>	<b>-53,6</b>	<b>-21,6</b>
<b>45-49</b>	1281	1130	1154	1033	949	898	773	728	653	<b>-50,8</b>	<b>-51,8</b>	<b>-35,9</b>
<b>50-54</b>	2125	2093	1955	1934	1935	1760	1655	1580	1437	-	<b>-34,2</b>	<b>-25,7</b>
<b>55-59</b>	2648	2866	2829	2895	2827	2647	2570	2435	2411	<b>-49,7</b>	-	<b>-17,8</b>
<b>60-64</b>	2192	1884	1995	2217	2637	3077	3291	3149	3240	<b>-59,1</b>	-	<b>41,8</b>
<b>65-69</b>	4630	4389	4131	3469	2749	2100	1879	1935	2176	<b>-67,8</b>	<b>-64,4</b>	<b>-41,2</b>
<b>70-74</b>	3552	3260	3499	3511	3858	3972	3792	3406	2827	-	-	-
<b>75-79</b>	3281	3187	3084	2782	2555	2346	2249	2321	2505	<b>44,5</b>	<b>-30,8</b>	-
<b>80-84</b>	976	1140	1337	1469	1557	1555	1601	1542	1399	<b>45,5</b>	<b>85,1</b>	-
<b>85 и ст.</b>	390	346	372	346	445	455	554	578	661	<b>32,7</b>	<b>83,8</b>	<b>90,1</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 42**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО желудка (C16) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>22389</b>	<b>21761</b>	<b>21151</b>	<b>20376</b>	<b>19834</b>	<b>19699</b>	<b>19150</b>	<b>18712</b>	<b>18164</b>	<b>17483</b>	<b>17111</b>	<b>16975</b>
<b>20-24</b>	21	22	18	27	21	17	22	27	24	21	26	21
<b>25-29</b>	69	79	56	58	74	65	55	54	58	63	43	55
<b>30-34</b>	210	208	180	172	161	122	123	120	134	124	105	114
<b>35-39</b>	385	358	368	362	301	341	303	271	243	220	234	202
<b>40-44</b>	577	562	585	552	528	490	507	479	506	458	423	427
<b>45-49</b>	486	620	733	814	791	823	769	719	762	701	704	702
<b>50-54</b>	1217	1010	769	579	583	653	823	900	1012	959	973	1021
<b>55-59</b>	1774	1947	1930	1898	1774	1443	1231	987	833	743	850	1013
<b>60-64</b>	2926	2625	2440	2160	2166	2216	2233	2422	2400	2193	1792	1497
<b>65-69</b>	4462	4351	4300	3956	3715	3446	3031	2695	2530	2447	2555	2788
<b>70-74</b>	3422	3528	3812	4146	4290	4563	4419	4344	4016	3748	3323	3038
<b>75-79</b>	3355	3076	2660	2533	2604	2759	3027	3223	3303	3468	3740	3592
<b>80-84</b>	2529	2417	2349	2182	1832	1765	1610	1417	1421	1469	1563	1659
<b>85 и ст.</b>	949	952	941	930	985	984	991	1051	916	861	770	838

**Продолжение таблицы 42**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО желудка (C16) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>16315</b>	<b>16170</b>	<b>16203</b>	<b>15605</b>	<b>15206</b>	<b>14885</b>	<b>14182</b>	<b>13610</b>	<b>13509</b>	<b>-38,7</b>	<b>-21,5</b>	<b>-14,4</b>
<b>20-24</b>	19	15	23	20	10	15	15	11	18	-	-	-
<b>25-29</b>	58	52	38	55	47	50	49	39	44	<b>-38,2</b>	-	<b>-21,1</b>
<b>30-34</b>	112	99	123	113	134	104	95	94	91	<b>-53,1</b>	-	<b>-27,2</b>
<b>35-39</b>	162	158	184	168	164	164	177	159	133	<b>-68,5</b>	<b>-28,4</b>	-
<b>40-44</b>	372	367	318	313	272	255	252	230	240	<b>-62,7</b>	<b>-49,1</b>	<b>-23,3</b>
<b>45-49</b>	655	629	641	543	568	477	416	368	357	<b>-39,6</b>	<b>-49,9</b>	<b>-38,4</b>
<b>50-54</b>	935	980	933	883	877	813	785	749	700	-	<b>-28,7</b>	<b>-20,7</b>
<b>55-59</b>	1141	1259	1249	1302	1202	1161	1175	1133	1082	<b>-43,2</b>	-	<b>-14,4</b>
<b>60-64</b>	1153	950	913	1011	1275	1427	1465	1510	1490	<b>-60,1</b>	-	<b>41,0</b>
<b>65-69</b>	2738	2707	2689	2162	1690	1347	1121	1038	1241	<b>-73,4</b>	<b>-64,6</b>	<b>-48,1</b>
<b>70-74</b>	2711	2632	2755	2874	2983	3113	2918	2691	2196	<b>-39,6</b>	-	-
<b>75-79</b>	3611	3491	3235	2936	2703	2572	2386	2283	2506	-	<b>-40,9</b>	<b>-17,9</b>
<b>80-84</b>	1876	2063	2294	2303	2298	2296	2168	2116	1963	-	<b>26,2</b>	<b>-14,2</b>
<b>85 и ст.</b>	761	763	803	912	974	1085	1156	1185	1446	-	<b>97,1</b>	<b>57,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 43

**Динамика показателей смертности от ЗНО желудка (С16), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,91	0,98	0,83	0,82	0,78	0,84	0,65	0,75	0,66	0,69	0,54	0,64
<b>30-39</b>	5,38	5,10	5,13	4,85	4,47	4,46	4,22	3,90	3,91	3,69	3,42	3,28
<b>40-49</b>	18,05	18,71	18,68	18,05	17,17	16,49	16,01	14,73	14,62	13,66	13,44	12,83
<b>50-59</b>	60,98	61,61	59,89	56,85	53,81	49,96	47,95	43,55	40,79	38,36	38,05	37,83
<b>60-69</b>	130,21	126,04	124,00	117,81	112,38	107,35	103,15	98,95	96,43	92,97	91,06	91,05
<b>70-79</b>	186,84	176,83	171,20	165,02	161,20	162,20	158,92	156,77	151,68	149,22	148,63	144,94
<b>80 и ст.</b>	166,64	155,08	150,01	144,77	139,28	136,84	133,26	129,17	126,79	125,58	132,37	134,41
<b>15-59</b>	16,79	16,64	15,99	15,05	14,13	13,22	12,64	11,64	11,26	10,78	10,77	10,91
<b>«Грубый» показатель</b>	35,29	34,15	33,37	32,23	31,49	31,21	30,87	30,13	29,66	28,90	28,28	27,78
<b>Стандарт. показатель</b>	24,58	23,77	23,05	21,88	21,01	20,51	20,15	19,43	18,83	18,03	17,61	17,22
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,61	0,59	0,55	0,55	0,51	0,52	0,44	0,40	0,54	<b>-52,3</b>	-	-
<b>30-39</b>	3,17	2,88	3,12	2,78	2,89	2,64	2,56	2,44	2,10	<b>-59,1</b>	<b>-32,8</b>	<b>-23,1</b>
<b>40-49</b>	12,39	11,55	11,81	10,84	10,44	9,91	9,13	8,55	8,41	<b>-56,6</b>	<b>-37,7</b>	<b>-23,9</b>
<b>50-59</b>	36,77	36,89	34,75	34,14	32,73	30,37	28,54	27,05	25,80	<b>-59,4</b>	<b>-32,6</b>	<b>-24,8</b>
<b>60-69</b>	87,01	83,41	83,52	77,87	73,80	69,89	64,18	60,05	59,55	<b>-53,2</b>	<b>-36,7</b>	<b>-24,9</b>
<b>70-79</b>	143,15	137,07	135,34	127,44	124,94	122,66	113,42	108,60	106,29	<b>-39,0</b>	<b>-28,9</b>	<b>-17,9</b>
<b>80 и ст.</b>	133,79	134,36	139,23	135,74	134,18	133,93	127,51	123,87	124,23	<b>-16,3</b>	<b>-7,1</b>	<b>-9,8</b>
<b>15-59</b>	10,89	10,86	10,68	10,43	10,18	9,54	9,13	8,72	8,42	<b>-48,5</b>	<b>-22,9</b>	<b>-19,9</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	27,02	26,22	26,36	25,39	25,00	24,27	23,23	22,30	21,93	<b>-35,8</b>	<b>-22,2</b>	<b>-14,6</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	16,50	15,82	15,69	15,02	14,73	14,16	13,27	12,55	12,24	<b>-49,1</b>	<b>-30,1</b>	<b>-19,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 43**

**Динамика показателей смертности от ЗНО желудка (С16), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,89	0,91	0,89	0,76	0,61	0,87	0,55	0,72	0,54	0,60	0,46	0,61
<b>30-39</b>	6,03	5,68	5,79	5,24	4,98	4,80	4,51	4,07	4,08	3,88	3,42	3,34
<b>40-49</b>	24,94	26,04	25,58	24,47	23,47	22,43	21,96	20,12	19,35	18,35	18,26	16,86
<b>50-59</b>	95,61	96,16	94,61	90,05	84,12	78,39	73,88	66,75	61,57	59,49	59,22	58,13
<b>60-69</b>	209,96	201,62	196,37	189,20	179,12	170,91	167,85	160,06	156,81	152,17	150,51	148,89
<b>70-79</b>	309,04	287,80	284,94	267,72	260,10	259,22	253,85	250,58	246,82	243,11	240,24	235,06
<b>80 и ст.</b>	290,38	256,67	246,24	237,15	240,33	225,79	222,25	213,21	213,67	207,64	237,56	236,38
<b>15-59</b>	23,46	23,10	22,20	20,75	19,37	18,13	17,22	15,81	15,01	14,71	14,80	14,78
<b>«Грубый» показатель</b>	42,99	41,41	40,58	39,23	38,35	37,88	37,86	36,82	36,39	35,67	35,17	34,20
<b>Стандарт. показатель</b>	39,14	37,30	36,22	34,33	32,90	31,95	31,62	30,43	29,54	28,46	28,15	27,25
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,55	0,61	0,59	0,48	0,54	0,51	0,35	0,37	0,53	<b>-52,2</b>	-	-
<b>30-39</b>	3,56	3,21	3,22	2,84	2,95	2,75	2,61	2,59	2,19	<b>-62,8</b>	<b>-33,0</b>	<b>-21,0</b>
<b>40-49</b>	16,66	15,04	15,69	14,36	13,42	13,26	11,96	11,35	10,97	<b>-59,3</b>	<b>-39,0</b>	<b>-23,9</b>
<b>50-59</b>	57,21	56,93	53,54	52,76	51,17	47,10	43,62	41,14	39,30	<b>-60,5</b>	<b>-33,5</b>	<b>-26,4</b>
<b>60-69</b>	143,46	136,97	136,38	128,76	121,53	115,61	106,46	99,16	98,24	<b>-51,1</b>	<b>-36,3</b>	<b>-24,9</b>
<b>70-79</b>	233,73	219,29	219,95	205,17	205,17	200,21	186,70	180,71	176,95	<b>-38,6</b>	<b>-26,9</b>	<b>-15,4</b>
<b>80 и ст.</b>	230,79	225,81	231,06	220,37	223,53	216,93	215,50	205,72	197,24	<b>-18,2</b>	<b>-14,9</b>	<b>-10,7</b>
<b>15-59</b>	15,04	14,84	14,58	14,25	13,96	13,12	12,38	11,87	11,44	<b>-49,6</b>	<b>-23,4</b>	<b>-20,6</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	33,49	32,10	32,31	31,12	30,87	29,79	28,79	27,65	27,03	<b>-34,6</b>	<b>-22,3</b>	<b>-13,9</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	26,33	24,93	24,82	23,68	23,44	22,44	21,14	20,01	19,39	<b>-48,4</b>	<b>-30,2</b>	<b>-19,3</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 43**

**Динамика показателей смертности от ЗНО желудка (С16), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,94	1,05	0,77	0,87	0,96	0,82	0,75	0,78	0,78	0,79	0,62	0,67
<b>30-39</b>	4,72	4,53	4,47	4,46	3,97	4,11	3,92	3,73	3,73	3,49	3,41	3,21
<b>40-49</b>	11,46	11,73	12,14	11,99	11,25	10,91	10,43	9,69	10,19	9,29	9,02	9,14
<b>50-59</b>	32,16	33,15	31,59	29,95	29,20	26,72	26,55	24,26	23,41	20,68	20,55	21,20
<b>60-69</b>	79,68	77,30	76,56	70,43	67,74	64,64	59,67	58,01	56,26	54,06	52,38	54,08
<b>70-79</b>	143,17	137,00	129,73	126,39	122,24	122,26	118,42	115,87	109,66	107,27	106,72	103,35
<b>80 и ст.</b>	135,79	129,54	125,81	121,59	113,80	114,29	110,52	107,36	103,95	103,85	107,24	109,84
<b>15-59</b>	10,31	10,38	9,97	9,55	9,07	8,47	8,20	7,60	7,64	7,00	6,93	7,25
<b>«Грубый» показатель</b>	28,48	27,73	26,98	26,05	25,42	25,31	24,70	24,24	23,74	22,96	22,30	22,21
<b>Стандарт. показатель</b>	15,88	15,51	15,01	14,21	13,71	13,40	12,98	12,58	12,24	11,55	11,21	11,21
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,67	0,57	0,51	0,62	0,47	0,54	0,54	0,43	0,55	<b>-52,4</b>	<b>-25,1</b>	-
<b>30-39</b>	2,78	2,57	3,03	2,72	2,84	2,53	2,51	2,30	2,01	<b>-54,5</b>	<b>-32,2</b>	<b>-25,3</b>
<b>40-49</b>	8,49	8,37	8,28	7,63	7,73	6,85	6,54	5,97	6,04	<b>-50,1</b>	<b>-35,5</b>	<b>-24,3</b>
<b>50-59</b>	20,18	20,73	19,64	19,17	17,93	16,94	16,35	15,64	14,82	<b>-55,7</b>	<b>-29,6</b>	<b>-21,6</b>
<b>60-69</b>	51,49	49,92	50,34	45,58	43,08	40,21	35,77	33,60	33,44	<b>-56,7</b>	<b>-39,9</b>	<b>-28,7</b>
<b>70-79</b>	100,89	98,27	95,12	90,36	86,70	85,74	78,38	74,41	73,16	<b>-46,4</b>	<b>-31,9</b>	<b>-20,1</b>
<b>80 и ст.</b>	109,87	110,77	114,19	111,56	107,81	109,11	100,82	98,66	101,53	<b>-19,1</b>	<b>-8,9</b>	<b>-10,9</b>
<b>15-59</b>	6,99	7,11	7,03	6,84	6,64	6,19	6,08	5,77	5,57	<b>-45,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>-18,6</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	21,43	21,14	21,23	20,46	19,94	19,51	18,45	17,69	17,53	<b>-36,8</b>	<b>-22,0</b>	<b>-15,4</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	10,59	10,30	10,18	9,76	9,51	9,16	8,55	8,04	7,90	<b>-49,6</b>	<b>-30,1</b>	<b>-20,4</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 44

## Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО желудка (С16), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	65,8	66,0	66,2	66,5	66,8	67,2	67,3	67,6	67,7	68,1	68,3	68,4
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	65,2	65,1	65,2	65,3	65,5	65,7	65,9	66,1	66,2	66,4	66,6	66,7
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	3,00	2,90	2,82	2,70	2,60	2,56	2,51	2,42	2,35	2,24	2,15	2,11
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	68,6	68,7	69,0	69,2	69,6	70,1	70,2	70,1	69,7	6,8	2,9	-
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	66,9	67,1	67,3	67,4	67,5	67,7	67,9	68,0	68,2	5,0	2,4	1,2
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	2,01	1,92	1,91	1,83	1,78	1,71	1,60	1,52	1,47	-50,2	-31,2	-20,4
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	63,6	63,7	64,1	64,6	65,0	65,2	65,1	65,4	65,7	65,9	66,4	66,7
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	63,1	63,0	63,2	63,4	63,7	63,9	64,0	64,3	64,6	64,7	65,0	65,2
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	4,78	4,58	4,43	4,24	4,07	4,01	3,96	3,79	3,69	3,57	3,43	3,33

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 44**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО желудка (С16), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
	1993-2013	2003-2013	2008-2013									
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	67,0	67,0	67,2	67,0	66,9	66,6	66,5	66,6	66,4	<b>5,0</b>	-	<b>-0,8</b>
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	65,3	65,3	65,6	65,6	65,8	65,9	66,2	66,3	66,4	<b>5,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	3,22	3,04	3,04	2,90	2,87	2,75	2,57	2,44	2,36	<b>-49,1</b>	<b>-30,3</b>	<b>-19,8</b>
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	69,0	69,0	69,1	69,5	69,7	70,2	70,5	70,8	70,7	71,1	71,3	71,1
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	67,9	67,8	67,8	67,9	68,0	68,2	68,3	68,5	68,3	68,6	68,8	68,8
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	1,92	1,86	1,82	1,73	1,67	1,63	1,57	1,52	1,47	1,39	1,32	1,33
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	71,5	71,6	71,8	72,1	72,3	72,6	72,6	72,7	73,1	<b>6,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1,2</b>
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	69,2	69,3	69,5	69,7	69,7	70,1	70,1	70,3	70,7	<b>4,3</b>	<b>2,7</b>	<b>1,4</b>
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	1,24	1,21	1,20	1,14	1,10	1,06	0,98	0,93	0,90	<b>-52,8</b>	<b>-32,3</b>	<b>-21,8</b>

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 45

## Динамика показателей диагностики ЗНО желудка (С16), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	52987	51339	50509	49692	48959	48653	46752	46114	44868	43897	42628
из них доля выявленных активно, %	3,5	3,1	3,3	3,3	3,1	3,3	3,5	3,5	4,0	4,2	4,2
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	60,4	63,7	65,0	68,4	69,0	70,9	71,7	73,2	75,6	76,7	77,4
*I-II ст., %	15,8	16,7	17,2	17,5	17,9	17,6	18,1	18,9	19,8	20,2	20,8
*III ст., %	34,3	34,0	33,1	32,9	32,0	32,4	31,3	31,4	31,6	30,8	30,6
*IV ст., %	40,7	40,9	40,9	41,1	41,7	41,9	42,6	42,6	41,6	41,2	41,6
Показатель одногодичной летальности, %	56,9	55,6	56,0	55,6	55,4	56,0	56,9	56,9	55,3	55,3	55,6
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	41690	40801	39459	39269	37828	37305	36724	35225	34010	33335	
из них доля выявленных активно, %	4,6	4,7	4,3	3,9	4,6	5,2	5,2	6,0	6,8	8,3	
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	79,0	80,2	80,7	82,0	83,7	85,4	87,0	86,5	88,9	90,2	
*I-II ст., %	21,7	23,3	23,3	24,1	25,1	24,6	26,3	27,2	28,7	28,7	
*III ст., %	30,4	28,8	29,1	28,3	27,4	27,8	27,2	26,4	26,6	26,2	
*IV ст., %	41,3	41,8	41,7	42,4	42,4	42,1	42,3	41,4	39,3	40,9	
Показатель одногодичной летальности, %	56,0	54,6	53,5	53,5	54,1	53,2	53,3	51,2	49,8	49,2	

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 46

**Динамика сведений о контингенте больных с ЗНО желудка (С16), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных, состоящих на учете на конец года	128937	129451	130664	131214	132978	132878	132071	132436	133073	132755	133008
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	44,1	45,2	45,5	46,6	46,7	46,8	47,9	49,0	49,6	49,8	50,7
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	48,0	48,8	48,3	48,2	48,8	48,3	48,8	49,6	50,3	49,7	50,7
Показатель распространенности на 100 000 населения	87,0	87,5	88,4	89,0	90,5	90,7	90,5	91,2	92,6	92,9	92,7
Индекс накопления контингента	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных, состоящих на учете на конец года	132105	132604	133326	132323	132411	132741	133725	134535	134676	135014	
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	51,4	52,1	52,3	53,0	53,1	53,4	53,2	53,9	53,1	54,1	
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	51,4	52,2	52,4	52,8	52,8	53,7	53,7	54,3	54,0	55,1	
Показатель распространенности на 100 000 населения	92,6	93,4	93,6	93,1	93,3	93,5	94,2	94,1	94,1	94,1	
Индекс накопления контингента	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,8	4,0	4,1	

Таблица 47

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО ободочной кишки (C18)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>21235</b>	<b>21144</b>	<b>22371</b>	<b>23019</b>	<b>23865</b>	<b>24822</b>	<b>25378</b>	<b>26030</b>	<b>26460</b>	<b>27041</b>	<b>28169</b>	<b>29057</b>
<b>20-24</b>	32,0	30,0	16,0	44,0	48,0	22,0	29,0	31,0	37,0	34,0	36,0	41,0
<b>25-29</b>	44,0	61,0	56,0	78,0	88,0	67,0	62,0	66,0	77,0	65,0	74,0	69,0
<b>30-34</b>	158,0	160,0	166,0	178,0	174,0	159,0	119,0	132,0	143,0	127,0	150,0	149,0
<b>35-39</b>	373,0	366,0	347,0	428,0	405,0	368,0	340,0	354,0	310,0	311,0	269,0	285,0
<b>40-44</b>	682,0	637,0	640,0	732,0	684,0	719,0	737,0	651,0	743,0	679,0	651,0	663,0
<b>45-49</b>	715,0	859,0	1062,0	1156,0	1061,0	1145,0	1140,0	1294,0	1130,0	1229,0	1210,0	1242,0
<b>50-54</b>	1515	1218	1103	1140	1127	1330	1544	1701	1856	1922	2087	2090
<b>55-59</b>	2472	2748	2851	2902	2548	2399	2009	1733	1727	1759	2157	2483
<b>60-64</b>	3415	3094	3061	2992	3352	3764	4203	4364	4500	4011	3742	3096
<b>65-69</b>	4220	4434	4518	4641	4752	4545	4132	4234	4265	4592	5024	5819
<b>70-74</b>	2913	3119	3765	4146	4718	5035	5451	5523	5384	5506	5289	4955
<b>75-79</b>	2479	2147	2280	2233	2559	2840	3144	3540	3885	4250	4679	5068
<b>80-84</b>	1560	1586	1734	1569	1501	1476	1492	1395	1506	1654	1855	2132
<b>85 и ст.</b>	635	655	740	745	807	916	949	971	866	869	916	936

**Продолжение таблицы 47**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО ободочной кишки (C18)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>29651</b>	<b>30129</b>	<b>30814</b>	<b>31732</b>	<b>32334</b>	<b>32978</b>	<b>33739</b>	<b>34238</b>	<b>34792</b>	<b>68,1</b>	<b>23,9</b>	<b>9,9</b>
<b>20-24</b>	45,0	40,0	39,0	40,0	28,0	55,0	56	42	30	<b>48,0</b>	-	-
<b>25-29</b>	81,0	75,0	73,0	87,0	89,0	90,0	86	99	99	<b>64,8</b>	<b>40,6</b>	<b>14,6</b>
<b>30-34</b>	137,0	141,0	144,0	189,0	149,0	168,0	173	177	170	-	<b>24,6</b>	-
<b>35-39</b>	269,0	260,0	293,0	296,0	334,0	306,0	325	335	336	<b>-21,3</b>	<b>29,4</b>	-
<b>40-44</b>	627,0	610,0	615,0	512,0	561,0	524,0	508	539	578	<b>-25,2</b>	<b>-20,1</b>	-
<b>45-49</b>	1341,0	1289,0	1229,0	1285,0	1214,0	1179,0	1092	1069	1009	-	<b>-18,3</b>	<b>-20,8</b>
<b>50-54</b>	2076	2119	2175	2243	2268	2319	2316	2367	2279	<b>117,7</b>	<b>14,6</b>	-
<b>55-59</b>	2944	3163	3189	3473	3485	3551	3586	3612	3762	<b>68,8</b>	<b>57,9</b>	<b>7,8</b>
<b>60-64</b>	2623	2553	2780	3304	3936	4547	4894	5070	5266	<b>39,6</b>	<b>102,9</b>	<b>58,0</b>
<b>65-69</b>	5926	6247	5669	4848	4116	3635	3474	3689	4425	-	<b>-38,3</b>	-
<b>70-74</b>	4895	5011	5472	6110	6798	7186	7344	6966	5975	<b>95,4</b>	<b>46,6</b>	-
<b>75-79</b>	5325	5049	5142	4825	4614	4402	4686	5127	5752	<b>156,7</b>	-	-
<b>80-84</b>	2421	2626	2938	3305	3393	3515	3525	3373	3235	<b>240,1</b>	<b>76,6</b>	-
<b>85 и ст.</b>	925	921	1033	1199	1322	1481	1652	1759	1862	<b>198,9</b>	<b>152,4</b>	<b>60,4</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 47**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО ободочной кишки (C18)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>8630</b>	<b>8785</b>	<b>9134</b>	<b>9354</b>	<b>9664</b>	<b>10331</b>	<b>10291</b>	<b>10651</b>	<b>10782</b>	<b>11278</b>	<b>11582</b>	<b>12008</b>
<b>20-24</b>	14	13	8	28	25	12	11	21	19	19	14	20
<b>25-29</b>	22	24	26	37	40	36	35	40	34	27	35	28
<b>30-34</b>	67	89	83	89	68	81	55	63	69	67	73	70
<b>35-39</b>	175	171	158	202	176	179	142	165	145	158	123	127
<b>40-44</b>	303	301	298	330	309	348	349	288	302	318	299	297
<b>45-49</b>	310	394	483	547	458	515	502	563	494	553	505	563
<b>50-54</b>	687	570	497	472	513	570	654	745	795	852	920	889
<b>55-59</b>	1135	1273	1298	1307	1142	1089	894	776	710	803	968	1116
<b>60-64</b>	1562	1469	1386	1387	1548	1767	1849	1965	1960	1779	1648	1309
<b>65-69</b>	1885	1959	2050	2038	2079	2086	1883	1855	1890	2077	2218	2626
<b>70-74</b>	989	1163	1367	1500	1807	2008	2124	2278	2241	2269	2188	2158
<b>75-79</b>	876	710	790	736	865	924	1054	1221	1351	1545	1754	1902
<b>80-84</b>	431	479	477	471	437	452	463	401	497	544	594	642
<b>85 и ст.</b>	162	153	195	190	183	247	263	251	260	250	231	246

**Продолжение таблицы 47**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО ободочной кишки (C18)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>12109</b>	<b>12331</b>	<b>12709</b>	<b>12925</b>	<b>13342</b>	<b>13645</b>	<b>14019</b>	<b>14146</b>	<b>14550</b>	<b>71,0</b>	<b>25,8</b>	<b>12,1</b>
<b>20-24</b>	19	19	24	18	11	31	29	25	15	-	-	-
<b>25-29</b>	36	31	35	37	38	46	36	46	59	<b>67,3</b>	<b>74,2</b>	-
<b>30-34</b>	54	81	69	97	77	98	88	71	86	-	<b>28,5</b>	-
<b>35-39</b>	121	130	137	126	170	152	156	168	166	-	<b>44,3</b>	-
<b>40-44</b>	279	286	274	234	266	240	231	245	278	<b>-24,4</b>	<b>-17,2</b>	-
<b>45-49</b>	576	558	513	584	517	559	481	488	467	-		<b>-18,5</b>
<b>50-54</b>	871	861	949	955	987	975	971	1035	992	<b>106,9</b>	<b>15,8</b>	
<b>55-59</b>	1276	1424	1415	1496	1551	1636	1653	1573	1697	<b>65,4</b>	<b>60,4</b>	<b>10,3</b>
<b>60-64</b>	1150	1180	1252	1483	1802	2069	2204	2280	2410	<b>37,5</b>	<b>114,3</b>	<b>58,7</b>
<b>65-69</b>	2588	2661	2480	2100	1762	1579	1571	1682	1998	-	<b>-37,0</b>	-
<b>70-74</b>	2084	2127	2270	2587	2819	3028	3077	2885	2461	<b>126,4</b>	<b>42,9</b>	-
<b>75-79</b>	2097	1921	2021	1836	1825	1652	1823	1982	2207	<b>215,0</b>	-	-
<b>80-84</b>	689	786	980	1056	1169	1174	1217	1153	1133	<b>366,9</b>	<b>110,7</b>	-
<b>85 и ст.</b>	261	250	277	310	331	395	468	509	576	<b>265,5</b>	<b>208,4</b>	<b>104,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 47**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО ободочной кишки (C18)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>12605</b>	<b>12359</b>	<b>13237</b>	<b>13665</b>	<b>14201</b>	<b>14491</b>	<b>15087</b>	<b>15379</b>	<b>15678</b>	<b>15763</b>	<b>16587</b>	<b>17049</b>
<b>20-24</b>	18	17	8	16	23	10	18	10	18	15	22	21
<b>25-29</b>	22	37	30	41	48	31	27	26	43	38	39	41
<b>30-34</b>	91	71	83	89	106	78	64	69	74	60	77	79
<b>35-39</b>	198	195	189	226	229	189	198	189	165	153	146	158
<b>40-44</b>	379	336	342	402	375	371	388	363	441	361	352	366
<b>45-49</b>	405	465	579	609	603	630	638	731	636	676	705	679
<b>50-54</b>	828	648	606	668	614	760	890	956	1061	1070	1167	1201
<b>55-59</b>	1337	1475	1553	1595	1406	1310	1115	957	1017	956	1189	1367
<b>60-64</b>	1853	1625	1675	1605	1804	1997	2354	2399	2540	2232	2094	1787
<b>65-69</b>	2335	2475	2468	2603	2673	2459	2249	2379	2375	2515	2806	3193
<b>70-74</b>	1924	1956	2398	2646	2911	3027	3327	3245	3143	3237	3101	2797
<b>75-79</b>	1603	1437	1490	1497	1694	1916	2090	2319	2534	2705	2925	3166
<b>80-84</b>	1129	1107	1257	1098	1064	1024	1029	994	1009	1110	1261	1490
<b>85 и ст.</b>	473	502	545	555	624	669	686	720	606	619	685	690

**Продолжение таблицы 47**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО ободочной кишки (C18)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>17542</b>	<b>17798</b>	<b>18105</b>	<b>18807</b>	<b>18992</b>	<b>19333</b>	<b>19720</b>	<b>20092</b>	<b>20242</b>	<b>66,2</b>	<b>22,5</b>	<b>8,3</b>
<b>20-24</b>	26	21	15	22	17	24	27	17	15	-	-	-
<b>25-29</b>	45	44	38	50	51	44	50	53	40	<b>62,5</b>	-	-
<b>30-34</b>	83	60	75	92	72	70	85	106	84	-	-	-
<b>35-39</b>	148	130	156	170	164	154	169	167	170	<b>-26,4</b>	<b>17,4</b>	-
<b>40-44</b>	348	324	341	278	295	284	277	294	300	<b>-25,8</b>	<b>-22,5</b>	
<b>45-49</b>	765	731	716	701	697	620	611	581	542	-	<b>-22,7</b>	<b>-22,7</b>
<b>50-54</b>	1205	1258	1226	1288	1281	1344	1345	1332	1287	<b>126,5</b>	<b>13,7</b>	-
<b>55-59</b>	1668	1739	1774	1977	1934	1915	1933	2039	2065	<b>71,6</b>	<b>55,9</b>	-
<b>60-64</b>	1473	1373	1528	1821	2134	2478	2690	2790	2856	<b>41,4</b>	<b>94,2</b>	<b>57,4</b>
<b>65-69</b>	3338	3586	3189	2748	2354	2056	1903	2007	2427	-	<b>-39,3</b>	-
<b>70-74</b>	2811	2884	3202	3523	3979	4158	4267	4081	3514	<b>77,5</b>	<b>49,4</b>	-
<b>75-79</b>	3228	3128	3121	2989	2789	2750	2863	3145	3545	<b>129,7</b>	-	-
<b>80-84</b>	1732	1840	1958	2249	2224	2341	2308	2220	2102	<b>198,7</b>	<b>62,6</b>	-
<b>85 и ст.</b>	664	671	756	889	991	1086	1184	1250	1286	<b>178,9</b>	<b>135,1</b>	<b>47,0</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 48

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО ободочной кишки (С18), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,39	0,46	0,36	0,61	0,67	0,43	0,44	0,46	0,54	0,46	0,49	0,48
<b>30-39</b>	2,10	2,10	2,09	2,53	2,49	2,34	2,11	2,31	2,23	2,21	2,13	2,22
<b>40-49</b>	7,70	7,60	8,05	8,53	7,67	7,99	7,92	8,12	7,78	7,92	7,77	8,05
<b>50-59</b>	23,40	24,38	25,50	27,00	25,13	26,15	25,16	24,10	24,76	24,36	26,19	26,21
<b>60-69</b>	50,41	50,71	52,01	52,83	55,94	56,74	56,50	58,37	60,06	60,49	64,00	68,66
<b>70-79</b>	83,92	80,40	88,80	87,71	92,57	93,14	95,82	96,65	96,34	100,24	103,34	106,89
<b>80 и ст.</b>	68,60	68,86	75,60	72,28	74,46	79,33	82,61	81,72	83,54	88,90	102,80	108,75
<b>15-59</b>	6,62	6,68	6,82	7,27	6,71	6,77	6,52	6,49	6,57	6,64	7,03	7,37
<b>«Грубый» показатель</b>	14,33	14,29	15,14	15,62	16,24	16,94	17,39	17,93	18,40	18,92	19,64	20,36
<b>Стандарт. показатель</b>	10,00	9,90	10,39	10,66	10,84	11,12	11,20	11,44	11,63	11,74	12,21	12,50
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,55	0,49	0,47	0,52	0,48	0,59	0,59	0,60	0,56	<b>24,4</b>	<b>22,4</b>	-
<b>30-39</b>	2,08	2,02	2,18	2,38	2,33	2,27	2,33	2,36	2,30	-	<b>12,2</b>	-
<b>40-49</b>	8,51	8,36	8,35	8,39	8,55	8,33	8,17	8,36	8,34	<b>8,0</b>	-	-
<b>50-59</b>	26,95	27,07	26,76	27,82	27,52	27,94	27,23	27,43	27,69	<b>14,4</b>	<b>5,4</b>	-
<b>60-69</b>	69,44	73,92	72,54	71,65	71,16	71,92	69,24	68,92	70,84	<b>48,7</b>	-	-
<b>70-79</b>	111,21	109,70	114,25	115,14	117,85	118,42	120,27	122,72	124,22	<b>53,2</b>	<b>18,9</b>	<b>7,7</b>
<b>80 и ст.</b>	111,83	110,52	115,04	121,55	119,96	124,12	120,48	117,27	115,78	<b>96,9</b>	<b>13,3</b>	-
<b>15-59</b>	7,82	7,94	8,03	8,44	8,51	8,61	8,62	8,80	8,91	<b>41,7</b>	<b>24,3</b>	<b>5,5</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	20,89	21,15	21,68	22,35	22,78	23,24	23,60	23,91	24,24	<b>75,7</b>	<b>23,4</b>	<b>8,5</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	12,69	12,89	13,05	13,34	13,50	13,69	13,64	13,67	13,75	<b>42,1</b>	<b>12,8</b>	<b>2,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 48**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО ободочной кишки (С18), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,36	0,37	0,34	0,64	0,63	0,46	0,43	0,57	0,50	0,43	0,44	0,42
<b>30-39</b>	1,92	2,08	1,96	2,43	2,10	2,31	1,81	2,16	2,09	2,25	2,01	2,04
<b>40-49</b>	6,91	7,24	7,59	8,17	6,96	7,63	7,41	7,35	6,85	7,49	7,01	7,61
<b>50-59</b>	23,55	25,07	25,77	26,54	25,25	25,87	24,24	23,51	22,84	24,04	25,75	25,53
<b>60-69</b>	58,68	58,90	59,56	59,42	62,47	65,46	62,94	64,63	66,03	68,37	71,60	77,74
<b>70-79</b>	110,27	108,29	118,58	112,46	120,28	118,90	118,48	122,92	121,87	126,89	130,19	137,10
<b>80 и ст.</b>	92,88	96,67	102,21	102,93	99,34	114,62	120,69	109,29	128,07	133,60	158,69	162,09
<b>15-59</b>	6,10	6,33	6,35	6,70	6,07	6,28	5,86	5,89	5,70	6,18	6,38	6,72
<b>«Грубый» показатель</b>	12,41	12,64	13,16	13,53	14,02	15,03	15,04	15,67	16,03	16,89	17,36	18,12
<b>Стандарт. показатель</b>	11,53	11,59	12,02	12,04	12,25	12,83	12,65	12,95	13,05	13,52	13,93	14,35
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,47	0,42	0,49	0,45	0,40	0,62	0,54	0,59	0,64	<b>27,7</b>	<b>51,5</b>	<b>49,4</b>
<b>30-39</b>	1,81	2,16	2,08	2,22	2,42	2,43	2,32	2,24	2,32	-	<b>22,2</b>	-
<b>40-49</b>	7,75	7,80	7,48	8,02	7,91	8,19	7,60	7,95	8,16	<b>11,0</b>	<b>9,7</b>	-
<b>50-59</b>	25,73	26,23	26,45	26,78	27,27	27,91	27,09	26,72	27,46	<b>12,4</b>	<b>7,7</b>	-
<b>60-69</b>	78,61	83,87	83,09	81,14	80,42	81,46	77,74	77,28	79,95	<b>47,0</b>	-	-
<b>70-79</b>	143,02	137,69	143,37	144,20	148,58	148,30	151,43	153,57	154,91	<b>45,3</b>	<b>16,5</b>	<b>7,1</b>
<b>80 и ст.</b>	160,51	157,43	169,95	165,85	167,48	169,34	168,50	161,27	163,63	<b>95,3</b>	-	-
<b>15-59</b>	6,93	7,23	7,31	7,62	7,84	8,12	7,99	8,04	8,36	<b>42,2</b>	<b>29,0</b>	<b>7,8</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	18,40	18,68	19,32	19,68	20,33	20,79	21,20	21,35	21,90	<b>82,5</b>	<b>25,9</b>	<b>10,6</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	14,45	14,74	14,96	15,13	15,47	15,80	15,77	15,66	15,86	<b>42,6</b>	<b>13,9</b>	<b>3,9</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 48**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО ободочной кишки (С18), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,42	0,56	0,39	0,59	0,72	0,41	0,44	0,35	0,58	0,50	0,55	0,55
<b>30-39</b>	2,29	2,13	2,22	2,63	2,88	2,37	2,41	2,46	2,37	2,16	2,25	2,41
<b>40-49</b>	8,45	7,95	8,48	8,88	8,34	8,32	8,39	8,85	8,65	8,32	8,46	8,46
<b>50-59</b>	23,28	23,80	25,27	27,36	25,02	26,39	25,92	24,59	26,37	24,62	26,56	26,77
<b>60-69</b>	45,17	45,43	47,06	48,46	51,57	50,87	52,18	54,17	56,09	55,31	59,05	62,86
<b>70-79</b>	74,51	70,39	77,94	78,40	81,65	82,53	86,15	85,20	85,06	88,33	91,05	92,95
<b>80 и ст.</b>	62,55	61,87	68,91	64,59	68,19	70,38	72,87	74,56	71,83	77,06	89,45	95,90
<b>15-59</b>	7,14	7,02	7,29	7,82	7,33	7,25	7,15	7,08	7,41	7,08	7,64	7,98
<b>«Грубый» показатель</b>	16,03	15,75	16,89	17,47	18,20	18,62	19,46	19,92	20,49	20,70	21,62	22,31
<b>Стандарт. показатель</b>	9,41	9,16	9,73	10,12	10,28	10,36	10,65	10,81	11,13	10,94	11,51	11,72
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,62	0,55	0,44	0,60	0,56	0,56	0,65	0,60	0,49	-	-	-
<b>30-39</b>	2,34	1,90	2,28	2,54	2,25	2,12	2,34	2,49	2,28	-	-	-
<b>40-49</b>	9,20	8,87	9,13	8,73	9,13	8,46	8,69	8,74	8,51	-	-	-
<b>50-59</b>	27,93	27,75	27,01	28,65	27,73	27,97	27,34	28,01	27,87	<b>16,1</b>	-	-
<b>60-69</b>	63,66	67,70	65,92	65,64	65,20	65,73	63,54	63,26	64,69	<b>50,1</b>	-	-
<b>70-79</b>	96,37	96,49	100,41	101,28	103,20	104,19	105,36	108,10	109,83	<b>51,8</b>	<b>20,0</b>	<b>8,4</b>
<b>80 и ст.</b>	99,83	98,42	100,07	108,88	105,93	110,60	105,92	103,71	100,90	<b>91,4</b>	<b>13,1</b>	<b>-6,6</b>
<b>15-59</b>	8,66	8,61	8,70	9,21	9,14	9,06	9,22	9,51	9,43	<b>40,7</b>	<b>20,7</b>	
<b>«Грубый» показатель</b>	23,04	23,27	23,72	24,66	24,90	25,35	25,66	26,11	26,27	<b>70,6</b>	<b>21,7</b>	<b>7,0</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	11,97	12,04	12,20	12,53	12,57	12,66	12,64	12,74	12,72	<b>39,7</b>	<b>10,8</b>	<b>1,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 49

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО ободочной кишки (C18),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	66,4	66,5	67,1	67,0	67,5	67,6	68,0	68,1	68,1	68,7	68,7	68,8
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	65,6	65,5	65,9	65,5	66,0	66,2	66,5	66,5	66,6	66,9	67,1	67,3
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,24	1,24	1,29	1,32	1,34	1,37	1,38	1,41	1,44	1,46	1,50	1,53
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	68,9	68,8	69,3	69,6	70,0	70,1	70,2	70,1	69,4	5,5	2,1	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	67,4	67,4	67,7	67,7	67,8	67,8	68,0	68,0	68,0	4,3	1,4	0,5
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,56	1,61	1,62	1,65	1,68	1,70	1,69	1,70	1,71	42,5	14,2	3,0
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	65,1	65,2	65,8	65,6	66,3	66,3	66,7	66,8	67,2	67,5	67,7	68,0
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	64,1	63,9	64,4	63,9	64,7	64,9	65,4	65,3	65,8	65,8	66,1	66,3
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,42	1,46	1,50	1,49	1,52	1,57	1,53	1,58	1,58	1,65	1,66	1,74

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 49**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО ободочной кишки (C18),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
	1993-2013	2003-2013	2008-2013									
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	68,2	68,0	68,4	68,4	68,5	68,2	68,7	68,4	67,8	<b>5,3</b>	-	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	66,6	66,3	66,7	66,7	66,7	66,5	67,0	67,0	66,9	<b>5,1</b>	<b>1,1</b>	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,75	1,82	1,83	1,87	1,90	1,96	1,94	1,94	1,96	<b>42,4</b>	<b>17,3</b>	<b>4,2</b>
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	67,5	67,6	68,1	68,0	68,5	68,8	69,1	69,1	68,9	69,6	69,4	69,4
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	66,6	66,6	66,9	66,5	66,9	67,2	67,3	67,4	67,2	67,7	67,7	68,0
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,16	1,13	1,20	1,24	1,26	1,26	1,30	1,32	1,36	1,35	1,41	1,42
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	69,5	69,5	70,0	70,4	70,6	70,8	70,9	70,8	70,5	<b>4,9</b>	<b>2,4</b>	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	68,0	68,2	68,3	68,5	68,5	68,7	68,7	68,7	68,8	<b>3,8</b>	<b>1,6</b>	<b>0,5</b>
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,46	1,49	1,51	1,54	1,55	1,56	1,56	1,57	1,58	<b>40,9</b>	<b>12,4</b>	<b>2,4</b>

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 50**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО ободочной кишки (C18) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>16599</b>	<b>16918</b>	<b>16934</b>	<b>17094</b>	<b>17662</b>	<b>18225</b>	<b>18144</b>	<b>18450</b>	<b>18756</b>	<b>19054</b>	<b>19512</b>	<b>19771</b>
<b>20-24</b>	11	19	15	16	13	12	11	18	19	11	19	19
<b>25-29</b>	29	45	33	34	33	40	28	26	47	32	27	31
<b>30-34</b>	97	106	81	81	88	58	70	67	65	74	84	67
<b>35-39</b>	200	198	218	195	193	190	171	148	152	162	127	132
<b>40-44</b>	361	412	347	380	323	391	350	364	378	316	355	307
<b>45-49</b>	428	475	618	612	607	655	592	662	646	643	637	618
<b>50-54</b>	994	826	706	594	583	648	860	938	1039	1012	1092	1055
<b>55-59</b>	1618	1957	1905	1893	1762	1554	1273	1162	928	905	1155	1384
<b>60-64</b>	2469	2394	2117	2000	2309	2407	2718	2706	2800	2586	2410	1935
<b>65-69</b>	3264	3480	3611	3661	3536	3405	2923	2920	2859	3051	3233	3712
<b>70-74</b>	2354	2559	2856	3222	3701	3931	4225	4178	4123	4115	3881	3602
<b>75-79</b>	2199	1981	1969	1912	2119	2404	2469	2840	3276	3634	3849	4040
<b>80-84</b>	1753	1723	1702	1691	1513	1513	1473	1338	1410	1519	1708	1863
<b>85 и ст.</b>	800	726	740	785	870	1010	969	1076	1002	981	928	993

**Продолжение таблицы 50**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО ободочной кишки (С18) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>19896</b>	<b>20509</b>	<b>20669</b>	<b>21219</b>	<b>21523</b>	<b>21562</b>	<b>21499</b>	<b>21867</b>	<b>21957</b>	<b>35,4</b>	<b>13,3</b>	<b>3,1</b>
<b>20-24</b>	18	22	12	10	18	13	11	12	17	-	-	-
<b>25-29</b>	29	47	29	34	47	29	32	30	31	-	-	-
<b>30-34</b>	73	73	72	83	80	95	78	71	63	-	-	-
<b>35-39</b>	112	109	118	129	119	125	130	122	145	<b>-46,6</b>	-	-
<b>40-44</b>	318	304	255	257	233	200	220	254	242	<b>-43,5</b>	<b>-35,5</b>	-
<b>45-49</b>	633	621	668	624	576	526	522	500	433	-	<b>-28,0</b>	<b>-26,8</b>
<b>50-54</b>	1040	1060	1109	1104	1104	1141	1153	1072	1079	<b>61,8</b>	-	<b>-2,7</b>
<b>55-59</b>	1586	1759	1750	1768	1722	1752	1838	1814	1841	-	<b>38,7</b>	<b>6,0</b>
<b>60-64</b>	1577	1383	1457	1786	2083	2416	2551	2614	2695	-	<b>55,6</b>	<b>49,2</b>
<b>65-69</b>	3764	3885	3617	3172	2612	2113	1921	1934	2389	<b>-31,8</b>	<b>-48,5</b>	-
<b>70-74</b>	3359	3417	3508	4027	4524	4721	4712	4481	3800	<b>47,6</b>	<b>28,3</b>	-
<b>75-79</b>	4202	4264	4336	3982	3718	3504	3474	3819	3973	<b>114,2</b>	-	-
<b>80-84</b>	2171	2483	2706	3035	3306	3335	3184	3179	3092	<b>184,2</b>	<b>85,8</b>	-
<b>85 и ст.</b>	1005	1071	1026	1196	1374	1587	1669	1962	2155	<b>191,7</b>	<b>176,0</b>	<b>87,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 50**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО ободочной кишки (C18) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>6827</b>	<b>6955</b>	<b>6900</b>	<b>6939</b>	<b>7231</b>	<b>7506</b>	<b>7464</b>	<b>7540</b>	<b>7668</b>	<b>7919</b>	<b>8046</b>	<b>8313</b>
<b>20-24</b>	6	10	8	10	8	5	5	9	11	6	8	11
<b>25-29</b>	19	21	14	19	15	21	18	13	30	17	15	12
<b>30-34</b>	41	51	39	44	46	33	34	41	29	39	41	30
<b>35-39</b>	113	100	104	105	83	87	75	64	68	86	66	59
<b>40-44</b>	172	211	175	183	153	195	149	173	191	156	164	153
<b>45-49</b>	210	242	292	296	277	308	273	325	292	299	279	310
<b>50-54</b>	476	401	354	258	284	286	403	447	476	482	523	489
<b>55-59</b>	785	947	901	882	836	752	573	542	427	418	535	650
<b>60-64</b>	1227	1221	1011	934	1097	1161	1299	1272	1295	1216	1096	885
<b>65-69</b>	1492	1554	1687	1737	1667	1570	1409	1344	1303	1451	1499	1771
<b>70-74</b>	841	900	1025	1124	1416	1627	1719	1739	1760	1731	1645	1617
<b>75-79</b>	754	657	640	628	690	778	800	908	1087	1275	1428	1534
<b>80-84</b>	491	466	450	519	432	425	443	398	420	468	535	516
<b>85 и ст.</b>	185	163	190	190	219	253	257	262	271	266	208	267

**Продолжение таблицы 50**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО ободочной кишки (C18) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>8213</b>	<b>8571</b>	<b>8541</b>	<b>8591</b>	<b>8946</b>	<b>8922</b>	<b>8936</b>	<b>9065</b>	<b>9096</b>	<b>37,4</b>	<b>13,0</b>	<b>4,8</b>
<b>20-24</b>	10	16	5	6	9	8	9	6	9	-	-	-
<b>25-29</b>	14	23	13	17	23	13	19	16	13	-	-	-
<b>30-34</b>	31	39	39	44	45	47	43	38	37	-	-	<b>-18,1</b>
<b>35-39</b>	52	51	61	64	57	60	63	65	76	<b>-46,4</b>	-	-
<b>40-44</b>	152	163	105	117	111	100	108	120	124	<b>-44,2</b>	<b>-33,6</b>	-
<b>45-49</b>	269	276	297	280	257	242	232	245	216	-	<b>-23,8</b>	<b>-18,9</b>
<b>50-54</b>	477	481	487	487	527	543	533	504	510	<b>57,2</b>	-	-
<b>55-59</b>	733	839	826	809	788	816	891	876	840	-	<b>40,0</b>	-
<b>60-64</b>	756	635	705	816	994	1135	1242	1224	1257	-	<b>61,0</b>	<b>50,2</b>
<b>65-69</b>	1735	1799	1633	1426	1223	985	905	927	1181	<b>-30,6</b>	<b>-46,8</b>	-
<b>70-74</b>	1468	1533	1533	1759	1954	2051	2042	1941	1588	<b>77,3</b>	-	-
<b>75-79</b>	1634	1686	1749	1508	1464	1347	1358	1485	1593	<b>179,8</b>	-	-
<b>80-84</b>	608	738	808	956	1149	1157	1097	1097	1067	<b>313,8</b>	<b>137,9</b>	-
<b>85 и ст.</b>	269	288	278	294	342	415	392	519	584	<b>222,0</b>	<b>189,2</b>	<b>109,1</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 50**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО ободочной кишки (C18) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>9772</b>	<b>9963</b>	<b>10034</b>	<b>10155</b>	<b>10431</b>	<b>10719</b>	<b>10680</b>	<b>10910</b>	<b>11088</b>	<b>11135</b>	<b>11466</b>	<b>11458</b>
<b>20-24</b>	5	9	7	6	5	7	6	9	8	5	11	8
<b>25-29</b>	10	24	19	15	18	19	10	13	17	15	12	19
<b>30-34</b>	56	55	42	37	42	25	36	26	36	35	43	37
<b>35-39</b>	87	98	114	90	110	103	96	84	84	76	61	73
<b>40-44</b>	189	201	172	197	170	196	201	191	187	160	191	154
<b>45-49</b>	218	233	326	316	330	347	319	337	354	344	358	308
<b>50-54</b>	518	425	352	336	299	362	457	491	563	530	569	566
<b>55-59</b>	833	1010	1004	1011	926	802	700	620	501	487	620	734
<b>60-64</b>	1242	1173	1106	1066	1212	1246	1419	1434	1505	1370	1314	1050
<b>65-69</b>	1772	1926	1924	1924	1869	1835	1514	1576	1556	1600	1734	1941
<b>70-74</b>	1513	1659	1831	2098	2285	2304	2506	2439	2363	2384	2236	1985
<b>75-79</b>	1445	1324	1329	1284	1429	1626	1669	1932	2189	2359	2421	2506
<b>80-84</b>	1262	1257	1252	1172	1081	1088	1030	940	990	1051	1173	1347
<b>85 и ст.</b>	615	563	550	595	651	757	712	814	731	715	720	726

**Продолжение таблицы 50**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО ободочной кишки (C18) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>11683</b>	<b>11938</b>	<b>12128</b>	<b>12628</b>	<b>12577</b>	<b>12640</b>	<b>12563</b>	<b>12802</b>	<b>12861</b>	<b>34,0</b>	<b>13,4</b>	<b>-</b>
<b>20-24</b>	8	6	7	4	9	5	2	6	8	-	-	-
<b>25-29</b>	15	24	16	17	24	16	13	14	18	-	-	-
<b>30-34</b>	42	34	33	39	35	48	35	33	26	-	-	-
<b>35-39</b>	60	58	57	65	62	65	67	57	69	<b>-46,8</b>	-	-
<b>40-44</b>	166	141	150	140	122	100	112	134	118	<b>-42,9</b>	<b>-37,3</b>	-
<b>45-49</b>	364	345	371	344	319	284	290	255	217	-	<b>-31,4</b>	<b>-33,0</b>
<b>50-54</b>	563	579	622	617	577	598	620	568	569	<b>65,9</b>	-	-
<b>55-59</b>	853	920	924	959	934	936	947	938	1001	-	<b>37,6</b>	-
<b>60-64</b>	821	748	752	970	1089	1281	1309	1390	1438	-	-	<b>48,4</b>
<b>65-69</b>	2029	2086	1984	1746	1389	1128	1016	1007	1208	<b>-32,9</b>	<b>-50,0</b>	-
<b>70-74</b>	1891	1884	1975	2268	2570	2670	2670	2540	2212	<b>30,1</b>	<b>31,1</b>	-
<b>75-79</b>	2568	2578	2587	2474	2254	2157	2116	2334	2380	<b>85,7</b>	<b>-12,1</b>	-
<b>80-84</b>	1563	1745	1898	2079	2157	2178	2087	2082	2025	<b>145,2</b>	<b>66,5</b>	-
<b>85 и ст.</b>	736	783	748	902	1032	1172	1277	1443	1571	<b>182,3</b>	<b>171,6</b>	<b>80,5</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 51

**Динамика показателей смертности от ЗНО ободочной кишки (С18), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,20	0,33	0,24	0,25	0,23	0,25	0,19	0,21	0,31	0,20	0,21	0,22
<b>30-39</b>	1,18	1,22	1,22	1,15	1,21	1,10	1,11	1,02	1,07	1,19	1,07	1,02
<b>40-49</b>	4,35	4,51	4,56	4,48	4,09	4,48	3,97	4,28	4,25	3,98	4,14	3,91
<b>50-59</b>	15,33	17,10	16,84	16,61	16,03	15,44	15,10	14,74	13,59	12,68	13,87	13,98
<b>60-69</b>	37,85	39,57	39,31	39,18	40,34	39,69	38,24	38,19	38,78	39,63	41,20	43,49
<b>70-79</b>	70,86	69,31	70,88	70,59	74,04	74,93	74,63	74,84	76,90	79,62	80,14	81,50
<b>80 и ст.</b>	79,79	75,25	74,62	77,34	76,88	83,68	82,64	83,37	84,95	88,09	97,79	101,24
<b>15-59</b>	4,14	4,43	4,29	4,15	3,93	3,86	3,66	3,68	3,57	3,42	3,69	3,79
<b>«Грубый» показатель</b>	11,20	11,43	11,46	11,60	12,02	12,44	12,43	12,71	13,05	13,33	13,60	13,86
<b>Стандарт. показатель</b>	7,57	7,69	7,64	7,57	7,71	7,83	7,74	7,85	7,87	7,87	8,10	8,18
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,20	0,29	0,17	0,18	0,27	0,17	0,18	0,18	0,21	-	-	-
<b>30-39</b>	0,95	0,92	0,95	1,04	0,96	1,05	0,97	0,89	0,94	<b>-24,1</b>	-	-
<b>40-49</b>	4,11	4,07	4,18	4,11	3,90	3,55	3,79	3,92	3,55	<b>-16,8</b>	<b>-11,3</b>	-
<b>50-59</b>	14,10	14,45	14,26	13,98	13,52	13,77	13,80	13,24	13,38	<b>-19,6</b>	<b>-5,4</b>	-
<b>60-69</b>	43,38	44,25	43,56	43,58	41,49	39,81	37,00	35,78	37,16	-	<b>-16,4</b>	<b>-17,1</b>
<b>70-79</b>	82,28	83,76	84,44	84,33	85,11	84,05	81,84	84,23	82,34	<b>23,1</b>	-	-
<b>80 и ст.</b>	106,15	110,74	108,12	114,18	119,07	122,28	112,94	117,47	119,19	<b>76,7</b>	<b>20,5</b>	-
<b>15-59</b>	3,96	4,12	4,15	4,17	4,08	4,08	4,21	4,13	4,15	-	<b>10,1</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	14,02	14,39	14,54	14,95	15,17	15,19	15,04	15,27	15,30	<b>41,5</b>	<b>12,9</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	8,14	8,25	8,18	8,39	8,40	8,34	8,12	8,07	8,06	<b>9,7</b>	-	<b>-4,8</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 51**

**Динамика показателей смертности от ЗНО ободочной кишки (С18), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,25	0,31	0,22	0,28	0,22	0,25	0,22	0,21	0,38	0,21	0,21	0,20
<b>30-39</b>	1,22	1,21	1,17	1,24	1,11	1,07	1,00	0,99	0,95	1,25	1,10	0,92
<b>40-49</b>	4,31	4,72	4,54	4,46	3,90	4,45	3,68	4,30	4,15	3,92	3,86	4,10
<b>50-59</b>	16,30	18,34	18,02	17,01	17,09	16,18	15,28	15,29	13,70	13,07	14,43	14,50
<b>60-69</b>	46,29	47,68	46,77	46,34	47,60	46,40	45,67	44,26	44,56	47,29	48,06	52,47
<b>70-79</b>	94,30	90,02	91,53	88,12	94,80	97,53	93,91	92,99	96,59	100,01	101,49	106,40
<b>80 и ст.</b>	105,88	96,21	97,34	110,40	104,30	111,17	116,36	110,63	116,90	123,50	142,92	142,92
<b>15-59</b>	4,10	4,43	4,19	3,99	3,78	3,74	3,40	3,57	3,38	3,32	3,54	3,70
<b>«Грубый» показатель</b>	9,82	10,01	9,94	10,03	10,49	10,92	10,91	11,09	11,40	11,86	12,06	12,54
<b>Стандарт. показатель</b>	9,26	9,24	9,12	8,93	9,20	9,37	9,23	9,25	9,29	9,47	9,67	10,02
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,21	0,33	0,15	0,19	0,26	0,17	0,23	0,18	0,19	-	-	-
<b>30-39</b>	0,86	0,92	1,01	1,07	1,00	1,04	1,01	0,97	1,04	<b>-17,8</b>	-	-
<b>40-49</b>	3,82	4,06	3,82	3,89	3,72	3,51	3,63	3,96	3,72	<b>-18,2</b>	-	-
<b>50-59</b>	14,50	15,15	14,69	14,16	14,13	14,52	14,70	14,14	13,79	<b>-20,5</b>	-	-
<b>60-69</b>	52,38	53,15	52,05	50,77	50,02	47,34	44,21	41,96	44,22	-	<b>-16,8</b>	<b>-16,6</b>
<b>70-79</b>	106,11	109,49	109,66	106,51	109,35	107,68	105,08	108,10	105,57	<b>22,8</b>	-	
<b>80 и ст.</b>	148,18	155,91	146,83	151,77	166,47	169,66	148,90	156,81	158,08	<b>77,6</b>	<b>11,4</b>	-
<b>15-59</b>	3,73	4,02	3,91	3,92	3,93	3,97	4,15	4,12	4,05	-	<b>13,5</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	12,48	12,99	12,98	13,08	13,63	13,59	13,52	13,68	13,69	<b>46,5</b>	<b>13,1</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	9,88	10,10	9,90	9,94	10,27	10,20	9,85	9,82	9,78	<b>11,9</b>	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 51**

**Динамика показателей смертности от ЗНО ободочной кишки (С18), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,16	0,34	0,27	0,22	0,23	0,26	0,16	0,21	0,24	0,19	0,21	0,24
<b>30-39</b>	1,13	1,23	1,27	1,06	1,31	1,14	1,21	1,05	1,19	1,13	1,05	1,12
<b>40-49</b>	4,39	4,31	4,59	4,50	4,27	4,51	4,25	4,27	4,35	4,04	4,40	3,74
<b>50-59</b>	14,53	16,09	15,87	16,29	15,17	14,84	14,96	14,28	13,50	12,36	13,40	13,55
<b>60-69</b>	32,51	34,34	34,42	34,43	35,49	35,17	33,25	34,12	34,93	34,60	36,73	37,75
<b>70-79</b>	62,49	61,88	63,34	64,00	65,86	65,62	66,40	66,93	68,21	70,51	70,37	70,00
<b>80 и ст.</b>	73,28	69,98	68,91	69,04	69,97	76,70	74,02	76,30	76,55	78,71	87,01	91,19
<b>15-59</b>	4,17	4,44	4,38	4,31	4,07	3,98	3,91	3,79	3,74	3,51	3,84	3,87
<b>«Грубый» показатель</b>	12,43	12,69	12,80	12,98	13,37	13,77	13,77	14,13	14,49	14,62	14,94	14,99
<b>Стандарт. показатель</b>	6,79	6,93	6,94	6,95	7,02	7,10	7,05	7,16	7,21	7,08	7,38	7,30
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,20	0,26	0,19	0,17	0,27	0,17	0,13	0,17	0,23	-	-	-
<b>30-39</b>	1,03	0,92	0,89	1,01	0,92	1,07	0,94	0,82	0,85	<b>-29,1</b>	<b>-18,1</b>	-
<b>40-49</b>	4,38	4,09	4,50	4,31	4,06	3,59	3,94	3,88	3,39	<b>-15,7</b>	<b>-15,0</b>	<b>-16,0</b>
<b>50-59</b>	13,77	13,88	13,92	13,83	13,03	13,16	13,07	12,51	13,05	<b>-18,8</b>	<b>-6,8</b>	-
<b>60-69</b>	37,71	38,69	38,24	39,02	36,00	34,92	32,16	31,61	32,40	-	<b>-16,7</b>	<b>-18,2</b>
<b>70-79</b>	71,16	71,61	72,45	73,75	73,56	72,80	70,73	72,91	71,44	<b>18,2</b>	-	-
<b>80 и ст.</b>	95,79	99,09	97,56	103,44	105,08	108,11	102,04	105,35	107,09	<b>71,7</b>	<b>20,3</b>	-
<b>15-59</b>	4,18	4,22	4,37	4,40	4,22	4,17	4,28	4,15	4,24	-	-	-
<b>«Грубый» показатель</b>	15,35	15,61	15,89	16,56	16,49	16,57	16,35	16,64	16,69	<b>37,7</b>	<b>12,7</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	7,33	7,37	7,37	7,65	7,49	7,45	7,23	7,19	7,18	<b>7,5</b>	-	<b>-6,5</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 52

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО ободочной кишки (C18),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	68,2	67,9	68,3	68,7	69,1	69,6	70,1	70,3	70,5	70,9	70,8	70,9
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	67,7	67,3	67,6	67,8	68,1	68,4	68,5	68,6	68,7	69,2	69,1	69,4
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,92	0,94	0,93	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,97	0,97	0,98
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	71,2	71,4	71,8	72,0	72,4	72,5	72,4	72,8	72,7	<b>7,3</b>	<b>3,1</b>	<b>0,9</b>
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	69,7	69,9	70,1	70,2	70,6	70,7	70,6	71,0	71,0	<b>5,7</b>	<b>2,7</b>	<b>1,0</b>
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,96	0,97	0,96	0,99	0,99	0,98	0,96	0,94	0,95	-	-	-5,3
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	66,2	65,8	66,6	67,1	67,4	67,9	68,2	68,3	68,9	69,2	69,3	69,4
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	65,5	65,1	65,6	66,0	66,4	66,7	67,0	66,9	67,2	67,6	67,7	68,0
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	1,11	1,13	1,12	1,08	1,13	1,14	1,11	1,11	1,10	1,12	1,12	1,18

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 52**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО ободочной кишки (C18),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	69,6	69,9	70,3	70,6	71,1	71,2	71,0	71,3	70,9	8,3	3,1	-
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	68,3	68,5	68,8	68,8	69,2	69,3	69,0	69,4	69,4	6,8	2,7	-
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	1,15	1,17	1,14	1,17	1,20	1,18	1,16	1,14	1,14	-	-	-4,2
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	69,9	69,5	69,9	70,2	70,5	70,9	71,2	71,4	71,5	72,0	71,8	72,1
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	69,2	68,8	68,9	69,1	69,3	69,6	69,5	69,8	69,8	70,2	70,1	70,5
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,81	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86	0,85	0,87	0,86
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	72,4	72,7	72,9	73,1	73,4	73,5	73,5	73,9	74,0	6,5	2,9	1,2
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	70,6	70,9	70,9	71,2	71,5	71,7	71,8	72,1	72,1	5,1	2,9	1,3
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,86	0,86	0,85	0,89	0,87	0,86	0,84	0,83	0,84	-	-	-6,3

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 53

## Динамика показателей диагностики ЗНО ободочной кишки (C18), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	20088	20219	21319	21796	22536	23333	23777	24371	24849	25169	26235
из них доля выявленных активно, %	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,8	2,2	2,2
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	64,6	66,0	66,9	69,9	69,2	71,3	72,3	73,8	75,0	75,9	77,1
*I-II ст., %	16,6	17,4	17,1	17,5	19,0	19,9	20,5	22,8	25,6	27,0	28,1
*III ст., %	44,7	44,0	42,4	42,8	41,4	41,8	40,7	40,1	37,3	37,2	36,7
*IV ст., %	31,1	31,7	32,7	32,0	32,5	31,8	32,4	31,3	31,1	30,5	30,0
Показатель одногодичной летальности, %	45,3	43,7	46,2	42,1	42,1	41,9	42,2	42,3	39,4	38,6	38,2
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	26961	27484	27737	28320	28962	29495	29922	30486	30552	30577	
из них доля выявленных активно, %	3,1	3,2	2,5	3,0	2,7	3,1	3,5	4,7	4,5	5,6	
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	78,9	79,1	80,4	81,7	83,3	84,7	85,9	85,2	88,1	89,5	
*I-II ст., %	29,8	31,7	33,0	35,5	36,3	38,6	39,6	40,0	42,0	41,9	
*III ст., %	35,8	33,9	33,4	32,1	31,9	30,3	29,9	28,4	27,5	27,6	
*IV ст., %	29,5	29,7	29,7	28,9	28,5	27,9	27,9	28,0	27,5	27,6	
Показатель одногодичной летальности, %	37,5	35,8	34,7	34,4	34,1	32,5	32,0	30,5	29,6	28,4	

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 54

**Динамика сведений о контингенте больных с ЗНО ободочной кишки (C18), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных, состоящих на учете на конец года	65836	69543	73194	77492	81725	85254	89126	94457	99431	103927	109380
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	43,2	44,1	44,3	45,4	45,3	45,1	45,3	45,4	45,6	45,8	46,6
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	58,2	58,9	57,8	59,1	59,1	58,4	58,0	58,6	58,5	58,2	59,8
Показатель распространенности на 100 000 населения	44,4	47,0	49,5	52,6	55,6	58,2	61,1	65,1	69,2	72,7	76,3
Индекс накопления контингента	3,3	3,4	3,4	3,6	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных, состоящих на учете на конец года	114468	120665	126501	132332	138339	145097	152547	159916	167170	174240	
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	46,8	47,6	47,5	47,5	47,7	48,7	48,8	49,6	49,4	50,2	
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	60,0	60,9	60,4	60,4	60,4	61,8	61,7	62,6	62,5	63,2	
Показатель распространенности на 100 000 населения	80,2	85,0	88,8	93,1	97,5	102,3	107,5	111,9	116,7	121,4	
Индекс накопления контингента	4,3	4,4	4,6	4,7	4,8	4,9	5,1	5,3	5,5	5,7	

**Таблица 55**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО прямой кишки (C19-21)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

<b>Возраст</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>18033</b>	<b>18142</b>	<b>18525</b>	<b>18880</b>	<b>19436</b>	<b>20225</b>	<b>20780</b>	<b>21500</b>	<b>21504</b>	<b>22477</b>	<b>22529</b>	<b>22782</b>
<b>20-24</b>	24	27	15	28	30	19	26	25	28	19	17	19
<b>25-29</b>	42	45	34	43	71	47	53	55	30	47	47	48
<b>30-34</b>	151	146	124	159	159	120	116	78	93	116	119	93
<b>35-39</b>	291	313	305	331	367	279	313	254	234	247	234	196
<b>40-44</b>	561	563	562	604	585	560	600	598	569	623	536	546
<b>45-49</b>	639	735	825	936	923	974	1059	1042	1116	1115	1149	1132
<b>50-54</b>	1329	1104	1018	931	920	1166	1376	1607	1731	1847	1850	1928
<b>55-59</b>	2256	2416	2516	2501	2376	2087	1751	1570	1452	1600	1772	2174
<b>60-64</b>	3149	2946	2729	2848	3007	3428	3663	3969	3833	3720	3115	2565
<b>65-69</b>	3695	4040	4109	4011	3988	3996	3708	3698	3597	3977	4262	4649
<b>70-74</b>	2404	2548	2902	3201	3583	4014	4312	4469	4450	4395	4120	3954
<b>75-79</b>	1871	1704	1667	1692	1863	1960	2153	2512	2816	3065	3521	3556
<b>80-84</b>	1140	1136	1224	1099	1020	1016	1041	979	1040	1138	1223	1384
<b>85 и ст.</b>	468	404	483	484	528	548	598	632	507	562	553	531

**Продолжение таблицы 55**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО прямой кишки (C19-21)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>23580</b>	<b>23622</b>	<b>23924</b>	<b>23987</b>	<b>25029</b>	<b>25568</b>	<b>25731</b>	<b>26316</b>	<b>26350</b>	<b>49,4</b>	<b>18,3</b>	<b>9,4</b>
<b>20-24</b>	26	25	25	17	18	19	22	22	17	-	-	-
<b>25-29</b>	53	39	40	57	50	63	49	72	66	<b>38,3</b>	<b>52,2</b>	-
<b>30-34</b>	100	127	116	118	122	123	123	133	162	-	<b>40,4</b>	<b>33,3</b>
<b>35-39</b>	191	188	213	206	248	239	240	264	274	<b>-30,3</b>	<b>36,4</b>	<b>26,2</b>
<b>40-44</b>	508	499	463	446	430	400	475	454	465	<b>-27,9</b>	<b>-18,2</b>	-
<b>45-49</b>	1112	1123	1125	1080	1072	1010	976	962	878	<b>23,7</b>	<b>-20,8</b>	<b>-17,6</b>
<b>50-54</b>	1932	2027	2073	2153	2178	2206	2177	2292	2202	<b>146,1</b>	<b>21,4</b>	-
<b>55-59</b>	2607	2947	2933	3157	3061	3278	3434	3397	3508	<b>81,7</b>	<b>73,2</b>	<b>13,7</b>
<b>60-64</b>	2218	2148	2366	2592	3309	3896	4148	4321	4530	-	<b>111,5</b>	<b>69,0</b>
<b>65-69</b>	4905	4737	4499	3786	3267	2870	2683	2859	3260	-	<b>-43,4</b>	-
<b>70-74</b>	3911	3909	4151	4571	5182	5357	5179	4935	4105	<b>70,0</b>	<b>26,9</b>	-
<b>75-79</b>	3772	3673	3529	3251	3238	3093	3209	3516	3800	<b>129,0</b>	-	-
<b>80-84</b>	1623	1622	1782	1925	2110	2225	2148	2186	2065	<b>170,7</b>	<b>72,6</b>	-
<b>85 и ст.</b>	616	549	604	620	737	783	864	899	1016	<b>110,5</b>	<b>103,7</b>	<b>60,5</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 55**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО прямой кишки (C19-21)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>8292</b>	<b>8460</b>	<b>8661</b>	<b>8791</b>	<b>9157</b>	<b>9725</b>	<b>9775</b>	<b>10239</b>	<b>10275</b>	<b>10922</b>	<b>10873</b>	<b>11076</b>
<b>20-24</b>	13	16	8	19	17	10	12	19	18	10	9	8
<b>25-29</b>	19	22	24	18	45	22	25	24	16	25	23	24
<b>30-34</b>	61	60	54	78	70	59	56	42	52	71	64	37
<b>35-39</b>	130	144	135	135	152	131	129	108	93	119	105	83
<b>40-44</b>	229	252	230	243	237	256	249	253	242	257	232	241
<b>45-49</b>	286	339	391	419	438	455	485	490	521	534	541	536
<b>50-54</b>	645	561	541	466	466	572	678	802	864	939	943	954
<b>55-59</b>	1214	1265	1308	1273	1197	1060	921	794	744	829	919	1170
<b>60-64</b>	1659	1573	1425	1453	1547	1810	1900	2046	2004	1916	1590	1315
<b>65-69</b>	1781	2013	2084	2090	2073	2107	1877	1942	1893	2101	2211	2474
<b>70-74</b>	961	1018	1224	1331	1678	1909	2033	2178	2190	2172	2049	1987
<b>75-79</b>	742	648	678	681	698	780	801	987	1126	1313	1573	1603
<b>80-84</b>	398	415	402	418	339	376	389	341	363	438	431	472
<b>85 и ст.</b>	148	123	151	157	191	173	212	202	146	194	176	167

**Продолжение таблицы 55**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО прямой кишки (C19-21)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>11482</b>	<b>11613</b>	<b>11719</b>	<b>11746</b>	<b>12144</b>	<b>12503</b>	<b>12516</b>	<b>12958</b>	<b>12812</b>	<b>58,4</b>	<b>18,9</b>	<b>9,4</b>
<b>20-24</b>	18	11	15	8	9	10	12	9	11	-	-	-
<b>25-29</b>	22	14	22	23	22	27	19	34	33	-	-	-
<b>30-34</b>	47	65	54	52	48	61	64	64	74	-	-	<b>49,3</b>
<b>35-39</b>	66	75	92	95	120	121	122	106	115	<b>-27,6</b>	<b>49,8</b>	-
<b>40-44</b>	236	244	219	194	182	180	228	205	211	<b>-19,1</b>	-	-
<b>45-49</b>	521	531	547	540	478	471	470	467	394	<b>27,0</b>	<b>-21,7</b>	<b>-20,4</b>
<b>50-54</b>	937	1024	1008	1098	1081	1053	1071	1131	1052	<b>136,0</b>	<b>17,2</b>	-
<b>55-59</b>	1409	1546	1535	1624	1555	1684	1774	1856	1842	<b>84,6</b>	<b>72,3</b>	<b>19,3</b>
<b>60-64</b>	1163	1150	1274	1361	1796	2176	2208	2317	2431	-	<b>125,2</b>	<b>68,3</b>
<b>65-69</b>	2569	2459	2336	1987	1708	1532	1409	1562	1752	-	<b>-41,7</b>	-
<b>70-74</b>	2004	1955	2094	2276	2548	2624	2499	2397	2020	<b>96,5</b>	-	-
<b>75-79</b>	1727	1741	1619	1512	1457	1411	1461	1591	1725	<b>188,4</b>	-	-
<b>80-84</b>	554	605	705	759	903	893	898	915	815	<b>257,3</b>	<b>111,6</b>	-
<b>85 и ст.</b>	205	187	196	212	231	258	277	302	337	<b>116,7</b>	<b>109,2</b>	<b>62,5</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 55**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО прямой кишки (C19-21)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>9741</b>	<b>9682</b>	<b>9864</b>	<b>10089</b>	<b>10279</b>	<b>10500</b>	<b>11005</b>	<b>11261</b>	<b>11229</b>	<b>11555</b>	<b>11656</b>	<b>11706</b>
<b>20-24</b>	11	11	7	9	13	9	14	6	10	9	8	11
<b>25-29</b>	23	23	10	25	26	25	28	31	14	22	24	24
<b>30-34</b>	90	86	70	81	89	61	60	36	41	45	55	56
<b>35-39</b>	161	169	170	196	215	148	184	146	141	128	129	113
<b>40-44</b>	332	311	332	361	348	304	351	345	327	366	304	305
<b>45-49</b>	353	396	434	517	485	519	574	552	595	581	608	596
<b>50-54</b>	684	543	477	465	454	594	698	805	867	908	907	974
<b>55-59</b>	1042	1151	1208	1228	1179	1027	830	776	708	771	853	1004
<b>60-64</b>	1490	1373	1304	1395	1460	1618	1763	1923	1829	1804	1525	1250
<b>65-69</b>	1914	2027	2025	1921	1915	1889	1831	1756	1704	1876	2051	2175
<b>70-74</b>	1443	1530	1678	1870	1905	2105	2279	2291	2260	2223	2071	1967
<b>75-79</b>	1129	1056	989	1011	1165	1180	1352	1525	1690	1752	1948	1953
<b>80-84</b>	742	721	822	681	681	640	652	638	677	700	792	912
<b>85 и ст.</b>	320	281	332	327	337	375	386	430	361	368	377	364

**Продолжение таблицы 55**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО прямой кишки (C19-21)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>12098</b>	<b>12009</b>	<b>12205</b>	<b>12241</b>	<b>12885</b>	<b>13065</b>	<b>13215</b>	<b>13358</b>	<b>13538</b>	<b>41,5</b>	<b>17,6</b>	<b>9,3</b>
<b>20-24</b>	8	14	10	9	9	9	10	13	6	-	-	-
<b>25-29</b>	31	25	18	34	28	36	30	38	33	<b>68,7</b>	<b>52,1</b>	-
<b>30-34</b>	53	62	62	66	74	62	59	69	88	-	<b>43,3</b>	-
<b>35-39</b>	125	113	121	111	128	118	118	158	159	<b>-32,4</b>	-	<b>45,5</b>
<b>40-44</b>	272	255	244	252	248	220	247	249	254	<b>-34,1</b>	<b>-19,3</b>	-
<b>45-49</b>	591	592	578	540	594	539	506	495	484	<b>20,8</b>	<b>-19,9</b>	<b>-15,1</b>
<b>50-54</b>	995	1003	1065	1055	1097	1153	1106	1161	1150	<b>156,6</b>	<b>25,7</b>	<b>8,3</b>
<b>55-59</b>	1198	1401	1398	1533	1506	1594	1660	1541	1666	<b>78,6</b>	<b>74,2</b>	-
<b>60-64</b>	1055	998	1092	1231	1513	1720	1940	2004	2099	-	-	<b>69,8</b>
<b>65-69</b>	2336	2278	2163	1799	1559	1338	1274	1297	1508	<b>-23,4</b>	<b>-45,2</b>	-
<b>70-74</b>	1907	1954	2057	2295	2634	2733	2680	2538	2085	<b>49,4</b>	<b>32,2</b>	-
<b>75-79</b>	2045	1932	1910	1739	1781	1682	1748	1925	2075	<b>94,5</b>	-	<b>19,0</b>
<b>80-84</b>	1069	1017	1077	1166	1207	1332	1250	1271	1250	<b>132,4</b>	<b>52,5</b>	-
<b>85 и ст.</b>	411	362	408	408	506	525	587	597	679	<b>107,6</b>	<b>101,1</b>	<b>59,5</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 56

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО прямой кишки (С19-21), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,33	0,37	0,25	0,36	0,50	0,32	0,38	0,38	0,27	0,31	0,29	0,29
<b>30-39</b>	1,75	1,84	1,75	2,05	2,26	1,77	1,97	1,58	1,61	1,83	1,79	1,48
<b>40-49</b>	6,61	6,60	6,56	6,96	6,63	6,57	7,00	6,85	7,00	7,21	7,03	7,09
<b>50-59</b>	21,04	21,63	22,79	22,92	22,53	22,81	22,14	22,30	22,00	22,81	22,36	23,51
<b>60-69</b>	45,19	47,06	46,92	47,47	48,28	50,69	49,97	52,05	50,91	54,12	53,86	55,56
<b>70-79</b>	66,54	64,92	67,12	67,28	69,28	70,66	72,07	74,45	75,52	76,65	79,21	80,09
<b>80 и ст.</b>	50,25	47,32	52,16	49,44	49,94	51,87	55,46	55,64	54,48	59,90	65,89	67,88
<b>15-59</b>	5,85	5,87	5,90	6,03	5,92	5,72	5,76	5,69	5,71	6,07	6,06	6,42
<b>«Грубый» показатель</b>	12,17	12,26	12,54	12,81	13,23	13,80	14,24	14,81	14,96	15,73	15,70	15,97
<b>Стандарт. показатель</b>	8,57	8,57	8,68	8,82	8,93	9,18	9,34	9,62	9,57	9,98	9,89	9,99
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,34	0,27	0,27	0,30	0,28	0,33	0,30	0,40	0,36	-	<b>26,8</b>	<b>32,8</b>
<b>30-39</b>	1,49	1,59	1,64	1,59	1,79	1,73	1,70	1,83	1,98	-	<b>20,4</b>	<b>18,3</b>
<b>40-49</b>	7,00	7,14	7,19	7,12	7,23	6,90	7,41	7,36	7,06	<b>10,0</b>	-	-
<b>50-59</b>	24,37	25,49	24,98	25,84	25,06	26,10	25,89	26,10	26,17	<b>24,1</b>	<b>13,8</b>	-
<b>60-69</b>	57,85	57,83	58,94	56,06	58,12	59,47	56,52	56,49	56,94	<b>29,0</b>	-	-
<b>70-79</b>	83,61	82,68	82,67	82,37	86,95	86,35	83,86	85,76	83,73	<b>35,0</b>	<b>6,5</b>	-
<b>80 и ст.</b>	74,83	67,65	69,12	68,68	72,43	74,73	70,10	70,49	69,99	<b>59,9</b>	-	-
<b>15-59</b>	6,79	7,19	7,22	7,51	7,50	7,70	7,93	8,11	8,15	<b>50,9</b>	<b>32,0</b>	<b>10,2</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	16,61	16,58	16,83	16,90	17,64	18,02	18,00	18,38	18,36	<b>56,0</b>	<b>17,9</b>	<b>8,0</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	10,30	10,34	10,43	10,34	10,70	10,88	10,71	10,80	10,69	<b>29,4</b>	<b>9,0</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 56**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО прямой кишки (С19-21), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,32	0,38	0,32	0,36	0,60	0,30	0,35	0,40	0,32	0,33	0,29	0,28
<b>30-39</b>	1,51	1,63	1,54	1,78	1,91	1,69	1,70	1,42	1,41	1,90	1,73	1,24
<b>40-49</b>	5,81	6,16	6,04	6,16	6,12	6,29	6,39	6,42	6,56	6,81	6,74	6,87
<b>50-59</b>	24,02	24,84	26,55	25,95	25,38	25,44	25,04	24,67	24,40	25,68	25,40	27,05
<b>60-69</b>	58,56	61,62	60,82	61,47	62,35	66,55	63,70	67,48	66,83	71,23	70,40	74,85
<b>70-79</b>	100,69	96,32	104,56	101,19	106,96	109,05	105,66	111,19	112,50	115,95	119,63	121,23
<b>80 и ст.</b>	85,52	82,29	84,11	89,54	84,92	90,02	99,91	91,02	86,11	106,34	116,76	116,64
<b>15-59</b>	5,83	5,93	5,98	5,88	5,81	5,68	5,66	5,61	5,64	6,13	6,16	6,57
<b>«Грубый» показатель</b>	11,93	12,18	12,48	12,71	13,29	14,15	14,29	15,06	15,28	16,36	16,30	16,71
<b>Стандарт. показатель</b>	11,03	11,05	11,33	11,29	11,54	12,02	11,97	12,43	12,37	13,10	12,99	13,23
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,34	0,21	0,31	0,25	0,25	0,30	0,26	0,36	0,38	-	-	<b>61,2</b>
<b>30-39</b>	1,17	1,43	1,47	1,46	1,65	1,77	1,77	1,59	1,74	-	<b>27,9</b>	-
<b>40-49</b>	6,86	7,16	7,28	7,20	6,67	6,67	7,45	7,29	6,62	<b>20,5</b>	<b>1,7</b>	-
<b>50-59</b>	28,12	29,50	28,46	29,74	28,32	29,25	29,37	30,60	29,56	<b>24,9</b>	<b>12,9</b>	-
<b>60-69</b>	78,48	78,80	80,37	75,82	79,06	82,80	74,48	75,66	75,87	<b>36,4</b>	-	-
<b>70-79</b>	127,62	125,72	124,06	123,50	128,13	127,86	122,38	125,84	124,28	<b>30,8</b>	-	-
<b>80 и ст.</b>	128,24	120,35	121,81	117,89	126,61	124,22	117,50	118,09	110,30	<b>55,2</b>	-	-
<b>15-59</b>	6,98	7,47	7,46	7,80	7,56	7,83	8,23	8,53	8,29	<b>59,1</b>	<b>32,9</b>	<b>10,9</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	17,44	17,59	17,81	17,88	18,50	19,05	18,93	19,55	19,28	<b>68,8</b>	<b>19,1</b>	<b>8,0</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	13,76	13,82	13,89	13,72	14,15	14,55	14,05	14,29	13,92	<b>33,6</b>	<b>7,9</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 56**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО прямой кишки (С19-21), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,35	0,36	0,18	0,35	0,40	0,34	0,41	0,36	0,23	0,29	0,29	0,31
<b>30-39</b>	1,99	2,04	1,96	2,31	2,61	1,85	2,25	1,74	1,80	1,76	1,85	1,72
<b>40-49</b>	7,39	7,01	7,05	7,71	7,11	6,84	7,56	7,25	7,41	7,59	7,30	7,30
<b>50-59</b>	18,56	18,99	19,72	20,47	20,23	20,66	19,75	20,33	19,99	20,40	19,84	20,62
<b>60-69</b>	36,71	37,67	37,82	38,19	38,88	40,04	40,74	41,71	40,32	42,88	43,09	43,23
<b>70-79</b>	54,34	53,65	53,46	54,52	54,44	54,85	57,75	58,43	59,19	59,09	60,73	61,10
<b>80 и ст.</b>	41,46	38,53	44,13	39,38	41,12	42,20	44,11	46,46	46,17	47,60	53,73	56,13
<b>15-59</b>	5,87	5,81	5,82	6,17	6,02	5,76	5,86	5,76	5,78	6,01	5,96	6,28
<b>«Грубый» показатель</b>	12,39	12,34	12,58	12,90	13,18	13,49	14,19	14,59	14,68	15,18	15,19	15,32
<b>Стандарт. показатель</b>	7,44	7,35	7,38	7,64	7,64	7,74	8,02	8,14	8,08	8,32	8,27	8,27
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,34	0,33	0,23	0,36	0,30	0,37	0,34	0,44	0,34	-	<b>29,3</b>	-
<b>30-39</b>	1,81	1,75	1,80	1,72	1,93	1,70	1,63	2,07	2,21	-	-	-
<b>40-49</b>	7,13	7,12	7,10	7,06	7,75	7,10	7,37	7,43	7,46	<b>1,7</b>	-	-
<b>50-59</b>	21,32	22,26	22,17	22,71	22,45	23,57	23,07	22,45	23,42	<b>23,5</b>	<b>14,8</b>	-
<b>60-69</b>	44,87	44,72	45,49	43,53	44,63	44,33	44,46	43,53	44,16	<b>21,6</b>	-	-
<b>70-79</b>	63,07	62,37	63,00	62,74	67,32	66,59	65,43	66,76	64,72	<b>27,8</b>	<b>9,3</b>	-
<b>80 и ст.</b>	61,66	54,05	54,75	54,62	56,44	59,93	55,72	55,83	57,45	<b>54,0</b>	-	-
<b>15-59</b>	6,60	6,92	6,99	7,24	7,45	7,59	7,65	7,71	8,03	<b>43,5</b>	<b>31,4</b>	<b>9,5</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	15,89	15,70	15,99	16,05	16,89	17,13	17,20	17,36	17,57	<b>45,3</b>	<b>16,8</b>	<b>8,0</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	8,47	8,46	8,55	8,50	8,86	8,88	8,85	8,84	8,90	<b>22,4</b>	<b>8,5</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 57

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО прямой кишки (C19-21),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	65,8	65,9	66,4	66,3	66,6	66,8	66,9	67,1	67,3	67,4	67,8	67,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	65,0	64,9	65,3	65,0	65,2	65,6	65,6	65,9	66,0	66,0	66,3	66,4
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,16	1,18	1,22	1,21	1,27	1,24	1,26
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	68,1	67,8	67,9	67,9	68,1	67,7	67,3	67,2	66,6	2,3	-1,5	-1,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	66,7	66,4	66,5	66,4	66,6	66,6	66,5	66,5	66,5	2,8	-	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,30	1,31	1,33	1,32	1,36	1,38	1,35	1,36	1,34	29,5	8,8	0,7
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	64,7	65,0	65,5	65,7	66,0	66,1	66,1	66,4	66,5	66,8	67,3	67,4
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	64,1	63,9	64,3	64,4	64,5	64,9	65,0	65,2	65,3	65,5	65,8	65,9
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,39	1,41	1,44	1,42	1,47	1,53	1,51	1,57	1,58	1,65	1,60	1,67

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 57**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО прямой кишки (C19-21),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	67,6	67,3	67,3	67,2	67,3	66,5	66,0	65,9	65,7	2,1	-2,7	-2,6
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	66,1	65,9	65,9	65,9	66,2	66,0	65,8	65,9	65,9	3,2	-	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,73	1,74	1,76	1,75	1,81	1,85	1,77	1,81	1,77	33,8	9,9	-
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	66,8	66,9	67,3	67,0	67,3	67,5	67,7	67,9	68,2	68,0	68,4	68,5
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	65,7	65,7	66,1	65,6	65,8	66,2	66,1	66,5	66,6	66,5	66,9	66,9
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,92	0,92	0,92	0,95	0,93	0,96	0,99	1,01	1,00	1,04	1,02	1,02
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	68,7	68,4	68,5	68,6	69,0	69,0	68,7	68,7	67,8	2,8	-0,1	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	67,2	66,8	67,0	66,9	67,0	67,1	67,1	67,1	67,0	2,5	-	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,04	1,06	1,07	1,07	1,10	1,10	1,10	1,09	1,09	22,3	8,2	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 58**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО прямой кишки (C19-21) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>14669</b>	<b>14612</b>	<b>14538</b>	<b>14620</b>	<b>14487</b>	<b>14750</b>	<b>15887</b>	<b>16391</b>	<b>16219</b>	<b>16332</b>	<b>16524</b>	<b>16271</b>
<b>20-24</b>	17	11	12	17	11	10	16	17	6	11	11	10
<b>25-29</b>	35	23	25	28	33	26	38	26	26	23	33	21
<b>30-34</b>	93	85	81	62	85	62	60	68	54	54	65	71
<b>35-39</b>	184	176	206	197	186	155	156	174	117	135	99	107
<b>40-44</b>	356	374	312	340	331	342	332	334	319	321	322	294
<b>45-49</b>	370	486	548	584	551	522	659	559	625	621	655	618
<b>50-54</b>	952	770	661	547	507	567	756	875	945	1048	1016	1086
<b>55-59</b>	1575	1746	1734	1684	1636	1444	1205	1030	912	954	1008	1241
<b>60-64</b>	2328	2210	2050	2030	1939	2121	2530	2643	2681	2457	2131	1748
<b>65-69</b>	3024	3160	3182	3206	3017	2899	2819	2673	2696	2704	2927	3171
<b>70-74</b>	2070	2123	2315	2565	2854	3191	3609	3890	3565	3428	3303	3043
<b>75-79</b>	1820	1654	1628	1587	1629	1681	1895	2296	2463	2799	3067	3044
<b>80-84</b>	1290	1248	1275	1235	1128	1091	1145	1102	1084	1141	1234	1198
<b>85 и ст.</b>	549	533	501	533	570	636	655	700	720	632	641	614

**Продолжение таблицы 58**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО прямой кишki (C19-21) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>16465</b>	<b>16466</b>	<b>16442</b>	<b>16692</b>	<b>16820</b>	<b>16628</b>	<b>16454</b>	<b>16892</b>	<b>16795</b>	<b>17,4</b>	<b>2,5</b>	<b>-</b>
<b>20-24</b>	13	7	14	16	4	11	8	9	10	<b>-36,4</b>	-	-
<b>25-29</b>	37	26	21	23	29	31	43	24	24	-	-	-
<b>30-34</b>	49	50	55	53	49	63	54	67	63	<b>-33,5</b>	-	-
<b>35-39</b>	93	104	97	97	107	115	131	119	94	<b>-53,4</b>	-	-
<b>40-44</b>	272	243	252	197	200	202	172	210	211	<b>-49,3</b>	<b>-40,1</b>	-
<b>45-49</b>	607	588	526	533	542	494	418	414	417	-	<b>-37,5</b>	<b>-26,6</b>
<b>50-54</b>	1027	1045	1022	1136	1041	1009	1057	1041	1016	<b>66,6</b>	-	-
<b>55-59</b>	1452	1557	1594	1758	1689	1643	1653	1746	1688	-	<b>46,4</b>	-
<b>60-64</b>	1413	1161	1253	1422	1847	2067	2239	2303	2414	-	-	<b>62,3</b>
<b>65-69</b>	3277	3178	3009	2574	2105	1794	1506	1585	1826	<b>-40,2</b>	<b>-54,2</b>	-
<b>70-74</b>	2821	2908	2910	3254	3603	3716	3461	3414	2894	<b>33,9</b>	-	-
<b>75-79</b>	3256	3247	3165	2915	2699	2563	2529	2724	2947	<b>88,8</b>	<b>-16,7</b>	-
<b>80-84</b>	1495	1673	1899	2022	2122	2064	2173	2141	1988	<b>126,4</b>	<b>74,6</b>	-
<b>85 и ст.</b>	652	668	619	685	779	848	1005	1090	1203	<b>109,4</b>	<b>117,8</b>	<b>84,9</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 58**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО прямой кишki (C19-21) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>6741</b>	<b>6801</b>	<b>6747</b>	<b>6804</b>	<b>6857</b>	<b>6992</b>	<b>7510</b>	<b>7835</b>	<b>7791</b>	<b>7947</b>	<b>8096</b>	<b>7964</b>
<b>20-24</b>	9	9	4	12	5	4	6	10	2	4	8	4
<b>25-29</b>	20	16	13	12	18	10	17	15	19	9	18	9
<b>30-34</b>	47	44	45	28	40	23	32	31	27	31	43	37
<b>35-39</b>	93	92	97	91	85	73	79	79	58	66	50	48
<b>40-44</b>	170	180	140	147	159	156	164	135	166	148	143	126
<b>45-49</b>	187	236	260	288	253	261	328	282	323	307	348	310
<b>50-54</b>	508	400	346	283	276	285	404	447	491	551	546	563
<b>55-59</b>	862	974	927	893	866	741	641	573	485	522	560	681
<b>60-64</b>	1263	1190	1119	1114	1078	1188	1333	1442	1449	1340	1187	952
<b>65-69</b>	1410	1588	1694	1697	1642	1561	1455	1444	1433	1478	1630	1739
<b>70-74</b>	896	826	904	1031	1260	1489	1751	1930	1752	1745	1674	1586
<b>75-79</b>	681	647	610	623	613	635	680	841	958	1145	1261	1334
<b>80-84</b>	442	415	437	426	390	371	413	383	382	412	421	386
<b>85 и ст.</b>	149	176	145	154	166	193	199	220	241	188	200	184

**Продолжение таблицы 58**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО прямой кишki (C19-21) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>8081</b>	<b>7976</b>	<b>8263</b>	<b>8219</b>	<b>8309</b>	<b>8110</b>	<b>8146</b>	<b>8304</b>	<b>8380</b>	<b>26,5</b>	<b>3,8</b>	<b>-</b>
<b>20-24</b>	5	1	8	9	0	9	3	6	8	-	-	-
<b>25-29</b>	16	10	7	10	16	13	21	11	9	-	-	-
<b>30-34</b>	26	24	30	24	25	36	25	35	29	<b>-31,7</b>	-	-
<b>35-39</b>	41	42	44	51	47	53	68	56	44	<b>-55,6</b>	-	-
<b>40-44</b>	136	123	115	97	87	104	85	113	103	<b>-45,4</b>	<b>-31,6</b>	-
<b>45-49</b>	290	296	274	246	280	249	205	199	223	-	<b>-38,2</b>	-
<b>50-54</b>	553	531	527	607	572	504	524	546	513	<b>62,4</b>	-	-
<b>55-59</b>	795	849	903	922	919	867	914	978	939	-	<b>47,2</b>	-
<b>60-64</b>	773	630	730	826	1062	1174	1300	1319	1433	-	<b>69,1</b>	<b>66,2</b>
<b>65-69</b>	1805	1691	1647	1380	1130	998	822	894	1006	<b>-34,9</b>	<b>-54,1</b>	-
<b>70-74</b>	1462	1550	1522	1705	1826	1887	1812	1705	1466	<b>66,0</b>	-	-
<b>75-79</b>	1476	1474	1507	1333	1259	1148	1171	1265	1391	<b>155,6</b>	-	-
<b>80-84</b>	518	547	748	806	854	806	914	835	820	<b>202,0</b>	<b>122,5</b>	-
<b>85 и ст.</b>	185	201	197	199	230	257	280	340	396	<b>117,0</b>	<b>131,2</b>	<b>113,1</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 58**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО прямой кишki (C19-21) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>7928</b>	<b>7811</b>	<b>7791</b>	<b>7816</b>	<b>7630</b>	<b>7758</b>	<b>8377</b>	<b>8556</b>	<b>8428</b>	<b>8385</b>	<b>8428</b>	<b>8307</b>
<b>20-24</b>	8	2	8	5	6	6	10	7	4	7	3	6
<b>25-29</b>	15	7	12	16	15	16	21	11	7	14	15	12
<b>30-34</b>	46	41	36	34	45	39	28	37	27	23	22	34
<b>35-39</b>	91	84	109	106	101	82	77	95	59	69	49	59
<b>40-44</b>	186	194	172	193	172	186	168	199	153	173	179	168
<b>45-49</b>	183	250	288	296	298	261	331	277	302	314	307	308
<b>50-54</b>	444	370	315	264	231	282	352	428	454	497	470	523
<b>55-59</b>	713	772	807	791	770	703	564	457	427	432	448	560
<b>60-64</b>	1065	1020	931	916	861	933	1197	1201	1232	1117	944	796
<b>65-69</b>	1614	1572	1488	1509	1375	1338	1364	1229	1263	1226	1297	1432
<b>70-74</b>	1174	1297	1411	1534	1594	1702	1858	1960	1813	1683	1629	1457
<b>75-79</b>	1139	1007	1018	964	1016	1046	1215	1455	1505	1654	1806	1710
<b>80-84</b>	848	833	838	809	738	720	732	719	702	729	813	812
<b>85 и ст.</b>	400	357	356	379	404	443	456	480	479	444	441	430

**Продолжение таблицы 58**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО прямой кишki (C19-21) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>8384</b>	<b>8490</b>	<b>8179</b>	<b>8473</b>	<b>8511</b>	<b>8518</b>	<b>8308</b>	<b>8588</b>	<b>8415</b>	<b>9,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20-24</b>	8	6	6	7	4	2	5	3	2	-	-	-
<b>25-29</b>	21	16	14	13	13	18	22	13	15	-	-	-
<b>30-34</b>	23	26	25	29	24	27	29	32	34	<b>-35,2</b>	-	-
<b>35-39</b>	52	62	53	46	60	62	63	63	50	<b>-51,3</b>	-	-
<b>40-44</b>	136	120	137	100	113	98	87	97	108	<b>-52,6</b>	<b>-47,1</b>	-
<b>45-49</b>	317	292	252	287	262	245	213	215	194	-	<b>-36,8</b>	<b>-31,4</b>
<b>50-54</b>	474	514	495	529	469	505	533	495	503	<b>71,4</b>	-	-
<b>55-59</b>	657	708	691	836	770	776	739	768	749	-	<b>45,4</b>	-
<b>60-64</b>	640	531	523	596	785	893	939	984	981	-	-	<b>57,1</b>
<b>65-69</b>	1472	1487	1362	1194	975	796	684	691	820	<b>-45,9</b>	<b>-54,4</b>	<b>-36,7</b>
<b>70-74</b>	1359	1358	1388	1549	1777	1829	1649	1709	1428	-	-	-
<b>75-79</b>	1780	1773	1658	1582	1440	1415	1358	1459	1556	<b>53,6</b>	<b>-22,3</b>	-
<b>80-84</b>	977	1126	1151	1216	1268	1258	1259	1306	1168	<b>94,3</b>	<b>51,8</b>	-
<b>85 и ст.</b>	467	467	422	486	549	591	725	750	807	<b>106,2</b>	<b>112,3</b>	<b>74,3</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 59

**Динамика показателей смертности от ЗНО прямой кишки (C19-21), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,26	0,17	0,19	0,23	0,22	0,18	0,26	0,20	0,15	0,16	0,20	0,14
<b>30-39</b>	1,10	1,04	1,17	1,08	1,16	0,96	0,99	1,15	0,84	0,95	0,83	0,91
<b>40-49</b>	4,00	4,37	4,07	4,18	3,88	3,70	4,18	3,73	3,92	3,91	4,08	3,86
<b>50-59</b>	14,83	15,46	15,44	14,90	14,65	14,10	13,89	13,37	12,83	13,25	12,49	13,34
<b>60-69</b>	35,34	36,17	35,90	36,24	34,21	34,28	36,26	36,09	36,84	36,29	36,93	37,88
<b>70-79</b>	60,55	57,66	57,92	57,09	57,03	57,62	61,36	65,97	62,65	63,98	66,04	64,92
<b>80 и ст.</b>	57,47	54,72	54,27	55,22	54,78	57,28	60,91	62,24	63,54	62,47	69,56	64,23
<b>15-59</b>	3,96	4,03	3,91	3,77	3,64	3,40	3,51	3,35	3,27	3,42	3,39	3,61
<b>«Грубый» показатель</b>	9,90	9,88	9,84	9,92	9,86	10,07	10,89	11,29	11,28	11,43	11,51	11,40
<b>Стандарт. показатель</b>	6,77	6,73	6,65	6,59	6,40	6,42	6,90	7,03	6,95	6,93	6,95	6,90
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,22	0,14	0,15	0,16	0,13	0,17	0,21	0,14	0,15	-	-	-
<b>30-39</b>	0,73	0,78	0,76	0,74	0,75	0,85	0,87	0,86	0,71	<b>-35,5</b>	-	-
<b>40-49</b>	3,80	3,66	3,52	3,41	3,57	3,40	3,01	3,24	3,30	<b>-22,9</b>	<b>-21,0</b>	-
<b>50-59</b>	13,31	13,33	13,05	14,08	13,06	12,62	12,50	12,79	12,39	<b>-17,4</b>	-	<b>-9,8</b>
<b>60-69</b>	38,09	36,45	36,59	35,12	34,93	33,94	30,99	30,59	30,99	<b>-9,4</b>	<b>-20,2</b>	<b>-14,6</b>
<b>70-79</b>	66,13	67,12	65,39	64,96	65,08	64,16	59,88	62,29	61,87	<b>10,2</b>	<b>-7,6</b>	-
<b>80 и ст.</b>	71,76	72,94	72,95	73,05	73,81	72,34	73,96	73,83	72,49	<b>43,5</b>	<b>7,8</b>	-
<b>15-59</b>	3,69	3,74	3,70	3,96	3,83	3,75	3,74	3,88	3,79	-	<b>8,6</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	11,60	11,56	11,57	11,76	11,85	11,72	11,51	11,80	11,70	<b>22,5</b>	<b>2,3</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	6,89	6,75	6,66	6,73	6,77	6,68	6,37	6,44	6,35	-	<b>-8,4</b>	<b>-6,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 59**

**Динамика показателей смертности от ЗНО прямой кишки (C19-21), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,29	0,25	0,17	0,23	0,22	0,13	0,22	0,23	0,20	0,12	0,23	0,11
<b>30-39</b>	1,11	1,09	1,16	0,99	1,07	0,85	1,02	1,04	0,83	0,97	0,95	0,88
<b>40-49</b>	4,02	4,33	3,89	4,05	3,74	3,69	4,29	3,60	4,21	3,92	4,28	3,86
<b>50-59</b>	17,70	18,69	18,28	17,55	17,43	16,00	16,36	15,77	14,81	15,58	15,09	15,84
<b>60-69</b>	45,50	47,73	48,76	48,77	46,85	46,71	47,02	48,83	49,43	49,97	52,18	53,16
<b>70-79</b>	93,24	85,16	83,23	83,19	84,32	86,14	90,63	97,35	91,94	96,15	96,94	98,60
<b>80 и ст.</b>	92,56	90,40	88,52	90,31	89,08	92,48	101,74	101,07	105,40	100,96	119,45	104,04
<b>15-59</b>	4,25	4,35	4,07	3,89	3,78	3,44	3,70	3,48	3,48	3,60	3,73	3,83
<b>«Грубый» показатель</b>	9,70	9,79	9,72	9,84	9,95	10,18	10,98	11,52	11,58	11,90	12,13	12,02
<b>Стандарт. показатель</b>	9,11	9,02	8,82	8,77	8,65	8,67	9,22	9,55	9,45	9,50	9,75	9,56
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,18	0,09	0,12	0,15	0,13	0,18	0,20	0,14	0,15	-	-	-
<b>30-39</b>	0,69	0,67	0,75	0,75	0,71	0,86	0,88	0,85	0,67	<b>-35,3</b>	-	-
<b>40-49</b>	3,86	3,87	3,70	3,36	3,71	3,62	3,09	3,38	3,57	<b>-16,6</b>	<b>-18,4</b>	-
<b>50-59</b>	16,16	15,84	16,00	16,71	16,02	14,65	14,85	15,61	14,83	<b>-15,8</b>	-	-
<b>60-69</b>	54,21	50,68	52,92	49,95	49,46	48,50	43,70	43,17	44,24	-	<b>-19,6</b>	<b>-14,6</b>
<b>70-79</b>	100,50	102,86	101,21	99,05	98,70	96,18	92,19	93,71	94,81	<b>14,5</b>	<b>-6,4</b>	<b>-5,8</b>
<b>80 и ст.</b>	118,78	113,67	127,76	122,02	121,03	114,73	119,40	114,02	116,43	<b>40,7</b>	-	-
<b>15-59</b>	3,99	4,00	4,08	4,22	4,21	3,99	4,04	4,29	4,15	-	<b>10,0</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	12,28	12,08	12,56	12,51	12,66	12,36	12,32	12,53	12,61	<b>34,6</b>	<b>3,9</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	9,64	9,37	9,58	9,46	9,55	9,36	8,96	9,01	8,97	-	<b>-7,6</b>	<b>-6,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 59**

**Динамика показателей смертности от ЗНО прямой кишки (C19-21), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,24	0,09	0,21	0,22	0,21	0,22	0,30	0,17	0,11	0,20	0,16	0,16
<b>30-39</b>	1,09	1,00	1,18	1,17	1,25	1,07	0,97	1,26	0,85	0,93	0,71	0,94
<b>40-49</b>	3,98	4,41	4,24	4,29	4,01	3,72	4,08	3,85	3,66	3,91	3,89	3,85
<b>50-59</b>	12,44	12,80	13,13	12,76	12,40	12,56	11,84	11,38	11,18	11,29	10,35	11,29
<b>60-69</b>	28,89	28,72	27,48	27,92	25,76	25,93	29,03	27,55	28,47	27,30	27,01	28,12
<b>70-79</b>	48,86	47,80	48,69	47,27	46,28	45,88	48,87	52,29	49,72	49,61	51,90	49,37
<b>80 и ст.</b>	48,73	45,76	45,66	46,42	46,13	48,35	50,48	52,16	52,53	52,28	57,64	54,64
<b>15-59</b>	3,67	3,72	3,75	3,65	3,51	3,37	3,32	3,23	3,06	3,25	3,08	3,40
<b>«Грубый» показатель</b>	10,08	9,95	9,94	9,99	9,78	9,97	10,80	11,08	11,02	11,01	10,98	10,87
<b>Стандарт. показатель</b>	5,64	5,60	5,55	5,49	5,25	5,29	5,69	5,70	5,62	5,55	5,46	5,48
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,25	0,19	0,17	0,17	0,14	0,16	0,23	0,14	0,15	-	-	-
<b>30-39</b>	0,76	0,88	0,77	0,73	0,80	0,84	0,85	0,87	0,75	<b>-36,0</b>	-	-
<b>40-49</b>	3,75	3,46	3,36	3,45	3,45	3,21	2,94	3,12	3,05	<b>-28,4</b>	<b>-23,2</b>	<b>-13,4</b>
<b>50-59</b>	11,00	11,31	10,68	11,98	10,68	10,99	10,61	10,49	10,41	<b>-18,7</b>	-	<b>-10,8</b>
<b>60-69</b>	27,95	27,55	26,34	25,71	25,57	24,48	22,45	22,09	22,05	<b>-18,2</b>	<b>-22,7</b>	<b>-16,7</b>
<b>70-79</b>	50,09	50,25	48,37	48,70	49,05	48,93	44,44	47,39	46,43	-	<b>-9,6</b>	-
<b>80 и ст.</b>	60,16	62,44	58,00	59,06	59,87	59,67	60,18	61,45	58,82	<b>38,2</b>	-	-
<b>15-59</b>	3,41	3,49	3,35	3,72	3,47	3,53	3,47	3,49	3,46	-	-	-
<b>«Грубый» показатель</b>	11,01	11,10	10,72	11,11	11,16	11,17	10,81	11,16	10,92	<b>12,4</b>	-	-
<b>Стандарт. показатель</b>	5,43	5,37	5,11	5,27	5,28	5,25	4,98	5,03	4,92	<b>-10,2</b>	<b>-9,7</b>	<b>-7,4</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 60

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО прямой кишки (C19-21),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	67,4	67,2	67,6	67,8	68,2	68,7	68,9	69,6	69,5	69,7	70,0	69,6
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	66,8	66,6	66,8	67,0	67,2	67,6	67,5	67,9	68,1	68,1	68,4	68,2
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,84	0,83	0,82	0,82	0,79	0,81	0,87	0,88	0,87	0,86	0,85	0,86
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	70,0	70,5	70,6	70,8	71,1	71,2	71,4	71,4	71,1	6,4	2,4	-
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	68,7	69,0	69,1	69,0	69,2	69,2	69,4	69,4	69,5	4,6	1,8	0,7
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,84	0,83	0,81	0,83	0,83	0,82	0,77	0,78	0,77	-	-9,8	-8,5
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	65,7	65,8	66,2	66,6	67,0	67,4	67,6	68,1	68,0	68,4	68,5	68,6
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	65,2	65,1	65,4	65,7	65,9	66,5	66,3	66,9	66,9	67,1	67,1	67,2
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	1,14	1,10	1,08	1,07	1,07	1,09	1,16	1,20	1,16	1,18	1,18	1,19

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 60**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО прямой кишке (C19-21),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	68,9	69,4	69,5	69,8	70,0	70,1	70,3	70,0	69,4	6,9	2,2	-
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	67,7	67,9	68,2	68,1	68,1	68,1	68,3	68,2	68,4	5,3	1,6	-
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	1,18	1,16	1,16	1,16	1,17	1,16	1,08	1,09	1,08	-	-9,0	-8,7
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	68,8	68,7	69,1	69,3	69,8	70,1	70,2	70,9	70,8	70,9	71,5	70,9
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	68,2	67,9	68,0	68,1	68,3	68,5	68,6	68,9	69,2	69,0	69,6	69,2
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,69	0,69	0,68	0,67	0,64	0,65	0,70	0,69	0,69	0,67	0,65	0,66
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	71,4	71,8	71,9	71,9	72,2	72,3	72,5	72,7	72,6	6,0	2,3	1,1
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	69,7	69,9	70,0	69,9	70,2	70,2	70,5	70,7	70,6	4,3	1,9	1,0
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,64	0,63	0,61	0,63	0,64	0,62	0,58	0,59	0,58	-14,5	-11,0	-9,8

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 61

## Динамика показателей диагностики ЗНО прямой кишки (C19-21), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	17378	17542	17886	18251	18774	19449	19965	20649	20541	21452	21432
из них доля выявленных активно, %	6,2	5,6	6,0	5,8	5,4	5,8	6,2	6,1	7,2	8,3	7,4
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	81,8	82,0	82,6	83,6	83,2	82,9	83,9	84,6	85,1	86,4	87,2
*I-II ст., %	29,4	30,2	29,3	29,6	30,4	30,3	31,1	33,4	35,8	36,6	38,3
*III ст., %	37,3	36,3	36,8	36,8	35,8	36,5	35,7	34,6	32,6	32,7	31,4
*IV ст., %	28,9	28,8	29,1	28,6	29,1	28,6	28,4	27,8	27,2	26,7	26,0
Показатель одногодичной летальности, %	37,3	36,6	37,3	35,7	36,5	35,8	36,3	36,2	35,1	33,5	33,5
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	21608	22427	22381	22597	22465	23270	23841	23917	24219	23889	
из них доля выявленных активно, %	8,6	8,5	8,2	7,7	7,4	8,0	7,7	9,6	10,3	11,7	
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	87,3	87,6	88,4	88,7	89,1	90,4	91,0	91,9	92,5	93,1	
*I-II ст., %	39,1	40,9	41,9	43,2	43,9	44,5	45,6	48,2	47,6	48,2	
*III ст., %	30,5	29,6	28,6	27,8	26,8	27,2	27,0	25,2	26,0	25,1	
*IV ст., %	26,5	25,6	26,3	25,6	25,8	24,9	24,6	23,4	23,2	23,7	
Показатель одногодичной летальности, %	33,0	31,7	31,1	30,0	30,6	30,5	28,6	27,7	25,8	25,7	

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 62

**Динамика сведений о контингенте больных с ЗНО прямой кишки (C19-21), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных, состоящих на учете на конец года	65872	68098	70965	73408	76041	78478	81016	83766	86862	90258	93316
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	43,2	44,3	44,6	46,0	45,4	45,4	46,1	46,4	46,4	46,2	47,2
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	53,4	53,6	53,8	55,0	54,6	54,1	54,8	54,8	55,0	54,8	56,1
Показатель распространенности на 100 000 населения	44,5	46,0	48,0	49,8	51,8	53,6	55,5	57,7	60,4	63,2	65,1
Индекс накопления контингента	3,8	3,9	4,0	4,0	4,1	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,4
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных, состоящих на учете на конец года	96258	100040	104204	107379	110274	115048	119937	124772	129392	134026	
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	47,2	47,5	47,5	48,2	48,4	48,2	48,9	49,9	49,6	49,6	
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	56,0	56,7	57,0	57,3	57,1	57,6	58,6	59,8	59,8	60,2	
Показатель распространенности на 100 000 населения	67,5	70,5	73,1	75,6	77,7	81,1	84,5	87,3	90,4	93,4	
Индекс накопления контингента	4,5	4,5	4,7	4,8	4,9	4,9	5,0	5,2	5,3	5,6	

**Таблица 63**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (С22) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>8584</b>	<b>8374</b>	<b>8034</b>	<b>7940</b>	<b>7680</b>	<b>7757</b>	<b>7534</b>	<b>7255</b>	<b>7099</b>	<b>6793</b>	<b>6769</b>	<b>6570</b>
<b>0-14</b>	48	30	30	43	43	42	33	29	34	31	36	53
<b>15-19</b>	23	14	10	22	22	13	18	13	15	17	13	27
<b>20-24</b>	13	8	17	21	24	21	21	23	25	9	19	30
<b>25-29</b>	23	21	26	26	46	26	21	17	20	25	29	32
<b>30-34</b>	47	37	47	88	71	52	41	40	29	38	24	42
<b>35-39</b>	122	100	118	124	119	87	81	89	68	61	62	64
<b>40-44</b>	225	243	228	294	217	204	186	204	215	188	178	171
<b>45-49</b>	338	322	372	435	361	373	371	352	328	309	345	346
<b>50-54</b>	684	511	443	421	396	417	492	539	570	514	583	534
<b>55-59</b>	1086	1209	1132	1121	920	826	690	549	497	510	549	621
<b>60-64</b>	1473	1441	1216	1152	1100	1242	1278	1265	1216	1137	952	747
<b>65-69</b>	1775	1835	1809	1600	1624	1487	1321	1149	1126	1106	1201	1229
<b>70-74</b>	1123	1163	1166	1306	1396	1592	1580	1557	1467	1352	1154	1082
<b>75-79</b>	869	762	716	635	736	741	795	905	920	952	1034	1005
<b>80-84</b>	530	480	502	437	408	419	386	316	355	354	408	388
<b>85 и ст.</b>	205	198	202	215	197	215	220	208	214	190	182	199

**Продолжение таблицы 63**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (С22) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>6486</b>	<b>6183</b>	<b>6298</b>	<b>6473</b>	<b>6626</b>	<b>6464</b>	<b>6525</b>	<b>6287</b>	<b>6789</b>	<b>-25,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>0-14</b>	31	32	36	44	42	43	38	50	41	-	-	-
<b>15-19</b>	7	14	17	7	6	9	7	6	10	-	-	-
<b>20-24</b>	25	29	27	30	14	22	17	13	11	-	<b>-49,0</b>	-
<b>25-29</b>	23	19	21	21	28	19	17	20	28	-	-	-
<b>30-34</b>	37	31	36	29	52	46	35	37	33	<b>-38,4</b>	-	-
<b>35-39</b>	50	55	48	69	66	75	59	72	67	<b>-54,1</b>	-	-
<b>40-44</b>	148	132	133	122	112	115	104	113	128	<b>-60,9</b>	<b>-36,7</b>	-
<b>45-49</b>	347	311	279	297	284	266	264	276	250	<b>-30,8</b>	<b>-28,2</b>	<b>-12,6</b>
<b>50-54</b>	545	560	529	497	531	515	509	544	538	-	-	-
<b>55-59</b>	744	756	771	797	811	756	763	794	868	-	<b>34,5</b>	-
<b>60-64</b>	618	527	577	736	834	942	1010	994	1051	<b>-43,3</b>	<b>54,1</b>	<b>40,7</b>
<b>65-69</b>	1288	1182	1120	936	811	690	673	611	802	<b>-63,3</b>	<b>-51,6</b>	-
<b>70-74</b>	986	910	1037	1148	1272	1227	1244	1076	1001	-	-	-
<b>75-79</b>	1023	986	910	909	845	796	792	821	970	-	<b>-19,4</b>	-
<b>80-84</b>	440	455	571	592	648	645	669	565	594	<b>54,2</b>	<b>62,6</b>	-
<b>85 и ст.</b>	174	184	186	239	270	298	324	295	397	<b>72,4</b>	<b>145,5</b>	<b>56,0</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 63**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (C22) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>4779</b>	<b>4753</b>	<b>4537</b>	<b>4482</b>	<b>4253</b>	<b>4408</b>	<b>4311</b>	<b>4078</b>	<b>4026</b>	<b>3787</b>	<b>3685</b>	<b>3645</b>
<b>0-14</b>	32	20	22	27	24	28	19	15	15	15	19	31
<b>15-19</b>	11	9	4	9	10	8	10	8	8	11	11	17
<b>20-24</b>	6	3	9	12	9	11	11	14	15	4	11	25
<b>25-29</b>	11	13	14	15	28	13	14	12	8	13	14	21
<b>30-34</b>	24	20	29	45	44	28	28	25	16	15	11	25
<b>35-39</b>	85	66	79	69	68	52	50	50	36	42	28	44
<b>40-44</b>	126	171	135	195	135	125	121	122	139	119	101	108
<b>45-49</b>	206	213	241	303	216	241	239	233	211	202	222	218
<b>50-54</b>	477	333	283	256	248	267	329	364	370	339	382	350
<b>55-59</b>	716	799	736	753	620	563	454	372	315	331	349	396
<b>60-64</b>	902	917	773	736	706	814	838	806	819	724	584	466
<b>65-69</b>	1036	1114	1084	946	934	894	791	697	688	659	702	719
<b>70-74</b>	542	553	576	620	715	825	844	825	776	695	563	572
<b>75-79</b>	347	313	315	271	301	303	339	369	398	428	458	462
<b>80-84</b>	196	156	180	163	137	157	147	114	137	125	153	132
<b>85 и ст.</b>	62	53	57	62	58	79	77	52	75	65	77	59

**Продолжение таблицы 63**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (С22) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>3619</b>	<b>3436</b>	<b>3531</b>	<b>3658</b>	<b>3712</b>	<b>3647</b>	<b>3582</b>	<b>3519</b>	<b>3731</b>	<b>-27,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>0-14</b>	15	21	21	28	27	21	23	26	24	-	-	-
<b>15-19</b>	4	11	6	3	3	4	4	3	5	-	-	-
<b>20-24</b>	12	19	11	16	5	9	13	7	8	-	-	-
<b>25-29</b>	15	11	12	15	19	11	13	10	15	-	-	-
<b>30-34</b>	19	22	24	18	29	22	21	18	20	-	-	-
<b>35-39</b>	30	34	23	47	43	49	29	47	34	<b>-58,7</b>		-
<b>40-44</b>	97	77	86	74	69	70	56	73	93	<b>-60,7</b>	<b>-30,7</b>	-
<b>45-49</b>	217	205	177	193	180	180	179	187	165	<b>-28,9</b>	<b>-23,4</b>	-
<b>50-54</b>	353	350	355	325	352	348	326	371	365	-	-	-
<b>55-59</b>	494	508	510	543	525	509	529	522	553	-	<b>36,3</b>	-
<b>60-64</b>	393	327	367	481	547	617	670	652	666	<b>-41,6</b>	<b>64,4</b>	<b>37,3</b>
<b>65-69</b>	770	707	655	561	472	405	385	367	486	<b>-63,5</b>	<b>-51,1</b>	-
<b>70-74</b>	507	490	572	623	694	658	623	575	525	-	-	<b>-18,2</b>
<b>75-79</b>	480	421	439	435	383	364	356	367	451	<b>35,7</b>	<b>-18,6</b>	-
<b>80-84</b>	159	167	219	220	285	294	267	208	206	<b>78,1</b>	<b>73,8</b>	-
<b>85 и ст.</b>	54	66	54	76	79	86	88	86	115	<b>61,2</b>	<b>79,6</b>	<b>44,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 63**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (C22) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>3805</b>	<b>3621</b>	<b>3497</b>	<b>3458</b>	<b>3427</b>	<b>3349</b>	<b>3223</b>	<b>3177</b>	<b>3073</b>	<b>3006</b>	<b>3084</b>	<b>2925</b>
<b>0-14</b>	16	10	8	16	19	14	14	14	19	16	17	22
<b>15-19</b>	12	5	6	13	12	5	8	5	7	6	2	10
<b>20-24</b>	7	5	8	9	15	10	10	9	10	5	8	5
<b>25-29</b>	12	8	12	11	18	13	7	5	12	12	15	11
<b>30-34</b>	23	17	18	43	27	24	13	15	13	23	13	17
<b>35-39</b>	37	34	39	55	51	35	31	39	32	19	34	20
<b>40-44</b>	99	72	93	99	82	79	65	82	76	69	77	63
<b>45-49</b>	132	109	131	132	145	132	132	119	117	107	123	128
<b>50-54</b>	207	178	160	165	148	150	163	175	200	175	201	184
<b>55-59</b>	370	410	396	368	300	263	236	177	182	179	200	225
<b>60-64</b>	571	524	443	416	394	428	440	459	397	413	368	281
<b>65-69</b>	739	721	725	654	690	593	530	452	438	447	499	510
<b>70-74</b>	581	610	590	686	681	767	736	732	691	657	591	510
<b>75-79</b>	522	449	401	364	435	438	456	536	522	524	576	543
<b>80-84</b>	334	324	322	274	271	262	239	202	218	229	255	256
<b>85 и ст.</b>	143	145	145	153	139	136	143	156	139	125	105	140

**Продолжение таблицы 63**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (С22) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>2867</b>	<b>2747</b>	<b>2767</b>	<b>2815</b>	<b>2914</b>	<b>2817</b>	<b>2943</b>	<b>2768</b>	<b>3058</b>	<b>-24,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>0-14</b>	16	11	15	16	15	22	15	24	17	-	-	-
<b>15-19</b>	3	3	11	4	3	5	3	3	5	-	-	-
<b>20-24</b>	13	10	16	14	9	13	4	6	3	-	-	-
<b>25-29</b>	8	8	9	6	9	8	4	10	13	-	-	-
<b>30-34</b>	18	9	12	11	23	24	14	19	13	-	-	-
<b>35-39</b>	20	21	25	22	23	26	30	25	33	<b>-46,3</b>	-	<b>44,4</b>
<b>40-44</b>	51	55	47	48	43	45	48	40	35	<b>-61,3</b>	<b>-45,5</b>	-
<b>45-49</b>	130	106	102	104	104	86	85	89	85	<b>-34,3</b>	<b>-36,4</b>	<b>-19,3</b>
<b>50-54</b>	192	210	174	172	179	167	183	173	173	-	<b>-13,5</b>	-
<b>55-59</b>	250	248	261	254	286	247	234	272	315	-	<b>30,9</b>	-
<b>60-64</b>	225	200	210	255	287	325	340	342	385	<b>-46,3</b>	-	<b>47,2</b>
<b>65-69</b>	518	475	465	375	339	285	288	244	316	<b>-63,0</b>	<b>-52,4</b>	-
<b>70-74</b>	479	420	465	525	578	569	621	501	476	<b>-26,5</b>	-	-
<b>75-79</b>	543	565	471	474	462	432	436	454	519	-	<b>-20,1</b>	-
<b>80-84</b>	281	288	352	372	363	351	402	357	388	<b>41,8</b>	<b>56,0</b>	-
<b>85 и ст.</b>	120	118	132	163	191	212	236	209	282	<b>77,8</b>	<b>186,4</b>	<b>60,9</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 64

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (С22), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>0-9</b>	0,18	0,11	0,11	0,17	0,19	0,20	0,16	0,13	0,19	0,17	0,18	0,30
<b>10-19</b>	0,15	0,10	0,08	0,14	0,14	0,10	0,11	0,10	0,10	0,11	0,11	0,19
<b>20-29</b>	0,18	0,15	0,22	0,24	0,35	0,23	0,20	0,19	0,21	0,16	0,22	0,27
<b>30-39</b>	0,67	0,55	0,67	0,89	0,82	0,62	0,56	0,61	0,48	0,50	0,44	0,54
<b>40-49</b>	3,10	2,87	2,84	3,29	2,54	2,47	2,35	2,32	2,26	2,06	2,18	2,19
<b>50-59</b>	10,39	10,57	10,16	10,30	9,00	8,72	8,37	7,64	7,37	6,78	6,99	6,62
<b>60-69</b>	21,44	22,07	20,76	19,05	18,80	18,63	17,62	16,39	16,05	15,77	15,72	15,22
<b>70-79</b>	31,00	29,39	27,65	26,69	27,12	27,59	26,48	26,26	24,81	23,67	22,68	22,26
<b>80 и ст.</b>	22,97	20,83	21,51	20,36	19,52	21,03	20,51	18,10	20,04	19,17	21,89	20,81
<b>15-59</b>	2,82	2,70	2,61	2,78	2,37	2,19	2,09	1,98	1,92	1,80	1,90	1,95
<b>«Грубый» показатель</b>	5,79	5,66	5,44	5,39	5,23	5,29	5,16	5,00	4,94	4,75	4,72	4,60
<b>Стандарт. показатель</b>	4,14	3,99	3,80	3,78	3,58	3,55	3,42	3,27	3,20	3,05	3,03	2,98
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	0,19	0,19	0,19	0,28	0,25	0,25	0,22	0,27	0,24	<b>89,9</b>	-	-
<b>10-19</b>	0,07	0,11	0,15	0,07	0,07	0,10	0,08	0,09	0,08	-	<b>-42,4</b>	-
<b>20-29</b>	0,21	0,20	0,20	0,21	0,17	0,17	0,14	0,14	0,17	-	<b>-39,8</b>	-
<b>30-39</b>	0,45	0,43	0,42	0,48	0,57	0,58	0,44	0,50	0,45	<b>-37,5</b>	-	-
<b>40-49</b>	2,14	1,95	1,86	1,96	1,91	1,86	1,88	2,02	1,99	<b>-41,0</b>	<b>-10,9</b>	-
<b>50-59</b>	6,92	6,74	6,49	6,30	6,42	6,05	5,87	6,14	6,44	<b>-46,8</b>	<b>-12,2</b>	-
<b>60-69</b>	15,48	14,36	14,57	14,70	14,54	14,35	13,93	12,63	13,54	<b>-39,6</b>	<b>-15,0</b>	<b>-11,4</b>
<b>70-79</b>	21,86	20,67	20,96	21,66	21,86	20,67	20,35	19,25	20,88	<b>-35,3</b>	<b>-10,0</b>	-
<b>80 и ст.</b>	20,52	19,91	21,93	22,43	23,36	23,43	23,11	19,65	22,51	-	-	-
<b>15-59</b>	2,00	1,96	1,92	1,94	1,99	1,91	1,88	2,00	2,08	<b>-30,3</b>	-	-
<b>«Грубый» показатель</b>	4,57	4,34	4,43	4,56	4,67	4,55	4,56	4,39	4,73	<b>-22,4</b>	-	-
<b>Стандарт. показатель</b>	2,89	2,73	2,76	2,84	2,86	2,79	2,73	2,62	2,77	<b>-36,0</b>	<b>-9,2</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 64**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (C22), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>0-9</b>	0,23	0,14	0,15	0,21	0,20	0,23	0,15	0,12	0,16	0,13	0,21	0,33
<b>10-19</b>	0,16	0,12	0,10	0,14	0,13	0,14	0,14	0,12	0,10	0,15	0,14	0,24
<b>20-29</b>	0,17	0,16	0,23	0,26	0,36	0,23	0,24	0,24	0,22	0,16	0,22	0,40
<b>30-39</b>	0,86	0,69	0,88	0,95	0,96	0,71	0,72	0,71	0,51	0,57	0,40	0,71
<b>40-49</b>	3,74	4,00	3,66	4,64	3,18	3,24	3,14	3,07	3,01	2,76	2,82	2,88
<b>50-59</b>	15,42	15,40	14,63	15,05	13,24	12,94	12,26	11,38	10,39	9,73	9,97	9,50
<b>60-69</b>	32,99	34,90	32,19	29,18	28,25	29,02	27,47	25,43	25,85	24,52	23,82	23,41
<b>70-79</b>	52,56	50,07	48,98	44,81	45,74	45,74	44,10	41,95	39,83	37,36	33,72	34,92
<b>80 и ст.</b>	40,41	31,97	36,05	35,04	31,24	38,70	37,24	27,82	35,87	31,97	44,24	34,86
<b>15-59</b>	3,72	3,62	3,39	3,67	3,05	2,89	2,77	2,65	2,47	2,37	2,45	2,59
<b>«Грубый» показатель</b>	6,87	6,84	6,54	6,48	6,17	6,41	6,30	6,00	5,99	5,67	5,52	5,50
<b>Стандарт. показатель</b>	6,36	6,19	5,88	5,72	5,36	5,48	5,31	4,97	4,90	4,59	4,52	4,47
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	0,19	0,23	0,20	0,36	0,32	0,24	0,28	0,27	0,27	<b>85,1</b>	-	<b>-23,7</b>
<b>10-19</b>	0,06	0,17	0,14	0,06	0,08	0,09	0,07	0,10	0,08	-	-	-
<b>20-29</b>	0,23	0,25	0,19	0,25	0,19	0,16	0,21	0,14	0,20	-	-	-
<b>30-39</b>	0,51	0,57	0,47	0,65	0,71	0,69	0,48	0,61	0,50	<b>-38,9</b>	-	-
<b>40-49</b>	2,85	2,61	2,50	2,62	2,52	2,56	2,51	2,82	2,82	<b>-37,5</b>	-	-
<b>50-59</b>	10,15	9,85	9,68	9,48	9,42	9,16	8,83	9,15	9,38	<b>-45,8</b>	<b>-9,0</b>	-
<b>60-69</b>	24,46	22,58	22,75	23,60	22,99	22,82	21,72	19,88	20,90	<b>-38,4</b>	<b>-13,5</b>	<b>-14,2</b>
<b>70-79</b>	33,76	30,99	33,78	34,49	34,46	32,39	30,26	29,72	32,39	<b>-43,3</b>	-	-
<b>80 и ст.</b>	35,99	35,41	36,91	35,94	40,64	41,01	35,50	28,53	30,73	-	-	-
<b>15-59</b>	2,66	2,63	2,57	2,65	2,65	2,61	2,56	2,73	2,79	<b>-27,6</b>	<b>7,2</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	5,50	5,21	5,37	5,57	5,66	5,56	5,42	5,31	5,61	<b>-22,0</b>	-	-
<b>Стандарт. показатель</b>	4,38	4,15	4,20	4,39	4,37	4,27	4,08	3,93	4,12	<b>-37,4</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 64**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (С22), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Женщины</b>												
<b>0-9</b>	0,13	0,07	0,06	0,13	0,18	0,17	0,16	0,13	0,23	0,22	0,16	0,28
<b>10-19</b>	0,13	0,07	0,07	0,15	0,14	0,05	0,09	0,09	0,10	0,07	0,08	0,14
<b>20-29</b>	0,20	0,14	0,21	0,21	0,33	0,23	0,17	0,14	0,21	0,16	0,21	0,14
<b>30-39</b>	0,48	0,41	0,47	0,82	0,67	0,52	0,40	0,52	0,45	0,43	0,47	0,38
<b>40-49</b>	2,49	1,80	2,06	2,03	1,94	1,75	1,61	1,63	1,55	1,41	1,60	1,55
<b>50-59</b>	6,20	6,59	6,51	6,44	5,55	5,26	5,16	4,53	4,85	4,30	4,52	4,26
<b>60-69</b>	14,13	13,80	13,27	12,32	12,49	11,66	10,99	10,33	9,53	10,02	10,45	9,98
<b>70-79</b>	23,30	21,97	19,87	19,87	19,79	20,12	18,96	19,42	18,18	17,56	17,63	16,41
<b>80 и ст.</b>	18,62	18,03	17,86	16,68	16,56	16,55	16,23	15,57	15,88	15,78	16,55	17,42
<b>15-59</b>	1,95	1,81	1,85	1,91	1,71	1,52	1,42	1,34	1,39	1,26	1,39	1,35
<b>«Грубый» показатель</b>	4,84	4,61	4,46	4,42	4,39	4,30	4,16	4,12	4,02	3,95	4,02	3,83
<b>Стандарт. показатель</b>	2,85	2,66	2,58	2,60	2,52	2,38	2,28	2,20	2,17	2,10	2,15	2,05
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	0,19	0,15	0,18	0,20	0,18	0,26	0,16	0,27	0,21	<b>103,7</b>	-	-
<b>10-19</b>	0,07	0,04	0,16	0,07	0,07	0,11	0,08	0,09	0,07	-	-	-
<b>20-29</b>	0,18	0,15	0,21	0,17	0,15	0,17	0,07	0,14	0,14	-	<b>-33,1</b>	-
<b>30-39</b>	0,39	0,30	0,36	0,32	0,44	0,47	0,41	0,40	0,41	<b>-33,5</b>	-	-
<b>40-49</b>	1,50	1,35	1,29	1,35	1,35	1,23	1,30	1,29	1,21	<b>-45,7</b>	<b>-22,1</b>	-
<b>50-59</b>	4,30	4,24	3,92	3,74	4,01	3,55	3,48	3,70	4,06	<b>-47,7</b>	<b>-17,2</b>	-
<b>60-69</b>	9,83	9,21	9,43	9,05	9,09	8,84	8,69	7,73	8,58	<b>-41,5</b>	<b>-20,1</b>	-
<b>70-79</b>	16,31	15,81	14,86	15,54	15,86	15,10	15,62	14,29	15,48	<b>-35,1</b>	<b>-11,8</b>	-
<b>80 и ст.</b>	16,71	15,91	17,85	18,56	18,25	18,17	19,35	16,92	19,95	-	<b>15,4</b>	-
<b>15-59</b>	1,38	1,34	1,31	1,28	1,37	1,26	1,24	1,32	1,41	<b>-33,4</b>	-	-
<b>«Грубый» показатель</b>	3,77	3,59	3,62	3,69	3,82	3,69	3,83	3,60	3,97	<b>-22,1</b>	-	-
<b>Стандарт. показатель</b>	1,98	1,86	1,88	1,88	1,93	1,88	1,87	1,77	1,90	<b>-36,2</b>	<b>-11,6</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 65

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (C22), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	65,6	65,7	66,0	65,7	66,6	66,9	67,0	67,2	67,4	67,5	67,5	67,5
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	64,5	64,8	64,8	64,0	64,7	65,3	65,5	65,5	65,6	65,8	65,7	65,3
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,52	0,51	0,48	0,47	0,44	0,45	0,43	0,41	0,4	0,38	0,37	0,36
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	67,6	67,7	68,0	68,1	68,3	68,1	68,3	66,8	67,3	3,3	-	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	65,8	65,8	66,1	66,3	66,4	66,4	66,8	66,0	66,5	3,3	1,6	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,35	0,33	0,34	0,34	0,35	0,33	0,33	0,31	0,33	-40,2	-	-
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	63,9	64,0	64,6	63,8	65,1	65,3	65,3	65,1	65,4	65,6	65,8	65,8
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	62,8	62,9	63,2	62,3	63,2	63,8	64,0	63,8	64,3	64,3	64,3	63,4
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,82	0,8	0,75	0,72	0,68	0,69	0,67	0,63	0,61	0,57	0,53	0,54

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 65**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (C22), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
	1993-2013	2003-2013	2008-2013									
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	66,0	65,9	66,3	65,8	65,6	64,9	64,5	63,8	64,4	-	-3,1	-2,8
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	64,2	63,9	64,6	64,4	64,7	64,7	64,6	63,9	64,3	2,7	-	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,54	0,51	0,52	0,54	0,54	0,52	0,5	0,48	0,51	-40,9	-	-9,2
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	67,8	68,0	68,0	68,1	68,6	69,4	69,7	70,3	70,2	70,2	69,9	69,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	66,7	67,2	66,9	66,1	66,6	67,3	67,5	67,7	67,4	67,7	67,5	67,6
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,35	0,33	0,32	0,32	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,24
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	69,9	70,2	70,4	71,2	71,2	71,4	71,8	71,4	71,4	<b>5,6</b>	<b>3,0</b>	-
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	67,8	68,1	68,1	68,7	68,6	68,6	69,4	68,6	69,3	<b>3,9</b>	<b>2,6</b>	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,24	0,22	0,22	0,22	0,23	0,22	0,22	0,2	0,22	-40,7	-	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 66**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (C22) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>7970</b>	<b>8350</b>	<b>8334</b>	<b>8383</b>	<b>8338</b>	<b>8124</b>	<b>8371</b>	<b>8040</b>	<b>8126</b>	<b>8319</b>	<b>8398</b>	<b>8382</b>
<b>0-14</b>	27	30	28	32	34	32	22	17	22	24	22	19
<b>15-19</b>	10	13	13	16	18	16	14	14	16	9	9	4
<b>20-24</b>	16	18	19	15	26	18	19	31	22	24	20	25
<b>25-29</b>	19	14	20	19	30	32	36	29	26	23	35	27
<b>30-34</b>	38	35	34	35	42	44	51	36	45	48	57	60
<b>35-39</b>	109	97	78	78	95	84	67	61	61	72	71	80
<b>40-44</b>	203	217	209	207	239	206	215	167	162	167	143	145
<b>45-49</b>	393	415	391	390	439	416	400	391	351	381	329	347
<b>50-54</b>	511	584	704	679	705	670	709	678	694	689	677	653
<b>55-59</b>	771	668	646	561	631	744	943	996	931	1014	1034	1004
<b>60-64</b>	1368	1532	1508	1507	1191	1012	794	619	667	843	1062	1153
<b>65-69</b>	1409	1365	1324	1377	1508	1538	1671	1594	1558	1285	1091	913
<b>70-74</b>	1680	1725	1735	1669	1481	1353	1279	1222	1280	1482	1599	1605
<b>75-79</b>	818	996	981	1141	1204	1240	1343	1346	1259	1224	1069	1048
<b>80-84</b>	385	396	380	415	466	495	569	609	762	753	831	872
<b>85 и ст.</b>	213	245	264	242	219	224	239	230	270	281	349	427

**Продолжение таблицы 66**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (C22) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>						
<b>Всего</b>	<b>8552</b>	<b>8645</b>	<b>8925</b>	<b>6,1</b>	<b>7,4</b>	<b>6,9</b>
<b>0-14</b>	24	20	22	<b>-35,5</b>	-	-
<b>15-19</b>	7	6	6	<b>-57,0</b>	<b>-73,9</b>	-
<b>20-24</b>	23	18	17	-	-	-
<b>25-29</b>	23	28	25	-	-	-
<b>30-34</b>	38	36	40	-	-	-
<b>35-39</b>	82	76	93	-	-	<b>25,4</b>
<b>40-44</b>	138	150	141	<b>-40,3</b>	<b>-41,5</b>	-
<b>45-49</b>	305	299	298	<b>-27,8</b>	<b>-32,5</b>	<b>-20,9</b>
<b>50-54</b>	689	683	695	-	-	-
<b>55-59</b>	989	1089	1056	<b>79,8</b>	<b>45,0</b>	-
<b>60-64</b>	1283	1281	1385	-	-	<b>57,6</b>
<b>65-69</b>	839	812	993	<b>-38,3</b>	<b>-51,1</b>	-
<b>70-74</b>	1665	1542	1362	-	-	-
<b>75-79</b>	1059	1196	1327	-	-	-
<b>80-84</b>	904	908	895	<b>216,9</b>	<b>105,9</b>	<b>17,9</b>
<b>85 и ст.</b>	484	501	570	<b>220,3</b>	<b>261,8</b>	<b>104,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 66**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (C22) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>4503</b>	<b>4745</b>	<b>4715</b>	<b>4764</b>	<b>4619</b>	<b>4556</b>	<b>4717</b>	<b>4495</b>	<b>4555</b>	<b>4691</b>	<b>4723</b>	<b>4682</b>
<b>0-14</b>	14	15	15	14	10	18	11	9	12	10	15	9
<b>15-19</b>	5	8	8	9	11	7	5	11	9	8	7	3
<b>20-24</b>	9	12	8	8	14	13	15	24	12	12	8	14
<b>25-29</b>	15	11	11	14	16	21	18	14	15	18	23	16
<b>30-34</b>	16	19	21	18	20	24	32	20	27	35	34	34
<b>35-39</b>	67	59	45	49	66	50	40	35	43	48	47	53
<b>40-44</b>	134	139	136	128	141	130	141	94	100	100	93	81
<b>45-49</b>	259	282	259	255	291	267	277	253	234	252	219	225
<b>50-54</b>	360	397	459	469	467	451	488	434	486	472	463	428
<b>55-59</b>	529	465	427	378	409	483	626	680	610	688	702	689
<b>60-64</b>	899	986	980	985	773	625	506	398	450	571	703	744
<b>65-69</b>	806	828	798	845	876	960	990	1001	934	788	633	542
<b>70-74</b>	850	904	926	874	770	715	697	674	698	795	869	881
<b>75-79</b>	326	404	415	470	531	571	613	549	597	564	477	482
<b>80-84</b>	131	143	125	162	158	169	180	225	262	257	329	367
<b>85 и ст.</b>	83	73	82	86	56	52	78	74	66	73	101	114

**Продолжение таблицы 66**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (C22) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>						
<b>Всего</b>	<b>4753</b>	<b>4786</b>	<b>4974</b>	-	<b>6,7</b>	<b>5,2</b>
<b>0-14</b>	15	13	18	-	-	-
<b>15-19</b>	1	5	3	-	-	-
<b>20-24</b>	15	11	10	-	-	-
<b>25-29</b>	17	18	16	-	-	-
<b>30-34</b>	28	24	20	<b>56,8</b>	-	<b>-41,0</b>
<b>35-39</b>	44	46	59	-	-	-
<b>40-44</b>	76	92	97	<b>-43,6</b>	<b>-40,7</b>	-
<b>45-49</b>	215	188	201	<b>-27,8</b>	<b>-32,1</b>	<b>-20,7</b>
<b>50-54</b>	461	465	485	<b>13,7</b>	-	-
<b>55-59</b>	690	735	695	<b>80,7</b>	<b>49,8</b>	-
<b>60-64</b>	857	866	950	-	<b>72,2</b>	<b>62,8</b>
<b>65-69</b>	508	504	609	<b>-36,9</b>	<b>-50,4</b>	-
<b>70-74</b>	878	809	710	-	-	-
<b>75-79</b>	490	525	633	<b>36,4</b>	-	-
<b>80-84</b>	337	335	316	<b>264,1</b>	<b>135,2</b>	-
<b>85 и ст.</b>	121	150	152	<b>134,2</b>	<b>263,7</b>	<b>109,8</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 66**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (С22) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>3467</b>	<b>3605</b>	<b>3619</b>	<b>3619</b>	<b>3719</b>	<b>3568</b>	<b>3654</b>	<b>3545</b>	<b>3571</b>	<b>3628</b>	<b>3675</b>	<b>3700</b>
<b>0-14</b>	13	15	13	18	24	14	11	8	10	14	7	10
<b>15-19</b>	5	5	5	7	7	9	9	3	7	1	2	1
<b>20-24</b>	7	6	11	7	12	5	4	7	10	12	12	11
<b>25-29</b>	4	3	9	5	14	11	18	15	11	5	12	11
<b>30-34</b>	22	16	13	17	22	20	19	16	18	13	23	26
<b>35-39</b>	42	38	33	29	29	34	27	26	18	24	24	27
<b>40-44</b>	69	78	73	79	98	76	74	73	62	67	50	64
<b>45-49</b>	134	133	132	135	148	149	123	138	117	129	110	122
<b>50-54</b>	151	187	245	210	238	219	221	244	208	217	214	225
<b>55-59</b>	242	203	219	183	222	261	317	316	321	326	332	315
<b>60-64</b>	469	546	528	522	418	387	288	221	217	272	359	409
<b>65-69</b>	603	537	526	532	632	578	681	593	624	497	458	371
<b>70-74</b>	830	821	809	795	711	638	582	548	582	687	730	724
<b>75-79</b>	492	592	566	671	673	669	730	797	662	660	592	566
<b>80-84</b>	254	253	255	253	308	326	389	384	500	496	502	505
<b>85 и ст.</b>	130	172	182	156	163	172	161	156	204	208	248	313

**Продолжение таблицы 66**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (C22) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>						
<b>Всего</b>	<b>3799</b>	<b>3859</b>	<b>3951</b>	<b>8,6</b>	<b>8,2</b>	<b>9,1</b>
<b>0-14</b>	9	7	4	-	-	-
<b>15-19</b>	6	1	3	-	-	-
<b>20-24</b>	8	7	7	-	-	-
<b>25-29</b>	6	10	9	-	-	-
<b>30-34</b>	10	12	20	-	-	-
<b>35-39</b>	38	30	34	-	-	-
<b>40-44</b>	62	58	44	<b>-34,7</b>	<b>-42,8</b>	-
<b>45-49</b>	90	111	97	<b>-27,8</b>	<b>-33,4</b>	-
<b>50-54</b>	228	218	210	-	-	-
<b>55-59</b>	299	354	361	<b>77,9</b>	<b>35,7</b>	-
<b>60-64</b>	426	415	435	-	-	<b>47,6</b>
<b>65-69</b>	331	308	384	<b>-40,4</b>	<b>-52,1</b>	<b>-31,3</b>
<b>70-74</b>	787	733	652	-	-	-
<b>75-79</b>	569	671	694	-	-	-
<b>80-84</b>	567	573	579	<b>194,1</b>	<b>91,5</b>	<b>20,6</b>
<b>85 и ст.</b>	363	351	418	<b>269,2</b>	<b>261,1</b>	<b>102,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 67

**Динамика показателей смертности от ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (С22), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>0-9</b>	0,12	0,15	0,17	0,16	0,17	0,22	0,13	0,08	0,15	0,14	0,13	0,12
<b>10-19</b>	0,08	0,09	0,08	0,12	0,14	0,09	0,10	0,11	0,10	0,08	0,08	0,03
<b>20-29</b>	0,17	0,15	0,18	0,16	0,25	0,22	0,24	0,25	0,20	0,19	0,22	0,21
<b>30-39</b>	0,68	0,63	0,55	0,57	0,70	0,66	0,60	0,49	0,53	0,59	0,62	0,67
<b>40-49</b>	2,51	2,64	2,49	2,48	2,83	2,63	2,66	2,46	2,32	2,56	2,27	2,41
<b>50-59</b>	9,08	8,79	9,33	8,20	8,25	8,11	8,87	8,58	8,11	8,29	8,19	7,89
<b>60-69</b>	18,82	19,67	19,41	20,28	19,70	19,64	20,02	18,59	19,10	18,70	19,03	18,16
<b>70-79</b>	27,85	29,02	28,23	28,87	27,84	27,65	28,53	28,00	27,33	28,49	27,55	27,11
<b>80 и ст.</b>	20,24	22,14	22,68	23,15	25,41	25,49	27,01	26,14	29,90	27,90	30,02	32,27
<b>15-59</b>	2,25	2,24	2,30	2,16	2,35	2,33	2,55	2,47	2,38	2,52	2,48	2,46
<b>«Грубый» показатель</b>	5,46	5,75	5,80	5,87	5,81	5,69	5,90	5,64	5,72	5,86	5,92	5,91
<b>Стандарт. показатель</b>	3,62	3,77	3,79	3,74	3,73	3,65	3,71	3,47	3,48	3,57	3,60	3,55
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>0-9</b>	0,13	0,09	0,13	-	<b>-35,6</b>	-						
<b>10-19</b>	0,08	0,08	0,04	-	<b>-57,4</b>	-						
<b>20-29</b>	0,19	0,19	0,18	-	<b>-25,1</b>	-						
<b>30-39</b>	0,56	0,52	0,60	-	-	-						
<b>40-49</b>	2,26	2,33	2,31	<b>-12,9</b>	<b>-17,2</b>	-						
<b>50-59</b>	7,74	8,13	8,03	<b>-11,8</b>	-	-						
<b>60-69</b>	17,56	16,47	17,38	<b>-12,8</b>	<b>-14,7</b>	<b>-11,1</b>						
<b>70-79</b>	27,23	27,79	28,48	-	-	-						
<b>80 и ст.</b>	32,30	32,20	33,28	<b>63,1</b>	<b>35,0</b>	<b>16,8</b>						
<b>15-59</b>	2,43	2,54	2,55	<b>14,2</b>	-	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	5,98	6,04	6,22	<b>7,7</b>	<b>7,1</b>	<b>5,5</b>						
<b>Стандарт. показатель</b>	3,51	3,46	3,54	<b>-7,1</b>	<b>-5,0</b>	-						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 67**

**Динамика показателей смертности от ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (С22), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>0-9</b>	0,10	0,14	0,19	0,15	0,06	0,24	0,13	0,09	0,14	0,11	0,19	0,12
<b>10-19</b>	0,09	0,11	0,09	0,11	0,15	0,08	0,07	0,14	0,12	0,12	0,10	0,04
<b>20-29</b>	0,23	0,22	0,18	0,20	0,27	0,30	0,28	0,32	0,22	0,24	0,25	0,24
<b>30-39</b>	0,76	0,74	0,64	0,67	0,88	0,77	0,75	0,56	0,71	0,83	0,79	0,85
<b>40-49</b>	3,42	3,64	3,40	3,30	3,77	3,51	3,79	3,21	3,17	3,45	3,15	3,14
<b>50-59</b>	13,92	13,33	13,44	12,30	11,95	11,89	13,35	12,79	12,26	12,67	12,52	11,94
<b>60-69</b>	28,75	30,69	30,49	32,45	30,54	31,31	31,46	30,55	30,81	30,77	30,14	28,72
<b>70-79</b>	43,84	45,95	45,50	44,72	42,97	43,43	44,81	41,60	43,27	44,31	43,06	43,19
<b>80 и ст.</b>	35,57	36,21	35,02	41,73	41,16	40,34	43,59	45,44	44,35	40,07	48,01	51,91
<b>15-59</b>	3,08	3,07	3,04	2,92	3,11	3,11	3,52	3,33	3,28	3,50	3,45	3,35
<b>«Грубый» показатель</b>	6,58	6,98	7,01	7,14	6,92	6,88	7,17	6,81	6,92	7,14	7,20	7,13
<b>Стандарт. показатель</b>	5,54	5,81	5,76	5,77	5,55	5,53	5,71	5,34	5,37	5,53	5,56	5,45
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>0-9</b>	0,15	0,12	0,21	-	-	-						
<b>10-19</b>	0,05	0,11	0,04	-	<b>-50,3</b>	-						
<b>20-29</b>	0,26	0,24	0,22	-	<b>-21,2</b>	-						
<b>30-39</b>	0,68	0,66	0,73	-	-	-						
<b>40-49</b>	3,10	3,04	3,26	<b>-13,1</b>	<b>-16,6</b>	-						
<b>50-59</b>	11,88	12,29	12,05	<b>-9,9</b>	-	-						
<b>60-69</b>	28,11	26,72	28,28	<b>-9,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>-10,8</b>						
<b>70-79</b>	42,28	42,09	44,57	-	-	-						
<b>80 и ст.</b>	45,80	47,06	44,81	<b>33,9</b>	-	-						
<b>15-59</b>	3,38	3,49	3,52	<b>17,7</b>	<b>9,6</b>	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	7,19	7,22	7,49	<b>7,2</b>	<b>6,9</b>	-						
<b>Стандарт. показатель</b>	5,37	5,29	5,43	<b>-6,5</b>	-	-						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 67**

**Динамика показателей смертности от ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (С22), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Женщины</b>												
<b>0-9</b>	0,14	0,16	0,15	0,17	0,28	0,20	0,12	0,08	0,15	0,17	0,07	0,12
<b>10-19</b>	0,07	0,08	0,07	0,13	0,12	0,10	0,12	0,06	0,08	0,04	0,05	0,03
<b>20-29</b>	0,11	0,09	0,19	0,11	0,23	0,14	0,19	0,19	0,18	0,14	0,20	0,18
<b>30-39</b>	0,59	0,52	0,46	0,47	0,51	0,55	0,47	0,42	0,35	0,36	0,45	0,50
<b>40-49</b>	1,66	1,71	1,65	1,72	1,97	1,82	1,63	1,77	1,55	1,75	1,47	1,74
<b>50-59</b>	5,08	5,01	5,89	4,78	5,19	5,00	5,23	5,18	4,76	4,77	4,71	4,63
<b>60-69</b>	12,15	12,28	12,03	12,28	12,65	12,18	12,82	11,11	11,75	11,05	11,87	11,31
<b>70-79</b>	21,03	21,64	20,60	21,79	20,91	20,37	20,94	21,59	19,76	20,95	20,16	19,46
<b>80 и ст.</b>	16,32	18,49	19,44	18,23	21,65	21,91	22,92	21,17	25,96	24,43	24,71	26,40
<b>15-59</b>	1,45	1,43	1,58	1,43	1,63	1,60	1,64	1,67	1,54	1,59	1,58	1,63
<b>«Грубый» показатель</b>	4,47	4,67	4,73	4,75	4,85	4,67	4,80	4,64	4,68	4,76	4,82	4,85
<b>Стандарт. показатель</b>	2,42	2,49	2,55	2,48	2,59	2,48	2,47	2,31	2,29	2,33	2,37	2,38
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>0-9</b>	0,11	0,06	0,05	<b>-58,2</b>	<b>-73,5</b>	<b>-60,3</b>						
<b>10-19</b>	0,10	0,04	0,04	-	<b>-65,1</b>	-						
<b>20-29</b>	0,12	0,15	0,14	-	<b>-28,2</b>	-						
<b>30-39</b>	0,44	0,38	0,48	<b>-21,7</b>	-	-						
<b>40-49</b>	1,49	1,69	1,43	-	<b>-18,5</b>	-						
<b>50-59</b>	4,40	4,75	4,75	<b>-13,4</b>	<b>-12,0</b>	-						
<b>60-69</b>	10,47	9,54	10,03	<b>-18,9</b>	<b>-21,4</b>	<b>-15,6</b>						
<b>70-79</b>	20,04	21,00	20,94	-	-	-						
<b>80 и ст.</b>	28,21	27,62	29,69	<b>72,7</b>	<b>39,0</b>	<b>22,2</b>						
<b>15-59</b>	1,53	1,66	1,64	<b>10,0</b>	-	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	4,94	5,02	5,13	<b>8,9</b>	<b>7,4</b>	<b>7,7</b>						
<b>Стандарт. показатель</b>	2,33	2,29	2,32	<b>-9,0</b>	<b>-8,4</b>	-						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 68

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (С22), Россия, 1999-2013 гг.**

Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	66,9	67,0	67,0	67,4	67,4	67,6	67,7	68,1	68,4	68,4	68,4	68,7
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	65,4	65,7	65,6	65,9	65,5	65,8	66,0	66,3	66,8	66,6	66,8	67,0
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,46	0,47	0,48	0,47	0,46	0,45	0,46	0,43	0,42	0,44	0,44	0,43
<b>Показатель</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	69,0	68,9	68,5	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>	-						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	67,3	67,4	67,5	<b>3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,4</b>						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,43	0,42	0,43	-	-	-						
Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	64,7	64,9	64,9	65,3	65,5	66,0	66,0	66,4	66,5	65,8	65,4	65,4
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	63,7	63,9	64,0	64,3	63,9	64,1	64,1	64,5	64,7	64,4	64,7	65,1
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,70	0,73	0,73	0,73	0,69	0,69	0,71	0,67	0,67	0,70	0,69	0,67

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 68**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (C22), Россия, 1999-2013 гг.**

Показатель	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %								
				1999-2013	2003-2013	2008-2013						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	64,8	64,6	64,7	-	-2,3	-1,9						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	64,9	65,0	65,0	2,2	1,8	-						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,67	0,65	0,67	-	-	-5,5						
<b>Показатель</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	69,8	70,2	70,0	70,4	70,0	70,2	70,3	71,0	71,4	71,7	71,6	71,8
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	67,6	68,0	67,7	68,0	67,6	68,0	68,5	68,7	69,4	69,3	69,5	69,4
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,30	0,29	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28
Показатель	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %								
				1999-2013	2003-2013	2008-2013						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	72,5	72,7	72,8	4,6	4,3	1,9						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	70,3	70,3	70,7	4,7	4,3	2,1						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,27	0,26	0,27	-	-	-						

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 69**

**Динамика сведений о диагностике и контингенте больных с ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (C22), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 2011-2013 гг.**

Показатель	2011	2012	2013
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	5181	4901	5047
из них доля выявленных активно, %	2,5	3,7	4,3
Число впервые выявленных ЗНО (без учтенных посмертно)	5383	5090	5292
из них *доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	46,6	48,9	51,3
*I ст., %	1,0	1,5	1,3
*II ст., %	6,0	6,8	6,4
*III ст., %	21,1	21,4	22,2
*IV ст., %	55,8	57,3	57,1
Показатель одногодичной летальности, %	-	66,1	69,9
Число больных, состоящих на учете на конец года	6670	6645	6710
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	27,2	26,6	26,7
Показатель распространенности на 100 000 населения	4,7	4,6	4,7
Индекс накопления контингента	1,3	1,4	1,3

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

**Таблица 70**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО поджелудочной железы (C25)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

<b>Возраст</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>12604</b>	<b>12431</b>	<b>12749</b>	<b>12646</b>	<b>12848</b>	<b>12943</b>	<b>12955</b>	<b>13146</b>	<b>13125</b>	<b>13002</b>	<b>13217</b>	<b>13318</b>
<b>20-24</b>	10	14	8	14	21	8	12	10	18	8	9	19
<b>25-29</b>	30	22	30	31	38	28	29	30	35	28	35	26
<b>30-34</b>	85	75	93	80	90	59	58	72	78	64	63	61
<b>35-39</b>	189	207	222	213	204	170	176	186	134	156	128	146
<b>40-44</b>	351	433	438	384	418	387	400	387	393	395	379	343
<b>45-49</b>	444	566	674	674	704	731	740	724	734	711	738	722
<b>50-54</b>	1003	783	722	625	629	754	966	1058	1176	1157	1273	1173
<b>55-59</b>	1589	1611	1727	1776	1533	1326	1147	981	914	947	1084	1382
<b>60-64</b>	2073	1879	1817	1708	1909	2005	2162	2339	2275	2002	1796	1472
<b>65-69</b>	2479	2577	2643	2494	2416	2336	2006	2038	2005	2153	2252	2423
<b>70-74</b>	1631	1728	1877	2255	2305	2585	2576	2629	2563	2334	2262	2075
<b>75-79</b>	1460	1280	1194	1137	1285	1325	1477	1530	1728	1831	1952	2070
<b>80-84</b>	857	919	893	864	811	747	733	705	683	790	823	927
<b>85 и ст.</b>	390	328	404	384	474	472	462	450	381	418	414	467

**Продолжение таблицы 70**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО поджелудочной железы (C25)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>13289</b>	<b>13223</b>	<b>14037</b>	<b>14092</b>	<b>14723</b>	<b>15034</b>	<b>14917</b>	<b>15193</b>	<b>15342</b>	<b>23,3</b>	<b>19,3</b>	<b>7,6</b>
<b>20-24</b>	9	16	10	19	10	14	14	8	11	-	-	-
<b>25-29</b>	31	26	29	27	34	39	31	30	35	-	-	-
<b>30-34</b>	71	73	65	61	68	88	75	68	76	-	-	-
<b>35-39</b>	134	156	123	128	142	138	143	139	127	-	-	-
<b>40-44</b>	356	343	336	295	273	279	307	262	271	<b>-35,6</b>	<b>-29,3</b>	-
<b>45-49</b>	766	703	768	680	740	656	574	616	559	-	<b>-23,4</b>	<b>-20,8</b>
<b>50-54</b>	1191	1152	1235	1249	1293	1307	1330	1279	1210	<b>83,6</b>	-	-
<b>55-59</b>	1516	1569	1671	1761	1823	1851	1934	1882	2003	-	<b>62,2</b>	<b>12,0</b>
<b>60-64</b>	1254	1119	1325	1634	1974	2204	2214	2424	2438	-	<b>98,9</b>	<b>45,6</b>
<b>65-69</b>	2540	2529	2500	2091	1783	1557	1430	1601	1781	<b>-32,1</b>	<b>-40,3</b>	-
<b>70-74</b>	1986	1920	2150	2378	2799	2900	2830	2714	2399	<b>33,3</b>	<b>38,4</b>	-
<b>75-79</b>	2088	2118	2113	1937	1830	1771	1796	1961	2267	<b>73,2</b>	-	-
<b>80-84</b>	935	1098	1211	1353	1385	1556	1500	1464	1311	<b>121,7</b>	<b>77,6</b>	-
<b>85 и ст.</b>	396	395	488	467	557	663	727	735	849	<b>111,1</b>	<b>138,7</b>	<b>79,4</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 70**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО поджелудочной железы (C25)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>6625</b>	<b>6460</b>	<b>6744</b>	<b>6646</b>	<b>6585</b>	<b>6753</b>	<b>6741</b>	<b>6849</b>	<b>6806</b>	<b>6839</b>	<b>6994</b>	<b>6802</b>
<b>20-24</b>	5	7	6	8	11	8	10	4	11	4	4	6
<b>25-29</b>	17	17	18	16	24	16	20	17	24	22	20	19
<b>30-34</b>	51	53	69	55	62	44	44	52	55	43	40	34
<b>35-39</b>	141	158	159	156	135	125	139	133	97	114	85	93
<b>40-44</b>	269	297	320	281	307	288	297	288	285	287	277	254
<b>45-49</b>	319	430	467	475	484	555	528	504	531	491	547	491
<b>50-54</b>	682	510	490	442	421	518	666	718	781	771	873	802
<b>55-59</b>	1018	1027	1146	1173	1003	858	723	630	578	590	706	898
<b>60-64</b>	1222	1119	1109	1026	1141	1215	1288	1386	1354	1235	1078	871
<b>65-69</b>	1309	1315	1392	1326	1275	1240	1062	1130	1048	1166	1225	1256
<b>70-74</b>	672	697	754	945	944	1113	1168	1184	1169	1119	1044	903
<b>75-79</b>	527	487	421	380	414	429	469	469	586	647	726	802
<b>80-84</b>	288	253	278	262	232	221	209	215	174	222	248	247
<b>85 и ст.</b>	99	86	114	96	126	120	113	116	110	124	116	121

**Продолжение таблицы 70**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО поджелудочной железы (C25)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>6780</b>	<b>6662</b>	<b>7127</b>	<b>7055</b>	<b>7354</b>	<b>7522</b>	<b>7378</b>	<b>7649</b>	<b>7724</b>	<b>16,2</b>	<b>14,7</b>	<b>8,2</b>
<b>20-24</b>	7	8	6	8	7	9	4	6	6	-	-	-
<b>25-29</b>	17	17	13	16	22	27	22	14	24		-	-
<b>30-34</b>	52	49	37	43	40	56	47	44	52	-	-	-
<b>35-39</b>	78	109	80	79	93	91	94	102	80	-	-	-
<b>40-44</b>	244	240	230	203	181	200	216	176	185	<b>-40,6</b>	<b>-33,4</b>	-
<b>45-49</b>	536	488	515	447	497	448	385	410	375	-	<b>-28,5</b>	<b>-20,1</b>
<b>50-54</b>	809	792	848	824	872	849	884	870	780	<b>78,5</b>	-	-
<b>55-59</b>	952	997	1071	1086	1149	1175	1176	1206	1210	-	<b>54,3</b>	<b>10,3</b>
<b>60-64</b>	709	662	777	975	1157	1285	1239	1420	1447	-	<b>95,1</b>	<b>44,9</b>
<b>65-69</b>	1297	1274	1289	1071	905	810	732	869	952	<b>-33,1</b>	<b>-39,6</b>	-
<b>70-74</b>	928	832	1001	1046	1234	1262	1245	1197	1072	<b>42,2</b>	<b>33,9</b>	-
<b>75-79</b>	796	788	804	734	674	650	677	726	920	<b>101,9</b>	-	-
<b>80-84</b>	262	296	343	424	410	509	473	451	418	<b>137,8</b>	<b>109,7</b>	-
<b>85 и ст.</b>	87	108	107	95	111	144	180	154	202	<b>63,0</b>	<b>99,6</b>	<b>114,1</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 70**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО поджелудочной железы (C25)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>5979</b>	<b>5971</b>	<b>6005</b>	<b>6000</b>	<b>6263</b>	<b>6190</b>	<b>6214</b>	<b>6297</b>	<b>6319</b>	<b>6163</b>	<b>6223</b>	<b>6516</b>
<b>20-24</b>	5	7	2	6	10	0	2	6	7	4	5	13
<b>25-29</b>	13	5	12	15	14	12	9	13	11	6	15	7
<b>30-34</b>	34	22	24	25	28	15	14	20	23	21	23	27
<b>35-39</b>	48	49	63	57	69	45	37	53	37	42	43	53
<b>40-44</b>	82	136	118	103	111	99	103	99	108	108	102	89
<b>45-49</b>	125	136	207	199	220	176	212	220	203	220	191	231
<b>50-54</b>	321	273	232	183	208	236	300	340	395	386	400	371
<b>55-59</b>	571	584	581	603	530	468	424	351	336	357	378	484
<b>60-64</b>	851	760	708	682	768	790	874	953	921	767	718	601
<b>65-69</b>	1170	1262	1251	1168	1141	1096	944	908	957	987	1027	1167
<b>70-74</b>	959	1031	1123	1310	1361	1472	1408	1445	1394	1215	1218	1172
<b>75-79</b>	933	793	773	757	871	896	1008	1061	1142	1184	1226	1268
<b>80-84</b>	569	666	615	602	579	526	524	490	509	568	575	680
<b>85 и ст.</b>	291	242	290	288	348	352	349	334	271	294	298	346

**Продолжение таблицы 70**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО поджелудочной железы (C25)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>6509</b>	<b>6561</b>	<b>6910</b>	<b>7037</b>	<b>7369</b>	<b>7512</b>	<b>7539</b>	<b>7544</b>	<b>7618</b>	<b>31,4</b>	<b>24,2</b>	<b>6,9</b>
<b>20-24</b>	2	8	4	11	3	5	10	2	5	-	-	-
<b>25-29</b>	14	9	16	11	12	12	9	16	11	-	-	-
<b>30-34</b>	19	24	28	18	28	32	28	24	24	-	-	-
<b>35-39</b>	56	47	43	49	49	47	49	37	47	-	-	-
<b>40-44</b>	112	103	106	92	92	79	91	86	86	<b>-21,4</b>	<b>-18,8</b>	-
<b>45-49</b>	230	215	253	233	243	208	189	206	184	<b>25,5</b>	-	<b>-22,1</b>
<b>50-54</b>	382	360	387	425	421	458	446	409	430	<b>94,7</b>	<b>17,7</b>	-
<b>55-59</b>	564	572	600	675	674	676	758	676	793	<b>52,7</b>	<b>77,1</b>	-
<b>60-64</b>	545	457	548	659	817	919	975	1004	991	-	<b>104,4</b>	<b>46,5</b>
<b>65-69</b>	1243	1255	1211	1020	878	747	698	732	829	<b>-30,9</b>	<b>-41,0</b>	-
<b>70-74</b>	1058	1088	1149	1332	1565	1638	1585	1517	1327	<b>26,7</b>	<b>42,3</b>	-
<b>75-79</b>	1292	1330	1309	1203	1156	1121	1119	1235	1347	<b>59,2</b>	-	-
<b>80-84</b>	673	802	868	929	975	1047	1027	1013	893	<b>115,3</b>	<b>65,8</b>	-
<b>85 и ст.</b>	309	287	381	372	446	519	547	581	647	<b>131,0</b>	<b>152,7</b>	<b>71,0</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 71

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО поджелудочной железы (C25), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,20	0,18	0,19	0,23	0,29	0,18	0,20	0,19	0,25	0,17	0,20	0,20
<b>30-39</b>	1,09	1,13	1,28	1,22	1,26	1,02	1,08	1,23	1,04	1,11	0,97	1,06
<b>40-49</b>	4,38	5,08	5,26	4,78	4,93	4,79	4,81	4,64	4,68	4,59	4,66	4,50
<b>50-59</b>	15,21	14,71	15,79	16,04	14,78	14,59	14,96	14,31	14,44	13,92	14,55	14,65
<b>60-69</b>	30,05	30,02	30,61	29,08	29,85	29,64	28,25	29,71	29,33	29,21	29,55	30,00
<b>70-79</b>	48,11	45,92	45,11	46,64	45,67	46,24	45,18	44,35	44,60	42,79	43,69	44,21
<b>80 и ст.</b>	38,97	38,32	39,63	38,98	41,46	40,43	40,44	39,89	37,47	42,57	45,89	49,41
<b>15-59</b>	4,09	4,07	4,27	4,13	3,96	3,77	3,84	3,75	3,79	3,75	3,92	4,06
<b>«Грубый» показатель</b>	8,51	8,40	8,63	8,58	8,74	8,83	8,88	9,05	9,13	9,10	9,21	9,33
<b>Стандарт. показатель</b>	5,96	5,85	6,00	5,86	5,89	5,85	5,83	5,89	5,87	5,77	5,84	5,88
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,17	0,18	0,16	0,19	0,18	0,22	0,19	0,16	0,20	-	-	-
<b>30-39</b>	1,05	1,16	0,94	0,93	1,01	1,08	1,02	0,96	0,92	<b>-19,6</b>	-	-
<b>40-49</b>	4,85	4,60	5,00	4,55	4,88	4,57	4,50	4,56	4,36	<b>-6,9</b>	-	-
<b>50-59</b>	14,53	13,94	14,50	14,65	14,91	15,03	15,06	14,50	14,73	-	-	-
<b>60-69</b>	30,81	30,64	32,84	32,74	33,20	33,06	30,15	31,67	30,84	<b>9,6</b>	-	-
<b>70-79</b>	44,33	44,03	45,89	45,44	47,80	47,73	46,25	47,44	49,42	-	<b>11,9</b>	-
<b>80 и ст.</b>	44,49	46,52	49,22	49,12	49,41	55,13	51,83	50,25	49,07	<b>41,5</b>	<b>11,6</b>	-
<b>15-59</b>	4,24	4,16	4,38	4,39	4,58	4,59	4,66	4,57	4,62	<b>18,9</b>	<b>17,9</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	9,36	9,28	9,88	9,93	10,37	10,59	10,43	10,61	10,69	<b>28,9</b>	<b>19,0</b>	<b>6,2</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	5,86	5,73	6,09	6,08	6,30	6,35	6,12	6,18	6,13	<b>6,0</b>	<b>7,6</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 71**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО поджелудочной железы (C25), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,22	0,24	0,24	0,23	0,34	0,23	0,28	0,20	0,33	0,24	0,21	0,22
<b>30-39</b>	1,52	1,69	1,86	1,76	1,69	1,50	1,68	1,75	1,48	1,57	1,28	1,31
<b>40-49</b>	6,63	7,57	7,65	7,04	7,17	7,46	7,19	6,84	7,02	6,69	7,18	6,59
<b>50-59</b>	21,97	20,91	23,49	24,10	21,73	21,45	21,75	20,84	20,62	19,77	21,54	21,65
<b>60-69</b>	43,08	41,82	43,35	40,80	41,61	41,71	39,63	42,57	41,20	42,57	42,66	42,02
<b>70-79</b>	70,89	68,45	64,60	66,64	61,13	62,53	61,03	58,07	59,54	58,76	58,46	57,58
<b>80 и ст.</b>	60,61	51,85	59,62	55,75	57,36	55,92	53,53	55,48	48,05	58,22	70,02	67,17
<b>15-59</b>	5,61	5,56	5,93	5,78	5,42	5,34	5,36	5,18	5,23	5,11	5,54	5,59
<b>«Грубый» показатель</b>	9,53	9,30	9,72	9,61	9,55	9,83	9,85	10,07	10,12	10,24	10,48	10,26
<b>Стандарт. показатель</b>	8,74	8,44	8,71	8,46	8,27	8,34	8,25	8,33	8,22	8,24	8,46	8,25
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,21	0,21	0,16	0,20	0,23	0,29	0,21	0,17	0,26	-	-	-
<b>30-39</b>	1,35	1,61	1,18	1,21	1,30	1,43	1,34	1,37	1,21	<b>-28,6</b>	-	-
<b>40-49</b>	7,07	6,73	7,08	6,37	6,85	6,64	6,41	6,35	6,13	<b>-13,0</b>	<b>-11,0</b>	-
<b>50-59</b>	21,11	20,54	21,47	20,87	21,71	21,63	21,27	21,27	20,32	<b>-5,9</b>	-	-
<b>60-69</b>	42,18	42,27	46,00	46,33	46,53	46,78	40,59	44,65	43,51	<b>8,1</b>	-	-
<b>70-79</b>	58,97	55,10	60,31	58,03	61,04	60,59	59,40	60,68	66,11	<b>-9,6</b>	<b>10,3</b>	-
<b>80 и ст.</b>	58,97	61,39	60,84	63,01	58,17	70,48	65,30	58,71	59,36	<b>14,9</b>	-	-
<b>15-59</b>	5,78	5,74	5,98	5,81	6,18	6,20	6,19	6,23	6,02	<b>13,6</b>	<b>11,9</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	10,30	10,09	10,83	10,74	11,20	11,46	11,16	11,54	11,62	<b>23,8</b>	<b>14,9</b>	<b>6,7</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	8,13	7,96	8,46	8,33	8,59	8,73	8,27	8,48	8,40	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 71**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО поджелудочной железы (C25), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,19	0,13	0,15	0,22	0,24	0,12	0,11	0,18	0,17	0,09	0,18	0,18
<b>30-39</b>	0,65	0,57	0,71	0,68	0,83	0,53	0,47	0,70	0,59	0,64	0,66	0,81
<b>40-49</b>	2,23	2,70	2,99	2,65	2,82	2,29	2,57	2,58	2,50	2,63	2,35	2,59
<b>50-59</b>	9,59	9,61	9,52	9,50	9,14	8,97	9,36	8,88	9,28	9,03	8,77	8,91
<b>60-69</b>	21,80	22,41	22,25	21,30	21,99	21,53	20,61	21,10	21,43	20,44	21,03	22,32
<b>70-79</b>	39,97	37,84	38,01	39,11	39,58	39,54	38,43	38,37	38,00	35,66	36,93	38,03
<b>80 и ст.</b>	33,58	34,91	34,61	34,77	37,45	36,50	37,09	35,85	34,69	38,42	40,13	45,13
<b>15-59</b>	2,62	2,62	2,67	2,55	2,55	2,25	2,36	2,36	2,40	2,43	2,39	2,61
<b>«Грубый» показатель</b>	7,61	7,61	7,66	7,67	8,03	7,95	8,01	8,16	8,26	8,09	8,11	8,53
<b>Стандарт. показатель</b>	4,25	4,21	4,25	4,15	4,31	4,16	4,18	4,23	4,26	4,11	4,12	4,31
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,14	0,14	0,17	0,18	0,12	0,14	0,16	0,15	0,14	-	-	-
<b>30-39</b>	0,76	0,71	0,70	0,65	0,73	0,75	0,71	0,56	0,64	-	-	-
<b>40-49</b>	2,83	2,67	3,10	2,90	3,08	2,69	2,74	2,92	2,73	<b>13,3</b>	-	-
<b>50-59</b>	9,20	8,63	8,89	9,65	9,44	9,73	10,04	9,01	10,17	-	<b>13,3</b>	-
<b>60-69</b>	23,66	23,37	24,58	24,12	24,63	24,15	23,14	22,89	22,28	<b>11,6</b>	-	<b>-8,9</b>
<b>70-79</b>	37,50	38,81	39,03	39,43	41,49	41,61	39,96	41,17	41,60	<b>6,6</b>	<b>12,6</b>	-
<b>80 и ст.</b>	40,92	42,69	46,05	45,14	46,82	50,54	47,74	47,64	45,86	<b>50,6</b>	<b>16,5</b>	-
<b>15-59</b>	2,79	2,68	2,89	3,06	3,09	3,08	3,24	3,02	3,30	<b>33,8</b>	<b>31,1</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	8,55	8,58	9,05	9,23	9,66	9,85	9,81	9,81	9,89	<b>35,0</b>	<b>23,4</b>	<b>5,6</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	4,35	4,23	4,49	4,56	4,74	4,74	4,68	4,59	4,61	<b>13,3</b>	<b>12,6</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 72

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО поджелудочной железы (C25),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	66,0	66,2	66,2	66,6	66,8	67,1	66,9	66,9	67,0	67,4	67,4	67,7
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	65,4	65,2	65,1	65,4	65,5	65,9	65,7	65,7	65,7	66,0	66,0	66,3
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,74	0,73	0,74	0,73	0,72	0,73	0,71	0,73	0,73	0,71	0,71	0,71
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	67,6	67,9	67,9	67,8	67,8	68,0	67,9	67,7	67,6	2,8	-	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	66,0	66,3	66,5	66,6	66,6	66,8	66,8	67,0	67,1	2,9	1,7	0,9
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,72	0,7	0,74	0,75	0,78	0,78	0,75	0,76	0,76	-	9,5	-
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	63,3	63,3	63,1	63,5	63,7	64,0	63,6	63,9	63,8	64,4	64,4	64,6
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	62,7	62,3	62,2	62,5	62,6	62,8	62,6	62,8	62,8	63,3	63,2	63,4
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,08	1,04	1,07	1,07	1,01	1,03	1,01	1,03	1,01	1,01	1,01	0,98

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 72**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО поджелудочной железы (C25),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
	1993-2013	2003-2013	2008-2013									
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	64,9	64,8	64,9	64,2	63,5	63,5	63,5	63,5	64,0	-	-2,0	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	63,2	63,2	63,6	63,8	63,6	63,8	63,9	63,9	64,4	3,0	1,7	1,0
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,00	0,96	1,04	1,03	1,08	1,08	1,01	1,06	1,04	-	7,2	-
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	69,0	69,0	69,2	69,8	70,1	70,5	70,7	70,6	70,6	70,7	70,8	70,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	68,4	68,3	68,3	68,6	68,7	69,2	69,1	68,8	68,7	69,0	69,1	69,3
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,53	0,53	0,53	0,52	0,53	0,52	0,51	0,52	0,53	0,50	0,50	0,52
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	70,4	71,0	71,1	71,2	71,5	71,7	71,6	71,9	71,5	3,7	1,7	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	69,0	69,5	69,5	69,4	69,5	69,9	69,7	70,1	69,9	2,3	1,3	0,8
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,53	0,52	0,54	0,56	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	-	13,2	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 73**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО поджелудочной железы (C25) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>11647</b>	<b>13018</b>	<b>13394</b>	<b>13762</b>	<b>13769</b>	<b>13774</b>	<b>13978</b>	<b>14116</b>	<b>14473</b>	<b>14808</b>	<b>15334</b>	<b>15606</b>
<b>20-24</b>	18	9	10	10	11	18	18	15	12	15	11	9
<b>25-29</b>	26	25	30	31	33	31	32	29	29	21	28	30
<b>30-34</b>	52	64	60	79	56	62	76	76	65	73	57	90
<b>35-39</b>	150	165	133	164	135	132	136	146	118	125	129	154
<b>40-44</b>	372	376	397	385	406	384	364	343	325	298	260	256
<b>45-49</b>	630	716	684	707	715	728	716	737	759	674	732	650
<b>50-54</b>	787	981	1170	1202	1269	1237	1214	1250	1271	1246	1261	1302
<b>55-59</b>	1126	1029	916	974	1102	1349	1471	1645	1725	1838	1900	1885
<b>60-64</b>	1880	2274	2361	2275	1911	1575	1356	1222	1233	1563	1903	2246
<b>65-69</b>	1944	1984	2054	2156	2451	2446	2735	2766	2635	2358	1948	1621
<b>70-74</b>	2330	2675	2654	2553	2372	2162	2023	2026	2223	2412	2966	3041
<b>75-79</b>	1261	1503	1739	1903	2029	2158	2255	2263	2279	2211	1939	1924
<b>80-84</b>	639	737	714	834	825	1001	1070	1120	1269	1422	1548	1682
<b>85 и ст.</b>	428	478	463	484	443	487	505	474	516	541	645	711

**Продолжение таблицы 73**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО поджелудочной железы (C25) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>						
<b>Всего</b>	<b>15694</b>	<b>16185</b>	<b>16117</b>	<b>31,0</b>	<b>20,6</b>	<b>8,8</b>
<b>20-24</b>	3	4	7	-	-	-
<b>25-29</b>	26	26	28	-	-	-
<b>30-34</b>	70	64	50	-	-	-
<b>35-39</b>	139	138	127	-	-	-
<b>40-44</b>	299	261	239	<b>-39,1</b>	<b>-40,0</b>	-
<b>45-49</b>	579	596	538	<b>-14,5</b>	<b>-23,7</b>	<b>-22,8</b>
<b>50-54</b>	1286	1296	1242	<b>29,4</b>	-	-
<b>55-59</b>	1908	1992	1959	<b>135,0</b>	<b>63,4</b>	<b>7,0</b>
<b>60-64</b>	2277	2548	2537	-	<b>92,7</b>	<b>61,3</b>
<b>65-69</b>	1496	1595	1838	-	<b>-42,3</b>	-
<b>70-74</b>	3117	2994	2576	-	<b>46,9</b>	-
<b>75-79</b>	1953	2123	2390	<b>38,1</b>	-	-
<b>80-84</b>	1684	1631	1506	<b>202,2</b>	<b>94,4</b>	-
<b>85 и ст.</b>	852	915	1075	<b>171,0</b>	<b>182,0</b>	<b>107,9</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 73**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО поджелудочной железы (C25) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>6112</b>	<b>6752</b>	<b>6904</b>	<b>7168</b>	<b>7288</b>	<b>7119</b>	<b>7146</b>	<b>7117</b>	<b>7344</b>	<b>7486</b>	<b>7692</b>	<b>7783</b>
<b>20-24</b>	15	6	6	7	9	13	16	11	9	10	6	7
<b>25-29</b>	20	15	21	25	23	23	21	18	15	16	19	24
<b>30-34</b>	35	44	46	63	40	39	56	57	47	44	45	68
<b>35-39</b>	109	122	104	115	94	98	86	99	79	86	93	103
<b>40-44</b>	286	289	292	275	307	294	270	244	229	215	179	169
<b>45-49</b>	453	518	491	488	546	511	516	521	524	456	532	445
<b>50-54</b>	570	683	817	824	879	851	833	856	903	856	843	872
<b>55-59</b>	723	678	586	607	710	892	939	1052	1109	1159	1209	1217
<b>60-64</b>	1149	1367	1368	1400	1160	959	805	705	724	945	1143	1309
<b>65-69</b>	1056	1097	1089	1161	1329	1331	1416	1434	1359	1208	1001	831
<b>70-74</b>	1036	1152	1213	1208	1104	925	926	894	1055	1071	1353	1345
<b>75-79</b>	379	454	563	639	724	822	861	817	828	852	694	713
<b>80-84</b>	168	214	176	215	237	240	276	291	345	436	428	529
<b>85 и ст.</b>	109	113	127	138	116	118	120	117	111	125	143	149

**Продолжение таблицы 73**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО поджелудочной железы (C25) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>						
<b>Всего</b>	<b>7930</b>	<b>8214</b>	<b>8095</b>	<b>25,0</b>	<b>16,3</b>	<b>9,1</b>
<b>20-24</b>	2	4	4	-	-	-
<b>25-29</b>	18	22	19	-	-	-
<b>30-34</b>	54	45	36	-	-	-
<b>35-39</b>	97	99	80	-	-	-
<b>40-44</b>	216	176	163	<b>-45,9</b>	<b>-46,9</b>	-
<b>45-49</b>	410	401	369	<b>-18,9</b>	<b>-28,8</b>	<b>-24,2</b>
<b>50-54</b>	866	890	831	<b>23,8</b>	-	-
<b>55-59</b>	1274	1272	1250	<b>135,1</b>	<b>63,0</b>	<b>8,6</b>
<b>60-64</b>	1350	1531	1555	-	<b>93,5</b>	<b>64,6</b>
<b>65-69</b>	787	874	990	-	<b>-42,5</b>	-
<b>70-74</b>	1400	1393	1156	-	<b>47,5</b>	-
<b>75-79</b>	766	817	948	<b>70,3</b>	-	-
<b>80-84</b>	504	486	446	<b>285,2</b>	<b>135,3</b>	-
<b>85 и ст.</b>	182	202	245	<b>104,7</b>	<b>135,3</b>	<b>110,3</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 73**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО поджелудочной железы (C25) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>5535</b>	<b>6266</b>	<b>6490</b>	<b>6594</b>	<b>6481</b>	<b>6655</b>	<b>6832</b>	<b>6999</b>	<b>7129</b>	<b>7322</b>	<b>7642</b>	<b>7823</b>
<b>20-24</b>	3	3	4	3	2	5	2	4	3	5	5	2
<b>25-29</b>	6	10	9	6	10	8	11	11	14	5	9	6
<b>30-34</b>	17	20	14	16	16	23	20	19	18	29	12	22
<b>35-39</b>	41	43	29	49	41	34	50	47	39	39	36	51
<b>40-44</b>	86	87	105	110	99	90	94	99	96	83	81	87
<b>45-49</b>	177	198	193	219	169	217	200	216	235	218	200	205
<b>50-54</b>	217	298	353	378	390	386	381	394	368	390	418	430
<b>55-59</b>	403	351	330	367	392	457	532	593	616	679	691	668
<b>60-64</b>	731	907	993	875	751	616	551	517	509	618	760	937
<b>65-69</b>	888	887	965	995	1122	1115	1319	1332	1276	1150	947	790
<b>70-74</b>	1294	1523	1441	1345	1268	1237	1097	1132	1168	1341	1613	1696
<b>75-79</b>	882	1049	1176	1264	1305	1336	1394	1446	1451	1359	1245	1211
<b>80-84</b>	471	523	538	619	588	761	794	829	924	986	1120	1153
<b>85 и ст.</b>	319	365	336	346	327	369	385	357	405	416	502	562

**Продолжение таблицы 73**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО поджелудочной железы (C25) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>						
<b>Всего</b>	<b>7764</b>	<b>7971</b>	<b>8022</b>	<b>37,6</b>	<b>25,3</b>	<b>8,6</b>
<b>20-24</b>	1	0	3	-	-	-
<b>25-29</b>	8	4	9	-	-	-
<b>30-34</b>	16	19	14	-	-	-
<b>35-39</b>	42	39	47	-	-	-
<b>40-44</b>	83	85	76	<b>-17,5</b>	<b>-19,1</b>	-
<b>45-49</b>	169	195	169	-	-	<b>-19,4</b>
<b>50-54</b>	420	406	411	<b>43,0</b>	<b>10,2</b>	-
<b>55-59</b>	634	720	709	<b>135,0</b>	<b>64,0</b>	--
<b>60-64</b>	927	1017	982	-	<b>91,4</b>	<b>56,5</b>
<b>65-69</b>	709	721	848	-	<b>-42,0</b>	<b>-30,7</b>
<b>70-74</b>	1717	1601	1420	-	<b>46,4</b>	-
<b>75-79</b>	1187	1306	1442	<b>23,1</b>	-	-
<b>80-84</b>	1180	1145	1060	<b>177,1</b>	<b>80,8</b>	-
<b>85 и ст.</b>	670	713	830	<b>197,8</b>	<b>198,5</b>	<b>107,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 74

**Динамика показателей смертности от ЗНО поджелудочной железы (C25), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,21	0,16	0,19	0,19	0,20	0,22	0,22	0,19	0,17	0,15	0,16	0,16
<b>30-39</b>	0,93	1,09	0,95	1,22	0,97	0,99	1,09	1,12	0,91	0,97	0,90	1,17
<b>40-49</b>	4,23	4,56	4,49	4,53	4,68	4,70	4,67	4,75	4,91	4,54	4,78	4,43
<b>50-59</b>	13,55	14,11	14,42	14,40	14,63	14,82	14,41	14,84	14,95	15,01	15,12	15,17
<b>60-69</b>	25,92	28,90	30,25	31,15	31,85	30,97	33,23	33,50	33,21	34,46	34,03	33,99
<b>70-79</b>	40,03	44,56	45,66	45,78	45,62	46,07	46,55	46,77	48,46	48,68	50,65	50,74
<b>80 и ст.</b>	36,11	41,96	41,45	46,44	47,04	52,74	52,64	49,67	51,71	52,97	55,79	59,45
<b>15-59</b>	3,44	3,65	3,70	3,84	3,94	4,12	4,19	4,37	4,46	4,46	4,58	4,59
<b>«Грубый» показатель</b>	7,98	8,97	9,32	9,63	9,60	9,65	9,85	9,91	10,18	10,43	10,81	11,00
<b>Стандарт. показатель</b>	5,24	5,82	5,96	6,09	6,08	6,07	6,13	6,13	6,18	6,31	6,48	6,53
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>20-29</b>	0,12	0,13	0,15	<b>-52,3</b>	<b>-40,7</b>	-						
<b>30-39</b>	0,98	0,93	0,80	-	-	-						
<b>40-49</b>	4,48	4,46	4,08	-	-	-						
<b>50-59</b>	14,74	15,08	14,67	-	-	-						
<b>60-69</b>	31,22	32,60	31,98	-	-	<b>-8,0</b>						
<b>70-79</b>	50,69	51,93	52,60	-	<b>16,4</b>	<b>6,8</b>						
<b>80 и ст.</b>	59,02	58,18	58,63		<b>23,1</b>	-						
<b>15-59</b>	4,56	4,67	4,51	-	<b>15,0</b>	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	10,98	11,30	11,23	-	<b>20,3</b>	<b>7,4</b>						
<b>Стандарт. показатель</b>	6,35	6,48	6,35	<b>15,1</b>	<b>7,2</b>	-						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 74**

**Динамика показателей смертности от ЗНО поджелудочной железы (C25), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,33	0,20	0,25	0,30	0,29	0,31	0,32	0,24	0,20	0,21	0,20	0,25
<b>30-39</b>	1,32	1,57	1,46	1,78	1,37	1,42	1,47	1,59	1,27	1,29	1,35	1,66
<b>40-49</b>	6,44	6,97	6,73	6,57	7,44	7,12	7,12	7,07	7,16	6,58	7,18	6,30
<b>50-59</b>	20,25	21,04	21,29	20,78	21,67	22,20	21,24	21,90	22,52	22,02	22,05	22,33
<b>60-69</b>	37,19	41,69	42,14	45,41	46,10	45,24	46,71	46,71	46,37	48,75	48,38	47,79
<b>70-79</b>	52,75	56,42	60,26	61,45	60,37	58,99	61,13	58,20	62,91	62,69	65,49	65,22
<b>80 и ст.</b>	46,05	54,81	51,26	59,40	67,90	65,35	66,91	62,00	61,65	68,11	63,75	73,17
<b>15-59</b>	4,89	5,20	5,23	5,29	5,66	5,86	5,87	6,08	6,23	6,11	6,33	6,30
<b>«Грубый» показатель</b>	8,93	9,93	10,27	10,74	10,92	10,74	10,86	10,78	11,16	11,40	11,72	11,86
<b>Стандарт. показатель</b>	7,48	8,23	8,35	8,64	8,80	8,63	8,66	8,51	8,64	8,82	9,01	8,99
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>20-29</b>	0,16	0,22	0,20	<b>-53,2</b>	<b>-38,5</b>	-						
<b>30-39</b>	1,44	1,35	1,07	-	-	-						
<b>40-49</b>	6,68	6,26	5,82	-	-	-						
<b>50-59</b>	22,09	22,15	21,25	-	-	-						
<b>60-69</b>	44,01	46,91	46,16	-								
<b>70-79</b>	66,94	69,73	69,82	-	<b>19,6</b>	<b>11,5</b>						
<b>80 и ст.</b>	68,60	66,76	66,16	-	-	-						
<b>15-59</b>	6,43	6,41	6,11	-	<b>10,5</b>	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	11,99	12,40	12,18	-	<b>16,5</b>	<b>7,6</b>						
<b>Стандарт. показатель</b>	8,87	9,06	8,81	<b>11,9</b>	-	-						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 74**

**Динамика показателей смертности от ЗНО поджелудочной железы (C25), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,09	0,13	0,12	0,09	0,11	0,11	0,11	0,13	0,14	0,08	0,12	0,07
<b>30-39</b>	0,53	0,60	0,43	0,66	0,57	0,58	0,71	0,66	0,56	0,66	0,46	0,69
<b>40-49</b>	2,15	2,30	2,39	2,64	2,15	2,49	2,43	2,65	2,86	2,68	2,59	2,73
<b>50-59</b>	8,01	8,34	8,67	9,05	8,82	8,79	8,88	9,14	8,86	9,38	9,56	9,42
<b>60-69</b>	18,35	20,34	22,34	21,79	22,57	21,85	24,75	25,24	24,95	25,40	24,80	25,03
<b>70-79</b>	34,61	39,38	39,21	38,78	38,88	40,11	39,75	41,38	41,59	41,99	43,58	43,84
<b>80 и ст.</b>	33,57	38,63	38,87	43,01	42,06	49,71	49,12	46,49	49,00	48,65	53,45	55,35
<b>15-59</b>	2,03	2,16	2,22	2,44	2,31	2,48	2,60	2,76	2,79	2,92	2,94	2,99
<b>«Грубый» показатель</b>	7,14	8,12	8,48	8,66	8,45	8,71	8,97	9,15	9,34	9,60	10,02	10,26
<b>Стандарт. показатель</b>	3,69	4,14	4,31	4,36	4,25	4,32	4,44	4,52	4,51	4,64	4,77	4,87
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>20-29</b>	0,08	0,03	0,11	-	<b>-39,5</b>	-						
<b>30-39</b>	0,53	0,53	0,55	-	-	-						
<b>40-49</b>	2,47	2,80	2,48	-	-	-						
<b>50-59</b>	8,79	9,35	9,31	-	-	-						
<b>60-69</b>	22,63	22,92	22,41	-	-	<b>-12,7</b>						
<b>70-79</b>	42,91	43,49	44,53	-	<b>13,5</b>	-						
<b>80 и ст.</b>	56,11	55,53	56,29	-	<b>28,3</b>	<b>12,8</b>						
<b>15-59</b>	2,81	3,04	3,01	-	<b>26,0</b>	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	10,10	10,36	10,41	-	<b>24,4</b>	<b>7,2</b>						
<b>Стандарт. показатель</b>	4,64	4,72	4,69	<b>20,5</b>	<b>11,3</b>	-						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 75

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО поджелудочной железы (C25),  
Россия, 1999-2013 гг.**

Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	67,0	67,2	67,3	67,4	67,5	67,8	67,9	67,9	68,2	68,3	68,5	68,6
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	65,8	66,0	66,0	66,2	66,1	66,4	66,5	66,5	66,8	67,0	67,1	67,2
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,65	0,72	0,74	0,75	0,75	0,73	0,74	0,75	0,75	0,77	0,80	0,80
Показатель	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				1999-2013	2003-2013	2008-2013						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	69,2	68,7	68,6	<b>2,9</b>	<b>2,0</b>	-						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	67,5	67,5	67,9	<b>3,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,3</b>						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,78	0,80	0,78	<b>14,5</b>	<b>8,7</b>	-						
Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	63,7	63,7	64,0	64,2	64,4	64,4	65,1	65,0	65,1	64,7	64,0	63,8
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	62,6	62,8	63,0	63,2	63,1	63,1	63,4	63,2	63,6	64,0	63,8	64,0
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,93	1,02	1,04	1,07	1,07	1,03	1,05	1,04	1,07	1,07	1,14	1,11

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 75**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО поджелудочной железы (C25),  
Россия, 1999-2013 гг.**

Показатель	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %								
				1999-2013	2003-2013	2008-2013						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	63,8	63,9	64,2	<b>0,1</b>	<b>-1,5</b>	-						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	64,2	64,4	64,8	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>1,3</b>						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	1,10	1,14	1,10	<b>13,5</b>	<b>8,3</b>	-						
Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	70,8	71,1	70,9	71,0	71,0	71,5	71,2	71,2	71,6	71,6	72,0	72,1
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	69,3	69,4	69,3	69,4	69,5	69,9	69,9	69,7	70,0	70,0	70,4	70,3
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,46	0,51	0,53	0,53	0,52	0,52	0,53	0,55	0,54	0,56	0,58	0,59
Показатель	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %								
				1999-2013	2003-2013	2008-2013						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	72,5	72,4	72,6	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	70,9	70,8	71,0	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,56	0,57	0,57	<b>18,1</b>	<b>11,5</b>	-						

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 76**

**Динамика сведений о диагностике и контингенте больных  
с ЗНО поджелудочной железы (C25), состоящем на учете  
онкологических учреждений, Россия, 2011-2013 гг.**

Показатель	2011	2012	2013
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	13031	13208	12908
из них доля выявленных активно, %	2,6	3,2	4,1
Число впервые выявленных ЗНО (без учтенных посмертно)	13490	13757	13535
из них *доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	47,1	44,2	48,8
*I ст., %	2,3	2,2	2,5
*II ст., %	9,7	10,2	10,8
*III ст., %	21,0	21,2	21,8
*IV ст., %	59,8	60,3	59,4
Показатель одногодичной летальности, %	-	68,1	69,3
Число больных, состоящих на учете на конец года	14313	14985	15505
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	24,2	23,9	25,0
Показатель распространенности на 100 000 населения	10,0	10,5	10,8
Индекс накопления контингента	1,1	1,1	1,2

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 77

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО гортани (C32)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>7993</b>	<b>7672</b>	<b>7653</b>	<b>7830</b>	<b>7699</b>	<b>7430</b>	<b>7657</b>	<b>7346</b>	<b>7203</b>	<b>7001</b>	<b>7022</b>	<b>6827</b>
<b>20-24</b>	5	8	2	10	7	2	2	4	3	3	4	5
<b>25-29</b>	12	9	10	12	18	13	6	11	9	8	5	8
<b>30-34</b>	50	41	52	37	29	21	21	19	21	18	13	25
<b>35-39</b>	155	129	136	170	132	103	121	78	64	64	50	62
<b>40-44</b>	446	419	430	386	384	342	334	324	246	256	271	214
<b>45-49</b>	630	658	728	818	791	778	809	758	706	636	643	592
<b>50-54</b>	1025	895	747	696	766	885	1004	1112	1158	1182	1142	1171
<b>55-59</b>	1499	1546	1592	1633	1429	1188	1058	830	836	854	1017	1164
<b>60-64</b>	1649	1463	1375	1342	1439	1433	1600	1569	1520	1351	1174	948
<b>65-69</b>	1400	1440	1509	1549	1400	1289	1197	1138	1132	1088	1200	1208
<b>70-74</b>	588	583	635	742	854	899	1047	1004	953	934	832	775
<b>75-79</b>	346	286	265	253	283	317	312	353	402	468	510	481
<b>80-84</b>	130	150	114	128	113	110	93	97	109	88	123	124
<b>85 и ст.</b>	54	44	54	51	44	44	52	44	39	48	33	45

**Продолжение таблицы 77**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО гортани (C32)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>6461</b>	<b>6655</b>	<b>6495</b>	<b>6723</b>	<b>6572</b>	<b>6689</b>	<b>6696</b>	<b>6760</b>	<b>6628</b>	<b>-18,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20-24</b>	9	2	8	2	2	3	2	5	2	-	-	-
<b>25-29</b>	4	9	3	11	9	14	10	11	8	-	-	-
<b>30-34</b>	17	19	16	18	27	19	20	23	25	<b>-59,5</b>	-	-
<b>35-39</b>	49	50	50	57	53	58	50	65	62	<b>-76,1</b>	-	-
<b>40-44</b>	173	153	148	171	128	149	161	141	136	<b>-78,5</b>	<b>-42,7</b>	-
<b>45-49</b>	560	548	541	500	417	421	359	373	378	<b>-51,8</b>	<b>-44,9</b>	<b>-24,1</b>
<b>50-54</b>	1012	1026	1052	1045	1005	989	1010	988	832	-	<b>-19,1</b>	<b>-14,6</b>
<b>55-59</b>	1301	1392	1357	1355	1420	1484	1356	1319	1371	-	<b>21,6</b>	-
<b>60-64</b>	795	767	823	1078	1199	1351	1475	1546	1564	<b>-17,7</b>	-	<b>48,4</b>
<b>65-69</b>	1209	1335	1098	991	803	716	658	771	896	<b>-48,1</b>	<b>-44,7</b>	-
<b>70-74</b>	654	657	747	817	890	874	934	846	681	-	-	-
<b>75-79</b>	482	497	443	449	351	372	381	413	412	<b>48,9</b>	<b>-25,3</b>	-
<b>80-84</b>	151	160	157	184	207	181	220	182	182	<b>96,5</b>	<b>58,3</b>	-
<b>85 и ст.</b>	41	38	49	43	56	57	57	75	76	<b>37,8</b>	<b>127,9</b>	<b>76,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 77**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО гортани (C32)**

**в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>7534</b>	<b>7214</b>	<b>7282</b>	<b>7352</b>	<b>7265</b>	<b>7048</b>	<b>7260</b>	<b>6962</b>	<b>6837</b>	<b>6634</b>	<b>6661</b>	<b>6467</b>
<b>20-24</b>	3	5	2	7	6	2	1	2	2	2	3	2
<b>25-29</b>	7	4	8	11	10	8	3	8	8	4	5	7
<b>30-34</b>	45	34	44	26	22	16	12	16	15	15	11	17
<b>35-39</b>	141	120	131	134	116	94	101	69	58	55	45	56
<b>40-44</b>	429	402	412	350	359	326	317	304	231	235	252	194
<b>45-49</b>	604	623	704	772	749	750	771	723	667	606	612	564
<b>50-54</b>	995	866	726	650	733	848	953	1072	1112	1132	1086	1119
<b>55-59</b>	1443	1490	1549	1566	1388	1151	1016	805	807	823	984	1110
<b>60-64</b>	1566	1395	1324	1305	1370	1382	1553	1501	1464	1306	1130	915
<b>65-69</b>	1301	1360	1441	1481	1339	1230	1137	1083	1083	1045	1151	1163
<b>70-74</b>	540	514	566	697	795	835	996	944	904	879	784	740
<b>75-79</b>	301	246	234	216	241	282	281	313	363	418	463	443
<b>80-84</b>	116	122	97	101	93	90	82	87	89	74	107	94
<b>85 и ст.</b>	40	32	42	35	36	31	37	33	32	39	25	40

**Продолжение таблицы 77**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО гортани (C32)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>6098</b>	<b>6242</b>	<b>6138</b>	<b>6335</b>	<b>6165</b>	<b>6237</b>	<b>6291</b>	<b>6346</b>	<b>6209</b>	<b>-19,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20-24</b>	6	0	3	1	2	2	0	2	1	<b>-72,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25-29</b>	4	6	3	5	5	6	4	8	3	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>30-34</b>	11	14	11	16	20	9	13	17	18	<b>-70,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>35-39</b>	42	44	43	44	46	49	41	57	50	<b>-79,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>40-44</b>	156	136	137	151	117	132	142	126	120	<b>-81,0</b>	<b>-45,3</b>	<b>-</b>
<b>45-49</b>	531	520	514	483	397	398	344	350	349	<b>-52,3</b>	<b>-45,7</b>	<b>-26,8</b>
<b>50-54</b>	963	973	996	1006	962	937	954	926	783	<b>-</b>	<b>-20,1</b>	<b>-16,7</b>
<b>55-59</b>	1243	1333	1309	1297	1343	1410	1292	1263	1313	<b>-</b>	<b>20,8</b>	<b>-</b>
<b>60-64</b>	755	712	787	1014	1131	1262	1409	1466	1479	<b>-</b>	<b>91,8</b>	<b>49,9</b>
<b>65-69</b>	1151	1274	1059	952	745	673	624	730	848	<b>-47,9</b>	<b>-45,8</b>	<b>-</b>
<b>70-74</b>	626	615	691	761	834	820	866	791	642	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>75-79</b>	437	449	407	412	328	335	360	393	384	<b>61,8</b>	<b>-22,5</b>	<b>-</b>
<b>80-84</b>	136	136	132	160	186	157	190	158	158	<b>108,4</b>	<b>64,6</b>	<b>-</b>
<b>85 и ст.</b>	36	29	44	31	45	47	49	58	59	<b>55,2</b>	<b>110,4</b>	<b>79,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 77**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО гортани (C32)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>459</b>	<b>458</b>	<b>371</b>	<b>478</b>	<b>434</b>	<b>382</b>	<b>397</b>	<b>384</b>	<b>366</b>	<b>367</b>	<b>361</b>	<b>360</b>
<b>20-24</b>	2	3	0	3	1	0	1	2	1	1	1	3
<b>25-29</b>	5	5	2	1	8	5	3	3	1	4	0	1
<b>30-34</b>	5	7	8	11	7	5	9	3	6	3	2	8
<b>35-39</b>	14	9	5	36	16	9	20	9	6	9	5	6
<b>40-44</b>	17	17	18	36	25	16	17	20	15	21	19	20
<b>45-49</b>	26	35	24	46	42	28	38	35	39	30	31	28
<b>50-54</b>	30	29	21	46	33	37	51	40	46	50	56	52
<b>55-59</b>	56	56	43	67	41	37	42	25	29	31	33	54
<b>60-64</b>	83	68	51	37	69	51	47	68	56	45	44	33
<b>65-69</b>	99	80	68	68	61	59	60	55	49	43	49	45
<b>70-74</b>	48	69	69	45	59	64	51	60	49	55	48	35
<b>75-79</b>	45	40	31	37	42	35	31	40	39	50	47	38
<b>80-84</b>	14	28	17	27	20	20	11	10	20	14	16	30
<b>85 и ст.</b>	14	12	12	16	8	13	15	11	7	9	8	5

**Продолжение таблицы 77**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО гортани (C32)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>363</b>	<b>413</b>	<b>357</b>	<b>388</b>	<b>407</b>	<b>452</b>	<b>405</b>	<b>414</b>	<b>419</b>	-	<b>19,4</b>	-
<b>20-24</b>	3	2	5	1	0	1	2	3	1	-	-	-
<b>25-29</b>	0	3	0	6	4	8	6	3	5	-	-	-
<b>30-34</b>	6	5	5	2	7	10	7	6	7	-	-	-
<b>35-39</b>	7	6	7	13	7	9	9	8	12	-	<b>93,6</b>	-
<b>40-44</b>	17	17	11	20	11	17	19	15	16	-	-	-
<b>45-49</b>	29	28	27	17	20	23	15	23	29	<b>-40,9</b>	-	-
<b>50-54</b>	49	53	56	39	43	52	56	62	49	<b>76,0</b>	-	-
<b>55-59</b>	58	59	48	58	77	74	64	56	58	-	-	-
<b>60-64</b>	40	55	36	64	68	89	66	80	85	-	<b>165,1</b>	-
<b>65-69</b>	58	61	39	39	58	43	34	41	48	<b>-50,9</b>	-	-
<b>70-74</b>	28	42	56	56	56	54	68	55	39	-	-	-
<b>75-79</b>	45	48	36	37	23	37	21	20	28	<b>-29,4</b>	<b>-51,6</b>	-
<b>80-84</b>	15	24	25	24	21	24	30	24	24	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	5	9	5	12	11	10	8	17	17	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 78

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО гортани (C32), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,09	0,09	0,06	0,11	0,12	0,07	0,04	0,07	0,06	0,05	0,04	0,06
<b>30-39</b>	0,81	0,68	0,77	0,86	0,69	0,55	0,65	0,46	0,42	0,41	0,32	0,45
<b>40-49</b>	5,93	5,47	5,48	5,44	5,17	4,80	4,82	4,52	3,96	3,70	3,81	3,41
<b>50-59</b>	14,81	15,00	15,08	15,56	15,01	14,54	14,60	13,63	13,78	13,47	13,33	13,38
<b>60-69</b>	20,13	19,56	19,79	20,01	19,60	18,59	18,96	18,38	18,17	17,15	17,33	16,60
<b>70-79</b>	14,54	13,27	13,22	13,68	14,46	14,38	15,15	14,47	14,08	14,40	13,91	13,39
<b>80 и ст.</b>	5,75	5,96	5,13	5,59	5,07	5,11	4,91	4,87	5,21	4,79	5,79	5,99
<b>15-59</b>	4,22	4,06	4,03	4,09	3,87	3,63	3,64	3,41	3,31	3,26	3,33	3,39
<b>«Грубый» показатель</b>	5,40	5,18	5,18	5,31	5,24	5,07	5,25	5,06	5,01	4,90	4,89	4,78
<b>Стандарт. показатель</b>	4,12	3,94	3,92	3,99	3,92	3,74	3,81	3,64	3,59	3,46	3,44	3,34
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,07	0,05	0,07	0,04	-	-	-
<b>30-39</b>	0,34	0,35	0,33	0,37	0,39	0,37	0,33	0,41	0,39	<b>-63,4</b>	-	-
<b>40-49</b>	3,17	3,09	3,12	3,13	2,62	2,79	2,65	2,67	2,70	<b>-60,9</b>	<b>-28,4</b>	-
<b>50-59</b>	12,42	12,39	12,02	11,68	11,60	11,77	10,92	10,58	10,10	<b>-32,5</b>	<b>-22,6</b>	<b>-13,9</b>
<b>60-69</b>	16,28	17,66	16,49	18,19	17,69	18,17	17,65	18,23	17,98	<b>-12,4</b>	<b>8,8</b>	-
<b>70-79</b>	12,36	12,58	12,81	13,33	12,82	12,73	13,15	12,78	11,58	<b>-13,6</b>	-	-
<b>80 и ст.</b>	6,42	6,17	5,97	6,13	6,69	5,91	6,45	5,87	5,86	<b>20,0</b>	-	-
<b>15-59</b>	3,25	3,29	3,28	3,28	3,20	3,29	3,14	3,12	3,03	<b>-26,2</b>	<b>-8,0</b>	<b>-7,1</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	4,55	4,67	4,57	4,74	4,63	4,71	4,68	4,72	4,62	<b>-14,8</b>	-	-
<b>Стандарт. показатель</b>	3,14	3,20	3,12	3,23	3,09	3,13	3,02	3,05	2,95	<b>-28,9</b>	<b>-11,2</b>	<b>-7,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 78**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО гортани (C32), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,10	0,09	0,10	0,18	0,15	0,10	0,04	0,09	0,09	0,06	0,07	0,08
<b>30-39</b>	1,47	1,23	1,43	1,34	1,19	0,98	1,04	0,80	0,71	0,70	0,57	0,76
<b>40-49</b>	11,64	10,68	10,85	10,45	10,05	9,52	9,48	8,87	7,72	7,24	7,53	6,71
<b>50-59</b>	31,51	32,05	32,67	33,06	32,36	31,17	30,83	29,02	29,12	28,39	28,23	28,38
<b>60-69</b>	48,80	47,34	47,93	48,33	46,66	44,38	45,36	43,72	43,68	41,69	42,25	41,05
<b>70-79</b>	49,72	43,94	43,98	45,92	46,64	45,30	47,61	44,16	42,99	43,15	41,19	39,95
<b>80 и ст.</b>	24,43	23,56	21,14	21,18	20,67	19,84	19,78	20,11	20,47	19,01	25,39	24,46
<b>15-59</b>	8,21	7,89	7,93	7,78	7,50	7,07	7,01	6,62	6,41	6,32	6,50	6,60
<b>«Грубый» показатель</b>	10,84	10,38	10,49	10,63	10,54	10,26	10,61	10,24	10,17	9,94	9,98	9,76
<b>Стандарт. показатель</b>	9,70	9,18	9,22	9,21	9,07	8,71	8,85	8,47	8,37	8,06	8,06	7,83
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,09	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,03	0,08	0,03	-	-	-
<b>30-39</b>	0,55	0,59	0,55	0,60	0,65	0,56	0,51	0,69	0,63	<b>-68,1</b>	-	-
<b>40-49</b>	6,23	6,06	6,19	6,22	5,19	5,43	5,19	5,16	5,13	<b>-61,0</b>	<b>-30,2</b>	-
<b>50-59</b>	26,44	26,47	25,79	25,16	24,77	25,08	23,19	22,43	21,41	<b>-32,9</b>	<b>-22,6</b>	<b>-15,2</b>
<b>60-69</b>	40,08	43,36	41,10	44,52	42,33	43,21	41,86	42,83	42,21	<b>-13,3</b>	-	-
<b>70-79</b>	36,36	36,19	36,69	38,24	37,18	36,60	37,89	37,36	34,05	<b>-27,3</b>	<b>-9,3</b>	-
<b>80 и ст.</b>	29,06	25,07	23,80	23,19	25,79	22,02	23,90	20,96	20,78	-	<b>-19,2</b>	-
<b>15-59</b>	6,33	6,43	6,44	6,44	6,25	6,38	6,10	6,06	5,86	<b>-25,8</b>	<b>-8,7</b>	<b>-8,2</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	9,26	9,46	9,33	9,65	9,39	9,50	9,52	9,58	9,34	<b>-13,9</b>	-	-
<b>Стандарт. показатель</b>	7,39	7,47	7,35	7,56	7,24	7,28	7,06	7,09	6,84	<b>-28,9</b>	<b>-12,1</b>	<b>-8,1</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 78**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО гортани (C32), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,07	0,08	0,02	0,04	0,09	0,05	0,04	0,05	0,02	0,05	0,01	0,04
<b>30-39</b>	0,15	0,13	0,11	0,39	0,20	0,12	0,27	0,11	0,12	0,12	0,07	0,14
<b>40-49</b>	0,46	0,52	0,39	0,72	0,57	0,37	0,45	0,44	0,43	0,41	0,40	0,39
<b>50-59</b>	0,92	0,95	0,75	1,37	0,92	0,94	1,20	0,84	0,95	0,98	1,00	1,11
<b>60-69</b>	1,96	1,64	1,35	1,21	1,50	1,26	1,21	1,39	1,20	1,03	1,12	0,98
<b>70-79</b>	1,96	2,26	2,00	1,55	1,79	1,65	1,30	1,53	1,32	1,56	1,44	1,14
<b>80 и ст.</b>	1,09	1,54	1,11	1,68	1,13	1,37	1,10	0,91	1,20	1,03	1,10	1,54
<b>15-59</b>	0,34	0,35	0,26	0,53	0,37	0,30	0,39	0,30	0,31	0,32	0,31	0,35
<b>«Грубый» показатель</b>	0,58	0,58	0,47	0,61	0,56	0,49	0,51	0,50	0,48	0,48	0,47	0,47
<b>Стандарт. показатель</b>	0,38	0,38	0,30	0,42	0,37	0,31	0,34	0,31	0,30	0,29	0,28	0,29
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,03	0,04	0,04	0,06	0,03	0,07	0,07	0,05	0,05	-	-	-
<b>30-39</b>	0,13	0,11	0,12	0,15	0,13	0,18	0,15	0,13	0,17	-	-	-
<b>40-49</b>	0,38	0,38	0,33	0,33	0,29	0,37	0,33	0,38	0,46	<b>-34,7</b>	<b>1,3</b>	<b>44,2</b>
<b>50-59</b>	1,04	1,04	0,94	0,85	1,03	1,08	1,00	0,98	0,89	-	-	-
<b>60-69</b>	1,30	1,58	1,05	1,48	1,83	1,91	1,38	1,60	1,63	-	<b>55,1</b>	-
<b>70-79</b>	1,16	1,44	1,46	1,45	1,20	1,37	1,32	1,12	1,04	<b>-42,4</b>	-	<b>-23,1</b>
<b>80 и ст.</b>	0,83	1,29	1,11	1,25	1,05	1,10	1,15	1,23	1,22	-	-	-
<b>15-59</b>	0,35	0,35	0,32	0,31	0,34	0,40	0,36	0,37	0,37	-	-	-
<b>«Грубый» показатель</b>	0,48	0,54	0,47	0,51	0,53	0,59	0,53	0,54	0,54	-	<b>18,2</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	0,30	0,34	0,28	0,31	0,33	0,36	0,31	0,32	0,32	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 79

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО гортани (C32),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	60,5	60,4	60,5	60,6	61,0	61,3	61,5	61,7	61,8	61,8	61,5	60,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	60,0	60,1	60,0	60,1	60,3	60,6	60,7	60,8	61,1	61,3	61,3	61,2
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,50	0,48	0,48	0,49	0,48	0,46	0,48	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	60,6	60,8	60,4	60,9	60,9	60,8	61,3	61,5	61,6	-	-	1,3
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	61,4	61,6	61,5	61,6	61,7	61,6	61,9	61,9	62,0	3,5	1,2	0,7
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,39	0,41	0,40	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	-24,5	-	-6,6
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	60,3	60,2	60,2	60,6	60,9	61,2	61,5	61,6	61,8	61,7	61,5	60,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	59,8	59,9	59,8	60,2	60,3	60,5	60,7	60,7	61,1	61,2	61,2	61,2
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,21	1,15	1,15	1,17	1,14	1,09	1,12	1,07	1,06	1,02	1,01	0,99

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 79**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО гортани (C32),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
	1993-2013	2003-2013	2008-2013									
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	60,6	60,7	60,3	60,8	60,8	60,7	61,3	61,4	61,6	-	-	1,5
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	61,4	61,5	61,4	61,5	61,7	61,6	61,9	61,9	62,0	3,8	1,3	0,8
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,93	0,95	0,94	0,97	0,94	0,94	0,91	0,92	0,89	-26,1	-8,8	-7,2
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	64,4	65,0	65,9	59,3	63,0	65,0	61,8	63,8	63,3	63,6	63,6	60,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	62,9	63,3	63,8	59,6	61,2	63,0	60,7	62,2	62,1	62,3	62,7	61,5
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
	1993-2013	2003-2013	2008-2013									
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	61,2	63,0	62,6	63,0	62,5	61,7	61,9	61,9	61,9	-3,6	-	-1,6
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	61,1	62,6	62,3	62,8	62,4	61,6	61,9	61,9	61,7	-	-	-1,6
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 80**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО гортани (C32) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>7395</b>	<b>7377</b>	<b>7070</b>	<b>6849</b>	<b>6702</b>	<b>6342</b>	<b>6023</b>	<b>6053</b>	<b>5838</b>	<b>5602</b>	<b>5386</b>	<b>5193</b>
<b>20-24</b>	4	4	4	3	1	4	2	2	3	1	2	1
<b>25-29</b>	3	2	3	4	2	3	3	2	1	4	3	2
<b>30-34</b>	20	19	18	14	11	6	6	9	6	4	4	6
<b>35-39</b>	116	87	81	75	73	54	54	54	33	29	25	29
<b>40-44</b>	358	322	286	284	232	227	189	194	159	152	123	130
<b>45-49</b>	478	547	553	603	583	577	510	532	445	433	407	377
<b>50-54</b>	1007	814	644	565	522	570	638	729	821	832	813	711
<b>55-59</b>	1291	1521	1474	1386	1326	1046	813	690	579	571	625	781
<b>60-64</b>	1608	1438	1358	1198	1253	1196	1239	1376	1264	1169	959	763
<b>65-69</b>	1354	1442	1504	1492	1390	1276	1073	974	992	928	1017	991
<b>70-74</b>	572	617	632	713	800	883	982	948	1012	887	755	695
<b>75-79</b>	326	289	280	287	304	302	308	369	377	429	494	529
<b>80-84</b>	187	191	166	145	132	130	133	112	99	114	103	131
<b>85 и ст.</b>	66	78	63	76	69	66	71	58	45	47	48	43

**Продолжение таблицы 80**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО гортани (C32) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>5081</b>	<b>4793</b>	<b>4623</b>	<b>4556</b>	<b>4622</b>	<b>4526</b>	<b>4375</b>	<b>4334</b>	<b>4270</b>	<b>-45,8</b>	<b>-20,0</b>	<b>-7,5</b>
<b>20-24</b>	2	3	1	2	0	1	1	2	0	-	-	-
<b>25-29</b>	2	1	2	1	2	1	2	5	1	-	-	-
<b>30-34</b>	5	7	8	5	4	5	5	9	6	-	-	-
<b>35-39</b>	22	19	27	24	30	29	27	19	27	<b>-89,6</b>	<b>2,9</b>	-
<b>40-44</b>	112	87	79	56	63	71	65	87	59	<b>-93,0</b>	<b>-52,1</b>	-
<b>45-49</b>	346	324	300	248	228	216	194	190	164	<b>-71,8</b>	<b>-60,4</b>	<b>-31,2</b>
<b>50-54</b>	700	638	583	610	583	520	500	468	500	<b>-32,6</b>	<b>-39,8</b>	<b>-21,5</b>
<b>55-59</b>	900	909	869	869	901	900	884	855	734	<b>-44,8</b>	<b>9,2</b>	-
<b>60-64</b>	641	526	555	628	780	896	954	902	952	<b>-53,3</b>	<b>33,6</b>	<b>43,1</b>
<b>65-69</b>	992	968	886	770	639	538	441	501	567	<b>-67,0</b>	<b>-57,4</b>	-
<b>70-74</b>	663	611	649	659	720	730	699	672	589	-	<b>-6,5</b>	-
<b>75-79</b>	518	493	483	410	394	363	327	357	382	<b>37,6</b>	<b>-36,5</b>	-
<b>80-84</b>	136	157	141	219	221	204	202	181	204	-	<b>82,4</b>	-
<b>85 и ст.</b>	42	46	38	54	56	50	73	84	83	-	<b>125,5</b>	<b>79,9</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 80**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО гортани (C32) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>6978</b>	<b>6999</b>	<b>6751</b>	<b>6522</b>	<b>6407</b>	<b>6037</b>	<b>5743</b>	<b>5770</b>	<b>5595</b>	<b>5355</b>	<b>5136</b>	<b>4955</b>
<b>20-24</b>	2	4	3	3	1	3	2	0	2	1	1	1
<b>25-29</b>	2	2	2	4	1	3	2	1	1	3	3	2
<b>30-34</b>	18	16	18	12	11	3	4	9	6	3	4	6
<b>35-39</b>	111	79	74	68	68	54	50	51	31	28	23	27
<b>40-44</b>	346	314	280	274	229	216	179	189	148	145	117	125
<b>45-49</b>	462	526	543	587	563	552	497	510	432	420	388	358
<b>50-54</b>	975	792	629	546	507	545	624	709	799	799	783	685
<b>55-59</b>	1258	1470	1438	1344	1304	1024	790	674	565	555	610	752
<b>60-64</b>	1552	1388	1325	1167	1225	1168	1213	1339	1232	1137	937	743
<b>65-69</b>	1275	1369	1427	1433	1331	1232	1034	928	962	902	981	965
<b>70-74</b>	512	559	572	656	740	821	918	900	952	851	725	667
<b>75-79</b>	270	257	248	253	260	262	269	323	344	382	437	483
<b>80-84</b>	153	158	138	120	112	105	107	93	83	91	87	108
<b>85 и ст.</b>	42	60	51	53	51	48	52	42	37	38	35	30

**Продолжение таблицы 80**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО гортани (C32) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>4833</b>	<b>4567</b>	<b>4427</b>	<b>4353</b>	<b>4404</b>	<b>4276</b>	<b>4129</b>	<b>4082</b>	<b>4022</b>	<b>-46,0</b>	<b>-21,1</b>	<b>-8,9</b>
<b>20-24</b>	2	2	1	2	0	1	0	0	0	-	-	-
<b>25-29</b>	0	1	2	1	0	1	1	4	0	-	-	-
<b>30-34</b>	5	5	8	5	3	3	2	7	3	-	-	-
<b>35-39</b>	21	14	23	21	24	27	21	16	23	<b>-92,7</b>	-	-
<b>40-44</b>	103	79	74	52	61	68	60	81	51	<b>-94,4</b>	<b>-54,1</b>	-
<b>45-49</b>	331	306	287	238	219	207	185	172	155	<b>-72,8</b>	<b>-61,0</b>	<b>-33,6</b>
<b>50-54</b>	669	612	568	589	558	497	472	440	471	<b>-34,3</b>	<b>-41,1</b>	<b>-23,6</b>
<b>55-59</b>	872	887	840	849	868	851	847	819	703	<b>-45,9</b>	-	<b>-14,0</b>
<b>60-64</b>	618	513	535	608	756	861	916	867	918	<b>-53,8</b>	-	<b>42,3</b>
<b>65-69</b>	962	942	860	748	618	514	422	475	534	<b>-66,4</b>	<b>-58,5</b>	-
<b>70-74</b>	631	593	623	630	685	694	662	639	566	-	-	-
<b>75-79</b>	472	444	453	383	373	332	305	332	361	<b>50,9</b>	<b>-33,4</b>	-
<b>80-84</b>	111	135	121	182	197	179	176	160	172	<b>51,6</b>	<b>91,7</b>	-
<b>85 и ст.</b>	36	31	30	45	41	39	59	70	64	-	<b>154,6</b>	<b>80,9</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 80**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО гортани (C32) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>417</b>	<b>378</b>	<b>319</b>	<b>327</b>	<b>295</b>	<b>305</b>	<b>280</b>	<b>283</b>	<b>243</b>	<b>247</b>	<b>250</b>	<b>238</b>
<b>20-24</b>	2	0	1	0	0	1	0	2	1	0	1	0
<b>25-29</b>	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
<b>30-34</b>	2	3	0	2	0	3	2	0	0	1	0	0
<b>35-39</b>	5	8	7	7	5	0	4	3	2	1	2	2
<b>40-44</b>	12	8	6	10	3	11	10	5	11	7	6	5
<b>45-49</b>	16	21	10	16	20	25	13	22	13	13	19	19
<b>50-54</b>	32	22	15	19	15	25	14	20	22	33	30	26
<b>55-59</b>	33	51	36	42	22	22	23	16	14	16	15	29
<b>60-64</b>	56	50	33	31	28	28	26	37	32	32	22	20
<b>65-69</b>	79	73	77	59	59	44	39	46	30	26	36	26
<b>70-74</b>	60	58	60	57	60	62	64	48	60	36	30	28
<b>75-79</b>	56	32	32	34	44	40	39	46	33	47	57	46
<b>80-84</b>	34	33	28	25	20	25	26	19	16	23	16	23
<b>85 и ст.</b>	24	18	12	23	18	18	19	16	8	9	13	13

**Продолжение таблицы 80**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО гортани (C32) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>248</b>	<b>226</b>	<b>196</b>	<b>203</b>	<b>218</b>	<b>250</b>	<b>246</b>	<b>252</b>	<b>248</b>	<b>-41,0</b>	<b>-</b>	<b>22,1</b>
<b>20-24</b>	0	1	0	0	0	0	1	2	0	-	-	-
<b>25-29</b>	2	0	0	0	2	0	1	1	1	-	-	-
<b>30-34</b>	0	2	0	0	1	2	3	2	3	-	-	-
<b>35-39</b>	1	5	4	3	6	2	6	3	4	-	-	-
<b>40-44</b>	9	8	5	4	2	3	5	6	8	<b>-48,8</b>	-	-
<b>45-49</b>	15	18	13	10	9	9	9	18	9	<b>-40,3</b>	<b>-47,1</b>	-
<b>50-54</b>	31	26	15	21	25	23	28	28	29	-	-	<b>36,7</b>
<b>55-59</b>	28	22	29	20	33	49	37	36	31	-	<b>86,6</b>	<b>24,9</b>
<b>60-64</b>	23	13	20	20	24	35	38	35	34	-	<b>127,7</b>	<b>69,1</b>
<b>65-69</b>	30	26	26	22	21	24	19	26	33	<b>-79,2</b>	-	<b>49,9</b>
<b>70-74</b>	32	18	26	29	35	36	37	33	23	<b>-63,2</b>	-	-
<b>75-79</b>	46	49	30	27	21	31	22	25	21	<b>-39,9</b>	<b>-65,2</b>	-
<b>80-84</b>	25	22	20	37	24	25	26	21	32	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	6	15	8	9	15	11	14	14	19	-	-	<b>76,1</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 81

**Динамика показателей смертности от ЗНО гортани (C32), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,04	0,03	0,04	0,04	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
<b>30-39</b>	0,54	0,42	0,40	0,37	0,36	0,27	0,28	0,30	0,19	0,17	0,15	0,18
<b>40-49</b>	4,61	4,42	3,97	4,01	3,58	3,45	2,95	3,03	2,51	2,43	2,21	2,14
<b>50-59</b>	13,49	14,35	13,66	13,03	12,63	11,33	10,27	9,96	9,67	9,28	8,88	8,55
<b>60-69</b>	19,56	19,40	19,64	18,62	18,24	16,88	15,67	15,95	15,46	14,74	14,43	13,51
<b>70-79</b>	13,98	13,83	13,40	13,75	14,04	14,02	14,38	14,05	14,44	13,52	12,95	13,05
<b>80 и ст.</b>	7,91	8,27	7,00	6,90	6,48	6,50	6,90	5,87	5,07	5,67	5,60	6,17
<b>15-59</b>	3,62	3,63	3,34	3,19	2,99	2,70	2,41	2,40	2,23	2,19	2,12	2,13
<b>«Грубый» показатель</b>	4,99	4,99	4,78	4,65	4,56	4,33	4,13	4,17	4,06	3,92	3,75	3,64
<b>Стандарт. показатель</b>	3,76	3,73	3,56	3,43	3,30	3,10	2,92	2,94	2,81	2,68	2,56	2,47
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,00	-	-	-
<b>30-39</b>	0,14	0,13	0,17	0,14	0,16	0,16	0,15	0,13	0,15	<b>-81,2</b>	-	-
<b>40-49</b>	1,98	1,81	1,72	1,42	1,40	1,40	1,32	1,44	1,17	<b>-80,0</b>	<b>-46,1</b>	-
<b>50-59</b>	8,59	7,93	7,24	7,20	7,10	6,76	6,39	6,07	5,66	<b>-61,5</b>	<b>-35,2</b>	<b>-21,3</b>
<b>60-69</b>	13,26	12,55	12,37	12,29	12,54	12,60	11,54	11,04	11,10	<b>-46,7</b>	<b>-20,3</b>	<b>-12,8</b>
<b>70-79</b>	12,85	12,04	12,19	11,26	11,50	11,17	10,26	10,44	10,29	<b>-27,6</b>	<b>-23,1</b>	<b>-11,0</b>
<b>80 и ст.</b>	5,95	6,33	5,19	7,37	7,05	6,31	6,40	6,06	6,52	-	-	-
<b>15-59</b>	2,17	2,05	1,93	1,88	1,89	1,83	1,78	1,75	1,61	<b>-56,2</b>	<b>-23,6</b>	<b>-13,4</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	3,58	3,36	3,25	3,21	3,26	3,19	3,06	3,03	2,98	<b>-43,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-8,6</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	2,41	2,24	2,15	2,09	2,10	2,06	1,92	1,89	1,83	<b>-53,9</b>	<b>-28,0</b>	<b>-13,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 81**

**Динамика показателей смертности от ЗНО гортани (C32), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,04	0,06	0,05	0,07	0,02	0,06	0,04	0,01	0,03	0,04	0,04	0,03
<b>30-39</b>	1,02	0,76	0,75	0,67	0,68	0,51	0,50	0,57	0,36	0,31	0,28	0,34
<b>40-49</b>	9,11	8,75	8,00	8,02	7,18	6,79	5,89	6,04	4,99	4,86	4,40	4,27
<b>50-59</b>	28,86	30,78	29,68	28,20	27,63	24,46	22,14	21,38	20,70	19,67	19,00	18,30
<b>60-69</b>	48,12	47,37	47,70	45,11	44,02	40,78	37,89	38,36	37,63	36,16	35,52	33,74
<b>70-79</b>	46,23	47,18	45,08	45,72	45,02	43,92	44,25	42,96	43,97	41,02	38,38	38,83
<b>80 и ст.</b>	30,54	33,35	28,75	26,94	26,12	25,09	26,43	22,63	20,30	21,71	23,47	25,19
<b>15-59</b>	7,11	7,13	6,62	6,28	5,95	5,31	4,74	4,73	4,38	4,30	4,18	4,21
<b>«Грубый» показатель</b>	10,04	10,07	9,73	9,43	9,30	8,79	8,40	8,49	8,32	8,02	7,69	7,48
<b>Стандарт. показатель</b>	8,96	8,95	8,58	8,22	7,93	7,41	7,02	7,03	6,78	6,46	6,19	5,99
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,02	0,03	0,02	0,02	0,00	0,02	0,01	0,03	0,00	-	-	-
<b>30-39</b>	0,27	0,19	0,31	0,26	0,26	0,29	0,22	0,22	0,24	<b>-85,1</b>	<b>-20,9</b>	-
<b>40-49</b>	3,93	3,56	3,43	2,84	2,83	2,82	2,61	2,74	2,26	<b>-80,3</b>	<b>-47,4</b>	<b>-16,2</b>
<b>50-59</b>	18,47	17,21	15,76	15,71	15,32	14,41	13,62	12,90	11,99	<b>-61,9</b>	<b>-35,9</b>	<b>-23,4</b>
<b>60-69</b>	33,23	31,77	31,06	30,71	31,00	30,71	27,55	26,18	26,34	<b>-46,5</b>	<b>-24,4</b>	<b>-17,6</b>
<b>70-79</b>	37,73	35,27	35,95	33,03	33,85	32,51	29,89	30,64	30,76	<b>-37,8</b>	<b>-23,6</b>	<b>-10,0</b>
<b>80 и ст.</b>	24,84	25,23	20,42	27,56	26,57	23,53	23,50	22,32	22,60	<b>-21,4</b>	-	<b>-19,5</b>
<b>15-59</b>	4,29	4,06	3,85	3,77	3,74	3,59	3,47	3,39	3,12	<b>-56,4</b>	<b>-25,0</b>	<b>-16,2</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	7,34	6,92	6,73	6,63	6,71	6,51	6,25	6,16	6,05	<b>-42,1</b>	<b>-20,9</b>	<b>-10,1</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	5,86	5,46	5,25	5,14	5,16	5,00	4,62	4,53	4,39	<b>-53,0</b>	<b>-28,6</b>	<b>-16,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 81**

**Динамика показателей смертности от ЗНО гортани (C32), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,03	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>30-39</b>	0,06	0,09	0,06	0,08	0,04	0,03	0,06	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>40-49</b>	0,30	0,29	0,15	0,23	0,20	0,30	0,19	0,22	0,19	0,16	0,20	0,19
<b>50-59</b>	0,70	0,82	0,60	0,74	0,46	0,60	0,48	0,46	0,46	0,60	0,51	0,57
<b>60-69</b>	1,46	1,36	1,25	1,04	1,00	0,82	0,74	0,94	0,71	0,68	0,70	0,58
<b>70-79</b>	2,45	1,87	1,84	1,72	1,84	1,70	1,64	1,44	1,39	1,23	1,31	1,15
<b>80 и ст.</b>	2,26	1,96	1,53	1,88	1,54	1,79	1,91	1,52	1,07	1,43	1,33	1,58
<b>15-59</b>	0,23	0,24	0,16	0,21	0,14	0,19	0,14	0,15	0,14	0,16	0,15	0,16
<b>«Грубый» показатель</b>	0,53	0,48	0,41	0,42	0,38	0,39	0,36	0,37	0,32	0,32	0,32	0,31
<b>Стандарт. показатель</b>	0,32	0,29	0,23	0,24	0,21	0,23	0,19	0,21	0,17	0,18	0,17	0,17
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,02	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,01	-	-	-
<b>30-39</b>	0,01	0,07	0,04	0,03	0,07	0,04	0,08	0,05	0,06	-	-	-
<b>40-49</b>	0,20	0,22	0,16	0,12	0,10	0,11	0,14	0,24	0,17	<b>-43,7</b>	-	-
<b>50-59</b>	0,57	0,44	0,40	0,36	0,50	0,62	0,54	0,53	0,50	<b>-28,6</b>	-	-
<b>60-69</b>	0,70	0,53	0,64	0,60	0,65	0,86	0,79	0,80	0,82	<b>-48,9</b>	<b>38,2</b>	-
<b>70-79</b>	1,24	1,08	0,89	0,87	0,85	1,01	0,87	0,87	0,68	<b>-67,9</b>	<b>-40,1</b>	-
<b>80 и ст.</b>	1,29	1,45	1,03	1,60	1,29	1,16	1,21	1,05	1,52	<b>-39,6</b>	-	-
<b>15-59</b>	0,17	0,17	0,13	0,12	0,16	0,18	0,18	0,20	0,18	-	-	-
<b>«Грубый» показатель</b>	0,33	0,30	0,26	0,27	0,29	0,33	0,32	0,33	0,32	<b>-38,6</b>	-	<b>18,4</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	0,18	0,16	0,14	0,14	0,15	0,17	0,17	0,19	0,17	<b>-45,9</b>	-	<b>27,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 82

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО гортани (C32),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	61,3	61,3	61,7	62,0	62,4	62,9	63,2	63,0	63,4	63,3	63,6	63,6
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	60,9	61,1	61,4	61,6	61,9	62,2	62,6	62,3	62,8	62,8	63,0	63,1
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,46	0,46	0,45	0,43	0,42	0,40	0,38	0,38	0,37	0,35	0,33	0,32
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	63,5	63,9	64,0	63,7	63,2	62,9	62,7	62,9	63,4	2,7	-1,3	-
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	63,2	63,4	63,5	63,8	63,8	63,7	63,7	63,8	64,2	5,0	1,7	-
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,31	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,25	0,25	0,24	-51,1	-26,6	-11,8
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	61,0	61,1	61,5	61,8	62,1	62,6	63,0	62,8	63,3	63,2	63,4	63,5
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	60,5	60,9	61,1	61,3	61,7	62,0	62,3	62,1	62,6	62,6	62,8	62,9
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	1,13	1,13	1,09	1,04	1,01	0,95	0,91	0,90	0,89	0,84	0,79	0,77

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 82**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО гортани (C32),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	63,4	63,7	63,8	63,5	63,1	62,8	62,6	62,9	63,3	<b>3,0</b>	<b>-1,1</b>	-
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	63,0	63,2	63,4	63,7	63,7	63,5	63,6	63,8	64,1	<b>5,4</b>	<b>1,9</b>	-
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,75	0,71	0,68	0,67	0,67	0,65	0,60	0,59	0,58	<b>-51,2</b>	<b>-26,9</b>	<b>-15,3</b>
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	67,8	66,7	68,2	67,9	69,5	69,2	70,6	68,6	69,3	68,4	68,8	68,3
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	66,3	65,8	67,0	66,4	68,0	66,6	68,1	66,6	66,3	66,4	66,6	66,7
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	67,5	68,3	67,3	70,1	66,7	65,4	64,3	64,0	65,6	<b>-4,7</b>	<b>-6,4</b>	-
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	66,0	66,0	66,3	67,9	66,1	66,3	65,1	64,1	65,8	-	-	-
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 83

## Динамика показателей диагностики ЗНО гортани (С32), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	7709	7388	7428	7500	7409	7140	7345	7053	6921	6725	6725
из них доля выявленных активно, %	3,8	3,7	4,1	3,9	3,4	4,1	4,3	4,2	4,0	4,0	4,6
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	88,8	88,7	89,6	90,1	89,6	90,4	90,2	90,2	90,2	91,8	91,4
*I-II ст., %	32,6	31,3	30,1	30,4	31,5	31,5	31,7	31,8	32,9	32,4	32,6
*III ст., %	51,7	51,7	52,7	52,0	50,2	50,4	50,0	50,6	48,5	49,6	48,5
*IV ст., %	13,5	14,5	14,9	15,0	15,9	15,7	15,2	15,3	15,7	15,5	16,6
Показатель одногодичной летальности, %	31,6	32,6	35,1	33,4	35,0	31,9	32,4	32,7	32,1	32,7	31,7
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	6532	6174	6406	6189	6361	6275	6298	6320	6346	6155	
из них доля выявленных активно, %	5,2	5,0	5,2	4,9	4,7	5,3	5,0	6,7	5,9	6,2	
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	91,8	90,8	90,4	92,0	92,2	92,8	93,3	94,9	94,5	94,6	
*I-II ст., %	33,7	34,2	35,3	34,8	34,9	33,9	34,8	36,2	34,2	35,5	
*III ст., %	48,4	47,2	45,5	47,5	47,5	47,6	46,7	45,9	46,8	45,8	
*IV ст., %	16,0	16,8	17,6	16,0	15,9	16,7	17,0	16,0	17,0	16,9	
Показатель одногодичной летальности, %	32,1	28,9	30,2	28,1	28,1	27,1	28,0	25,3	24,2	24,9	

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 84

**Динамика сведений о контингенте больных с ЗНО гортани (C32), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных, состоящих на учете на конец года	41635	41624	41870	41860	41837	40171	40405	40353	40426	40248	40234
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	49,7	51,9	52,7	54,1	52,6	52,8	53,3	53,4	53,6	53,7	54,6
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	56,7	58,6	56,6	56,1	53,4	51,0	51,8	51,5	51,8	51,7	54,7
Показатель распространенности на 100 000 населения	28,1	28,1	28,3	28,4	28,5	27,4	27,7	27,8	28,1	28,2	28,1
Индекс накопления контингента	5,4	5,6	5,6	5,6	5,7	5,6	5,5	5,7	5,8	6,0	6,0
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных, состоящих на учете на конец года	40078	39982	40435	40085	40525	40729	41375	41697	41498	42229	
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	54,0	55,0	54,8	55,0	55,0	55,4	55,0	57,0	53,7	54,7	
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	53,6	54,5	54,8	54,7	55,4	56,3	57,0	58,8	55,6	57,0	
Показатель распространенности на 100 000 населения	28,1	28,2	28,4	28,2	28,6	28,7	29,2	29,2	29,0	29,4	
Индекс накопления контингента	6,1	6,5	6,3	6,5	6,4	6,5	6,6	6,6	6,5	6,9	

**Таблица 85**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>70192</b>	<b>69059</b>	<b>66052</b>	<b>65631</b>	<b>65660</b>	<b>64727</b>	<b>63092</b>	<b>63125</b>	<b>62145</b>	<b>60337</b>	<b>58812</b>	<b>59057</b>
<b>20-24</b>	61	35	25	48	75	30	37	40	29	43	50	36
<b>25-29</b>	143	89	66	95	140	68	75	78	117	84	64	74
<b>30-34</b>	362	236	229	214	361	195	183	151	207	189	147	140
<b>35-39</b>	736	585	661	756	705	574	544	513	498	488	396	360
<b>40-44</b>	1917	1896	1815	1973	1859	1609	1601	1668	1674	1551	1297	1354
<b>45-49</b>	2718	3289	3502	3932	3845	3826	3696	3701	3689	3417	3377	3376
<b>50-54</b>	6931	5645	4595	4144	4238	4650	5273	6000	6301	6353	6475	6396
<b>55-59</b>	11649	12611	11736	11685	10353	8681	6952	5790	5261	5360	6073	7235
<b>60-64</b>	14960	13473	11815	11700	11618	12545	13177	13431	12989	11359	9524	7750
<b>65-69</b>	15422	16132	15954	15214	14549	13507	12112	11135	10927	11238	11486	12584
<b>70-74</b>	7233	7809	8257	9034	10733	11728	12024	12520	11722	10882	10121	9199
<b>75-79</b>	4895	4169	4242	4024	4209	4472	4702	5379	6036	6659	7020	7427
<b>80-84</b>	2299	2317	2308	2054	2061	1962	1849	1787	1834	1856	1962	2250
<b>85 и ст.</b>	834	744	819	727	866	843	844	896	837	839	794	861

**Продолжение таблицы 85**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>57635</b>	<b>57219</b>	<b>57175</b>	<b>56767</b>	<b>57052</b>	<b>56985</b>	<b>56030</b>	<b>55475</b>	<b>56051</b>	<b>-20,8</b>	<b>-5,2</b>	<b>-2,3</b>
<b>20-24</b>	47	28	33	27	36	20	27	23	25	<b>-48,3</b>	<b>-51,1</b>	-
<b>25-29</b>	64	57	65	70	63	70	89	63	76	<b>-39,6</b>	-	-
<b>30-34</b>	148	149	132	139	141	159	151	148	156	<b>-56,8</b>	-	-
<b>35-39</b>	352	379	324	358	327	337	344	366	331	<b>-61,5</b>	-	-
<b>40-44</b>	1188	1060	981	898	847	906	832	819	866	<b>-64,1</b>	<b>-40,8</b>	-
<b>45-49</b>	3100	3194	3136	2979	2775	2551	2255	2101	2053	<b>-35,2</b>	<b>-40,1</b>	<b>-32,6</b>
<b>50-54</b>	6038	6120	6189	5989	6118	5947	5985	5663	5455	-	<b>-12,1</b>	<b>-9,2</b>
<b>55-59</b>	8110	8808	8966	9243	9284	9487	9221	8993	9247	-	<b>35,2</b>	-
<b>60-64</b>	6368	5778	6321	7414	8920	10170	10567	11134	11517	<b>-36,7</b>	<b>68,5</b>	<b>51,9</b>
<b>65-69</b>	12493	12285	10965	9254	7718	6558	6012	6367	7491	<b>-58,0</b>	<b>-53,9</b>	-
<b>70-74</b>	8749	8694	9060	9657	10349	10404	10057	9256	7843	-	-	-
<b>75-79</b>	7630	7050	6933	6299	5742	5591	5584	5792	6315	<b>49,6</b>	<b>-24,6</b>	-
<b>80-84</b>	2456	2735	3194	3421	3647	3598	3491	3365	3166	<b>101,4</b>	<b>64,0</b>	-
<b>85 и ст.</b>	877	861	865	1006	1072	1170	1395	1371	1486	<b>87,6</b>	<b>106,1</b>	<b>53,1</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 85**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>59295</b>	<b>58489</b>	<b>55948</b>	<b>55278</b>	<b>55207</b>	<b>54483</b>	<b>53363</b>	<b>52961</b>	<b>51962</b>	<b>50455</b>	<b>49213</b>	<b>48999</b>
<b>20-24</b>	30	19	18	32	56	19	21	28	11	17	28	22
<b>25-29</b>	82	52	42	55	90	41	45	39	67	40	30	39
<b>30-34</b>	245	167	159	147	281	146	121	105	146	122	97	89
<b>35-39</b>	595	476	536	506	565	465	431	392	369	377	276	279
<b>40-44</b>	1654	1655	1595	1658	1593	1349	1330	1381	1367	1252	1076	1115
<b>45-49</b>	2381	2928	3128	3457	3336	3404	3285	3187	3219	2949	2909	2897
<b>50-54</b>	6289	5153	4131	3729	3805	4132	4715	5369	5588	5642	5745	5594
<b>55-59</b>	10676	11513	10726	10603	9390	7862	6299	5196	4674	4739	5400	6369
<b>60-64</b>	13373	11987	10527	10459	10319	11286	11826	12036	11499	10099	8434	6766
<b>65-69</b>	13120	13888	13749	13172	12568	11655	10535	9673	9445	9820	10015	10877
<b>70-74</b>	5465	5912	6378	7019	8481	9390	9854	10171	9611	8892	8342	7552
<b>75-79</b>	3413	2877	3017	2791	2889	3022	3241	3702	4306	4896	5170	5557
<b>80-84</b>	1487	1437	1449	1246	1290	1206	1161	1158	1162	1128	1213	1361
<b>85 и ст.</b>	465	406	475	384	513	478	477	495	481	469	464	472

**Продолжение таблицы 85**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>47889</b>	<b>47388</b>	<b>47196</b>	<b>46520</b>	<b>46661</b>	<b>46407</b>	<b>45442</b>	<b>45120</b>	<b>45076</b>	<b>-24,6</b>	<b>-8,5</b>	<b>-3,9</b>
<b>20-24</b>	26	19	16	15	24	10	9	15	13	<b>-56,3</b>	<b>-57,1</b>	-
<b>25-29</b>	44	33	37	33	40	42	55	43	43	<b>-39,1</b>	<b>37,0</b>	-
<b>30-34</b>	91	95	78	85	77	99	93	90	89	<b>-67,2</b>	-	-
<b>35-39</b>	256	263	242	249	223	223	233	245	196	<b>-70,2</b>	<b>-22,9</b>	-
<b>40-44</b>	976	870	785	710	647	704	633	606	649	<b>-69,5</b>	<b>-47,7</b>	-
<b>45-49</b>	2630	2721	2652	2498	2273	2122	1824	1723	1661	<b>-40,5</b>	<b>-43,8</b>	<b>-34,5</b>
<b>50-54</b>	5313	5369	5386	5175	5274	5104	5060	4799	4573	-	<b>-16,5</b>	<b>-11,9</b>
<b>55-59</b>	7182	7723	7863	8048	8096	8259	8009	7842	7997	-	<b>32,2</b>	-
<b>60-64</b>	5566	5024	5458	6421	7714	8693	9082	9573	9858	<b>-40,1</b>	<b>62,7</b>	<b>50,3</b>
<b>65-69</b>	10845	10605	9438	7887	6573	5552	5083	5394	6263	<b>-58,6</b>	<b>-55,6</b>	-
<b>70-74</b>	7161	7175	7495	7916	8515	8483	8197	7497	6200	-	-	-
<b>75-79</b>	5743	5317	5234	4705	4299	4192	4180	4342	4730	<b>66,0</b>	<b>-24,2</b>	-
<b>80-84</b>	1547	1704	2049	2264	2374	2332	2238	2200	2027	<b>112,7</b>	<b>72,8</b>	<b>-10,8</b>
<b>85 и ст.</b>	500	455	454	506	523	582	735	741	763	<b>63,8</b>	<b>85,4</b>	<b>64,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 85**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34))  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>10897</b>	<b>10570</b>	<b>10104</b>	<b>10353</b>	<b>10453</b>	<b>10244</b>	<b>9729</b>	<b>10164</b>	<b>10183</b>	<b>9882</b>	<b>9599</b>	<b>10058</b>
<b>20-24</b>	31	16	7	16	19	11	16	12	18	26	22	14
<b>25-29</b>	61	37	24	40	50	27	30	39	50	44	34	35
<b>30-34</b>	117	69	70	67	80	49	62	46	61	67	50	51
<b>35-39</b>	141	109	125	250	140	109	113	121	129	111	120	81
<b>40-44</b>	263	241	220	315	266	260	271	287	307	299	221	239
<b>45-49</b>	337	361	374	475	509	422	411	514	470	468	468	479
<b>50-54</b>	642	492	464	415	433	518	558	631	713	711	730	802
<b>55-59</b>	973	1098	1010	1082	963	819	653	594	587	621	673	866
<b>60-64</b>	1587	1486	1288	1241	1299	1259	1351	1395	1490	1260	1090	984
<b>65-69</b>	2302	2244	2205	2042	1981	1852	1577	1462	1482	1418	1471	1707
<b>70-74</b>	1768	1897	1879	2015	2252	2338	2170	2349	2111	1990	1779	1647
<b>75-79</b>	1482	1292	1225	1233	1320	1450	1461	1677	1730	1763	1850	1870
<b>80-84</b>	812	880	859	808	771	756	688	629	672	728	749	889
<b>85 и ст.</b>	369	338	344	343	353	365	367	401	356	370	330	389

**Продолжение таблицы 85**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>9746</b>	<b>9831</b>	<b>9979</b>	<b>10247</b>	<b>10391</b>	<b>10578</b>	<b>10588</b>	<b>10355</b>	<b>10975</b>	-	<b>11,9</b>	-
<b>20-24</b>	21	9	17	12	12	10	18	8	12	-	-	-
<b>25-29</b>	20	24	28	37	23	28	34	20	33	<b>-40,2</b>	-	-
<b>30-34</b>	57	54	54	54	64	60	58	58	67	<b>-29,7</b>	<b>25,0</b>	-
<b>35-39</b>	96	116	82	109	104	114	111	121	135	-	-	<b>25,32</b>
<b>40-44</b>	212	190	196	188	200	202	199	213	217	<b>-30,0</b>	-	<b>13,78</b>
<b>45-49</b>	470	473	484	481	502	429	431	378	392	-	<b>-17,6</b>	<b>-23,04</b>
<b>50-54</b>	725	751	803	814	844	843	925	864	882	<b>102,9</b>	<b>23,0</b>	-
<b>55-59</b>	928	1085	1103	1195	1188	1228	1212	1151	1250	<b>44,1</b>	<b>58,4</b>	-
<b>60-64</b>	802	754	863	993	1206	1477	1485	1561	1659	-	<b>113,4</b>	<b>61,7</b>
<b>65-69</b>	1648	1680	1527	1367	1145	1006	929	973	1228	<b>-54,1</b>	<b>-42,1</b>	-
<b>70-74</b>	1588	1519	1565	1741	1834	1921	1860	1759	1643	<b>-18,7</b>	-	-
<b>75-79</b>	1887	1733	1699	1594	1443	1399	1404	1450	1585	-	<b>-25,8</b>	-
<b>80-84</b>	909	1031	1145	1157	1273	1266	1253	1165	1139	<b>83,7</b>	<b>49,8</b>	-
<b>85 и ст.</b>	377	406	411	500	549	588	660	630	723	<b>122,2</b>	<b>133,4</b>	<b>42,05</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 86

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	1,04	0,63	0,46	0,72	1,06	0,48	0,54	0,56	0,69	0,60	0,51	0,48
<b>30-39</b>	4,35	3,28	3,63	4,05	4,58	3,42	3,34	3,16	3,46	3,41	2,76	2,56
<b>40-49</b>	25,55	26,35	25,15	26,68	25,07	23,29	22,34	22,42	22,28	20,62	19,51	20,00
<b>50-59</b>	109,05	112,20	105,31	105,72	99,76	93,49	86,56	82,76	79,90	77,50	77,45	78,14
<b>60-69</b>	200,59	199,43	190,56	186,28	180,61	177,89	171,43	166,76	163,88	158,88	153,39	156,60
<b>70-79</b>	188,77	182,87	183,60	179,54	190,08	191,60	186,47	190,88	184,57	180,23	177,70	177,31
<b>80 и ст.</b>	97,91	94,05	95,55	86,86	94,43	93,03	91,13	92,67	94,07	94,96	102,25	110,28
<b>15-59</b>	27,06	26,74	24,68	24,87	23,51	21,36	19,96	19,49	19,33	18,90	18,90	19,85
<b>«Грубый» показатель</b>	47,38	46,67	44,70	44,53	44,69	44,17	43,23	43,48	43,23	42,22	41,00	41,39
<b>Стандарт. показатель</b>	34,25	33,63	31,99	31,71	31,26	30,41	29,46	29,30	28,87	27,86	26,98	27,00
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,48	0,36	0,41	0,40	0,40	0,37	0,48	0,36	0,44	<b>-56,1</b>	-	-
<b>30-39</b>	2,56	2,67	2,27	2,44	2,26	2,38	2,32	2,37	2,21	<b>-50,0</b>	<b>-16,4</b>	
<b>40-49</b>	18,54	18,72	18,63	18,10	17,45	16,91	15,76	15,18	15,34	<b>-43,8</b>	<b>-23,8</b>	<b>-17,0</b>
<b>50-59</b>	75,95	76,50	75,61	74,13	73,68	73,46	70,16	67,24	67,38	<b>-40,3</b>	<b>-13,6</b>	<b>-10,6</b>
<b>60-69</b>	153,19	151,73	148,41	146,51	147,04	147,04	137,18	137,70	138,94	<b>-31,8</b>	<b>-11,9</b>	<b>-7,3</b>
<b>70-79</b>	178,23	171,68	172,15	168,02	166,17	163,45	156,37	152,71	149,97	<b>-18,4</b>	<b>-16,2</b>	<b>-11,5</b>
<b>80 и ст.</b>	111,40	112,05	117,59	119,47	120,06	118,45	113,71	108,22	105,67	<b>31,3</b>	-	<b>-12,6</b>
<b>15-59</b>	19,80	20,39	20,48	20,45	20,47	20,45	20,00	19,40	19,62	<b>-24,1</b>	-	<b>-5,4</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	40,60	40,16	40,23	39,99	40,20	40,15	39,19	38,74	39,06	<b>-17,1</b>	<b>-5,4</b>	<b>-3,5</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	26,22	25,93	25,73	25,42	25,33	25,18	24,04	23,55	23,54	<b>-31,0</b>	<b>-13,1</b>	<b>-8,8</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 86**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	1,11	0,71	0,59	0,85	1,41	0,57	0,62	0,63	0,73	0,53	0,52	0,53
<b>30-39</b>	6,65	5,14	5,67	5,46	7,28	5,43	5,08	4,70	5,02	4,98	3,82	3,81
<b>40-49</b>	45,48	47,75	45,92	47,62	44,70	42,05	40,20	39,46	39,44	36,15	34,75	35,50
<b>50-59</b>	219,23	226,75	213,32	213,84	201,34	187,00	172,47	163,33	155,71	150,78	152,01	152,34
<b>60-69</b>	450,99	444,60	420,79	409,96	394,17	389,78	377,10	367,32	359,20	353,20	341,70	348,54
<b>70-79</b>	524,90	508,13	516,50	493,39	511,83	503,35	488,21	487,36	472,17	458,73	446,27	442,67
<b>80 и ст.</b>	305,73	281,91	292,63	253,81	288,87	276,13	272,29	277,07	277,96	268,72	322,58	334,58
<b>15-59</b>	49,17	48,92	45,08	44,70	42,36	38,54	35,92	34,68	34,15	33,32	33,74	35,30
<b>«Грубый» показатель</b>	85,28	84,18	80,63	79,93	80,10	79,29	78,01	77,89	77,26	75,58	73,76	73,94
<b>Стандарт. показатель</b>	76,61	74,88	71,49	69,69	68,70	66,87	64,96	64,17	62,86	60,73	59,21	58,93
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,60	0,44	0,44	0,39	0,52	0,42	0,53	0,48	0,48	<b>-57,2</b>	-	-
<b>30-39</b>	3,59	3,66	3,23	3,32	2,94	3,13	3,10	3,14	2,62	<b>-59,7</b>	<b>-26,9</b>	-
<b>40-49</b>	32,68	33,18	32,67	31,45	29,50	28,98	26,22	25,26	25,29	<b>-48,0</b>	<b>-29,7</b>	<b>-20,8</b>
<b>50-59</b>	149,76	150,29	148,26	144,48	143,65	142,82	134,92	129,52	128,37	<b>-43,7</b>	<b>-15,8</b>	<b>-12,6</b>
<b>60-69</b>	345,11	341,26	331,63	324,00	322,36	318,11	291,69	291,93	292,41	<b>-33,9</b>	<b>-17,5</b>	<b>-11,9</b>
<b>70-79</b>	441,39	424,90	425,30	411,48	409,96	401,66	382,51	373,56	362,73	<b>-29,8</b>	<b>-18,5</b>	<b>-12,6</b>
<b>80 и ст.</b>	345,85	328,08	338,40	336,32	323,45	314,50	297,30	285,38	267,13	-	<b>-17,2</b>	<b>-19,8</b>
<b>15-59</b>	35,38	36,35	36,41	36,06	35,98	35,94	34,81	33,85	33,81	<b>-27,7</b>	-	<b>-7,3</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	72,75	71,79	71,74	70,83	71,09	70,70	68,73	68,09	67,83	<b>-19,5</b>	<b>-8,3</b>	<b>-5,2</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	57,62	56,55	55,89	54,87	54,61	53,97	51,11	49,96	49,15	<b>-34,4</b>	<b>-16,9</b>	<b>-11,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 86**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО трахеи, бронхов, легкого (С33,34), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,96	0,55	0,32	0,58	0,70	0,38	0,45	0,49	0,65	0,66	0,51	0,43
<b>30-39</b>	2,05	1,43	1,59	2,65	1,89	1,40	1,61	1,59	1,88	1,81	1,71	1,34
<b>40-49</b>	6,47	5,97	5,47	6,94	6,61	5,67	5,57	6,48	6,24	6,15	5,52	5,81
<b>50-59</b>	17,37	17,82	17,25	18,10	17,29	17,04	15,65	15,75	16,50	16,19	15,82	17,39
<b>60-69</b>	41,94	41,33	39,68	37,81	37,78	35,52	33,19	32,39	33,92	31,20	30,86	33,97
<b>70-79</b>	68,66	66,16	62,22	61,46	63,34	63,25	57,75	61,65	57,55	55,79	54,83	54,82
<b>80 и ст.</b>	46,11	46,83	46,00	44,97	45,41	46,60	44,83	44,81	45,72	48,94	49,60	56,22
<b>15-59</b>	5,60	5,24	4,94	5,71	5,29	4,74	4,52	4,80	5,01	4,99	4,80	5,23
<b>«Грубый» показатель</b>	13,86	13,47	12,89	13,24	13,40	13,16	12,55	13,17	13,31	12,98	12,51	13,16
<b>Стандарт. показатель</b>	8,15	7,78	7,39	7,61	7,56	7,20	6,82	7,07	7,18	6,90	6,63	6,95
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,36	0,28	0,38	0,41	0,29	0,31	0,44	0,24	0,40	<b>-53,5</b>	-	-
<b>30-39</b>	1,55	1,70	1,34	1,58	1,60	1,65	1,56	1,63	1,81	-	-	-
<b>40-49</b>	5,64	5,57	5,87	5,96	6,46	5,90	6,17	5,90	6,16	-	<b>10,4</b>	-
<b>50-59</b>	16,07	17,00	17,16	17,63	17,52	17,77	17,83	16,74	17,73	-	<b>7,8</b>	-
<b>60-69</b>	32,42	33,23	33,40	33,90	34,16	35,99	33,39	33,42	35,35	<b>-15,5</b>	<b>8,3</b>	-
<b>70-79</b>	55,46	52,19	51,83	51,87	49,97	50,07	48,23	48,00	50,22	<b>-28,7</b>	<b>-12,8</b>	-
<b>80 и ст.</b>	53,58	56,33	57,37	57,50	60,04	59,83	58,03	53,65	55,45	<b>36,5</b>	-	-
<b>15-59</b>	5,11	5,40	5,54	5,81	5,95	5,93	6,13	5,82	6,26	<b>20,6</b>	<b>26,2</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	12,80	12,85	13,07	13,43	13,62	13,87	13,78	13,46	14,24	-	<b>11,1</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	6,68	6,74	6,80	6,96	7,01	7,13	6,99	6,76	7,17	<b>-11,0</b>	<b>5,2</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 87

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	63,5	63,8	64,4	64,3	64,8	65,1	65,0	65,1	65,1	65,6	65,9	66,1
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	63,1	63,3	63,6	63,4	63,7	64,2	64,3	64,4	64,4	64,6	64,7	64,8
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	4,33	4,29	4,07	4,02	4,00	3,92	3,81	3,79	3,71	3,58	3,45	3,44
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	66,4	66,2	66,1	65,7	65,0	64,4	64,3	64,3	64,3	-	-3,6	-2,1
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	65,0	64,9	65,0	65,1	65,0	65,0	65,1	65,1	65,1	3,2	0,5	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	3,36	3,33	3,29	3,25	3,24	3,20	3,05	3,01	3,00	-31,0	-13,5	-9,0
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	62,9	63,0	63,6	63,6	64,1	64,3	64,4	64,5	64,6	65,0	65,3	65,6
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	62,5	62,6	62,9	62,8	63,1	63,5	63,7	63,8	63,9	64,1	64,2	64,3
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	9,59	9,48	8,99	8,80	8,68	8,50	8,25	8,12	7,89	7,64	7,39	7,35

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 87**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	65,9	65,7	65,6	65,0	64,3	63,8	63,7	63,8	63,7	-	-3,7	-1,8
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	64,5	64,3	64,5	64,5	64,5	64,4	64,5	64,6	64,5	3,4	0,4	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	7,21	7,16	7,06	6,94	6,94	6,81	6,45	6,33	6,24	-34,2	-15,6	-11,4
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	67,8	68,0	68,3	68,1	68,7	69,4	69,4	69,9	69,3	69,7	69,7	69,3
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	66,6	67,0	67,2	66,3	66,8	67,6	67,4	67,3	67,0	67,2	67,4	67,5
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,02	0,99	0,93	0,94	0,93	0,89	0,84	0,87	0,87	0,84	0,80	0,83
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	69,7	69,3	69,4	69,5	69,6	69,4	69,4	69,1	68,4	1,4	-1,0	-1,5
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	67,7	67,6	67,7	67,6	67,6	67,6	67,5	67,6	67,5	1,3	-	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,81	0,81	0,81	0,83	0,83	0,85	0,82	0,81	0,86	-16,6	-	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 88**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>66655</b>	<b>65915</b>	<b>63584</b>	<b>61179</b>	<b>61364</b>	<b>60201</b>	<b>59301</b>	<b>58872</b>	<b>57018</b>	<b>56245</b>	<b>54181</b>	<b>53646</b>
<b>20-24</b>	27	30	38	32	30	22	23	35	38	29	30	28
<b>25-29</b>	62	65	70	75	61	61	54	46	60	56	46	67
<b>30-34</b>	192	200	170	170	141	146	134	115	94	120	109	93
<b>35-39</b>	618	581	553	492	463	462	455	434	359	361	339	252
<b>40-44</b>	1687	1608	1671	1567	1563	1401	1333	1258	1272	1208	1130	1119
<b>45-49</b>	2267	2739	3050	3243	3264	3397	3234	3127	3106	2957	2894	2841
<b>50-54</b>	6795	5420	4257	3493	3184	3723	4351	5079	5413	5504	5715	5402
<b>55-59</b>	10767	11761	11578	10939	10275	8691	6881	5739	4668	4686	4946	6215
<b>60-64</b>	15087	13563	11836	10954	11135	11537	12394	12831	12257	11244	9324	7357
<b>65-69</b>	14849	15543	15950	15314	14709	13207	11866	10550	10182	10465	10671	11603
<b>70-74</b>	6586	7117	7449	8192	9795	10819	11553	12177	11514	10871	9762	8867
<b>75-79</b>	4417	4110	3882	3783	3920	3982	4280	4853	5475	6216	6629	7018
<b>80-84</b>	2446	2349	2257	2120	1966	1867	1855	1682	1710	1709	1754	1970
<b>85 и ст.</b>	820	802	797	780	837	861	868	914	852	805	783	796

**Продолжение таблицы 88**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>52695</b>	<b>51902</b>	<b>51912</b>	<b>51364</b>	<b>51433</b>	<b>51322</b>	<b>50440</b>	<b>49908</b>	<b>50068</b>	<b>-26,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-3,3</b>
<b>20-24</b>	30	19	20	19	16	28	20	12	19	<b>-45,1</b>	<b>-42,8</b>	-
<b>25-29</b>	51	59	49	44	48	47	65	48	43	<b>-28,7</b>	-	-
<b>30-34</b>	104	101	106	99	95	102	111	130	119	<b>-46,4</b>	-	<b>33,6</b>
<b>35-39</b>	253	259	270	282	239	254	287	240	257	<b>-66,1</b>	-	-
<b>40-44</b>	971	869	782	710	680	696	651	641	624	<b>-68,9</b>	<b>-48,4</b>	<b>-11,8</b>
<b>45-49</b>	2657	2582	2624	2526	2264	2087	1819	1681	1641	<b>-38,3</b>	<b>-43,8</b>	<b>-36,0</b>
<b>50-54</b>	5233	5199	5095	4990	5097	4983	4729	4596	4437	-	<b>-18,7</b>	<b>-12,4</b>
<b>55-59</b>	6996	7536	7740	8058	7911	8104	7997	7635	7840	<b>-31,9</b>	<b>36,2</b>	-
<b>60-64</b>	5997	5078	5453	6092	7469	8814	9292	9692	10040	<b>-47,0</b>	-	<b>61,3</b>
<b>65-69</b>	11977	11553	10864	8952	7406	6161	5463	5652	6559	<b>-61,4</b>	<b>-55,9</b>	-
<b>70-74</b>	8204	8023	8228	8912	9825	9900	9617	9008	7713	<b>4,0</b>	-	-
<b>75-79</b>	7124	7168	6897	6349	5730	5384	5430	5666	6034	<b>61,9</b>	<b>-22,9</b>	-
<b>80-84</b>	2240	2602	2961	3383	3551	3554	3561	3457	3154	<b>101,0</b>	<b>90,2</b>	-
<b>85 и ст.</b>	844	837	804	935	1087	1196	1387	1446	1579	<b>89,6</b>	<b>139,0</b>	<b>72,3</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 88**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>56657</b>	<b>56043</b>	<b>54195</b>	<b>52128</b>	<b>52133</b>	<b>51254</b>	<b>50655</b>	<b>50087</b>	<b>48227</b>	<b>47620</b>	<b>45943</b>	<b>45196</b>
<b>20-24</b>	18	19	28	18	20	13	17	21	21	16	18	23
<b>25-29</b>	38	46	44	51	41	38	35	27	45	39	25	40
<b>30-34</b>	133	152	117	125	101	106	96	75	62	83	76	60
<b>35-39</b>	511	481	453	395	372	366	364	344	272	286	248	192
<b>40-44</b>	1489	1405	1466	1372	1330	1210	1120	1078	1061	999	935	931
<b>45-49</b>	2021	2469	2713	2911	2880	3032	2871	2766	2768	2622	2561	2480
<b>50-54</b>	6256	4922	3911	3159	2887	3353	3935	4624	4854	4945	5089	4804
<b>55-59</b>	9901	10758	10642	9982	9374	7911	6271	5250	4223	4197	4427	5521
<b>60-64</b>	13598	12183	10621	9898	10022	10446	11282	11658	10979	10106	8394	6549
<b>65-69</b>	12628	13406	13915	13452	12840	11604	10382	9287	8946	9269	9483	10201
<b>70-74</b>	4953	5409	5710	6365	7834	8765	9587	10084	9540	9023	8188	7396
<b>75-79</b>	3073	2859	2747	2652	2722	2780	3015	3290	3899	4552	4985	5381
<b>80-84</b>	1572	1472	1389	1304	1232	1134	1178	1070	1089	1039	1049	1174
<b>85 и ст.</b>	448	444	420	430	465	484	484	489	454	436	427	434

**Продолжение таблицы 88**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>44355</b>	<b>43579</b>	<b>43460</b>	<b>42748</b>	<b>42706</b>	<b>42583</b>	<b>41767</b>	<b>41066</b>	<b>41123</b>	<b>-28,6</b>	<b>-10,1</b>	<b>-4,6</b>
<b>20-24</b>	15	12	12	12	9	17	9	8	14	<b>-49,9</b>	<b>-45,7</b>	-
<b>25-29</b>	37	37	32	27	37	31	36	33	29	<b>-29,3</b>	-	-
<b>30-34</b>	69	66	77	70	56	76	74	91	72	<b>-52,0</b>	-	-
<b>35-39</b>	189	198	206	217	171	174	201	171	182	<b>-72,7</b>	<b>-19,2</b>	
<b>40-44</b>	814	731	650	576	551	536	520	501	489	<b>-73,0</b>	<b>-52,4</b>	<b>-14,8</b>
<b>45-49</b>	2306	2255	2260	2155	1906	1794	1529	1410	1358	<b>-42,2</b>	<b>-46,9</b>	<b>-37,5</b>
<b>50-54</b>	4662	4617	4525	4397	4500	4382	4132	3949	3851	<b>-3,4</b>	<b>-21,1</b>	<b>-14,4</b>
<b>55-59</b>	6264	6692	6832	7133	7001	7190	7106	6741	6895	<b>-35,5</b>	<b>34,7</b>	-
<b>60-64</b>	5332	4541	4807	5367	6551	7728	8132	8466	8820	<b>-49,1</b>	-	<b>60,8</b>
<b>65-69</b>	10545	10057	9524	7767	6434	5319	4704	4872	5593	<b>-61,4</b>	<b>-57,4</b>	-
<b>70-74</b>	6842	6804	6885	7497	8232	8245	8002	7437	6264	-	-	-
<b>75-79</b>	5416	5502	5350	4837	4333	4141	4229	4385	4642	<b>85,2</b>	<b>-21,5</b>	-
<b>80-84</b>	1394	1635	1874	2229	2370	2382	2388	2239	2093	<b>121,0</b>	<b>112,2</b>	-
<b>85 и ст.</b>	463	416	412	456	543	563	700	760	816	<b>66,5</b>	<b>122,6</b>	<b>88,5</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 88**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>9998</b>	<b>9872</b>	<b>9389</b>	<b>9051</b>	<b>9231</b>	<b>8947</b>	<b>8646</b>	<b>8785</b>	<b>8791</b>	<b>8625</b>	<b>8238</b>	<b>8450</b>
<b>20-24</b>	9	11	10	14	10	9	6	14	17	13	12	5
<b>25-29</b>	24	19	26	24	20	23	19	19	15	17	21	27
<b>30-34</b>	59	48	53	45	40	40	38	40	32	37	33	33
<b>35-39</b>	107	100	100	97	91	96	91	90	87	75	91	60
<b>40-44</b>	198	203	205	195	233	191	213	180	211	209	195	188
<b>45-49</b>	246	270	337	332	384	365	363	361	338	335	333	361
<b>50-54</b>	539	498	346	334	297	370	416	455	559	559	626	598
<b>55-59</b>	866	1003	936	957	901	780	610	489	445	489	519	694
<b>60-64</b>	1489	1380	1215	1056	1113	1091	1112	1173	1278	1138	930	808
<b>65-69</b>	2221	2137	2035	1862	1869	1603	1484	1263	1236	1196	1188	1402
<b>70-74</b>	1633	1708	1739	1827	1961	2054	1966	2093	1974	1848	1574	1471
<b>75-79</b>	1344	1251	1135	1131	1198	1202	1265	1563	1576	1664	1644	1637
<b>80-84</b>	874	877	868	816	734	733	677	612	621	670	705	796
<b>85 и ст.</b>	372	358	377	350	372	377	384	425	398	369	356	362

**Продолжение таблицы 88**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>8340</b>	<b>8323</b>	<b>8452</b>	<b>8616</b>	<b>8727</b>	<b>8739</b>	<b>8673</b>	<b>8842</b>	<b>8945</b>	<b>-9,9</b>	<b>8,0</b>	<b>3,2</b>
<b>20-24</b>	15	7	8	7	7	11	11	4	5	-	-	-
<b>25-29</b>	14	22	17	17	11	16	29	15	14	-	-	-
<b>30-34</b>	35	35	29	29	39	26	37	39	47	<b>-31,9</b>	-	-
<b>35-39</b>	64	61	64	65	68	80	86	69	75	<b>-35,6</b>	-	-
<b>40-44</b>	157	138	132	134	129	160	131	140	135	<b>-41,0</b>	<b>-27,4</b>	-
<b>45-49</b>	351	327	364	371	358	293	290	271	283	-	<b>-21,3</b>	<b>-27,1</b>
<b>50-54</b>	571	582	570	593	597	601	597	647	586	<b>64,5</b>	-	-
<b>55-59</b>	732	844	908	925	910	914	891	894	945	-	<b>49,1</b>	-
<b>60-64</b>	665	537	646	725	918	1086	1160	1226	1220	-	<b>90,1</b>	<b>65,4</b>
<b>65-69</b>	1432	1496	1340	1185	972	842	759	780	966	<b>-61,6</b>	<b>-44,5</b>	-
<b>70-74</b>	1362	1219	1343	1415	1593	1655	1615	1571	1449	<b>-23,7</b>	-	-
<b>75-79</b>	1708	1666	1547	1512	1397	1243	1201	1281	1392	-	<b>-27,3</b>	-
<b>80-84</b>	846	967	1087	1154	1181	1172	1173	1218	1061	<b>71,4</b>	<b>57,4</b>	-
<b>85 и ст.</b>	381	421	392	479	544	633	687	686	763	<b>120,6</b>	<b>158,2</b>	<b>57,9</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 89

**Динамика показателей смертности от ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,45	0,48	0,55	0,54	0,45	0,40	0,37	0,38	0,46	0,40	0,34	0,42
<b>30-39</b>	3,21	3,12	2,95	2,76	2,59	2,70	2,71	2,61	2,23	2,42	2,27	1,77
<b>40-49</b>	21,79	22,09	22,33	21,73	21,22	20,56	19,26	18,31	18,19	17,29	16,80	16,74
<b>50-59</b>	103,07	105,60	102,11	96,39	92,02	87,06	79,53	75,93	69,66	67,42	65,80	66,59
<b>60-69</b>	197,64	196,07	190,68	181,81	178,38	168,96	164,45	158,72	153,76	152,64	145,98	146,02
<b>70-79</b>	171,26	171,41	166,45	164,65	174,47	175,06	176,51	181,61	176,57	175,56	169,92	169,41
<b>80 и ст.</b>	102,07	96,82	93,32	90,58	90,43	90,47	92,15	89,66	90,23	88,59	94,12	98,05
<b>15-59</b>	24,74	24,56	23,33	21,78	20,66	19,48	17,90	17,21	16,32	16,13	16,07	16,76
<b>«Грубый» показатель</b>	44,99	44,55	43,03	41,51	41,76	41,08	40,63	40,55	39,66	39,36	37,77	37,60
<b>Стандарт. показатель</b>	32,34	31,97	30,68	29,19	28,74	28,09	27,56	27,28	26,26	25,74	24,65	24,43
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,35	0,33	0,29	0,26	0,26	0,31	0,35	0,25	0,27	<b>-49,1</b>	<b>-27,3</b>	-
<b>30-39</b>	1,83	1,82	1,88	1,87	1,61	1,71	1,86	1,71	1,71	<b>-51,3</b>	-	-
<b>40-49</b>	15,69	15,19	15,41	15,11	14,18	13,62	12,61	12,07	11,91	<b>-47,8</b>	<b>-29,8</b>	<b>-21,9</b>
<b>50-59</b>	65,64	65,27	64,04	63,50	62,23	62,29	58,72	56,11	56,27	<b>-49,1</b>	<b>-15,7</b>	<b>-12,8</b>
<b>60-69</b>	145,98	139,70	140,09	132,23	131,46	131,63	122,09	120,73	121,33	<b>-39,9</b>	<b>-19,4</b>	<b>-10,2</b>
<b>70-79</b>	166,80	165,65	162,81	160,70	160,63	156,18	150,43	148,92	145,61	<b>-13,5</b>	<b>-14,4</b>	<b>-10,2</b>
<b>80 и ст.</b>	103,08	107,16	109,07	116,53	118,00	118,01	115,16	112,03	107,51	<b>30,0</b>	<b>17,3</b>	<b>-7,8</b>
<b>15-59</b>	16,94	17,12	17,24	17,36	17,09	17,11	16,58	15,98	16,13	<b>-33,0</b>	-	<b>-8,1</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	37,12	36,43	36,53	36,18	36,24	36,16	35,28	34,85	34,89	<b>-22,5</b>	<b>-7,6</b>	<b>-4,5</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	23,91	23,17	23,05	22,59	22,54	22,43	21,34	20,81	20,70	<b>-36,2</b>	<b>-16,1</b>	<b>-9,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 89**

**Динамика показателей смертности от ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,56	0,65	0,71	0,67	0,59	0,49	0,49	0,45	0,62	0,51	0,38	0,55
<b>30-39</b>	5,10	5,06	4,65	4,34	4,07	4,20	4,23	3,97	3,26	3,68	3,32	2,61
<b>40-49</b>	39,57	40,36	40,63	39,88	38,18	37,53	34,77	33,20	32,93	31,16	30,48	30,18
<b>50-59</b>	208,79	213,33	208,96	196,07	187,09	175,61	159,82	152,65	137,73	132,78	129,79	131,48
<b>60-69</b>	446,44	439,68	425,30	405,08	393,74	374,64	365,35	354,39	341,72	343,55	331,11	330,90
<b>70-79</b>	474,53	478,01	464,93	453,50	475,19	468,19	469,83	469,83	455,96	451,64	435,07	431,46
<b>80 и ст.</b>	316,38	293,08	275,14	270,01	271,89	265,31	276,28	261,32	261,04	248,19	283,92	293,51
<b>15-59</b>	45,63	45,09	42,95	39,88	37,65	35,46	32,51	31,35	29,43	29,01	29,00	30,24
<b>«Грубый» показатель</b>	81,49	80,66	78,10	75,37	75,64	74,59	74,05	73,67	71,71	71,33	68,86	68,20
<b>Стандарт. показатель</b>	72,86	71,71	68,77	65,31	64,20	62,64	61,68	60,80	58,24	57,16	55,06	54,42
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,45	0,41	0,36	0,32	0,37	0,39	0,37	0,34	0,37	<b>-50,0</b>	-	-
<b>30-39</b>	2,67	2,70	2,86	2,86	2,22	2,43	2,62	2,46	2,33	<b>-58,2</b>	<b>-20,9</b>	-
<b>40-49</b>	28,27	27,59	27,66	26,77	24,82	23,89	21,86	20,72	20,22	<b>-50,6</b>	<b>-34,1</b>	<b>-24,8</b>
<b>50-59</b>	130,95	129,82	127,09	125,98	123,57	123,68	116,02	109,53	109,74	<b>-51,2</b>	<b>-16,6</b>	<b>-14,5</b>
<b>60-69</b>	333,88	318,75	319,05	297,42	292,98	291,35	264,32	260,16	261,43	<b>-40,9</b>	<b>-24,2</b>	<b>-14,4</b>
<b>70-79</b>	419,30	418,58	408,80	402,12	401,99	392,50	378,00	373,03	361,93	<b>-23,5</b>	<b>-16,1</b>	<b>-10,5</b>
<b>80 и ст.</b>	313,75	311,67	309,07	326,00	325,24	317,84	308,81	291,01	278,53	<b>12,0</b>	-	<b>-14,8</b>
<b>15-59</b>	30,75	31,07	31,15	31,29	30,75	30,81	29,74	28,43	28,62	<b>-35,2</b>	-	<b>-9,6</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	67,38	66,02	66,07	65,09	65,06	64,87	63,17	61,97	61,89	<b>-23,8</b>	<b>-9,9</b>	<b>-5,8</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	53,50	51,76	51,20	50,02	49,95	49,49	46,81	45,30	44,73	<b>-37,9</b>	<b>-18,5</b>	<b>-12,0</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 89**

**Динамика показателей смертности от ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,34	0,31	0,37	0,39	0,30	0,32	0,25	0,32	0,31	0,28	0,30	0,28
<b>30-39</b>	1,32	1,19	1,25	1,19	1,12	1,21	1,19	1,24	1,18	1,14	1,25	0,94
<b>40-49</b>	4,79	4,69	4,99	4,63	5,26	4,62	4,71	4,37	4,41	4,36	4,23	4,45
<b>50-59</b>	15,11	16,83	15,01	15,61	14,84	14,66	13,26	12,14	12,74	12,74	12,91	13,47
<b>60-69</b>	40,01	38,97	36,92	33,60	34,35	30,76	29,43	27,62	28,69	27,19	25,52	27,89
<b>70-79</b>	62,89	61,39	57,61	55,97	56,01	54,37	51,39	55,98	53,19	52,21	48,62	48,45
<b>80 и ст.</b>	48,65	47,49	47,61	45,56	44,68	46,15	45,08	45,11	45,32	46,31	48,77	50,94
<b>15-59</b>	4,46	4,66	4,32	4,28	4,23	4,02	3,75	3,53	3,65	3,69	3,78	4,02
<b>«Грубый» показатель</b>	12,72	12,58	11,98	11,57	11,83	11,50	11,15	11,38	11,49	11,33	10,74	11,06
<b>Стандарт. показатель</b>	7,26	7,17	6,75	6,45	6,47	6,21	5,96	5,92	5,96	5,81	5,55	5,72
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,25	0,25	0,21	0,20	0,15	0,22	0,34	0,16	0,17	<b>-46,6</b>	-	-
<b>30-39</b>	1,00	0,96	0,92	0,91	1,02	1,00	1,13	0,98	1,09	<b>-22,9</b>	-	-
<b>40-49</b>	4,20	3,91	4,28	4,50	4,48	4,24	4,12	4,10	4,23	<b>-15,7</b>	-	<b>-8,3</b>
<b>50-59</b>	12,67	13,20	13,31	13,32	13,00	13,00	12,41	12,80	12,73	<b>-19,4</b>	-	-
<b>60-69</b>	27,75	27,75	27,76	27,44	27,46	27,95	26,55	26,46	26,77	<b>-31,5</b>	-	-
<b>70-79</b>	48,99	46,30	45,89	45,52	45,59	43,71	41,61	42,66	44,20	<b>-31,6</b>	<b>-13,5</b>	-
<b>80 и ст.</b>	51,12	54,41	54,53	56,66	56,84	58,25	56,42	56,91	54,32	<b>30,3</b>	<b>13,9</b>	-
<b>15-59</b>	3,93	4,03	4,19	4,31	4,29	4,28	4,25	4,30	4,37	<b>0,8</b>	<b>13,2</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	10,95	10,88	11,07	11,30	11,44	11,46	11,29	11,49	11,61	<b>-7,3</b>	<b>7,3</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	5,57	5,42	5,54	5,58	5,64	5,68	5,50	5,49	5,56	<b>-22,9</b>	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 90

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	63,6	63,9	64,4	64,8	65,2	65,2	65,3	65,4	65,6	65,9	66,2	66,5
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	63,4	63,5	63,7	63,9	64,2	64,4	64,6	64,8	64,9	65,1	65,1	65,3
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	4,10	4,07	3,91	3,74	3,73	3,66	3,61	3,58	3,43	3,36	3,19	3,16
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	66,7	66,8	66,8	66,6	66,3	65,4	65,2	65,2	65,0	2,5	-2,5	-2,4
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	65,4	65,6	65,6	65,7	65,8	65,7	65,9	66,0	65,9	4,1	1,2	0,4
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	3,09	2,99	2,97	2,90	2,91	2,88	2,73	2,67	2,67	-35,9	-16,7	-9,7
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	62,9	63,2	63,6	64,1	64,5	64,6	64,7	64,7	64,9	65,3	65,6	66,0
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	62,7	62,8	63,0	63,2	63,6	63,8	64,0	64,1	64,3	64,5	64,6	64,7
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	9,13	9,03	8,67	8,28	8,23	8,04	7,93	7,83	7,45	7,33	6,96	6,88

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 90**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	66,2	66,3	66,2	65,9	65,4	64,6	64,5	64,5	64,4	2,6	-3,0	-2,3
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	64,8	64,9	65,0	65,1	65,1	65,0	65,2	65,3	65,2	4,2	1,0	-
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	6,78	6,58	6,50	6,36	6,39	6,30	5,93	5,78	5,72	-37,4	-17,8	-11,8
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	68,3	68,3	68,6	68,9	69,1	69,7	69,9	70,7	70,4	70,7	70,5	70,1
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	67,6	67,5	67,7	67,7	67,7	67,9	68,0	68,5	68,2	68,4	68,2	68,3
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,93	0,91	0,85	0,80	0,81	0,77	0,74	0,73	0,73	0,71	0,66	0,69
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	70,5	70,5	70,5	70,9	71,1	71,0	71,1	71,1	70,7	3,9	1,0	-
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	68,6	68,9	68,8	68,9	69,0	69,0	69,0	69,2	69,1	2,6	1,3	-
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,67	0,64	0,66	0,66	0,66	0,67	0,65	0,65	0,67	-29,2	-	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 91

## Динамика показателей диагностики ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	67367	66350	63304	62781	62822	61929	60143	59947	59016	57072	55488
из них доля выявленных активно, %	13,9	14,1	14,3	15,2	16,4	16,7	16,8	16,8	17,7	18,8	20,0
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	42,1	43,1	45,2	46,5	47,5	48,9	49,9	50,7	52,7	52,8	54,6
*I-II ст., %	18,6	19,7	19,5	18,5	19,6	20,1	20,8	22,0	22,9	23,3	24,2
*III ст., %	39,0	38,5	37,9	38,6	37,6	37,1	36,8	36,6	35,1	35,6	35,4
*IV ст., %	32,8	33,1	33,9	34,3	34,2	34,3	34,2	33,6	33,5	33,8	32,9
Показатель одногодичной летальности, %	57,3	55,8	55,6	56,9	56,8	56,8	57,6	58,0	56,7	56,2	57,1
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	55479	53826	53670	53079	52646	52602	51955	51013	50259	49784	
из них доля выявленных активно, %	19,7	19,8	19,3	20,5	20,7	19,7	19,8	21,9	20,2	21,8	
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	55,0	56,2	57,6	58,3	58,7	61,0	63,0	64,2	65,3	68,6	
*I-II ст., %	25,8	25,3	25,6	25,9	26,5	26,5	26,5	26,8	26,4	25,7	
*III ст., %	34,4	33,9	33,8	33,3	32,8	32,4	32,1	32,3	31,8	31,5	
*IV ст., %	33,3	34,5	34,8	35,2	35,6	36,0	37,0	36,8	38,3	39,4	
Показатель одногодичной летальности, %	56,8	56,1	56,0	55,3	55,4	54,1	54,3	53,2	52,4	51,8	

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 92

**Динамика сведений о контингенте больных с ЗНО трахеи, бронхов, легкого (C33,34), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных, состоящих на учете на конец года	103323	104583	105859	106876	108951	109129	108108	107182	109471	108818	109419
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	24,3	26,2	27,3	28,9	29,9	31,3	31,5	32,8	32,8	33,5	34,7
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	30,0	30,7	30,7	31,3	32,2	33,0	32,5	33,2	33,6	33,4	34,8
Показатель распространенности на 100 000 населения	69,7	70,7	71,6	72,5	74,2	74,5	74,1	73,8	76,1	76,2	76,3
Индекс накопления контингента	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных, состоящих на учете на конец года	109964	110776	113742	113840	115753	118609	120940	123670	123970	126958	
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	34,9	36,1	36,5	36,9	37,0	36,9	37,8	38,6	38,7	39,3	
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	35,5	37,3	37,9	38,6	39,1	39,8	41,2	42,0	42,2	43,1	
Показатель распространенности на 100 000 населения	77,1	78,0	79,8	80,1	81,5	83,6	85,2	86,5	86,6	88,5	
Индекс накопления контингента	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6	

Таблица 93

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>2652</b>	<b>2556</b>	<b>2379</b>	<b>2497</b>	<b>2531</b>	<b>2457</b>	<b>2472</b>	<b>2351</b>	<b>2271</b>	<b>2218</b>	<b>2158</b>	<b>2047</b>
<b>0-14</b>	194	168	172	182	171	207	191	178	171	141	169	155
<b>15-19</b>	156	120	162	130	136	176	155	170	177	188	167	173
<b>20-24</b>	70	72	98	82	103	91	88	96	87	96	104	93
<b>25-29</b>	66	53	61	60	75	77	83	77	68	74	69	66
<b>30-34</b>	87	105	80	86	79	65	71	59	64	58	50	62
<b>35-39</b>	101	94	98	115	97	111	109	92	98	84	90	73
<b>40-44</b>	138	168	114	162	156	128	134	140	142	121	102	82
<b>45-49</b>	149	156	179	183	187	186	165	149	156	159	189	152
<b>50-54</b>	206	178	141	114	150	169	210	224	178	214	217	213
<b>55-59</b>	305	281	263	280	281	214	154	169	120	131	162	181
<b>60-64</b>	330	329	224	284	292	252	310	289	315	240	202	150
<b>65-69</b>	374	379	318	318	306	282	262	224	230	234	216	252
<b>70-74</b>	185	185	218	241	264	275	282	247	227	227	191	163
<b>75-79</b>	169	151	131	132	131	106	156	139	135	158	160	155
<b>80-84</b>	90	84	80	81	62	77	58	53	58	61	48	52
<b>85 и ст.</b>	32	33	40	47	41	41	44	45	45	32	22	25

**Продолжение таблицы 93**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>2005</b>	<b>1893</b>	<b>1950</b>	<b>1918</b>	<b>1777</b>	<b>1757</b>	<b>1699</b>	<b>1690</b>	<b>1518</b>	<b>-39,7</b>	<b>-25,3</b>	<b>-17,2</b>
<b>0-14</b>	142	127	136	139	124	121	141	127	119	<b>-37,8</b>	<b>-22,7</b>	-
<b>15-19</b>	194	152	128	128	108	87	92	108	94	<b>-32,3</b>	<b>-53,4</b>	-
<b>20-24</b>	102	96	104	100	93	105	86	85	71	-	<b>-20,3</b>	<b>-25,3</b>
<b>25-29</b>	66	85	80	99	78	80	81	96	75	<b>37,7</b>	-	-
<b>30-34</b>	56	54	63	70	78	80	79	70	77	-	<b>52,9</b>	-
<b>35-39</b>	62	55	62	76	70	63	68	80	62	<b>-43,9</b>	-	-
<b>40-44</b>	111	102	89	95	77	91	70	69	69	<b>-56,4</b>	<b>-32,2</b>	<b>-26,7</b>
<b>45-49</b>	156	147	151	114	126	110	109	108	69	<b>-42,4</b>	<b>-51,1</b>	<b>-30,8</b>
<b>50-54</b>	158	182	184	172	160	179	169	158	135	-	<b>-27,6</b>	-
<b>55-59</b>	184	191	210	208	200	179	203	194	170	<b>-35,0</b>	-	-
<b>60-64</b>	120	132	158	137	165	180	168	181	180	<b>-56,9</b>	-	<b>24,4</b>
<b>65-69</b>	227	235	208	185	129	114	107	99	106	<b>-71,3</b>	<b>-63,7</b>	<b>-42,5</b>
<b>70-74</b>	168	139	119	174	180	168	178	123	95	<b>-45,6</b>	-	<b>-39,6</b>
<b>75-79</b>	171	110	158	123	96	108	72	90	95	<b>-33,7</b>	<b>-51,0</b>	-
<b>80-84</b>	62	69	67	70	78	69	54	62	58	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	26	17	33	28	15	23	22	40	43	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 93**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1515</b>	<b>1399</b>	<b>1305</b>	<b>1403</b>	<b>1435</b>	<b>1370</b>	<b>1356</b>	<b>1322</b>	<b>1303</b>	<b>1227</b>	<b>1207</b>	<b>1156</b>
<b>0-14</b>	106	91	104	93	94	110	103	92	89	67	91	80
<b>15-19</b>	94	68	90	76	74	110	84	107	111	116	99	104
<b>20-24</b>	44	46	62	48	64	55	54	50	57	62	65	46
<b>25-29</b>	32	25	34	33	41	48	50	40	36	35	39	37
<b>30-34</b>	48	51	41	48	41	32	33	36	39	36	22	36
<b>35-39</b>	51	53	53	66	54	63	62	57	53	41	58	45
<b>40-44</b>	94	97	71	100	92	71	76	87	85	72	65	50
<b>45-49</b>	100	91	117	114	128	118	91	98	98	90	111	84
<b>50-54</b>	134	105	86	73	102	97	130	152	122	129	142	140
<b>55-59</b>	196	180	170	171	174	127	93	108	77	81	100	116
<b>60-64</b>	212	203	122	168	180	158	196	174	208	144	123	97
<b>65-69</b>	204	215	164	194	180	157	163	114	132	137	121	137
<b>70-74</b>	83	81	101	126	120	137	132	124	115	121	89	83
<b>75-79</b>	70	59	60	56	54	45	57	54	52	63	62	74
<b>80-84</b>	35	24	23	24	22	30	19	19	18	21	15	18
<b>85 и ст.</b>	12	10	7	13	15	12	13	10	11	12	5	9

**Продолжение таблицы 93**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1152</b>	<b>1031</b>	<b>1091</b>	<b>1057</b>	<b>961</b>	<b>975</b>	<b>969</b>	<b>895</b>	<b>858</b>	<b>-40,4</b>	<b>-26,9</b>	<b>-16,2</b>
<b>0-14</b>	81	62	71	78	73	69	62	77	66	<b>-38,1</b>	<b>-19,6</b>	-
<b>15-19</b>	118	82	85	83	71	55	64	67	67	-	<b>-45,2</b>	-
<b>20-24</b>	70	60	56	50	61	72	46	52	48	-	-	-
<b>25-29</b>	41	50	46	57	43	46	55	48	44	<b>53,0</b>	-	-
<b>30-34</b>	30	28	39	41	37	47	48	37	45	-	<b>70,8</b>	-
<b>35-39</b>	35	37	35	44	37	33	41	44	29	<b>-43,5</b>	-	-
<b>40-44</b>	74	59	63	51	42	60	43	39	46	<b>-55,9</b>	<b>-34,4</b>	-
<b>45-49</b>	92	77	84	74	71	65	63	49	44	<b>-51,2</b>	<b>-52,4</b>	<b>-39,1</b>
<b>50-54</b>	100	117	114	100	92	98	109	98	81	-	<b>-34,4</b>	-
<b>55-59</b>	125	117	124	121	119	110	137	100	103	<b>-39,5</b>	-	-
<b>60-64</b>	73	76	105	83	88	97	107	100	98	<b>-60,6</b>	-	-
<b>65-69</b>	123	142	114	100	59	61	56	53	59	<b>-73,1</b>	<b>-66,1</b>	-
<b>70-74</b>	83	55	61	89	88	84	81	55	44	<b>-44,9</b>	-	<b>-46,0</b>
<b>75-79</b>	78	42	62	54	50	50	32	40	43	<b>-26,0</b>	<b>-46,3</b>	-
<b>80-84</b>	19	24	22	24	28	23	19	24	26	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	10	3	10	8	2	5	6	12	15	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 93**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>1137</b>	<b>1157</b>	<b>1074</b>	<b>1094</b>	<b>1096</b>	<b>1087</b>	<b>1116</b>	<b>1029</b>	<b>968</b>	<b>991</b>	<b>951</b>	<b>891</b>
<b>0-14</b>	88	77	68	89	77	97	88	86	82	74	78	75
<b>15-19</b>	62	52	72	54	62	66	71	63	66	72	68	69
<b>20-24</b>	26	26	36	34	39	36	34	46	30	34	39	47
<b>25-29</b>	34	28	27	27	34	29	33	37	32	39	30	29
<b>30-34</b>	39	54	39	38	38	33	38	23	25	22	28	26
<b>35-39</b>	50	41	45	49	43	48	47	35	45	43	32	28
<b>40-44</b>	44	71	43	62	64	57	58	53	57	49	37	32
<b>45-49</b>	49	65	62	69	59	68	74	51	58	69	78	68
<b>50-54</b>	72	73	55	41	48	72	80	72	56	85	75	73
<b>55-59</b>	109	101	93	109	107	87	61	61	43	50	62	65
<b>60-64</b>	118	126	102	116	112	94	114	115	107	96	79	53
<b>65-69</b>	170	164	154	124	126	125	99	110	98	97	95	115
<b>70-74</b>	102	104	117	115	144	138	150	123	112	106	102	80
<b>75-79</b>	99	92	71	76	77	61	99	85	83	95	98	81
<b>80-84</b>	55	60	57	57	40	47	39	34	40	40	33	34
<b>85 и ст.</b>	20	23	33	34	26	29	31	35	34	20	17	16

**Продолжение таблицы 93**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО костей и суставных хрящей (С40,41) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>853</b>	<b>862</b>	<b>859</b>	<b>861</b>	<b>816</b>	<b>782</b>	<b>730</b>	<b>795</b>	<b>660</b>	<b>-38,7</b>	<b>-23,2</b>	<b>-18,4</b>
<b>0-14</b>	61	65	65	61	51	52	79	50	53	<b>-37,5</b>	-	-
<b>15-19</b>	76	70	43	45	37	32	28	41	27	<b>-45,4</b>	<b>-65,1</b>	-
<b>20-24</b>	32	36	48	50	32	33	40	33	23	-	-	-
<b>25-29</b>	25	35	34	42	35	34	26	48	31	-	-	-
<b>30-34</b>	26	26	24	29	41	33	31	33	32	-	-	-
<b>35-39</b>	27	18	27	32	33	30	27	36	33	<b>-44,3</b>	-	-
<b>40-44</b>	37	43	26	44	35	31	27	30	23	<b>-57,1</b>	-	<b>-41,9</b>
<b>45-49</b>	64	70	67	40	55	45	46	59	25	<b>-26,9</b>	<b>-49,3</b>	-
<b>50-54</b>	58	65	70	72	68	81	60	60	54	-	-	-
<b>55-59</b>	59	74	86	87	81	69	66	94	67	-	-	-
<b>60-64</b>	47	56	53	54	77	83	61	81	82	<b>-50,8</b>	-	--
<b>65-69</b>	104	93	94	85	70	53	51	46	47	<b>-68,8</b>	<b>-60,8</b>	<b>-46,4</b>
<b>70-74</b>	85	84	58	85	92	84	97	68	51	<b>-46,3</b>	-	-
<b>75-79</b>	93	68	96	69	46	58	40	50	52	<b>-38,9</b>	<b>-54,4</b>	-
<b>80-84</b>	43	45	45	46	50	46	35	38	32	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	16	14	23	20	13	18	16	28	28	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 94

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО костей и суставных хрящей (С40,41), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>0-9</b>	0,41	0,30	0,40	0,33	0,35	0,48	0,48	0,41	0,43	0,32	0,49	0,46
<b>10-19</b>	1,21	1,01	1,13	1,09	1,05	1,29	1,15	1,23	1,26	1,28	1,23	1,28
<b>20-29</b>	0,69	0,64	0,80	0,71	0,88	0,82	0,82	0,82	0,73	0,80	0,78	0,70
<b>30-39</b>	0,74	0,80	0,73	0,84	0,76	0,78	0,83	0,72	0,80	0,72	0,71	0,69
<b>40-49</b>	1,58	1,65	1,39	1,56	1,51	1,35	1,26	1,21	1,24	1,16	1,21	0,99
<b>50-59</b>	3,00	2,82	2,61	2,63	2,95	2,69	2,58	2,76	2,06	2,28	2,34	2,26
<b>60-69</b>	4,65	4,77	3,72	4,17	4,13	3,65	3,88	3,48	3,73	3,33	3,05	3,10
<b>70-79</b>	5,51	5,13	5,13	5,13	5,02	4,51	4,88	4,12	3,76	3,96	3,64	3,39
<b>80 и ст.</b>	3,81	3,59	3,67	4,00	3,32	3,91	3,45	3,38	3,63	3,28	2,60	2,73
<b>15-59</b>	1,41	1,34	1,30	1,32	1,37	1,32	1,27	1,28	1,18	1,22	1,21	1,15
<b>«Грубый» показатель</b>	1,79	1,73	1,61	1,69	1,72	1,68	1,69	1,62	1,58	1,55	1,50	1,43
<b>Стандарт. показатель</b>	1,49	1,41	1,35	1,38	1,41	1,39	1,37	1,32	1,28	1,24	1,24	1,18
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	0,45	0,33	0,46	0,39	0,40	0,45	0,46	0,38	0,35	-	-	-
<b>10-19</b>	1,39	1,24	1,13	1,28	1,11	0,94	1,12	1,25	1,13	-	-	-
<b>20-29</b>	0,73	0,77	0,77	0,82	0,70	0,75	0,69	0,76	0,64	-	-	-
<b>30-39</b>	0,60	0,55	0,62	0,72	0,71	0,69	0,69	0,69	0,63	<b>-19,1</b>	-	<b>-10,0</b>
<b>40-49</b>	1,15	1,10	1,09	0,98	0,98	0,98	0,91	0,92	0,73	<b>-48,0</b>	<b>-28,6</b>	<b>-20,5</b>
<b>50-59</b>	1,84	1,91	1,97	1,85	1,72	1,70	1,72	1,61	1,40	<b>-49,7</b>	<b>-33,5</b>	<b>-19,4</b>
<b>60-69</b>	2,82	3,08	3,14	2,83	2,60	2,58	2,28	2,20	2,09	<b>-52,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-25,8</b>
<b>70-79</b>	3,69	2,72	2,98	3,13	2,85	2,82	2,50	2,16	2,01	<b>-61,4</b>	<b>-40,4</b>	<b>-35,0</b>
<b>80 и ст.</b>	2,94	2,68	2,90	2,64	2,37	2,29	1,77	2,33	2,29	<b>-46,6</b>	<b>-25,0</b>	-
<b>15-59</b>	1,13	1,10	1,11	1,10	1,03	1,02	1,01	1,03	0,88	<b>-31,3</b>	<b>-20,6</b>	<b>-14,3</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	1,41	1,33	1,37	1,35	1,25	1,24	1,19	1,18	1,06	<b>-36,7</b>	<b>-25,1</b>	<b>-18,0</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	1,16	1,10	1,14	1,13	1,04	1,03	1,01	1,01	0,90	<b>-34,9</b>	<b>-22,5</b>	<b>-16,0</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 94**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>0-9</b>	0,44	0,32	0,49	0,31	0,38	0,44	0,50	0,42	0,49	0,21	0,48	0,45
<b>10-19</b>	1,38	1,11	1,26	1,20	1,13	1,53	1,23	1,40	1,41	1,47	1,40	1,44
<b>20-29</b>	0,75	0,71	0,95	0,79	1,01	0,98	0,98	0,84	0,87	0,90	0,93	0,73
<b>30-39</b>	0,78	0,83	0,77	0,95	0,82	0,84	0,87	0,88	0,90	0,77	0,82	0,84
<b>40-49</b>	2,19	1,96	1,83	1,99	1,99	1,67	1,45	1,60	1,57	1,39	1,53	1,19
<b>50-59</b>	4,26	3,88	3,68	3,64	4,21	3,49	3,49	4,02	3,02	3,05	3,30	3,26
<b>60-69</b>	7,08	7,18	4,96	6,28	6,20	5,35	6,05	4,87	5,83	4,98	4,52	4,62
<b>70-79</b>	9,05	8,09	8,85	9,15	7,83	7,38	7,05	6,25	5,67	6,12	4,99	5,30
<b>80 и ст.</b>	7,36	5,20	4,56	5,76	5,93	6,89	5,32	4,86	4,91	5,55	3,85	4,93
<b>15-59</b>	1,78	1,59	1,60	1,61	1,70	1,59	1,49	1,62	1,50	1,46	1,52	1,42
<b>«Грубый» показатель</b>	2,18	2,01	1,88	2,03	2,08	1,99	1,98	1,94	1,94	1,84	1,81	1,74
<b>Стандарт. показатель</b>	2,05	1,85	1,77	1,84	1,89	1,80	1,76	1,72	1,71	1,58	1,58	1,53
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	0,53	0,32	0,50	0,41	0,45	0,51	0,42	0,36	0,41	-	-	-
<b>10-19</b>	1,61	1,26	1,34	1,55	1,39	1,10	1,25	1,60	1,40	-	-	-
<b>20-29</b>	0,96	0,93	0,84	0,87	0,84	0,95	0,83	0,84	0,79	-	-	-
<b>30-39</b>	0,67	0,66	0,75	0,85	0,72	0,78	0,85	0,76	0,68	<b>-12,9</b>	-	-
<b>40-49</b>	1,50	1,26	1,40	1,23	1,14	1,28	1,13	0,95	0,99	<b>-51,6</b>	<b>-30,5</b>	-
<b>50-59</b>	2,70	2,69	2,66	2,41	2,27	2,22	2,54	2,03	1,88	<b>-51,8</b>	<b>-38,9</b>	-
<b>60-69</b>	4,12	4,76	4,88	4,14	3,32	3,53	3,36	2,98	2,85	<b>-55,0</b>	<b>-38,7</b>	<b>-27,2</b>
<b>70-79</b>	5,51	3,30	4,11	4,66	4,42	4,25	3,49	3,00	2,89	<b>-68,9</b>	<b>-40,0</b>	<b>-39,8</b>
<b>80 и ст.</b>	4,90	4,10	4,33	3,89	3,35	3,02	2,50	3,49	3,93	<b>-50,0</b>	<b>-30,8</b>	-
<b>15-59</b>	1,47	1,33	1,38	1,33	1,24	1,27	1,32	1,18	1,13	<b>-30,4</b>	<b>-21,8</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	1,75	1,56	1,66	1,61	1,46	1,49	1,47	1,35	1,29	<b>-36,3</b>	<b>-26,5</b>	<b>-17,3</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	1,54	1,37	1,49	1,44	1,29	1,31	1,28	1,22	1,16	<b>-39,3</b>	<b>-25,2</b>	<b>-16,5</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 94**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>0-9</b>	0,37	0,29	0,30	0,36	0,32	0,52	0,46	0,39	0,36	0,44	0,50	0,47
<b>10-19</b>	1,03	0,91	1,00	0,98	0,97	1,05	1,07	1,05	1,09	1,07	1,05	1,11
<b>20-29</b>	0,62	0,56	0,65	0,63	0,74	0,65	0,66	0,80	0,59	0,69	0,62	0,67
<b>30-39</b>	0,71	0,76	0,69	0,73	0,70	0,72	0,78	0,55	0,69	0,66	0,60	0,55
<b>40-49</b>	1,00	1,35	0,97	1,15	1,05	1,04	1,08	0,84	0,92	0,95	0,92	0,81
<b>50-59</b>	1,95	1,95	1,73	1,81	1,92	2,03	1,82	1,71	1,26	1,64	1,54	1,44
<b>60-69</b>	3,11	3,21	2,91	2,76	2,74	2,50	2,41	2,55	2,34	2,25	2,10	2,12
<b>70-79</b>	4,25	4,07	3,77	3,61	3,92	3,32	3,96	3,19	2,92	2,99	3,02	2,51
<b>80 и ст.</b>	2,93	3,19	3,44	3,56	2,67	3,16	2,97	3,00	3,29	2,67	2,30	2,20
<b>15-59</b>	1,05	1,10	1,01	1,03	1,06	1,06	1,06	0,94	0,88	0,98	0,92	0,89
<b>«Грубый» показатель</b>	1,45	1,47	1,37	1,40	1,40	1,40	1,44	1,33	1,27	1,30	1,24	1,17
<b>Стандарт. показатель</b>	1,12	1,12	1,05	1,07	1,07	1,11	1,10	1,03	0,97	1,01	0,98	0,94
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	0,36	0,33	0,43	0,36	0,35	0,39	0,51	0,40	0,29	-	-	-
<b>10-19</b>	1,17	1,21	0,91	1,00	0,83	0,76	0,97	0,88	0,85	<b>-12,0</b>	<b>-27,6</b>	-
<b>20-29</b>	0,50	0,60	0,69	0,76	0,55	0,55	0,55	0,69	0,48	-	-	-
<b>30-39</b>	0,54	0,44	0,50	0,59	0,71	0,60	0,53	0,63	0,58	<b>-25,4</b>	-	-
<b>40-49</b>	0,84	0,95	0,80	0,75	0,83	0,71	0,71	0,89	0,49	<b>-41,0</b>	-	-
<b>50-59</b>	1,14	1,29	1,40	1,40	1,28	1,29	1,05	1,28	1,01	<b>-45,4</b>	<b>-22,8</b>	-
<b>60-69</b>	2,00	2,03	2,05	2,00	2,14	1,97	1,55	1,67	1,58	<b>-47,4</b>	<b>-23,7</b>	<b>-26,1</b>
<b>70-79</b>	2,84	2,44	2,45	2,40	2,10	2,14	2,02	1,77	1,60	<b>-59,0</b>	<b>-41,2</b>	<b>-29,9</b>
<b>80 и ст.</b>	2,46	2,31	2,51	2,29	2,08	2,07	1,55	1,97	1,79	<b>-46,8</b>	<b>-25,9</b>	-
<b>15-59</b>	0,81	0,87	0,85	0,89	0,84	0,79	0,72	0,90	0,66	<b>-31,1</b>	<b>-16,9</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	1,12	1,13	1,13	1,13	1,07	1,03	0,95	1,03	0,86	<b>-36,7</b>	<b>-23,7</b>	<b>-19,4</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	0,87	0,91	0,88	0,90	0,84	0,80	0,81	0,84	0,69	<b>-32,7</b>	<b>-21,4</b>	<b>-16,5</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 95

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	57,6	57,9	56,6	57,4	57,0	55,4	56,0	54,8	54,9	54,4	53,2	53,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	52,2	52,8	51,3	52,1	51,8	50,4	51,4	50,7	50,6	50,8	49,7	49,9
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,15	0,14	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	53,6	53,5	54,4	54,0	54,2	54,0	53,7	53,2	54,6	-7,2	-	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	49,7	49,7	50,4	49,8	50,0	50,1	49,1	49,1	49,7	-5,6	-	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	-	-	
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	56,4	57,0	54,7	56,5	55,8	54,0	54,8	53,1	53,4	53,7	51,9	53,4
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	51,1	51,7	49,2	51,2	50,8	49,2	50,3	49,2	49,2	50,0	48,2	49,3
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,21	0,20	0,18	0,20	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 95**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
	1993-2013	2003-2013	2008-2013									
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	51,8	52,6	52,9	52,5	52,5	52,1	52,9	51,8	52,5	-8,0	-0,3	-0,4
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	47,9	48,4	48,8	48,3	48,0	48,0	48,1	47,1	47,7	-7,2	-2,3	-1,7
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,15	0,13	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10	-48,5	-	-
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	59,8	59,5	59,8	58,9	58,9	57,2	57,9	59,0	58,8	55,9	55,9	54,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	53,7	54,1	53,8	53,3	53,1	51,9	52,7	52,5	52,5	52,0	51,6	50,7
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	56,7	55,2	56,5	55,9	56,3	56,5	55,1	55,4	57,2	-7,1	-	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	52,2	51,1	52,5	51,7	52,4	52,8	50,4	51,3	52,4	-3,9	-	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	-	-	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 96**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>3673</b>	<b>3470</b>	<b>3373</b>	<b>3282</b>	<b>3319</b>	<b>3328</b>	<b>2702</b>	<b>2347</b>	<b>2165</b>	<b>2053</b>	<b>1982</b>	<b>1910</b>
<b>0-14</b>	135	120	137	108	125	119	106	86	90	78	69	66
<b>15-19</b>	109	109	129	100	118	114	107	110	105	106	93	98
<b>20-24</b>	73	64	62	68	82	86	74	70	63	52	46	66
<b>25-29</b>	74	55	55	70	42	67	49	38	41	33	50	39
<b>30-34</b>	87	86	73	76	73	59	57	49	33	36	32	29
<b>35-39</b>	135	126	132	114	131	125	80	73	76	63	60	53
<b>40-44</b>	184	184	170	160	160	159	126	112	110	94	100	86
<b>45-49</b>	175	200	219	240	253	231	193	171	164	146	140	150
<b>50-54</b>	300	246	198	151	161	211	195	202	191	187	185	198
<b>55-59</b>	441	417	425	442	403	306	239	190	148	144	147	190
<b>60-64</b>	521	467	394	376	420	443	393	329	295	269	254	195
<b>65-69</b>	549	567	590	514	487	507	332	305	241	273	251	252
<b>70-74</b>	316	307	326	388	375	437	378	339	315	274	233	189
<b>75-79</b>	280	228	205	215	236	233	211	153	169	171	213	197
<b>80-84</b>	211	200	174	160	160	140	92	63	62	77	60	59
<b>85 и ст.</b>	83	94	84	100	93	91	70	57	62	50	47	43

**Продолжение таблицы 96**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>1842</b>	<b>1735</b>	<b>1773</b>	<b>1751</b>	<b>1610</b>	<b>1531</b>	<b>1529</b>	<b>1426</b>	<b>1282</b>	<b>-68,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>-23,4</b>
<b>0-14</b>	50	51	56	34	45	52	34	42	34	<b>-81,0</b>	<b>-46,0</b>	-
<b>15-19</b>	88	91	86	76	72	50	47	44	52	<b>-56,6</b>	<b>-55,7</b>	<b>-39,7</b>
<b>20-24</b>	60	67	60	68	54	57	64	51	64	<b>-21,0</b>	<b>2,5</b>	-
<b>25-29</b>	47	47	36	39	47	30	43	44	42	<b>-39,8</b>	-	-
<b>30-34</b>	41	36	53	43	47	33	33	50	41	<b>-59,4</b>	-	-
<b>35-39</b>	47	32	45	38	41	41	35	33	45	<b>-85,4</b>	<b>-31,2</b>	-
<b>40-44</b>	76	71	59	66	60	45	53	55	45	<b>-82,7</b>	<b>-51,8</b>	-
<b>45-49</b>	129	121	139	120	99	92	89	72	49	<b>-69,5</b>	<b>-56,6</b>	<b>-50,4</b>
<b>50-54</b>	175	173	170	171	150	160	138	142	130	<b>-39,7</b>	<b>-30,5</b>	<b>-21,1</b>
<b>55-59</b>	186	201	191	238	191	173	202	198	147	<b>-68,5</b>	-	-
<b>60-64</b>	158	126	144	163	188	202	194	166	155	<b>-77,2</b>	-	-
<b>65-69</b>	272	252	250	209	152	126	128	109	97	<b>-87,1</b>	<b>-65,0</b>	<b>-50,1</b>
<b>70-74</b>	183	178	193	184	176	218	235	164	149	<b>-59,9</b>	-	-
<b>75-79</b>	206	170	175	169	144	125	95	116	117	<b>-52,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-33,5</b>
<b>80-84</b>	86	87	83	96	111	88	96	93	77	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	38	32	33	37	33	39	43	47	38	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 96**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1969</b>	<b>1871</b>	<b>1816</b>	<b>1828</b>	<b>1816</b>	<b>1792</b>	<b>1539</b>	<b>1365</b>	<b>1252</b>	<b>1180</b>	<b>1175</b>	<b>1095</b>
<b>0-14</b>	76	55	76	48	67	62	51	49	45	34	34	36
<b>15-19</b>	64	69	80	55	75	73	69	55	70	65	55	54
<b>20-24</b>	44	45	36	45	52	48	44	49	44	37	29	41
<b>25-29</b>	38	31	31	38	22	40	35	25	29	20	34	24
<b>30-34</b>	59	45	41	45	53	27	36	27	16	25	22	17
<b>35-39</b>	78	66	76	68	71	67	45	44	47	32	41	37
<b>40-44</b>	115	100	106	114	92	99	82	66	71	63	71	56
<b>45-49</b>	104	128	148	165	176	148	120	111	113	95	100	109
<b>50-54</b>	199	163	115	97	109	137	129	147	130	127	131	125
<b>55-59</b>	279	274	272	288	254	196	163	129	107	99	102	119
<b>60-64</b>	310	293	249	221	241	269	252	216	195	174	155	118
<b>65-69</b>	283	307	329	296	285	286	212	181	141	156	146	144
<b>70-74</b>	128	135	131	178	162	203	176	176	151	143	132	101
<b>75-79</b>	106	83	66	88	83	64	69	48	59	72	96	86
<b>80-84</b>	65	57	46	51	47	47	32	25	20	29	18	17
<b>85 и ст.</b>	21	20	14	31	27	26	24	17	14	9	8	11

**Продолжение таблицы 96**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %			
										1993-2013	2003-2013	2008-2013	
<b>Мужчины</b>													
<b>Всего</b>	<b>1051</b>	<b>1018</b>	<b>1033</b>	<b>995</b>	<b>936</b>	<b>878</b>	<b>905</b>	<b>829</b>	<b>723</b>	<b>-64,7</b>	<b>-32,1</b>	<b>-23,2</b>	
<b>0-14</b>	26	25	30	13	21	22	16	26	17	<b>-82,8</b>	<b>-47,3</b>	-	
<b>15-19</b>	54	58	55	40	46	33	38	23	30	<b>-55,6</b>	<b>-52,2</b>	-	
<b>20-24</b>	41	38	41	43	36	41	48	35	49	-	-	-	
<b>25-29</b>	31	32	27	28	29	22	29	28	29	-	-	-	
<b>30-34</b>	22	22	25	29	32	23	23	28	25	<b>-57,2</b>	-	-	
<b>35-39</b>	32	20	27	24	26	21	20	23	26	<b>-81,7</b>	<b>-42,8</b>	-	
<b>40-44</b>	51	50	38	50	36	29	31	37	25	<b>-80,3</b>	<b>-58,6</b>	-	
<b>45-49</b>	87	82	81	89	64	55	55	50	28	<b>-69,5</b>	<b>-62,6</b>	<b>-57,3</b>	
<b>50-54</b>	111	110	113	108	98	106	99	99	79	<b>-38,9</b>	<b>-30,0</b>	<b>-19,2</b>	
<b>55-59</b>	125	145	137	153	130	123	137	133	97	<b>-65,1</b>	-	-	
<b>60-64</b>	100	87	95	110	120	131	118	100	106	<b>-74,7</b>	-	-	
<b>65-69</b>	159	143	152	111	78	83	74	56	49	<b>-86,1</b>	<b>-67,6</b>	<b>-50,9</b>	
<b>70-74</b>	103	94	98	89	88	98	117	90	67	<b>-51,0</b>	<b>-26,2</b>	-	
<b>75-79</b>	83	77	74	70	77	53	46	55	57	<b>-29,9</b>	<b>-45,9</b>	-	
<b>80-84</b>	22	25	28	25	46	31	39	38	27	-	-	-	
<b>85 и ст.</b>	4	10	12	13	9	7	15	8	12	-	-	-	

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 96**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1704</b>	<b>1599</b>	<b>1557</b>	<b>1454</b>	<b>1503</b>	<b>1536</b>	<b>1163</b>	<b>982</b>	<b>913</b>	<b>873</b>	<b>807</b>	<b>815</b>
<b>0-14</b>	59	65	61	60	58	57	55	37	45	44	35	30
<b>15-19</b>	45	40	49	45	43	41	38	55	35	41	38	44
<b>20-24</b>	29	19	26	23	30	38	30	21	19	15	17	25
<b>25-29</b>	36	24	24	32	20	27	14	13	12	13	16	15
<b>30-34</b>	28	41	32	31	20	32	21	22	17	11	10	12
<b>35-39</b>	57	60	56	46	60	58	35	29	29	31	19	16
<b>40-44</b>	69	84	64	46	68	60	44	46	39	31	29	30
<b>45-49</b>	71	72	71	75	77	83	73	60	51	51	40	41
<b>50-54</b>	101	83	83	54	52	74	66	55	61	60	54	73
<b>55-59</b>	162	143	153	154	149	110	76	61	41	45	45	71
<b>60-64</b>	211	174	145	155	179	174	141	113	100	95	99	77
<b>65-69</b>	266	260	261	218	202	221	120	124	100	117	105	108
<b>70-74</b>	188	172	195	210	213	234	202	163	164	131	101	88
<b>75-79</b>	174	145	139	127	153	169	142	105	110	99	117	111
<b>80-84</b>	146	143	128	109	113	93	60	38	42	48	42	42
<b>85 и ст.</b>	62	74	70	69	66	65	46	40	48	41	39	32

**Продолжение таблицы 96**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41) зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>791</b>	<b>717</b>	<b>740</b>	<b>756</b>	<b>674</b>	<b>653</b>	<b>624</b>	<b>597</b>	<b>559</b>	<b>-72,6</b>	<b>-30,3</b>	<b>-23,7</b>
<b>0-14</b>	24	26	26	21	24	30	18	16	17	<b>-79,1</b>	<b>-44,7</b>	-
<b>15-19</b>	34	33	31	36	26	17	9	21	22	<b>-58,0</b>	<b>-60,8</b>	-
<b>20-24</b>	19	29	19	25	18	16	16	16	15	<b>-40,8</b>	-	<b>-35,6</b>
<b>25-29</b>	16	15	9	11	18	8	14	16	13	<b>-64,0</b>	-	-
<b>30-34</b>	19	14	28	14	15	10	10	22	16	<b>-62,5</b>	-	-
<b>35-39</b>	15	12	18	14	15	20	15	10	19	<b>-90,2</b>	-	-
<b>40-44</b>	25	21	21	16	24	16	22	18	20	<b>-86,6</b>	<b>-36,1</b>	-
<b>45-49</b>	42	39	58	31	35	37	34	22	21	<b>-69,5</b>	<b>-42,5</b>	-
<b>50-54</b>	64	63	57	63	52	54	39	43	51	<b>-41,3</b>	<b>-31,4</b>	-
<b>55-59</b>	61	56	54	85	61	50	65	65	50	<b>-74,5</b>	-	-
<b>60-64</b>	58	39	49	53	68	71	76	66	49	<b>-81,3</b>	-	-
<b>65-69</b>	113	109	98	98	74	43	54	53	48	<b>-88,3</b>	<b>-61,4</b>	<b>-49,3</b>
<b>70-74</b>	80	84	95	95	88	120	118	74	82	<b>-67,2</b>	-	-
<b>75-79</b>	123	93	101	99	67	72	49	61	60	<b>-63,3</b>	<b>-56,6</b>	-
<b>80-84</b>	64	62	55	71	65	57	57	55	50	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	34	22	21	24	24	32	28	39	26	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 97

**Динамика показателей смертности от ЗНО костей и суставных хрящей (С40,41), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>0-9</b>	0,31	0,30	0,35	0,23	0,35	0,29	0,28	0,20	0,23	0,15	0,20	0,26
<b>10-19</b>	0,81	0,75	0,87	0,72	0,78	0,79	0,72	0,71	0,71	0,73	0,61	0,62
<b>20-29</b>	0,75	0,61	0,59	0,69	0,61	0,74	0,59	0,51	0,49	0,40	0,43	0,46
<b>30-39</b>	0,88	0,85	0,84	0,79	0,88	0,82	0,63	0,58	0,54	0,50	0,47	0,42
<b>40-49</b>	1,98	1,95	1,84	1,81	1,82	1,67	1,35	1,18	1,14	1,00	1,00	1,00
<b>50-59</b>	4,35	4,07	4,02	3,96	3,86	3,63	3,07	2,75	2,34	2,19	2,05	2,22
<b>60-69</b>	7,06	6,97	6,75	6,16	6,26	6,49	4,91	4,30	3,67	3,81	3,69	3,44
<b>70-79</b>	9,28	8,17	7,80	8,29	7,77	7,92	6,57	5,25	5,03	4,57	4,62	4,12
<b>80 и ст.</b>	9,19	9,03	7,88	8,12	8,16	7,66	5,48	4,14	4,37	4,48	3,97	3,62
<b>15-59</b>	1,74	1,63	1,59	1,55	1,55	1,48	1,22	1,10	1,01	0,93	0,90	0,95
<b>«Грубый» показатель</b>	2,48	2,35	2,28	2,23	2,26	2,27	1,85	1,62	1,51	1,44	1,38	1,34
<b>Стандарт. показатель</b>	1,93	1,81	1,77	1,69	1,71	1,71	1,40	1,22	1,13	1,06	1,02	1,01
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	0,14	0,16	0,17	0,08	0,10	0,17	0,10	0,13	0,10	<b>-72,5</b>	<b>-52,6</b>	-
<b>10-19</b>	0,60	0,63	0,67	0,60	0,66	0,51	0,45	0,46	0,51	<b>-39,9</b>	<b>-25,1</b>	-
<b>20-29</b>	0,46	0,48	0,40	0,44	0,41	0,35	0,45	0,40	0,46	<b>-45,8</b>	-	-
<b>30-39</b>	0,45	0,34	0,49	0,40	0,43	0,35	0,32	0,38	0,39	<b>-67,9</b>	-	-
<b>40-49</b>	0,89	0,85	0,90	0,87	0,77	0,67	0,72	0,66	0,49	<b>-76,1</b>	<b>-42,6</b>	<b>-35,3</b>
<b>50-59</b>	1,94	1,92	1,80	1,99	1,63	1,59	1,57	1,56	1,27	<b>-74,1</b>	<b>-35,0</b>	<b>-28,4</b>
<b>60-69</b>	3,49	3,18	3,38	3,27	3,00	2,88	2,66	2,16	1,84	<b>-73,7</b>	<b>-41,7</b>	<b>-40,6</b>
<b>70-79</b>	4,23	3,79	3,96	3,72	3,30	3,51	3,30	2,84	2,82	<b>-74,1</b>	<b>-36,1</b>	<b>-23,1</b>
<b>80 и ст.</b>	4,14	3,71	3,36	3,59	3,66	3,16	3,23	3,20	2,61	<b>-76,2</b>	<b>-26,8</b>	<b>-23,5</b>
<b>15-59</b>	0,88	0,86	0,87	0,89	0,79	0,71	0,74	0,74	0,66	<b>-65,1</b>	<b>-26,9</b>	<b>-21,0</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	1,30	1,22	1,25	1,23	1,13	1,08	1,07	1,00	0,89	<b>-66,3</b>	<b>-31,4</b>	<b>-24,1</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	0,95	0,90	0,92	0,89	0,83	0,78	0,76	0,71	0,65	<b>-69,5</b>	<b>-34,1</b>	<b>-24,9</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 97**

**Динамика показателей смертности от ЗНО костей и суставных хрящей (С40,41), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>0-9</b>	0,36	0,32	0,40	0,20	0,36	0,30	0,26	0,18	0,22	0,15	0,15	0,21
<b>10-19</b>	0,91	0,81	1,01	0,72	0,93	0,92	0,83	0,76	0,85	0,78	0,70	0,71
<b>20-29</b>	0,81	0,76	0,66	0,81	0,71	0,84	0,74	0,69	0,68	0,53	0,56	0,57
<b>30-39</b>	1,08	0,89	0,95	0,94	1,07	0,84	0,74	0,67	0,61	0,57	0,64	0,56
<b>40-49</b>	2,47	2,38	2,47	2,60	2,43	2,19	1,76	1,53	1,58	1,36	1,49	1,46
<b>50-59</b>	6,18	5,95	5,56	5,74	5,54	5,19	4,57	4,27	3,60	3,28	3,18	3,11
<b>60-69</b>	10,09	10,31	10,02	8,97	9,06	9,43	7,83	6,72	5,76	5,85	5,57	5,18
<b>70-79</b>	13,84	12,60	10,83	13,38	11,03	10,83	9,13	7,87	7,12	7,15	7,53	6,31
<b>80 и ст.</b>	13,47	11,78	9,13	12,77	11,86	11,97	9,31	7,04	5,75	6,39	5,00	5,11
<b>15-59</b>	2,19	2,05	2,00	2,03	2,00	1,85	1,60	1,44	1,39	1,24	1,27	1,25
<b>«Грубый» показатель</b>	2,83	2,69	2,62	2,64	2,63	2,61	2,25	2,01	1,86	1,77	1,76	1,65
<b>Стандарт. показатель</b>	2,61	2,47	2,36	2,36	2,33	2,29	1,96	1,73	1,60	1,48	1,46	1,39
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	0,12	0,16	0,18	0,04	0,07	0,14	0,10	0,16	0,07	<b>-81,0</b>		-
<b>10-19</b>	0,71	0,74	0,80	0,59	0,78	0,57	0,62	0,50	0,58	<b>-37,1</b>	<b>-24,5</b>	-
<b>20-29</b>	0,62	0,59	0,56	0,58	0,53	0,51	0,63	0,53	0,67	<b>-31,2</b>		-
<b>30-39</b>	0,56	0,43	0,53	0,53	0,57	0,43	0,41	0,48	0,47	<b>-62,6</b>		-
<b>40-49</b>	1,25	1,22	1,13	1,36	1,01	0,86	0,92	0,94	0,58	<b>-74,0</b>	<b>-50,1</b>	<b>-44,8</b>
<b>50-59</b>	2,83	2,93	2,80	2,85	2,45	2,45	2,44	2,38	1,80	<b>-71,8</b>	<b>-34,2</b>	<b>-27,3</b>
<b>60-69</b>	5,45	5,02	5,50	5,00	4,47	4,78	3,95	3,04	2,81	<b>-71,3</b>	<b>-42,7</b>	<b>-42,6</b>
<b>70-79</b>	6,36	5,82	5,75	5,18	5,28	4,79	5,04	4,58	4,12	<b>-73,5</b>	<b>-39,3</b>	<b>-18,8</b>
<b>80 и ст.</b>	4,39	5,32	5,41	4,61	6,14	4,10	5,40	4,46	3,73	<b>-75,3</b>		-
<b>15-59</b>	1,19	1,18	1,16	1,21	1,07	0,98	1,05	1,00	0,86	<b>-61,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>-22,7</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	1,60	1,54	1,57	1,51	1,43	1,34	1,37	1,25	1,09	<b>-61,7</b>	<b>-31,7</b>	<b>-24,0</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	1,32	1,29	1,32	1,23	1,16	1,10	1,10	0,99	0,87	<b>-67,8</b>	<b>-35,1</b>	<b>-25,9</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 97**

**Динамика показателей смертности от ЗНО костей и суставных хрящей (С40,41), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>0-9</b>	0,27	0,29	0,29	0,27	0,33	0,28	0,31	0,22	0,24	0,16	0,25	0,31
<b>10-19</b>	0,71	0,69	0,74	0,72	0,64	0,65	0,60	0,66	0,56	0,68	0,52	0,52
<b>20-29</b>	0,68	0,45	0,52	0,57	0,51	0,65	0,43	0,33	0,30	0,26	0,30	0,35
<b>30-39</b>	0,67	0,81	0,72	0,64	0,69	0,80	0,52	0,49	0,46	0,43	0,29	0,28
<b>40-49</b>	1,51	1,55	1,24	1,06	1,24	1,19	0,96	0,86	0,72	0,66	0,55	0,57
<b>50-59</b>	2,83	2,53	2,76	2,51	2,49	2,35	1,84	1,49	1,29	1,28	1,12	1,50
<b>60-69</b>	5,14	4,81	4,61	4,30	4,39	4,51	2,96	2,69	2,28	2,47	2,46	2,34
<b>70-79</b>	7,65	6,58	6,70	6,38	6,49	6,73	5,47	4,10	4,11	3,42	3,29	3,10
<b>80 и ст.</b>	8,12	8,34	7,57	6,95	7,23	6,57	4,50	3,39	4,00	3,97	3,72	3,26
<b>15-59</b>	1,30	1,22	1,20	1,08	1,11	1,12	0,85	0,77	0,65	0,63	0,55	0,67
<b>«Грубый» показатель</b>	2,17	2,04	1,99	1,86	1,93	1,97	1,50	1,27	1,19	1,15	1,05	1,07
<b>Стандарт. показатель</b>	1,47	1,37	1,35	1,25	1,27	1,30	1,00	0,87	0,79	0,76	0,70	0,73
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	0,16	0,17	0,15	0,12	0,14	0,19	0,11	0,10	0,13	<b>-63,6</b>	<b>-58,0</b>	-
<b>10-19</b>	0,49	0,52	0,54	0,60	0,53	0,45	0,27	0,42	0,43	<b>-44,6</b>	<b>-26,8</b>	-
<b>20-29</b>	0,30	0,37	0,23	0,30	0,30	0,20	0,25	0,27	0,25	<b>-65,4</b>	<b>-27,0</b>	-
<b>30-39</b>	0,34	0,26	0,45	0,27	0,29	0,28	0,23	0,29	0,31	<b>-74,0</b>	-	-
<b>40-49</b>	0,55	0,50	0,68	0,42	0,54	0,50	0,55	0,40	0,41	<b>-79,3</b>	<b>-23,4</b>	-
<b>50-59</b>	1,22	1,10	1,00	1,30	0,97	0,89	0,87	0,90	0,84	<b>-77,9</b>	<b>-36,2</b>	<b>-30,7</b>
<b>60-69</b>	2,26	2,02	2,05	2,17	2,06	1,65	1,80	1,57	1,19	<b>-76,9</b>	<b>-41,3</b>	<b>-39,1</b>
<b>70-79</b>	3,24	2,84	3,11	3,02	2,36	2,90	2,47	2,02	2,21	<b>-77,7</b>	<b>-33,7</b>	-
<b>80 и ст.</b>	4,08	3,29	2,80	3,30	2,93	2,87	2,58	2,81	2,26	<b>-77,5</b>	<b>-34,3</b>	<b>-25,4</b>
<b>15-59</b>	0,60	0,56	0,59	0,59	0,53	0,46	0,46	0,48	0,47	<b>-71,1</b>	<b>-26,4</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	1,04	0,94	0,97	0,99	0,88	0,86	0,81	0,78	0,73	<b>-71,4</b>	<b>-30,4</b>	<b>-24,0</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	0,67	0,62	0,64	0,64	0,60	0,56	0,51	0,51	0,48	<b>-72,7</b>	<b>-32,3</b>	<b>-24,8</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 98

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	61,2	61,4	61,1	61,5	61,3	62,1	61,6	61,1	61,0	61,6	61,3	59,5
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	57,4	57,6	56,9	57,7	57,2	57,4	56,9	56,2	56,1	56,7	56,7	55,9
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,21	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,15	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	60,7	59,4	59,8	59,6	60,0	60,8	60,7	59,6	59,7	-3,2	-	-
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	57,0	56,3	56,4	57,2	56,8	57,5	57,8	57,1	56,3	-	-	-
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,10	0,09	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	-71,5	-	-
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	58,7	59,3	58,7	59,2	58,8	60,0	59,9	59,2	57,9	59,7	58,4	57,0
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	54,9	55,5	54,3	55,9	54,7	55,3	55,1	54,8	53,7	55,1	54,9	54,1
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,28	0,28	0,26	0,26	0,25	0,25	0,21	0,20	0,17	0,16	0,16	0,15

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 98**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	57,8	57,5	57,9	57,4	58,1	58,5	58,4	57,5	57,8	-2,8	-	-
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	54,5	54,4	54,6	55,0	55,1	55,2	55,4	54,8	53,9	-	-	-
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,10	0,09	-69,5	-38,8	-27,4
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	64,6	64,8	65,3	65,1	64,9	65,3	64,6	64,1	65,4	65,0	65,1	63,3
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	60,3	60,0	59,9	60,0	60,2	59,9	59,3	58,2	59,3	58,9	59,5	58,2
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	65,8	65,5	65,0	65,5	63,6	64,8	64,6	63,8	63,6	-	-	-
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	60,2	58,9	58,9	60,2	59,1	60,5	61,2	60,2	59,3	-	-	-
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	-73,0	-	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 99**

**Динамика сведений о диагностике и контингенте больных  
с ЗНО костей и суставных хрящей (C40,41), состоящем на учете  
онкологических учреждений, Россия, 2011-2013 гг.**

Показатель	2011	2012	2013
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	1587	1583	1382
из них доля выявленных активно, %	5,0	6,4	4,9
Число впервые выявленных ЗНО (без учтенных посмертно)	1630	1625	1440
из них *доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	82,8	83,0	82,1
*I ст., %	11,0	10,5	10,8
*II ст., %	28,9	30,3	30,8
*III ст., %	17,6	15,9	15,8
*IV ст., %	26,8	25,5	23,1
Показатель одногодичной летальности, %	-	32,7	27,3
Число больных, состоящих на учете на конец года	16994	16402	15941
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	59,8	62,1	64,4
Показатель распространенности на 100 000 населения	11,9	11,5	11,1
Индекс накопления контингента	10,7	10,4	11,5

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

**Таблица 100**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных случаев меланомы кожи (C43)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>4588</b>	<b>4870</b>	<b>4989</b>	<b>5391</b>	<b>5711</b>	<b>5921</b>	<b>5785</b>	<b>6379</b>	<b>6539</b>	<b>6606</b>	<b>6914</b>	<b>7276</b>
<b>20-24</b>	61	83	101	110	99	108	105	127	154	141	136	167
<b>25-29</b>	131	109	85	121	120	118	133	145	153	151	118	160
<b>30-34</b>	214	232	220	214	224	188	186	202	206	168	215	221
<b>35-39</b>	345	360	342	361	386	402	324	363	337	327	324	313
<b>40-44</b>	426	431	441	543	478	475	506	540	551	532	549	539
<b>45-49</b>	387	465	507	609	653	599	638	649	646	678	716	703
<b>50-54</b>	442	386	361	354	450	591	612	727	786	810	845	871
<b>55-59</b>	541	624	654	659	649	598	467	410	441	487	601	769
<b>60-64</b>	553	554	510	538	667	734	754	881	876	852	767	631
<b>65-69</b>	545	642	681	676	667	729	554	650	694	734	845	995
<b>70-74</b>	351	410	427	551	632	669	689	730	731	734	714	655
<b>75-79</b>	277	222	272	261	280	337	395	478	490	538	631	691
<b>80-84</b>	174	157	180	192	192	160	177	175	201	218	240	286
<b>85 и ст.</b>	70	94	95	100	106	119	129	164	147	128	119	152

**Продолжение таблицы 100**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных случаев меланомы кожи (C43)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>7235</b>	<b>7364</b>	<b>7732</b>	<b>7744</b>	<b>8013</b>	<b>8416</b>	<b>8718</b>	<b>8723</b>	<b>8974</b>	<b>93,4</b>	<b>30,8</b>	<b>15,9</b>
<b>20-24</b>	147	142	135	130	131	145	129	111	80	-	-31,6	-
<b>25-29</b>	157	148	163	175	163	202	201	193	184	<b>88,6</b>	<b>47,5</b>	-
<b>30-34</b>	218	220	222	266	260	231	275	271	264	<b>30,8</b>	<b>29,5</b>	-
<b>35-39</b>	292	297	354	320	330	388	371	377	382	-	<b>29,1</b>	<b>19,1</b>
<b>40-44</b>	539	423	468	435	384	435	453	464	462	-	-18,4	-
<b>45-49</b>	725	730	756	767	670	681	638	632	615	<b>34,3</b>	<b>-14,9</b>	<b>-17,6</b>
<b>50-54</b>	816	882	903	867	887	985	960	925	887	<b>157,6</b>	<b>11,3</b>	-
<b>55-59</b>	869	931	977	946	973	1036	1077	1104	1164	<b>154,6</b>	<b>64,7</b>	<b>23,7</b>
<b>60-64</b>	555	567	673	744	913	1077	1204	1135	1254	<b>109,6</b>	<b>144,3</b>	<b>62,2</b>
<b>65-69</b>	987	1026	936	793	751	653	650	764	864	<b>33,2</b>	<b>-25,7</b>	-
<b>70-74</b>	672	665	875	949	1078	1119	1178	1091	1012	<b>181,6</b>	<b>86,4</b>	-
<b>75-79</b>	671	686	649	688	723	644	735	775	936	<b>306,9</b>	<b>30,5</b>	<b>34,1</b>
<b>80-84</b>	328	387	408	441	487	516	545	518	498	<b>540,7</b>	<b>110,9</b>	-
<b>85 и ст.</b>	148	185	142	162	208	259	258	326	334	<b>394,5</b>	<b>227,0</b>	<b>112,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 100**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных случаев меланомы кожи (C43)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1752</b>	<b>1816</b>	<b>2005</b>	<b>2050</b>	<b>2168</b>	<b>2283</b>	<b>2220</b>	<b>2395</b>	<b>2479</b>	<b>2481</b>	<b>2636</b>	<b>2687</b>
<b>20-24</b>	26	39	55	63	59	69	59	76	96	96	80	101
<b>25-29</b>	52	50	38	51	43	55	50	69	61	59	41	60
<b>30-34</b>	80	80	81	70	69	73	82	75	80	70	76	90
<b>35-39</b>	114	141	144	152	144	152	130	147	123	136	135	121
<b>40-44</b>	163	162	176	191	164	189	190	203	198	197	194	195
<b>45-49</b>	157	171	217	238	268	212	248	245	244	263	272	251
<b>50-54</b>	180	143	151	141	203	254	254	287	315	319	321	336
<b>55-59</b>	226	256	267	259	258	230	183	160	182	178	241	300
<b>60-64</b>	229	217	224	242	258	290	304	326	363	334	310	236
<b>65-69</b>	204	231	265	259	251	279	214	204	245	266	321	382
<b>70-74</b>	121	127	145	154	210	238	246	270	237	260	263	215
<b>75-79</b>	88	72	88	78	82	107	116	153	158	147	215	213
<b>80-84</b>	49	48	52	60	51	50	47	50	59	60	75	75
<b>85 и ст.</b>	22	15	29	26	28	23	27	33	38	31	29	31

**Продолжение таблицы 100**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных случаев меланомы кожи (C43)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>2768</b>	<b>2696</b>	<b>2888</b>	<b>2897</b>	<b>3047</b>	<b>3093</b>	<b>3324</b>	<b>3335</b>	<b>3390</b>	<b>89,2</b>	<b>32,3</b>	<b>17,7</b>
<b>20-24</b>	104	86	68	66	61	69	64	53	25	-	<b>-56,0</b>	-
<b>25-29</b>	69	60	70	55	57	84	72	71	63	<b>54,5</b>	-	-
<b>30-34</b>	90	93	85	104	100	88	115	117	113	<b>58,8</b>	<b>43,1</b>	-
<b>35-39</b>	114	96	131	124	118	136	140	161	162	-	<b>36,8</b>	<b>41,0</b>
<b>40-44</b>	219	163	173	163	161	160	180	167	168	-	<b>-17,5</b>	-
<b>45-49</b>	284	255	288	282	250	246	245	237	239	<b>26,7</b>	<b>-12,9</b>	<b>-13,4</b>
<b>50-54</b>	327	311	318	321	331	353	376	344	382	<b>133,5</b>	<b>17,1</b>	<b>16,4</b>
<b>55-59</b>	331	373	383	396	407	413	441	454	459	<b>159,1</b>	<b>70,8</b>	<b>17,9</b>
<b>60-64</b>	219	233	279	309	404	417	481	472	507	<b>111,1</b>	<b>152,6</b>	<b>55,5</b>
<b>65-69</b>	373	389	328	308	289	232	251	316	341	<b>39,8</b>	-	-
<b>70-74</b>	236	224	332	323	401	421	432	402	357	<b>230,3</b>	<b>96,2</b>	-
<b>75-79</b>	215	213	230	248	240	210	262	273	327	<b>421,6</b>	<b>44,4</b>	-
<b>80-84</b>	88	118	127	129	151	167	160	162	136	<b>613,9</b>	<b>117,6</b>	-
<b>85 и ст.</b>	30	43	41	37	52	78	85	88	100	<b>860,1</b>	<b>524,5</b>	<b>168,4</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 100**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных случаев меланомы кожи (C43)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>2836</b>	<b>3054</b>	<b>2984</b>	<b>3341</b>	<b>3543</b>	<b>3638</b>	<b>3565</b>	<b>3984</b>	<b>4060</b>	<b>4125</b>	<b>4278</b>	<b>4589</b>
<b>20-24</b>	35	44	46	47	40	39	46	51	58	45	56	66
<b>25-29</b>	79	59	47	70	77	63	83	76	92	92	77	100
<b>30-34</b>	134	152	139	144	155	115	104	127	126	98	139	131
<b>35-39</b>	231	219	198	209	242	250	194	216	214	191	189	192
<b>40-44</b>	263	269	265	352	314	286	316	337	353	335	355	344
<b>45-49</b>	230	294	290	371	385	387	390	404	402	415	444	452
<b>50-54</b>	262	243	210	213	247	337	358	440	471	491	524	535
<b>55-59</b>	315	368	387	400	391	368	284	250	259	309	360	469
<b>60-64</b>	324	337	286	296	409	444	450	555	513	518	457	395
<b>65-69</b>	341	411	416	417	416	450	340	446	449	468	524	613
<b>70-74</b>	230	283	282	397	422	431	443	460	494	474	451	440
<b>75-79</b>	189	150	184	183	198	230	279	325	332	391	416	478
<b>80-84</b>	125	109	128	132	141	110	130	125	142	158	165	211
<b>85 и ст.</b>	48	79	66	74	78	96	102	131	109	97	90	121

**Продолжение таблицы 100**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных случаев меланомы кожи (C43)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>4467</b>	<b>4668</b>	<b>4844</b>	<b>4847</b>	<b>4966</b>	<b>5323</b>	<b>5394</b>	<b>5388</b>	<b>5584</b>	<b>96,0</b>	<b>29,9</b>	<b>14,9</b>
<b>20-24</b>	43	56	67	64	70	76	65	58	55	<b>71,7</b>	-	-
<b>25-29</b>	88	88	93	120	106	118	129	122	121	<b>116,2</b>	<b>57,0</b>	-
<b>30-34</b>	128	127	137	162	160	143	160	154	151	-	<b>21,3</b>	-
<b>35-39</b>	178	201	223	196	212	252	231	216	220	-	<b>24,6</b>	-
<b>40-44</b>	320	260	295	272	223	275	273	297	294	-	-	-
<b>45-49</b>	441	475	468	485	420	435	393	395	376	<b>39,2</b>	<b>-16,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>50-54</b>	489	571	585	546	556	632	584	581	505	<b>174,8</b>	-	-
<b>55-59</b>	538	558	594	550	566	623	636	650	705	<b>151,7</b>	<b>60,7</b>	<b>27,9</b>
<b>60-64</b>	336	334	394	435	509	660	723	663	747	<b>108,5</b>	<b>138,8</b>	<b>67,1</b>
<b>65-69</b>	614	637	608	485	462	421	399	448	523	-	<b>-27,9</b>	-
<b>70-74</b>	436	441	543	626	677	698	746	689	655	<b>159,5</b>	<b>81,2</b>	-
<b>75-79</b>	456	473	419	440	483	434	473	502	609	<b>265,2</b>	<b>24,0</b>	<b>32,8</b>
<b>80-84</b>	240	269	281	312	336	349	385	356	362	<b>513,9</b>	<b>108,2</b>	-
<b>85 и ст.</b>	118	142	101	125	156	181	173	238	234	<b>316,7</b>	<b>172,5</b>	<b>95,3</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 101

**Динамика показателей заболеваемости меланомой кожи (C43), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,97	0,98	0,94	1,16	1,08	1,10	1,14	1,29	1,45	1,37	1,14	1,44
<b>30-39</b>	2,21	2,37	2,29	2,40	2,62	2,62	2,35	2,68	2,67	2,49	2,74	2,74
<b>40-49</b>	4,48	4,55	4,48	5,21	4,97	4,60	4,82	4,97	4,97	5,02	5,28	5,25
<b>50-59</b>	5,77	6,21	6,55	6,77	7,51	8,34	7,64	7,98	8,48	8,58	8,92	9,40
<b>60-69</b>	7,25	8,06	8,17	8,40	9,21	9,99	8,87	10,39	10,76	11,15	11,77	12,52
<b>70-79</b>	9,77	9,65	10,27	11,16	11,60	11,90	12,08	12,88	12,69	13,07	13,94	14,35
<b>80 и ст.</b>	7,63	7,71	8,40	9,12	9,61	9,25	10,36	11,71	12,26	12,19	13,32	15,53
<b>15-59</b>	2,87	3,04	3,05	3,32	3,42	3,43	3,33	3,56	3,66	3,66	3,79	4,02
<b>«Грубый» показатель</b>	3,10	3,29	3,38	3,66	3,89	4,04	3,96	4,39	4,55	4,62	4,82	5,10
<b>Стандарт. показатель</b>	2,43	2,57	2,60	2,80	2,96	3,03	2,91	3,18	3,28	3,28	3,40	3,57
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	1,32	1,23	1,24	1,25	1,20	1,42	1,37	1,28	1,15	<b>27,6</b>	-	-
<b>30-39</b>	2,61	2,61	2,87	2,88	2,85	2,97	3,02	2,99	2,93	<b>31,0</b>	<b>13,3</b>	-
<b>40-49</b>	5,46	5,08	5,54	5,61	5,08	5,46	5,57	5,70	5,66	<b>24,4</b>	<b>7,6</b>	-
<b>50-59</b>	9,05	9,29	9,38	8,82	8,90	9,62	9,40	9,31	9,40	<b>51,6</b>	<b>3,3</b>	-
<b>60-69</b>	12,52	13,38	13,81	13,51	14,71	15,21	15,34	14,94	15,48	<b>121,3</b>	<b>31,6</b>	<b>10,9</b>
<b>70-79</b>	14,61	14,73	16,40	17,24	18,60	18,02	19,12	18,94	20,63	<b>120,3</b>	<b>50,8</b>	<b>15,9</b>
<b>80 и ст.</b>	15,91	17,82	15,93	16,27	17,68	19,25	18,69	19,29	18,90	<b>193,6</b>	<b>35,4</b>	<b>14,8</b>
<b>15-59</b>	4,01	3,95	4,17	4,10	4,01	4,34	4,37	4,38	4,38	<b>50,1</b>	<b>14,4</b>	<b>9,0</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	5,10	5,17	5,44	5,46	5,65	5,93	6,10	6,09	6,25	<b>102,1</b>	<b>30,2</b>	<b>14,3</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	3,54	3,56	3,75	3,69	3,75	3,95	3,99	3,97	4,00	<b>62,8</b>	<b>18,0</b>	<b>8,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 101**

**Динамика показателей заболеваемости меланомой кожи (C43), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,77	0,89	0,92	1,11	0,98	1,18	1,03	1,36	1,47	1,44	1,08	1,41
<b>30-39</b>	1,54	1,77	1,83	1,85	1,83	2,00	1,95	2,10	1,98	2,06	2,16	2,18
<b>40-49</b>	3,61	3,47	3,82	3,99	3,92	3,55	3,82	3,87	3,80	3,96	4,06	3,95
<b>50-59</b>	5,25	5,43	6,00	5,97	7,03	7,55	6,84	6,91	7,54	7,22	7,67	8,10
<b>60-69</b>	7,37	7,70	8,48	8,69	8,77	9,67	8,74	8,97	10,43	10,64	11,69	12,21
<b>70-79</b>	12,36	11,51	12,81	11,67	13,14	13,99	13,50	14,86	13,40	13,54	15,79	14,45
<b>80 и ст.</b>	11,12	9,64	12,32	13,39	12,66	11,97	12,30	13,91	16,41	15,31	20,00	19,35
<b>15-59</b>	2,30	2,44	2,64	2,71	2,83	2,84	2,77	2,98	3,01	3,03	3,07	3,28
<b>«Грубый» показатель</b>	2,52	2,61	2,89	2,96	3,15	3,32	3,25	3,52	3,69	3,72	3,95	4,05
<b>Стандарт. показатель</b>	2,30	2,33	2,58	2,61	2,76	2,86	2,73	2,92	3,05	3,01	3,20	3,26
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	1,49	1,23	1,14	0,99	0,96	1,24	1,12	1,04	0,76	<b>6,6</b>	<b>-29,3</b>	-
<b>30-39</b>	2,11	1,93	2,18	2,27	2,14	2,18	2,42	2,61	2,53	<b>43,8</b>	<b>22,6</b>	<b>20,0</b>
<b>40-49</b>	4,56	3,86	4,38	4,36	4,15	4,16	4,53	4,38	4,46	<b>23,7</b>	-	-
<b>50-59</b>	7,89	7,85	7,84	7,83	7,93	8,19	8,43	8,18	8,59	<b>48,0</b>	<b>8,7</b>	<b>8,8</b>
<b>60-69</b>	12,45	13,58	13,51	13,97	15,64	14,49	15,07	15,37	15,38	<b>129,8</b>	<b>33,1</b>	-
<b>70-79</b>	15,43	14,86	18,78	18,62	20,51	20,00	21,45	21,30	22,70	<b>103,9</b>	<b>60,0</b>	<b>18,5</b>
<b>80 и ст.</b>	19,94	24,47	22,71	20,15	22,67	26,44	24,50	24,26	22,60	<b>170,6</b>	<b>22,9</b>	-
<b>15-59</b>	3,42	3,13	3,30	3,29	3,25	3,39	3,60	3,57	3,60	<b>46,3</b>	<b>14,1</b>	<b>12,1</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	4,20	4,08	4,39	4,41	4,64	4,71	5,03	5,03	5,10	<b>102,0</b>	<b>32,5</b>	<b>16,1</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	3,36	3,28	3,49	3,44	3,60	3,63	3,81	3,80	3,77	<b>64,1</b>	<b>20,7</b>	<b>10,0</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 101**

**Динамика показателей заболеваемости меланомой кожи (C43), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	1,18	1,08	0,97	1,20	1,19	1,02	1,26	1,22	1,43	1,29	1,20	1,47
<b>30-39</b>	2,89	2,97	2,75	2,95	3,41	3,24	2,74	3,27	3,37	2,94	3,30	3,28
<b>40-49</b>	5,32	5,59	5,11	6,35	5,96	5,59	5,77	5,99	6,07	6,01	6,40	6,45
<b>50-59</b>	6,20	6,85	6,99	7,41	7,90	8,99	8,30	8,87	9,26	9,72	9,97	10,47
<b>60-69</b>	7,17	8,29	7,97	8,21	9,50	10,21	8,95	11,35	10,98	11,49	11,82	12,72
<b>70-79</b>	8,85	8,98	9,34	10,98	10,99	11,04	11,48	12,02	12,38	12,86	13,10	14,31
<b>80 и ст.</b>	6,75	7,23	7,42	8,05	8,85	8,56	9,86	11,14	11,16	11,37	11,72	14,60
<b>15-59</b>	3,41	3,62	3,45	3,91	3,99	4,00	3,86	4,12	4,29	4,26	4,47	4,73
<b>«Грубый» показатель</b>	3,61	3,89	3,81	4,27	4,54	4,68	4,60	5,16	5,31	5,42	5,58	6,00
<b>Стандарт. показатель</b>	2,64	2,82	2,69	3,02	3,18	3,22	3,12	3,43	3,53	3,54	3,63	3,86
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	1,14	1,22	1,34	1,52	1,45	1,60	1,63	1,54	1,55	<b>49,8</b>	<b>33,0</b>	-
<b>30-39</b>	3,10	3,27	3,55	3,47	3,55	3,74	3,61	3,37	3,32	<b>22,7</b>	-	-
<b>40-49</b>	6,29	6,18	6,59	6,75	5,92	6,64	6,52	6,91	6,78	<b>23,8</b>	-	-
<b>50-59</b>	9,98	10,45	10,61	9,62	9,68	10,77	10,18	10,23	10,06	<b>53,8</b>	-	-
<b>60-69</b>	12,57	13,26	14,00	13,22	14,11	15,67	15,52	14,65	15,55	<b>116,0</b>	<b>30,7</b>	-
<b>70-79</b>	14,24	14,67	15,28	16,58	17,69	17,07	18,01	17,82	19,67	<b>124,2</b>	<b>45,9</b>	<b>14,6</b>
<b>80 и ст.</b>	14,92	16,11	14,08	15,16	16,21	17,10	16,93	17,75	17,75	<b>194,8</b>	<b>36,9</b>	<b>16,2</b>
<b>15-59</b>	4,56	4,72	4,97	4,85	4,73	5,23	5,10	5,15	5,11	<b>51,9</b>	<b>14,7</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	5,87	6,10	6,35	6,35	6,51	6,98	7,02	7,00	7,25	<b>101,0</b>	<b>28,9</b>	<b>13,6</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	3,72	3,85	4,05	3,97	3,97	4,30	4,24	4,20	4,28	<b>61,8</b>	<b>17,4</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 102

## Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении меланомы кожи (C43), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	57,0	57,2	57,5	57,1	57,6	58,2	57,9	58,6	58,5	59,0	58,8	58,5
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	55,7	55,5	55,9	55,7	56,1	56,7	56,7	56,8	56,9	57,4	57,7	57,7
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,26	0,28	0,28	0,30	0,32	0,33	0,31	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	58,5	59,1	59,1	59,5	60,8	60,3	60,9	61,1	61,6	7,4	5,6	2,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	58,0	58,9	58,7	59,0	59,9	59,6	60,0	60,3	60,8	9,7	5,5	2,6
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,38	0,39	0,42	0,41	0,42	0,44	0,45	0,44	0,45	71,9	23,6	9,4
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	56,4	56,1	56,3	56,0	56,1	56,6	55,7	55,0	56,2	56,0	57,8	56,8
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	54,8	53,8	54,2	54,0	54,4	54,9	54,8	54,4	54,9	55,2	56,5	55,6
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,25	0,26	0,28	0,28	0,30	0,31	0,29	0,30	0,32	0,33	0,34	0,35

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 102**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении меланомы кожи (C43), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	56,6	58,3	58,6	58,8	60,2	59,7	60,1	60,5	60,7	9,4	7,1	2,6
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	55,7	57,4	57,8	58,0	59,1	58,8	59,1	59,4	59,9	11,8	7,6	2,6
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,36	0,36	0,39	0,38	0,41	0,41	0,43	0,43	0,43	75,3	29,9	12,2
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Женщины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	57,4	57,9	58,3	57,9	58,6	59,2	59,3	60,5	60,1	60,4	59,5	59,6
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	56,2	56,5	57,0	56,8	57,2	57,8	57,9	58,3	58,0	58,7	58,5	59,0
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,28	0,30	0,29	0,32	0,34	0,35	0,33	0,37	0,38	0,38	0,39	0,41
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	59,7	59,7	59,4	60,0	61,4	60,6	61,4	61,5	62,3	6,4	4,7	30,0
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	59,5	59,7	59,2	59,6	60,4	60,0	60,5	60,9	61,4	8,4	4,2	2,6
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,40	0,42	0,45	0,44	0,44	0,47	0,47	0,46	0,48	70,2	22,1	8,5

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 103**

**Динамика абсолютного числа умерших от меланомы кожи (C43) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>2269</b>	<b>2541</b>	<b>2720</b>	<b>2755</b>	<b>2851</b>	<b>2902</b>	<b>3023</b>	<b>3033</b>	<b>3149</b>	<b>3159</b>	<b>3325</b>	<b>3495</b>
<b>20-24</b>	12	17	18	21	18	11	30	17	31	18	21	20
<b>25-29</b>	35	43	39	40	37	51	35	49	51	34	51	53
<b>30-34</b>	66	67	78	79	69	79	85	68	83	83	86	91
<b>35-39</b>	132	123	142	122	106	109	108	95	105	101	104	117
<b>40-44</b>	184	187	195	212	222	180	196	166	146	179	167	164
<b>45-49</b>	225	285	260	262	268	287	303	288	289	260	264	272
<b>50-54</b>	218	263	295	297	353	332	360	352	374	350	346	378
<b>55-59</b>	190	151	188	181	225	312	321	398	402	419	432	421
<b>60-64</b>	296	336	368	359	324	282	221	234	258	272	377	429
<b>65-69</b>	273	283	283	309	325	409	440	429	443	381	326	290
<b>70-74</b>	270	340	345	361	316	289	316	301	292	376	426	476
<b>75-79</b>	140	217	242	274	332	313	324	333	331	333	332	327
<b>80-84</b>	102	93	121	127	141	138	159	181	238	231	233	289
<b>85 и ст.</b>	113	122	136	102	106	101	112	107	98	110	148	161

**Продолжение таблицы 103**

**Динамика абсолютного числа умерших от меланомы кожи (C43) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>						
<b>Всего</b>	<b>3368</b>	<b>3419</b>	<b>3456</b>	<b>44,6</b>	<b>23,2</b>	<b>-</b>
<b>20-24</b>	20	19	14	-	-	-
<b>25-29</b>	53	51	35	-	-	-
<b>30-34</b>	73	82	97	<b>28,2</b>	-	-
<b>35-39</b>	132	117	120	-	<b>19,8</b>	-
<b>40-44</b>	132	132	181	<b>-26,2</b>	<b>-26,2</b>	-
<b>45-49</b>	221	219	216	-	<b>-25,0</b>	<b>-21,0</b>
<b>50-54</b>	384	347	338	<b>38,9</b>	-	-
<b>55-59</b>	357	416	417	<b>179,9</b>	<b>47,8</b>	-
<b>60-64</b>	497	420	476	<b>53,8</b>	<b>113,5</b>	<b>56,5</b>
<b>65-69</b>	238	300	319	-	<b>-31,2</b>	-
<b>70-74</b>	462	471	404	<b>58,9</b>	<b>70,2</b>	-
<b>75-79</b>	314	384	395	<b>79,3</b>	<b>16,4</b>	-
<b>80-84</b>	281	258	252	<b>246,6</b>	<b>106,4</b>	-
<b>85 и ст.</b>	199	196	189	<b>93,1</b>	<b>141,3</b>	<b>70,0</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 103**

**Динамика абсолютного числа умерших от меланомы кожи (C43) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>987</b>	<b>1125</b>	<b>1222</b>	<b>1222</b>	<b>1282</b>	<b>1339</b>	<b>1389</b>	<b>1331</b>	<b>1433</b>	<b>1444</b>	<b>1543</b>	<b>1595</b>
<b>20-24</b>	5	6	11	10	11	8	17	8	18	7	11	7
<b>25-29</b>	12	22	18	21	22	23	13	26	30	19	24	31
<b>30-34</b>	37	26	32	47	35	37	43	34	49	48	34	48
<b>35-39</b>	62	57	80	63	52	68	60	48	47	60	44	69
<b>40-44</b>	91	97	84	102	118	93	99	78	78	84	89	86
<b>45-49</b>	100	133	126	129	144	140	166	133	139	122	133	140
<b>50-54</b>	112	138	152	157	181	165	189	172	168	182	184	168
<b>55-59</b>	97	88	99	90	120	159	172	202	205	218	213	214
<b>60-64</b>	144	165	171	167	160	138	110	112	125	135	210	212
<b>65-69</b>	126	127	129	141	142	202	197	194	204	187	150	141
<b>70-74</b>	101	140	154	141	129	120	129	113	129	147	209	202
<b>75-79</b>	39	74	92	82	112	116	120	123	137	133	130	132
<b>80-84</b>	35	19	38	43	30	36	42	52	76	74	76	104
<b>85 и ст.</b>	21	31	30	25	22	27	24	28	24	24	29	39

**Продолжение таблицы 103**

**Динамика абсолютного числа умерших от меланомы кожи (C43) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>						
<b>Всего</b>	<b>1558</b>	<b>1576</b>	<b>1601</b>	<b>52,1</b>	<b>26,2</b>	<b>8,2</b>
<b>20-24</b>	11	8	6	-	-	-
<b>25-29</b>	29	29	15	-	-	-
<b>30-34</b>	37	49	52	<b>45,6</b>	-	-
<b>35-39</b>	68	57	57	-	-	-
<b>40-44</b>	70	73	95	-	-	-
<b>45-49</b>	107	108	109	-	<b>-27,8</b>	-
<b>50-54</b>	201	175	164	<b>31,3</b>	-	-
<b>55-59</b>	184	218	211	<b>167,3</b>	<b>44,7</b>	-
<b>60-64</b>	265	205	238	<b>68,4</b>	<b>124,0</b>	-
<b>65-69</b>	117	149	153	-	-	-
<b>70-74</b>	203	193	177	<b>75,1</b>	<b>84,7</b>	-
<b>75-79</b>	129	167	171	<b>153,3</b>	<b>45,7</b>	<b>36,0</b>
<b>80-84</b>	89	93	96	<b>479,8</b>	<b>246,1</b>	-
<b>85 и ст.</b>	45	50	55	<b>136,4</b>	<b>197,0</b>	<b>151,4</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 103**

**Динамика абсолютного числа умерших от меланомы кожи (C43) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1282</b>	<b>1416</b>	<b>1498</b>	<b>1533</b>	<b>1569</b>	<b>1563</b>	<b>1634</b>	<b>1702</b>	<b>1716</b>	<b>1715</b>	<b>1782</b>	<b>1900</b>
<b>20-24</b>	7	11	7	11	7	3	13	9	13	11	10	13
<b>25-29</b>	23	21	21	19	15	28	22	23	21	15	27	22
<b>30-34</b>	29	41	46	32	34	42	42	34	34	35	52	43
<b>35-39</b>	70	66	62	59	54	41	48	47	58	41	60	48
<b>40-44</b>	93	90	111	110	104	87	97	88	68	95	78	78
<b>45-49</b>	125	152	134	133	124	147	137	155	150	138	131	132
<b>50-54</b>	106	125	143	140	172	167	171	180	206	168	162	210
<b>55-59</b>	93	63	89	91	105	153	149	196	197	201	219	207
<b>60-64</b>	152	171	197	192	164	144	111	122	133	137	167	217
<b>65-69</b>	147	156	154	168	183	207	243	235	239	194	176	149
<b>70-74</b>	169	200	191	220	187	169	187	188	163	229	217	274
<b>75-79</b>	101	143	150	192	220	197	204	210	194	200	202	195
<b>80-84</b>	67	74	83	84	111	102	117	129	162	157	157	185
<b>85 и ст.</b>	92	91	106	77	84	74	88	79	74	86	119	122

**Продолжение таблицы 103**

**Динамика абсолютного числа умерших от меланомы кожи (C43) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>						
<b>Всего</b>	<b>1810</b>	<b>1843</b>	<b>1855</b>	<b>38,8</b>	<b>20,7</b>	<b>-</b>
<b>20-24</b>	9	11	8	-	-	-
<b>25-29</b>	24	22	20	-	-	-
<b>30-34</b>	36	33	45	-	-	-
<b>35-39</b>	64	60	63	-	<b>35,4</b>	-
<b>40-44</b>	62	59	86	<b>-33,0</b>	<b>-29,5</b>	-
<b>45-49</b>	114	111	107	-	<b>-22,1</b>	<b>-23,4</b>
<b>50-54</b>	183	172	174	<b>47,2</b>	-	-
<b>55-59</b>	173	198	206	<b>194,4</b>	<b>51,2</b>	-
<b>60-64</b>	232	215	238	-	<b>103,6</b>	<b>65,8</b>
<b>65-69</b>	121	151	166	-	<b>-35,5</b>	-
<b>70-74</b>	259	278	227	<b>48,3</b>	<b>60,4</b>	-
<b>75-79</b>	185	217	224	<b>47,6</b>	-	-
<b>80-84</b>	192	165	156	<b>186,0</b>	<b>68,1</b>	-
<b>85 и ст.</b>	154	146	134	<b>82,0</b>	<b>126,9</b>	<b>52,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 104

**Динамика показателей смертности от меланомы кожи (C43), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,23	0,28	0,27	0,29	0,25	0,27	0,28	0,28	0,34	0,21	0,29	0,30
<b>30-39</b>	0,91	0,90	1,08	1,01	0,89	0,96	0,99	0,82	0,94	0,90	0,92	1,00
<b>40-49</b>	1,72	1,97	1,89	1,97	2,05	1,97	2,16	2,00	1,97	2,05	2,08	2,13
<b>50-59</b>	2,89	2,91	3,34	3,16	3,57	3,69	3,66	3,84	3,87	3,74	3,72	3,80
<b>60-69</b>	3,86	4,20	4,46	4,70	4,74	5,32	5,37	5,57	6,02	5,74	6,21	6,32
<b>70-79</b>	4,57	5,94	6,10	6,52	6,72	6,42	6,96	6,91	6,71	7,47	7,83	8,21
<b>80 и ст.</b>	7,28	7,43	9,05	8,07	9,16	8,47	9,06	8,97	9,73	9,20	9,69	11,18
<b>15-59</b>	1,16	1,25	1,33	1,32	1,38	1,43	1,50	1,49	1,54	1,51	1,55	1,60
<b>«Грубый» показатель</b>	1,55	1,75	1,89	1,93	1,99	2,03	2,13	2,13	2,22	2,23	2,34	2,46
<b>Стандарт. показатель</b>	1,10	1,21	1,30	1,30	1,34	1,38	1,43	1,42	1,46	1,44	1,52	1,57
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>20-29</b>	0,30	0,30	0,21	-	-	-						
<b>30-39</b>	0,96	0,92	0,98	-	-	-						
<b>40-49</b>	1,80	1,82	2,09	-	-	-						
<b>50-59</b>	3,42	3,50	3,46	<b>17,6</b>	-	<b>-9,1</b>						
<b>60-69</b>	6,08	5,67	5,81	<b>51,3</b>	<b>18,5</b>	-						
<b>70-79</b>	7,76	8,68	8,46	<b>60,2</b>	<b>34,6</b>	<b>13,5</b>						
<b>80 и ст.</b>	11,17	10,37	10,02	<b>42,1</b>	<b>23,9</b>	-						
<b>15-59</b>	1,45	1,48	1,53	<b>25,3</b>	-	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	2,36	2,39	2,41	<b>46,8</b>	<b>22,8</b>	-						
<b>Стандарт. показатель</b>	1,47	1,47	1,48	<b>28,3</b>	<b>10,2</b>	-						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 104**

**Динамика показателей смертности от меланомы кожи (C43), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,16	0,26	0,27	0,29	0,29	0,27	0,26	0,29	0,40	0,21	0,28	0,31
<b>30-39</b>	0,91	0,79	1,09	1,10	0,89	1,09	1,07	0,84	0,97	1,07	0,76	1,14
<b>40-49</b>	1,66	1,99	1,81	1,99	2,28	2,06	2,40	1,95	2,06	2,02	2,24	2,32
<b>50-59</b>	3,27	3,49	3,81	3,59	4,11	4,13	4,33	4,29	4,17	4,37	4,27	4,08
<b>60-69</b>	4,55	4,94	5,15	5,46	5,59	6,72	6,46	6,68	7,32	7,29	8,12	7,88
<b>70-79</b>	5,22	7,52	8,35	7,42	7,96	7,97	8,52	8,03	8,89	9,13	10,85	10,58
<b>80 и ст.</b>	9,31	8,38	11,50	11,44	10,00	11,50	11,15	12,16	13,52	11,90	11,72	15,43
<b>15-59</b>	1,14	1,26	1,34	1,37	1,48	1,51	1,64	1,51	1,57	1,59	1,59	1,66
<b>«Грубый» показатель</b>	1,44	1,65	1,82	1,83	1,92	2,02	2,11	2,02	2,18	2,20	2,35	2,43
<b>Стандарт. показатель</b>	1,21	1,36	1,49	1,47	1,54	1,63	1,67	1,60	1,70	1,69	1,82	1,86
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>20-29</b>	0,33	0,31	0,18	-	-	-						
<b>30-39</b>	1,00	0,99	1,00	-	-	-						
<b>40-49</b>	1,89	1,96	2,23	-	-	-						
<b>50-59</b>	3,97	4,03	3,83	<b>14,5</b>	<b>-6,8</b>	<b>-11,5</b>						
<b>60-69</b>	7,87	6,90	7,09	<b>64,2</b>	<b>22,6</b>	-						
<b>70-79</b>	10,26	11,36	11,55	<b>81,3</b>	<b>54,1</b>	<b>20,1</b>						
<b>80 и ст.</b>	13,40	13,88	14,46	<b>55,7</b>	<b>37,6</b>	-						
<b>15-59</b>	1,55	1,58	1,58	<b>29,6</b>	-	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	2,36	2,38	2,41	<b>56,5</b>	<b>26,5</b>	-						
<b>Стандарт. показатель</b>	1,77	1,76	1,76	<b>37,8</b>	<b>14,7</b>	-						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 104**

**Динамика показателей смертности от меланомы кожи (C43), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,29	0,31	0,27	0,28	0,20	0,27	0,30	0,27	0,28	0,22	0,30	0,29
<b>30-39</b>	0,91	1,02	1,07	0,92	0,89	0,84	0,91	0,81	0,91	0,74	1,07	0,86
<b>40-49</b>	1,78	1,96	1,97	1,95	1,83	1,89	1,93	2,04	1,88	2,08	1,92	1,96
<b>50-59</b>	2,57	2,42	2,94	2,81	3,12	3,34	3,11	3,48	3,63	3,24	3,29	3,58
<b>60-69</b>	3,39	3,71	4,01	4,19	4,18	4,43	4,68	4,87	5,20	4,76	4,98	5,31
<b>70-79</b>	4,29	5,25	5,11	6,12	6,15	5,71	6,24	6,39	5,67	6,67	6,39	7,07
<b>80 и ст.</b>	6,76	7,18	8,41	7,18	8,96	7,74	8,54	8,15	8,70	8,43	9,09	9,91
<b>15-59</b>	1,18	1,24	1,32	1,27	1,28	1,36	1,37	1,47	1,50	1,43	1,50	1,54
<b>«Грубый» показатель</b>	1,65	1,83	1,96	2,01	2,04	2,05	2,15	2,23	2,25	2,25	2,34	2,49
<b>Стандарт. показатель</b>	1,05	1,13	1,20	1,20	1,20	1,23	1,27	1,32	1,32	1,29	1,34	1,40
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>20-29</b>	0,28	0,28	0,25	-	-	-						
<b>30-39</b>	0,92	0,85	0,97	-	-	-						
<b>40-49</b>	1,72	1,70	1,95	-	-	-						
<b>50-59</b>	2,97	3,07	3,16	<b>21,7</b>	-	-						
<b>60-69</b>	4,88	4,83	4,95	<b>40,0</b>	<b>13,6</b>	-						
<b>70-79</b>	6,56	7,40	7,02	<b>45,8</b>	<b>22,3</b>	-						
<b>80 и ст.</b>	10,49	9,30	8,64	<b>34,2</b>	-	-						
<b>15-59</b>	1,36	1,39	1,48	<b>21,0</b>	-	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	2,36	2,40	2,41	<b>39,4</b>	<b>20,0</b>	-						
<b>Стандарт. показатель</b>	1,28	1,30	1,32	<b>20,8</b>	<b>8,0</b>	-						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 105

## Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от меланомы кожи (C43), Россия, 1999-2013 гг.

Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	61,0	61,8	61,8	62,2	61,8	61,4	61,4	61,5	61,7	62,3	62,4	62,6
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	59,5	60,0	60,4	60,4	60,8	60,6	60,6	61,1	61,2	61,7	61,9	62,2
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,12	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17
<b>Показатель</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	63,1	63,8	63,2	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>	<b>2,2</b>						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	62,8	63,2	62,8	<b>5,7</b>	<b>4,6</b>	<b>2,4</b>						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,16	0,17	0,17	-	-	-						
Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	58,6	59,6	60,1	59,3	58,1	59,0	57,9	58,9	59,5	59,5	60,8	60,8
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	57,4	58,3	58,5	58,0	58,0	58,5	58,2	59,2	59,4	59,7	60,3	60,4
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,13	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,21	0,21

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 105**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от меланомы кожи (C43), Россия, 1999-2013 гг.**

Показатель	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %								
				1999-2013	2003-2013	2008-2013						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	61,3	61,7	61,9	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>3,6</b>						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	60,7	61,3	61,5	<b>6,7</b>	<b>6,1</b>	<b>2,8</b>						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,20	0,20	0,20	-	-	-						
<b>Показатель</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Женщины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	62,9	63,7	63,4	64,3	65,0	63,9	65,5	64,6	64,0	65,2	64,4	64,4
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	61,1	61,4	61,8	62,3	63,0	62,3	62,6	62,6	62,7	63,4	63,2	63,8
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15
Показатель	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %								
				1999-2013	2003-2013	2008-2013						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	65,3	66,2	64,6	<b>2,8</b>	-	-						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	64,7	64,8	64,0	<b>5,2</b>	<b>3,6</b>	-						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,14	0,15	0,15	-	-	-						

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 106

## Динамика показателей диагностики меланомы кожи (C43), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	4461	4712	4880	5253	5578	5744	5621	6163	6335	6414	6725
из них доля выявленных активно, %	7,5	7,3	8,0	7,3	8,8	8,6	8,9	8,9	9,3	10,7	10,5
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	96,2	96,9	96,7	96,9	96,8	96,5	96,4	96,6	96,5	97,5	97,3
*I-II ст., %	62,2	62,7	62,0	60,3	62,0	60,1	61,2	63,3	63,6	62,4	63,5
*III ст., %	20,8	20,4	20,9	22,3	21,8	22,9	22,5	22,9	22,5	24,1	23,3
*IV ст., %	9,2	9,7	10,4	9,9	10,2	10,9	10,9	10,1	9,5	9,7	10,0
Показатель одногодичной летальности, %	17,6	17,8	16,4	16,4	16,7	16,7	16,8	16,4	15,1	15,7	15,0
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	7018	6980	7069	7385	7420	7578	8001	8252	8182	8275	
из них доля выявленных активно, %	11,2	11,5	9,5	11,5	11,4	12,1	11,8	14,9	15,8	19,1	
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	97,0	97,4	97,7	97,4	97,8	97,9	98,0	97,9	98,4	98,3	
*I-II ст., %	64,5	63,7	64,9	68,2	67,4	68,6	68,1	71,3	72,5	73,1	
*III ст., %	22,1	22,5	21,3	19,6	19,2	19,0	18,7	16,8	15,5	15,0	
*IV ст., %	9,4	10,0	10,5	9,5	10,0	9,6	9,7	9,0	9,0	8,8	
Показатель одногодичной летальности, %	14,2	14,1	14,2	14,2	13,4	14,4	13,1	13,1	12,0	12,3	

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 107

**Динамика сведений о контингенте больных меланомой кожи (C43), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных, состоящих на учете на конец года	29654	31594	33230	35042	37102	38855	40085	42404	44678	46702	49751
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	51,2	52,5	51,8	52,0	52,6	51,3	51,6	51,2	52,1	52,4	52,2
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	-	71,3	68,5	68,5	69,7	67,3	65,4	65,3	66,4	65,9	66,9
Показатель распространенности на 100 000 населения	20,0	21,4	22,5	23,8	25,3	26,5	27,5	29,2	31,1	32,7	34,7
Индекс накопления контингента	6,7	6,7	6,8	6,7	6,7	6,8	7,1	6,9	7,1	7,3	7,4
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных, состоящих на учете на конец года	51561	53981	56511	58481	60583	63079	66108	69087	71666	74263	
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	52,3	52,7	54,0	54,3	54,6	54,2	54,6	56,3	55,9	56,3	
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	67,3	67,1	68,3	67,9	66,5	66,4	66,8	68,8	68,5	69,0	
Показатель распространенности на 100 000 населения	36,1	38,0	39,7	41,2	42,7	44,5	46,6	48,3	50,1	51,8	
Индекс накопления контингента	7,4	7,7	8,0	7,9	8,2	8,3	8,3	8,4	8,8	9,0	

**Таблица 108**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО соединительной и других мягких тканей (C46.1,3,7-9;47;49) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>2688</b>	<b>2683</b>	<b>2700</b>	<b>2846</b>	<b>2997</b>	<b>2897</b>	<b>2888</b>	<b>3113</b>	<b>3159</b>	<b>3055</b>	<b>3050</b>	<b>3312</b>
<b>0-14</b>	138	115	118	120	110	122	140	126	118	106	114	150
<b>15-19</b>	61	77	77	77	116	92	84	80	87	78	82	90
<b>20-24</b>	79	74	81	69	77	83	74	86	87	89	88	116
<b>25-29</b>	81	69	72	69	79	80	94	103	83	92	101	93
<b>30-34</b>	121	135	120	107	123	86	86	95	103	107	85	97
<b>35-39</b>	141	162	170	172	172	163	144	163	147	107	120	117
<b>40-44</b>	198	156	169	189	217	194	216	206	228	185	218	205
<b>45-49</b>	168	197	203	232	241	231	241	253	290	269	266	253
<b>50-54</b>	212	232	164	155	194	208	229	333	333	306	300	339
<b>55-59</b>	298	286	320	296	309	259	205	207	210	223	269	306
<b>60-64</b>	333	310	262	325	318	339	363	370	367	379	301	285
<b>65-69</b>	344	337	383	379	383	343	330	329	309	323	341	446
<b>70-74</b>	190	243	248	296	313	334	320	398	395	370	314	331
<b>75-79</b>	162	131	134	173	167	192	185	194	234	255	286	293
<b>80-84</b>	104	114	129	117	111	95	102	100	88	111	103	124
<b>85 и ст.</b>	58	45	50	70	67	76	75	70	80	55	62	67

**Продолжение таблицы 108**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО соединительной и других мягких тканей (C46.1,3,7-9;47;49) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>3288</b>	<b>3368</b>	<b>3245</b>	<b>3380</b>	<b>3413</b>	<b>3413</b>	<b>3491</b>	<b>3400</b>	<b>3407</b>	<b>30,3</b>	<b>8,6</b>	<b>-</b>
<b>0-14</b>	121	140	132	137	157	184	146	150	149	<b>35,0</b>	-	-
<b>15-19</b>	85	98	79	100	68	56	54	53	34	<b>-29,1</b>	<b>-51,6</b>	<b>-57,8</b>
<b>20-24</b>	109	98	101	124	64	92	82	75	77	-	-	-
<b>25-29</b>	112	103	80	112	103	103	112	93	113	<b>49,4</b>	-	-
<b>30-34</b>	105	129	111	118	97	114	126	121	106	-	-	-
<b>35-39</b>	128	110	123	119	130	138	153	151	146	<b>-19,2</b>	<b>33,3</b>	<b>25,1</b>
<b>40-44</b>	175	176	165	211	173	161	187	165	173	-	-	-
<b>45-49</b>	279	283	253	276	290	271	248	213	196	-	<b>-18,7</b>	<b>-30,6</b>
<b>50-54</b>	340	344	287	328	351	337	340	338	319	<b>87,1</b>	-	-
<b>55-59</b>	321	367	363	411	370	378	410	401	397	<b>64,9</b>	<b>40,3</b>	-
<b>60-64</b>	222	223	240	243	359	376	421	409	445	-	<b>97,6</b>	<b>63,2</b>
<b>65-69</b>	465	417	418	301	270	210	245	270	281	-	<b>-45,5</b>	-
<b>70-74</b>	301	324	322	348	399	434	400	382	320	<b>47,6</b>	-	-
<b>75-79</b>	301	326	296	272	271	248	288	282	332	<b>122,2</b>	-	-
<b>80-84</b>	156	150	201	207	211	205	184	201	198	<b>150,1</b>	<b>70,6</b>	-
<b>85 и ст.</b>	68	80	74	73	100	106	95	96	121	<b>99,1</b>	<b>90,7</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 108**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО соединительной и других мягких тканей (C46.1,3,7-9;47;49)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1330</b>	<b>1331</b>	<b>1291</b>	<b>1308</b>	<b>1474</b>	<b>1381</b>	<b>1343</b>	<b>1499</b>	<b>1466</b>	<b>1447</b>	<b>1421</b>	<b>1577</b>
<b>0-14</b>	80	67	60	67	63	56	64	58	55	56	55	81
<b>15-19</b>	38	45	36	44	71	59	41	49	53	51	40	54
<b>20-24</b>	35	40	39	34	41	43	35	49	42	48	41	67
<b>25-29</b>	40	36	38	35	47	34	47	58	26	54	53	45
<b>30-34</b>	65	69	64	50	66	35	46	50	51	52	45	54
<b>35-39</b>	75	82	84	85	83	85	69	87	73	51	55	52
<b>40-44</b>	102	71	75	81	96	101	98	98	104	93	108	99
<b>45-49</b>	87	107	107	95	130	121	124	123	158	130	146	116
<b>50-54</b>	110	131	99	85	105	120	122	162	158	163	150	158
<b>55-59</b>	172	154	156	145	174	132	97	118	105	120	119	157
<b>60-64</b>	168	169	138	161	173	171	191	173	185	182	147	148
<b>65-69</b>	185	160	201	176	187	167	160	169	146	152	158	219
<b>70-74</b>	67	84	91	124	133	148	141	172	181	165	142	148
<b>75-79</b>	58	57	56	68	55	57	63	79	82	80	108	126
<b>80-84</b>	35	41	35	36	33	34	32	36	24	32	34	33
<b>85 и ст.</b>	13	18	12	22	17	18	13	18	23	18	20	20

**Продолжение таблицы 108**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО соединительной и других мягких тканей (C46.1,3,7-9;47;49) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1505</b>	<b>1630</b>	<b>1505</b>	<b>1640</b>	<b>1633</b>	<b>1644</b>	<b>1612</b>	<b>1594</b>	<b>1550</b>	<b>25,8</b>	-	<b>-5,1</b>
<b>0-14</b>	52	66	65	74	76	95	71	71	67	-	-	-
<b>15-19</b>	52	63	47	68	44	30	28	31	24	-	<b>-47,9</b>	<b>-62,3</b>
<b>20-24</b>	66	49	52	65	40	48	47	42	42	-	-	-
<b>25-29</b>	52	52	36	53	61	58	58	49	59	<b>56,2</b>	-	-
<b>30-34</b>	49	62	46	63	59	66	57	58	52	-	-	-
<b>35-39</b>	68	52	72	70	65	69	76	66	77	-	<b>36,0</b>	-
<b>40-44</b>	85	93	66	127	87	86	100	87	85	-	-	-
<b>45-49</b>	134	133	129	159	143	137	125	111	95	-	-	<b>-37,1</b>
<b>50-54</b>	148	189	145	165	173	169	164	160	158	<b>62,9</b>	-	-
<b>55-59</b>	152	201	172	204	182	193	196	196	200	<b>49,3</b>	<b>43,1</b>	-
<b>60-64</b>	108	113	123	116	190	180	185	205	212	-	<b>83,1</b>	<b>55,7</b>
<b>65-69</b>	199	213	194	142	121	90	124	135	107	<b>-30,9</b>	<b>-48,8</b>	-
<b>70-74</b>	136	156	143	151	184	200	175	177	145	<b>74,1</b>	-	-
<b>75-79</b>	133	127	119	90	98	113	108	116	128	<b>145,1</b>	-	<b>38,7</b>
<b>80-84</b>	56	39	70	69	80	80	70	64	65	<b>198,4</b>	<b>95,4</b>	-
<b>85 и ст.</b>	15	22	26	24	30	30	28	26	34	<b>126,9</b>	<b>80,2</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 108**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО соединительной и других мягких тканей (C46.1,3,7-9;47;49)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>1358</b>	<b>1352</b>	<b>1409</b>	<b>1538</b>	<b>1523</b>	<b>1516</b>	<b>1545</b>	<b>1614</b>	<b>1693</b>	<b>1608</b>	<b>1629</b>	<b>1735</b>
<b>0-14</b>	58	48	58	53	47	66	76	68	63	50	59	69
<b>15-19</b>	23	32	41	33	45	33	43	31	34	27	42	36
<b>20-24</b>	44	34	42	35	36	40	39	37	45	41	47	49
<b>25-29</b>	41	33	34	34	32	46	47	45	57	38	48	48
<b>30-34</b>	56	66	56	57	57	51	40	45	52	55	40	43
<b>35-39</b>	66	80	86	87	89	78	75	76	74	56	65	65
<b>40-44</b>	96	85	94	108	121	93	118	108	124	92	110	106
<b>45-49</b>	81	90	96	137	111	110	117	130	132	139	120	137
<b>50-54</b>	102	101	65	70	89	88	107	171	175	143	150	181
<b>55-59</b>	126	132	164	151	135	127	108	89	105	103	150	149
<b>60-64</b>	165	141	124	164	145	168	172	197	182	197	154	137
<b>65-69</b>	159	177	182	203	196	176	170	160	163	171	183	227
<b>70-74</b>	123	159	157	172	180	186	179	226	214	205	172	183
<b>75-79</b>	104	74	78	105	112	135	122	115	152	175	178	167
<b>80-84</b>	69	73	94	81	78	61	70	64	64	79	69	91
<b>85 и ст.</b>	45	27	38	48	50	58	62	52	57	37	42	47

**Продолжение таблицы 108**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО соединительной и других мягких тканей (C46.1,3,7-9;47;49) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1783</b>	<b>1738</b>	<b>1740</b>	<b>1740</b>	<b>1780</b>	<b>1769</b>	<b>1879</b>	<b>1806</b>	<b>1857</b>	<b>34,6</b>	<b>9,8</b>	<b>6,4</b>
<b>0-14</b>	69	74	67	63	81	89	75	79	82	<b>56,2</b>	<b>31,6</b>	
<b>15-19</b>	33	35	32	32	24	26	26	22	10	-36,4	-56,9	-49,8
<b>20-24</b>	43	49	49	59	24	44	35	33	35	-	-	-
<b>25-29</b>	60	51	44	59	42	45	54	44	54	<b>42,8</b>	-	-
<b>30-34</b>	56	67	65	55	38	48	69	63	54	-	-	-
<b>35-39</b>	60	58	51	49	65	69	77	85	69	-	-	-
<b>40-44</b>	90	83	99	84	86	75	87	78	88	-21,3	-23,0	-
<b>45-49</b>	145	150	124	117	147	134	123	102	101	-	-	-
<b>50-54</b>	192	155	142	163	178	168	176	178	161	<b>117,2</b>	-	-
<b>55-59</b>	169	166	191	207	188	185	214	205	197	<b>83,1</b>	<b>37,6</b>	-
<b>60-64</b>	114	110	117	127	169	196	236	204	233	-	<b>113,1</b>	<b>70,7</b>
<b>65-69</b>	266	204	224	159	149	120	121	135	174	-	-42,6	-
<b>70-74</b>	165	168	179	197	215	234	225	205	175	<b>30,4</b>	-	-
<b>75-79</b>	168	199	177	182	173	135	180	166	204	<b>109,4</b>	-	-
<b>80-84</b>	100	111	131	138	131	125	114	137	133	<b>130,4</b>	<b>59,5</b>	-
<b>85 и ст.</b>	53	58	48	49	70	76	67	70	87	<b>89,53</b>	<b>95,28</b>	<b>47,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 109

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО соединительной и других мягких тканей (С46.1,3,7-9;47;49), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>0-9</b>	0,42	0,35	0,39	0,43	0,41	0,44	0,52	0,57	0,54	0,48	0,58	0,77
<b>10-19</b>	0,50	0,54	0,53	0,51	0,66	0,61	0,61	0,53	0,57	0,53	0,54	0,66
<b>20-29</b>	0,81	0,73	0,77	0,69	0,77	0,79	0,81	0,90	0,80	0,85	0,85	0,92
<b>30-39</b>	1,04	1,19	1,18	1,17	1,27	1,11	1,06	1,23	1,23	1,08	1,04	1,10
<b>40-49</b>	2,02	1,79	1,76	1,90	2,01	1,82	1,93	1,92	2,15	1,88	2,02	1,94
<b>50-59</b>	2,99	3,18	3,12	3,01	3,44	3,28	3,07	3,79	3,75	3,50	3,51	3,70
<b>60-69</b>	4,47	4,36	4,43	4,87	4,84	4,66	4,70	4,75	4,63	4,94	4,69	5,63
<b>70-79</b>	5,48	5,71	5,61	6,45	6,11	6,22	5,63	6,31	6,54	6,42	6,22	6,65
<b>80 и ст.</b>	5,06	4,89	5,47	5,84	5,74	5,67	5,99	5,87	5,92	5,85	6,12	6,77
<b>15-59</b>	1,50	1,52	1,50	1,49	1,66	1,52	1,49	1,66	1,70	1,57	1,61	1,69
<b>«Грубый» показатель</b>	1,81	1,81	1,83	1,93	2,04	1,98	1,98	2,14	2,20	2,14	2,13	2,32
<b>Стандарт. показатель</b>	1,48	1,48	1,46	1,54	1,63	1,56	1,56	1,67	1,69	1,62	1,63	1,78
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	0,56	0,75	0,69	0,71	0,84	1,02	0,79	0,77	0,74	<b>152,0</b>	-	-
<b>10-19</b>	0,66	0,72	0,65	0,83	0,66	0,59	0,54	0,57	0,45	-	-	<b>-39,8</b>
<b>20-29</b>	0,96	0,85	0,75	0,97	0,68	0,80	0,81	0,71	0,83	-	-	-
<b>30-39</b>	1,19	1,21	1,17	1,16	1,10	1,21	1,31	1,26	1,14	-	-	-
<b>40-49</b>	1,96	2,02	1,89	2,27	2,23	2,11	2,22	1,97	1,94	<b>13,1</b>	-	<b>-14,3</b>
<b>50-59</b>	3,55	3,64	3,24	3,60	3,45	3,40	3,46	3,39	3,28	<b>9,6</b>	<b>-7,4</b>	<b>-6,9</b>
<b>60-69</b>	5,58	5,38	5,65	4,78	5,56	5,15	5,51	5,34	5,31	<b>23,9</b>	-	-
<b>70-79</b>	6,55	7,09	6,65	6,53	6,92	6,97	6,88	6,74	6,91	<b>22,9</b>	-	-
<b>80 и ст.</b>	7,49	7,17	7,97	7,56	7,91	7,73	6,49	6,79	7,25	<b>50,2</b>	-	-
<b>15-59</b>	1,72	1,76	1,61	1,87	1,72	1,73	1,81	1,72	1,68	<b>18,8</b>	-	-
<b>«Грубый» показатель</b>	2,32	2,36	2,28	2,38	2,41	2,40	2,44	2,37	2,37	<b>36,0</b>	<b>8,0</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	1,73	1,79	1,70	1,79	1,79	1,80	1,80	1,73	1,69	<b>21,1</b>	-	<b>-5,3</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 109**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО соединительной и других мягких тканей (С46.1,3,7-9;47;49), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>0-9</b>	0,46	0,38	0,36	0,47	0,51	0,37	0,51	0,59	0,50	0,46	0,57	0,88
<b>10-19</b>	0,62	0,64	0,52	0,57	0,75	0,70	0,54	0,53	0,62	0,66	0,50	0,71
<b>20-29</b>	0,74	0,76	0,76	0,67	0,85	0,73	0,77	1,00	0,64	0,95	0,84	0,98
<b>30-39</b>	1,11	1,21	1,21	1,13	1,28	1,07	1,06	1,30	1,21	1,03	1,02	1,10
<b>40-49</b>	2,13	1,85	1,77	1,64	2,05	1,96	1,93	1,91	2,25	1,92	2,21	1,90
<b>50-59</b>	3,64	3,88	3,66	3,43	4,26	3,93	3,43	4,33	3,99	4,11	3,67	4,01
<b>60-69</b>	6,01	5,65	5,88	5,85	6,20	5,74	5,92	5,79	5,68	5,92	5,65	7,25
<b>70-79</b>	7,39	8,15	8,08	9,66	8,46	8,31	7,61	8,82	8,92	8,15	8,26	9,25
<b>80 и ст.</b>	7,52	9,02	7,15	9,03	8,01	8,53	7,48	9,05	7,95	8,41	10,39	9,67
<b>15-59</b>	1,62	1,64	1,55	1,45	1,80	1,61	1,50	1,75	1,70	1,68	1,64	1,72
<b>«Грубый» показатель</b>	1,91	1,92	1,86	1,89	2,14	2,01	1,96	2,20	2,18	2,17	2,13	2,38
<b>Стандарт. показатель</b>	1,77	1,79	1,71	1,76	1,94	1,78	1,73	1,95	1,87	1,86	1,83	2,07
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	0,47	0,71	0,68	0,80	0,75	1,09	0,72	0,68	0,68	<b>120,6</b>	-	-
<b>10-19</b>	0,71	0,83	0,71	0,99	0,81	0,55	0,57	0,66	0,48	-	-	<b>-45,7</b>
<b>20-29</b>	1,02	0,85	0,73	0,96	0,82	0,86	0,87	0,76	0,87	<b>15,8</b>	-	-
<b>30-39</b>	1,21	1,16	1,19	1,32	1,21	1,31	1,26	1,16	1,19	-	-	
<b>40-49</b>	1,98	2,09	1,85	2,80	2,32	2,29	2,40	2,15	1,97	<b>22,8</b>	-	<b>-24,0</b>
<b>50-59</b>	3,60	4,48	3,55	4,03	3,81	3,87	3,72	3,65	3,66	-	-	<b>-8,9</b>
<b>60-69</b>	6,46	7,12	7,06	5,84	7,02	6,03	6,36	6,63	5,79	<b>12,8</b>	-	-
<b>70-79</b>	9,20	9,63	8,75	7,86	9,02	9,92	8,75	9,25	9,06	<b>14,0</b>	-	-
<b>80 и ст.</b>	12,00	9,27	12,98	11,29	12,28	11,87	9,80	8,73	9,48	<b>43,4</b>	-	<b>-25,0</b>
<b>15-59</b>	1,73	1,90	1,63	2,09	1,84	1,86	1,86	1,76	1,76	<b>19,2</b>	-	<b>-13,3</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	2,29	2,47	2,29	2,50	2,49	2,50	2,44	2,41	2,33	<b>34,1</b>	-	<b>-6,5</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	1,92	2,09	1,94	2,11	2,09	2,09	2,01	1,96	1,85	<b>16,5</b>	-	<b>-11,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 109**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО соединительной и других мягких тканей (С46.1,3,7-9;47;49), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Женщины</b>												
<b>0-9</b>	0,39	0,32	0,42	0,39	0,31	0,51	0,53	0,55	0,59	0,51	0,59	0,66
<b>10-19</b>	0,37	0,44	0,53	0,45	0,57	0,51	0,69	0,53	0,51	0,40	0,58	0,61
<b>20-29</b>	0,88	0,70	0,79	0,71	0,69	0,86	0,84	0,79	0,98	0,75	0,86	0,86
<b>30-39</b>	0,97	1,17	1,16	1,20	1,25	1,14	1,06	1,15	1,25	1,13	1,06	1,10
<b>40-49</b>	1,91	1,74	1,75	2,15	1,98	1,69	1,92	1,92	2,06	1,85	1,84	1,97
<b>50-59</b>	2,45	2,61	2,68	2,67	2,77	2,74	2,78	3,34	3,55	2,99	3,38	3,44
<b>60-69</b>	3,49	3,52	3,48	4,23	3,93	3,93	3,88	4,05	3,94	4,29	4,06	4,59
<b>70-79</b>	4,80	4,83	4,71	5,24	5,18	5,36	4,79	5,22	5,48	5,65	5,29	5,46
<b>80 и ст.</b>	4,45	3,84	5,05	5,04	5,17	4,95	5,61	5,05	5,38	5,17	5,10	6,07
<b>15-59</b>	1,38	1,41	1,45	1,52	1,53	1,42	1,48	1,56	1,71	1,47	1,59	1,66
<b>«Грубый» показатель</b>	1,73	1,72	1,80	1,97	1,95	1,95	1,99	2,09	2,21	2,11	2,12	2,27
<b>Стандарт. показатель</b>	1,30	1,29	1,32	1,43	1,41	1,42	1,46	1,51	1,60	1,46	1,52	1,61
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	0,65	0,79	0,70	0,61	0,93	0,94	0,87	0,88	0,80	<b>188,6</b>	<b>46,5</b>	-
<b>10-19</b>	0,61	0,61	0,60	0,65	0,51	0,64	0,51	0,48	0,42	-	<b>-23,2</b>	<b>-30,0</b>
<b>20-29</b>	0,90	0,85	0,78	0,98	0,54	0,73	0,75	0,66	0,79	-	-	-
<b>30-39</b>	1,18	1,25	1,14	1,01	0,98	1,11	1,35	1,35	1,10	-	-	-
<b>40-49</b>	1,94	1,96	1,93	1,79	2,14	1,96	2,06	1,80	1,91	-	-	-
<b>50-59</b>	3,51	2,97	3,00	3,25	3,16	3,03	3,25	3,18	2,98	<b>21,5</b>	-	-
<b>60-69</b>	5,03	4,29	4,77	4,11	4,62	4,58	4,94	4,47	4,98	<b>35,9</b>	-	-
<b>70-79</b>	5,31	5,89	5,65	5,89	5,92	5,57	5,98	5,55	5,90	<b>22,5</b>	<b>8,5</b>	-
<b>80 и ст.</b>	6,37	6,62	6,60	6,49	6,62	6,49	5,49	6,19	6,55	<b>48,5</b>	-	-
<b>15-59</b>	1,71	1,62	1,59	1,66	1,60	1,61	1,76	1,68	1,61	<b>18,6</b>	-	-
<b>«Грубый» показатель</b>	2,34	2,27	2,28	2,28	2,33	2,32	2,45	2,35	2,41	<b>38,1</b>	<b>9,3</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	1,65	1,61	1,58	1,55	1,61	1,63	1,68	1,59	1,60	<b>24,9</b>	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 110

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО соединительной и других мягких тканей (С46.1,3,7-9;47;49), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	57,4	57,2	57,8	58,9	57,7	58,7	58,3	57,7	57,5	59,2	57,8	58,2
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	53,6	53,7	54,0	54,9	54,1	54,7	54,3	54,6	54,9	55,6	55,1	55,0
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15	0,17	0,17	0,17	0,16	0,18
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	58,0	57,8	59,0	57,0	58,7	58,3	58,6	59,3	59,9	2,1	2,8	4,1
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	55,5	55,3	56,2	54,7	56,3	55,5	55,9	56,4	56,9	4,9	2,8	3,1
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,17	0,18	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	-	-	-
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	56,0	55,6	56,4	57,7	56,0	56,4	56,3	55,7	55,6	56,1	55,7	57,0
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	51,6	52,0	52,5	53,3	51,9	53,0	52,9	53,0	53,6	53,3	53,7	53,3
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,19	0,18	0,20	0,20	0,20	0,18	0,21

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 110**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО соединительной и других мягких тканей (С46.1,3,7-9;47;49), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
	1993-2013	2003-2013	2008-2013									
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	56,5	56,4	57,8	54,3	56,9	56,7	57,0	58,1	57,9	-	-	<b>5,8</b>
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	53,9	53,7	54,8	51,9	54,2	53,7	54,3	55,0	54,9	4,8	-	<b>4,9</b>
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,19	0,22	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,19	-	-	-
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	59,4	59,1	59,0	60,1	60,0	60,8	60,1	60,2	59,3	61,5	59,5	59,5
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	55,5	55,4	55,4	56,4	56,3	56,3	55,6	56,1	56,0	57,6	56,3	56,6
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,16	0,15	0,15	0,16
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
	1993-2013	2003-2013	2008-2013									
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	59,3	59,4	60,3	59,6	60,5	60,0	60,1	60,3	61,7	-	<b>2,8</b>	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	56,8	56,8	57,5	57,4	58,2	57,2	57,3	57,7	58,7	4,7	<b>3,1</b>	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,16	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	-	-	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 111**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО соединительной и других мягких тканей (C46.1,3,7-9;47;49) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>2598</b>	<b>2930</b>	<b>2920</b>	<b>3007</b>	<b>3097</b>	<b>3074</b>	<b>3159</b>	<b>3095</b>	<b>3085</b>	<b>3203</b>	<b>3322</b>	<b>3146</b>
<b>0-14</b>	70	87	80	76	86	77	75	85	91	97	85	90
<b>15-19</b>	41	52	33	46	37	37	52	37	35	35	31	29
<b>20-24</b>	52	40	43	45	41	33	43	44	54	45	66	48
<b>25-29</b>	48	42	45	38	57	38	64	42	47	57	61	54
<b>30-34</b>	51	51	60	60	67	59	57	62	62	53	64	65
<b>35-39</b>	84	87	93	79	84	70	80	70	78	78	78	70
<b>40-44</b>	120	138	135	146	150	125	118	99	110	126	111	91
<b>45-49</b>	197	185	214	190	191	211	183	197	178	206	207	182
<b>50-54</b>	207	259	257	282	298	279	277	274	277	270	300	279
<b>55-59</b>	203	221	182	203	260	332	359	355	348	375	357	339
<b>60-64</b>	358	438	446	410	363	286	277	210	228	284	338	405
<b>65-69</b>	363	381	366	398	445	503	491	525	454	428	372	271
<b>70-74</b>	421	476	439	461	441	401	389	384	391	460	541	507
<b>75-79</b>	190	242	272	363	347	398	441	399	384	339	332	301
<b>80-84</b>	109	134	145	135	130	156	172	209	249	265	266	282
<b>85 и ст.</b>	84	97	110	75	100	69	81	103	99	85	113	133

**Продолжение таблицы 111**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО соединительной и других мягких тканей (C46.1,3,7-9;47;49) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>						
<b>Всего</b>	<b>3319</b>	<b>3216</b>	<b>3006</b>	<b>13,9</b>	-	-
<b>0-14</b>	84	103	85	<b>21,7</b>	-	-
<b>15-19</b>	31	31	26	<b>-37,7</b>	<b>-34,5</b>	<b>-18,0</b>
<b>20-24</b>	57	33	30	-	-	-
<b>25-29</b>	55	50	53	-	-	-
<b>30-34</b>	71	81	63	<b>30,4</b>	-	-
<b>35-39</b>	85	86	66	-	-	-
<b>40-44</b>	111	107	102	<b>-27,7</b>	<b>-24,1</b>	-
<b>45-49</b>	153	153	163	<b>-17,7</b>	<b>-20,3</b>	<b>-27,3</b>
<b>50-54</b>	275	265	265	-	-	-
<b>55-59</b>	344	380	340	<b>86,8</b>	-	-
<b>60-64</b>	442	401	386	-	<b>57,0</b>	-
<b>65-69</b>	275	265	288	-	<b>-50,0</b>	<b>-36,0</b>
<b>70-74</b>	527	473	342	-	-	-
<b>75-79</b>	350	352	384	-	-	-
<b>80-84</b>	294	280	251	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	165	156	162	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 111**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО соединительной и других мягких тканей (C46.1,3,7-9;47;49)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1213</b>	<b>1449</b>	<b>1366</b>	<b>1407</b>	<b>1497</b>	<b>1481</b>	<b>1490</b>	<b>1414</b>	<b>1436</b>	<b>1495</b>	<b>1564</b>	<b>1559</b>
<b>0-14</b>	39	44	36	36	49	44	38	51	45	50	47	49
<b>15-19</b>	22	21	19	18	20	22	28	25	21	22	18	22
<b>20-24</b>	27	28	25	28	25	19	26	24	26	25	45	28
<b>25-29</b>	28	32	23	25	32	25	39	26	22	31	37	37
<b>30-34</b>	32	37	37	45	41	32	37	43	46	35	41	38
<b>35-39</b>	45	53	63	49	39	35	44	45	47	43	44	41
<b>40-44</b>	64	84	83	88	81	72	62	52	54	74	63	46
<b>45-49</b>	113	116	127	116	114	112	92	107	98	110	116	109
<b>50-54</b>	116	145	141	138	165	170	148	147	156	154	161	177
<b>55-59</b>	98	127	106	112	144	187	204	167	184	183	182	189
<b>60-64</b>	173	237	212	206	191	142	150	107	123	130	190	221
<b>65-69</b>	179	195	172	181	217	242	229	249	212	199	168	122
<b>70-74</b>	165	187	172	203	196	162	166	155	164	218	240	218
<b>75-79</b>	62	81	84	110	117	164	162	136	146	116	108	121
<b>80-84</b>	28	38	44	34	38	41	46	57	64	77	76	110
<b>85 и ст.</b>	22	24	22	18	28	12	19	23	28	28	28	31

**Продолжение таблицы 111**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО соединительной и других мягких тканей (C46.1,3,7-9;47;49) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>						
<b>Всего</b>	<b>1574</b>	<b>1500</b>	<b>1465</b>	<b>14,4</b>	-	-
<b>0-14</b>	47	53	42	<b>24,7</b>	-	-
<b>15-19</b>	16	16	15	-	<b>-34,0</b>	<b>-30,3</b>
<b>20-24</b>	33	22	20	-	-	-
<b>25-29</b>	39	25	36	-	-	-
<b>30-34</b>	34	49	41	-	-	-
<b>35-39</b>	52	49	37	-	-	-
<b>40-44</b>	58	58	57	<b>-34,2</b>	-	-
<b>45-49</b>	93	91	99	<b>-18,4</b>	-	-
<b>50-54</b>	146	127	150	-	-	-
<b>55-59</b>	191	219	202	<b>95,3</b>	<b>23,1</b>	<b>16,8</b>
<b>60-64</b>	249	200	209	-	<b>64,9</b>	-
<b>65-69</b>	121	128	141	<b>-31,8</b>	<b>-51,5</b>	-
<b>70-74</b>	233	203	138	-	-	-
<b>75-79</b>	130	127	151	<b>55,4</b>	-	<b>32,8</b>
<b>80-84</b>	88	89	76	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	44	44	51	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 111**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО соединительной и других мягких тканей (C46.1,3,7-9;47;49)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1385</b>	<b>1481</b>	<b>1554</b>	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>1593</b>	<b>1669</b>	<b>1681</b>	<b>1649</b>	<b>1708</b>	<b>1758</b>	<b>1587</b>
<b>0-14</b>	31	43	44	40	37	33	37	34	46	47	38	41
<b>15-19</b>	19	31	14	28	17	15	24	12	14	13	13	7
<b>20-24</b>	25	12	18	17	16	14	17	20	28	20	21	20
<b>25-29</b>	20	10	22	13	25	13	25	16	25	26	24	17
<b>30-34</b>	19	14	23	15	26	27	20	19	16	18	23	27
<b>35-39</b>	39	34	30	30	45	35	36	25	31	35	34	29
<b>40-44</b>	56	54	52	58	69	53	56	47	56	52	48	45
<b>45-49</b>	84	69	87	74	77	99	91	90	80	96	91	73
<b>50-54</b>	91	114	116	144	133	109	129	127	121	116	139	102
<b>55-59</b>	105	94	76	91	116	145	155	188	164	192	175	150
<b>60-64</b>	185	201	234	204	172	144	127	103	105	154	148	184
<b>65-69</b>	184	186	194	217	228	261	262	276	242	229	204	149
<b>70-74</b>	256	289	267	258	245	239	223	229	227	242	301	289
<b>75-79</b>	128	161	188	253	230	234	279	263	238	223	224	180
<b>80-84</b>	81	96	101	101	92	115	126	152	185	188	190	172
<b>85 и ст.</b>	62	73	88	57	72	57	62	80	71	57	85	102

**Продолжение таблицы 111**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО соединительной и других мягких тканей (C46.1,3,7-9;47;49) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>						
<b>Всего</b>	<b>1745</b>	<b>1716</b>	<b>1541</b>	<b>13,6</b>	-	-
<b>0-14</b>	37	50	43	-	-	-
<b>15-19</b>	15	15	11	<b>-54,9</b>	-	-
<b>20-24</b>	24	11	10	-	-	-
<b>25-29</b>	16	25	17	-	-	-
<b>30-34</b>	37	32	22	<b>64,5</b>	-	-
<b>35-39</b>	33	37	29	-	-	-
<b>40-44</b>	53	49	45	<b>-18,6</b>	<b>-23,8</b>	-
<b>45-49</b>	60	62	64	-	<b>-30,9</b>	<b>-38,4</b>
<b>50-54</b>	129	138	115	-	-	-
<b>55-59</b>	153	161	138	<b>77,4</b>	-	<b>-23,5</b>
<b>60-64</b>	193	201	177	-	-	-
<b>65-69</b>	154	137	147	-	<b>-48,6</b>	<b>-39,0</b>
<b>70-74</b>	294	270	204	-	-	-
<b>75-79</b>	220	225	233	-	-	-
<b>80-84</b>	206	191	175	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	121	112	111	-	-	<b>79,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 112

**Динамика показателей смертности от ЗНО соединительной и других мягких тканей (С46.1,3,7-9;47;49), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>0-9</b>	0,36	0,45	0,41	0,37	0,48	0,46	0,42	0,53	0,49	0,57	0,49	0,55
<b>10-19</b>	0,24	0,32	0,25	0,32	0,27	0,25	0,36	0,26	0,33	0,31	0,28	0,25
<b>20-29</b>	0,48	0,39	0,42	0,39	0,44	0,31	0,46	0,36	0,42	0,42	0,52	0,42
<b>30-39</b>	0,62	0,66	0,75	0,70	0,77	0,66	0,70	0,67	0,70	0,64	0,69	0,65
<b>40-49</b>	1,34	1,35	1,45	1,39	1,42	1,42	1,30	1,30	1,30	1,55	1,53	1,34
<b>50-59</b>	2,90	3,37	3,03	3,21	3,44	3,50	3,41	3,22	3,12	3,14	3,14	2,94
<b>60-69</b>	4,89	5,56	5,56	5,68	5,90	6,08	6,24	6,17	5,86	6,26	6,27	5,94
<b>70-79</b>	6,81	7,66	7,39	8,47	8,17	8,52	9,03	8,54	8,34	8,41	9,02	8,26
<b>80 и ст.</b>	6,53	7,98	8,98	7,40	8,53	7,98	8,46	9,72	10,08	9,45	9,64	10,31
<b>15-59</b>	1,09	1,17	1,15	1,18	1,25	1,24	1,28	1,21	1,23	1,29	1,33	1,21
<b>«Грубый» показатель</b>	1,78	2,02	2,03	2,10	2,16	2,15	2,23	2,17	2,17	2,26	2,34	2,22
<b>Стандарт. показатель</b>	1,31	1,48	1,46	1,48	1,55	1,51	1,55	1,50	1,49	1,56	1,59	1,49
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>0-9</b>	0,45	0,55	0,44	<b>29,7</b>	-	-						
<b>10-19</b>	0,31	0,34	0,28	-	-	-						
<b>20-29</b>	0,47	0,35	0,36	-	-	-						
<b>30-39</b>	0,73	0,77	0,59	-	-	-						
<b>40-49</b>	1,35	1,35	1,39	-	-	-						
<b>50-59</b>	2,86	2,96	2,77	<b>-10,8</b>	<b>-19,9</b>	<b>-11,1</b>						
<b>60-69</b>	5,93	5,24	4,93	-	<b>-13,2</b>	<b>-21,1</b>						
<b>70-79</b>	8,77	8,37	7,69	-	-	-						
<b>80 и ст.</b>	10,68	9,96	9,38	<b>40,4</b>	<b>21,0</b>	-						
<b>15-59</b>	1,25	1,27	1,19	<b>9,5</b>	-	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	2,32	2,25	2,09	<b>15,6</b>	-	-						
<b>Стандарт. показатель</b>	1,53	1,48	1,36	-	-	<b>-11,4</b>						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 112**

**Динамика показателей смертности от ЗНО соединительной и других мягких тканей (C46.1,3,7-9;47;49), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>0-9</b>	0,41	0,45	0,37	0,35	0,51	0,50	0,43	0,65	0,47	0,55	0,49	0,59
<b>10-19</b>	0,24	0,27	0,25	0,26	0,31	0,30	0,36	0,32	0,36	0,38	0,35	0,34
<b>20-29</b>	0,52	0,56	0,45	0,49	0,51	0,38	0,56	0,42	0,40	0,46	0,66	0,53
<b>30-39</b>	0,71	0,85	0,98	0,94	0,82	0,69	0,84	0,90	0,94	0,78	0,83	0,77
<b>40-49</b>	1,54	1,73	1,81	1,76	1,70	1,63	1,40	1,47	1,44	1,80	1,81	1,59
<b>50-59</b>	3,35	4,21	3,75	3,63	4,21	4,55	4,22	3,60	3,80	3,68	3,69	3,91
<b>60-69</b>	5,94	7,31	6,59	6,86	7,56	7,59	7,97	7,77	7,46	7,45	8,08	7,66
<b>70-79</b>	8,46	9,41	8,69	10,41	10,34	11,01	11,22	9,90	10,36	10,89	11,13	10,74
<b>80 и ст.</b>	8,31	10,39	11,17	8,75	12,70	9,67	10,98	12,16	12,44	12,75	11,61	15,22
<b>15-59</b>	1,20	1,42	1,38	1,36	1,43	1,45	1,46	1,35	1,40	1,45	1,53	1,49
<b>«Грубый» показатель</b>	1,77	2,13	2,03	2,11	2,24	2,23	2,26	2,14	2,18	2,28	2,38	2,38
<b>Стандарт. показатель</b>	1,55	1,85	1,73	1,76	1,92	1,85	1,89	1,80	1,80	1,87	1,94	1,90
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>0-9</b>	0,47	0,50	0,45	<b>25,1</b>	-	-						
<b>10-19</b>	0,35	0,39	0,27	<b>38,7</b>	-	-						
<b>20-29</b>	0,59	0,39	0,48	-	-	-						
<b>30-39</b>	0,82	0,92	0,72	-	-	-						
<b>40-49</b>	1,61	1,62	1,71	-	-	-						
<b>50-59</b>	3,48	3,55	3,59	-	<b>-18,7</b>							
<b>60-69</b>	7,62	6,40	6,35	-	<b>-13,0</b>	<b>-18,5</b>						
<b>70-79</b>	11,22	10,41	9,59	<b>15,4</b>	-	-						
<b>80 и ст.</b>	13,20	12,91	12,16	<b>43,8</b>	-	-						
<b>15-59</b>	1,45	1,44	1,46	<b>11,4</b>	-	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	2,38	2,26	2,20	<b>17,6</b>	-	-						
<b>Стандарт. показатель</b>	1,88	1,78	1,70	-	-	<b>-9,8</b>						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 112**

**Динамика показателей смертности от ЗНО соединительной и других мягких тканей (С46.1,3,7-9;47;49), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Женщины</b>												
<b>0-9</b>	0,30	0,44	0,45	0,39	0,45	0,42	0,40	0,41	0,52	0,60	0,49	0,50
<b>10-19</b>	0,24	0,37	0,25	0,39	0,23	0,20	0,36	0,20	0,29	0,23	0,21	0,16
<b>20-29</b>	0,44	0,21	0,38	0,28	0,37	0,24	0,37	0,31	0,44	0,38	0,37	0,30
<b>30-39</b>	0,53	0,46	0,52	0,46	0,71	0,63	0,57	0,44	0,46	0,51	0,54	0,53
<b>40-49</b>	1,14	0,99	1,12	1,06	1,17	1,23	1,22	1,15	1,17	1,32	1,28	1,10
<b>50-59</b>	2,53	2,67	2,44	2,86	2,81	2,65	2,76	2,92	2,57	2,70	2,71	2,16
<b>60-69</b>	4,18	4,39	4,88	4,91	4,82	5,11	5,15	5,17	4,85	5,50	5,11	4,83
<b>70-79</b>	6,11	6,89	6,82	7,60	7,18	7,37	8,01	7,90	7,38	7,23	8,01	7,07
<b>80 и ст.</b>	6,08	7,35	8,41	7,04	7,54	7,57	7,83	9,09	9,44	8,50	9,06	8,84
<b>15-59</b>	0,98	0,92	0,94	1,00	1,08	1,04	1,12	1,09	1,07	1,14	1,15	0,95
<b>«Грубый» показатель</b>	1,79	1,92	2,03	2,10	2,09	2,08	2,19	2,20	2,16	2,24	2,31	2,08
<b>Стандарт. показатель</b>	1,15	1,21	1,27	1,28	1,31	1,27	1,33	1,28	1,29	1,36	1,34	1,22
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>0-9</b>	0,44	0,59	0,43	<b>36,8</b>	-	-						
<b>10-19</b>	0,27	0,28	0,30	-	-	-						
<b>20-29</b>	0,34	0,31	0,24	-	-	<b>-30,4</b>						
<b>30-39</b>	0,65	0,63	0,46	-	-	-						
<b>40-49</b>	1,11	1,11	1,10	-	-	<b>-17,5</b>						
<b>50-59</b>	2,35	2,48	2,10	<b>-14,0</b>	<b>-21,4</b>	-						
<b>60-69</b>	4,80	4,46	3,97	-	<b>-14,3</b>	<b>-24,6</b>						
<b>70-79</b>	7,60	7,40	6,80	-	-	-						
<b>80 и ст.</b>	9,92	9,06	8,52	<b>36,1</b>	<b>18,8</b>	-						
<b>15-59</b>	1,06	1,10	0,94	<b>7,8</b>	-	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	2,27	2,23	2,00	<b>13,7</b>	-	-						
<b>Стандарт. показатель</b>	1,29	1,29	1,13	-	-	<b>-12,8</b>						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 113

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО соединительной и других мягких тканей (С46.1,3,7-9;47;49, Россия, 1999-2013 гг.**

Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	63,2	63,5	63,6	64,1	63,8	64,8	64,9	65,7	65,4	64,6	64,5	64,0
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	59,3	59,8	60,2	60,4	60,1	60,9	60,8	61,3	61,1	60,8	61,1	61,5
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,14	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,17	0,18	0,16
<b>Показатель</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	64,5	64,0	64,0	<b>1,2</b>	-	-						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	62,0	61,6	61,9	<b>3,8</b>	<b>2,4</b>	<b>1,7</b>						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,17	0,16	0,14	-	-	<b>-15,8</b>						
Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	60,7	60,8	60,5	61,2	61,0	60,8	60,9	60,9	60,8	60,8	60,7	61,0
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	56,4	56,9	56,9	57,4	57,6	58,3	58,1	57,7	58,3	58,2	57,8	58,6
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,17	0,20	0,19	0,20	0,21	0,20	0,21	0,20	0,20	0,21	0,22	0,21

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 113**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО соединительной и других мягких тканей (C46.1,3,7-9;47;49, Россия, 1999-2013 гг.**

Показатель	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %								
				1999-2013	2003-2013	2008-2013						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	61,6	61,0	60,8	-	-	-						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	58,9	58,8	58,9	3,9	2,0	1,7						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,21	0,19	0,18	-	-	-15,3						
<b>Показатель</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	65,5	66,7	66,6	67,0	66,5	67,1	67,2	67,9	67,9	66,9	68,1	68,3
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	61,7	62,7	63,0	63,1	62,5	63,3	63,1	64,4	63,5	63,1	64,1	64,4
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,13
Показатель	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %								
				1999-2013	2003-2013	2008-2013						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	69,0	67,8	68,4	3,7	2,5	-						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	64,7	64,0	64,8	3,8	2,8	-						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,14	0,13	0,12	-	-	-18,6						

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 114**

**Динамика сведений о диагностике и контингенте больных  
с ЗНО соединительной и других мягких тканей (C46.1,3,7-9;47;49), состоя-  
щем на учете онкологических учреждений,  
Россия, 2011-2013 гг.**

<b>Показатель</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	3275	3143	3144
из них доля выявленных активно, %	6,4	6,3	6,9
Число впервые выявленных ЗНО (без учтенных посмертно)	3413	3310	3324
из них *доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	93,3	94,5	93,9
*I ст., %	18,3	19,2	21,1
*II ст., %	32,3	29,8	32,3
*III ст., %	17,2	17,4	15,5
*IV ст., %	16,4	16,2	15,1
Показатель одногодичной летальности, %	-	22,3	20,1
Число больных, состоящих на учете на конец года	27154	27831	28158
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	59,1	59,3	59,6
Показатель распространенности на 100 000 населения	19,0	19,4	19,6
Индекс накопления контингента	8,3	8,9	9,0

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

**Таблица 115**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО молочной железы (C50)  
в зависимости от возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

<b>Возраст</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Всего</b>	<b>36041</b>	<b>37015</b>	<b>37649</b>	<b>38969</b>	<b>40360</b>	<b>42607</b>	<b>44522</b>	<b>44840</b>	<b>45257</b>	<b>45857</b>	<b>46288</b>	<b>49230</b>
<b>20-24</b>	50	34	29	51	60	53	40	39	36	29	37	31
<b>25-29</b>	232	157	168	202	205	200	177	219	199	204	190	215
<b>30-34</b>	907	863	801	740	752	645	683	667	628	617	615	664
<b>35-39</b>	2128	2037	2082	2133	2044	2071	1940	1813	1735	1587	1548	1473
<b>40-44</b>	3610	3807	3845	3884	3931	4094	4183	4157	4106	4058	3884	3760
<b>45-49</b>	3502	4300	4843	5361	5403	5909	6051	5997	6065	6089	6077	6284
<b>50-54</b>	4143	3495	3066	3103	3588	4440	5324	5755	6109	6327	6658	6858
<b>55-59</b>	4829	5334	5637	5786	5389	4865	4219	3789	3600	4049	4626	5907
<b>60-64</b>	4747	4624	4232	4467	5013	5752	6687	6912	6961	6485	5627	4951
<b>65-69</b>	5045	5088	5128	5067	5087	4886	4753	4660	4913	5311	6011	7211
<b>70-74</b>	2968	3418	3932	4213	4502	4998	5275	5246	5070	4855	4687	4660
<b>75-79</b>	2108	1995	1884	1983	2365	2613	3057	3360	3603	3898	3989	4395
<b>80-84</b>	1214	1294	1372	1328	1272	1265	1240	1320	1361	1524	1579	1894
<b>85 и ст.</b>	529	560	617	638	731	807	886	891	855	817	759	921

**Продолжение таблицы 115**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО молочной железы (C50)  
в зависимости от возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Всего</b>	<b>49548</b>	<b>50292</b>	<b>51865</b>	<b>52469</b>	<b>54315</b>	<b>57241</b>	<b>57534</b>	<b>59037</b>	<b>60717</b>	<b>68,3</b>	<b>30,0</b>	<b>15,3</b>
<b>20-24</b>	36	44	43	44	56	49	35	40	30	-	-	-
<b>25-29</b>	231	236	225	231	249	296	278	284	329	<b>69,0</b>	<b>60,6</b>	<b>36,1</b>
<b>30-34</b>	687	758	733	790	799	796	858	919	952	-	<b>50,0</b>	<b>23,6</b>
<b>35-39</b>	1461	1520	1532	1577	1728	1682	1763	1906	1955	<b>-20,8</b>	<b>34,0</b>	<b>23,0</b>
<b>40-44</b>	3520	3409	3307	3020	2978	3067	3132	3321	3284	<b>-23,4</b>	<b>-17,1</b>	<b>11,8</b>
<b>45-49</b>	6192	6390	6281	6241	5952	5846	5316	5218	5066	-	<b>-18,5</b>	<b>-19,4</b>
<b>50-54</b>	6896	7322	7301	7364	7385	7714	7773	7835	7557	<b>151,9</b>	<b>16,1</b>	-
<b>55-59</b>	6742	7274	7651	8171	8398	8716	8709	8777	9143	<b>129,6</b>	<b>72,5</b>	<b>10,5</b>
<b>60-64</b>	4332	4150	4949	5730	6982	8549	8996	9212	9827	<b>93,4</b>	<b>162,3</b>	<b>67,5</b>
<b>65-69</b>	7468	7211	6956	5867	5326	4722	4694	5201	6493	-	<b>-26,2</b>	-
<b>70-74</b>	4587	4656	5421	5954	6800	7546	7669	7308	6354	<b>107,0</b>	<b>76,5</b>	-
<b>75-79</b>	4326	4175	4130	3823	3711	3915	4102	4670	5487	<b>147,0</b>	-	<b>49,2</b>
<b>80-84</b>	2208	2252	2425	2598	2728	2925	2807	2795	2612	<b>221,7</b>	<b>60,8</b>	-
<b>85 и ст.</b>	854	887	901	1050	1219	1410	1397	1545	1625	<b>202,0</b>	<b>137,0</b>	<b>52,5</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 116

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО молочной железы (C50), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 женского населения соответствующего возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>20-29</b>	2,93	1,99	2,05	2,60	2,69	2,52	2,13	2,49	2,25	2,20	2,05	2,18
<b>30-39</b>	24,07	23,22	23,53	24,00	24,01	24,10	24,14	23,66	23,40	22,39	21,78	21,71
<b>40-49</b>	76,70	80,43	80,01	81,16	79,64	83,14	83,65	82,10	81,73	81,37	79,75	81,33
<b>50-59</b>	96,47	98,97	101,87	107,48	111,20	118,62	123,35	122,70	123,20	126,10	127,21	133,08
<b>60-69</b>	105,61	107,62	106,32	109,79	116,34	121,45	129,67	131,19	135,50	137,44	140,25	153,51
<b>70-79</b>	107,23	112,30	116,58	117,25	121,76	127,08	132,52	131,78	129,95	130,12	131,09	141,15
<b>80 и ст.</b>	68,05	71,29	76,06	76,82	80,91	86,14	90,34	96,18	98,56	104,34	107,47	123,83
<b>15-59</b>	42,23	43,24	43,93	45,50	45,74	47,65	48,36	47,93	48,06	48,74	48,69	51,28
<b>«Грубый» показатель</b>	45,84	47,16	48,03	49,82	51,74	54,75	57,42	58,08	59,15	60,22	60,32	64,42
<b>Стандарт. показатель</b>	33,03	33,55	33,70	34,85	35,82	37,36	38,36	38,24	38,53	38,89	38,84	40,82
Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>20-29</b>	2,32	2,38	2,24	2,28	2,51	2,84	2,63	2,77	3,17	-	46,2	31,6
<b>30-39</b>	21,79	22,74	22,32	22,95	24,09	23,43	24,17	25,73	26,05	-	20,7	13,4
<b>40-49</b>	80,29	82,37	82,82	82,54	82,20	83,40	82,70	85,27	84,44	5,4	5,4	3,1
<b>50-59</b>	132,59	135,13	134,61	136,33	136,11	141,00	137,49	138,01	138,86	41,6	7,4	-
<b>60-69</b>	156,15	155,09	166,38	166,60	178,81	192,38	189,37	190,08	199,83	103,7	40,9	16,6
<b>70-79</b>	142,24	141,73	151,67	152,06	160,28	172,86	173,95	179,18	184,23	68,1	41,4	20,6
<b>80 и ст.</b>	127,58	123,04	122,63	126,58	130,05	139,90	127,52	129,71	126,18	103,4	12,2	-
<b>15-59</b>	51,99	53,82	54,17	55,13	55,73	57,23	57,07	58,55	59,18	39,9	19,3	7,5
<b>«Грубый» показатель</b>	65,08	65,76	67,95	68,79	71,22	75,05	74,87	76,73	78,80	72,7	29,1	13,8
<b>Стандарт. показатель</b>	40,89	41,51	42,74	42,83	43,84	45,75	45,24	46,17	47,05	42,3	19,8	9,2

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 117

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО молочной железы (C50),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	58,5	58,6	58,5	58,5	58,9	59,0	59,6	60,0	60,1	60,0	59,5	59,5
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	58,1	58,3	58,4	58,3	58,6	58,7	59,0	59,2	59,3	59,5	59,6	60,0
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	3,60	3,67	3,70	3,80	3,89	4,06	4,18	4,17	4,22	4,27	4,29	4,53
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	59,3	58,8	59,3	59,3	59,8	60,3	60,5	60,7	61,0	3,2	3,1	2,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	60,1	59,9	60,2	60,3	60,5	60,8	60,9	61,0	61,2	5,4	2,5	1,4
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	4,56	4,62	4,81	4,82	4,96	5,17	5,14	5,23	5,34	50,0	23,3	10,0

**Таблица 118**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО молочной железы (C50) в зависимости от возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

<b>Возраст</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Всего</b>	<b>18448</b>	<b>19057</b>	<b>19141</b>	<b>19597</b>	<b>20423</b>	<b>20925</b>	<b>21216</b>	<b>21707</b>	<b>21592</b>	<b>21873</b>	<b>22420</b>	<b>22757</b>
<b>20-24</b>	10	8	9	7	7	8	7	8	11	4	10	6
<b>25-29</b>	58	59	43	52	54	42	41	46	45	61	49	50
<b>30-34</b>	279	251	247	253	200	204	200	171	155	166	161	186
<b>35-39</b>	704	720	789	697	699	710	617	554	501	479	447	447
<b>40-44</b>	1283	1279	1279	1359	1421	1345	1357	1285	1283	1189	1183	1086
<b>45-49</b>	1192	1482	1746	1950	2028	2031	2100	2053	2083	2037	2067	1992
<b>50-54</b>	2141	1845	1466	1420	1462	1753	2155	2475	2666	2700	2852	2865
<b>55-59</b>	2409	2883	3077	3103	3070	2811	2204	1861	1645	1797	2104	2628
<b>60-64</b>	2468	2459	2251	2292	2599	2827	3311	3464	3434	3342	2908	2472
<b>65-69</b>	2920	2907	2962	2932	2855	2755	2531	2508	2440	2666	3050	3438
<b>70-74</b>	1786	2010	2227	2401	2662	2883	2967	3082	2981	2866	2780	2539
<b>75-79</b>	1401	1404	1217	1383	1458	1699	1835	2169	2350	2515	2708	2757
<b>80-84</b>	1143	1169	1169	1092	1150	1053	999	1064	1081	1118	1298	1434
<b>85 и ст.</b>	652	577	656	651	754	800	890	964	910	928	795	855

**Продолжение таблицы 118**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО молочной железы (C50) в зависимости от возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Всего</b>	<b>22461</b>	<b>22409</b>	<b>22834</b>	<b>22946</b>	<b>23517</b>	<b>23282</b>	<b>23320</b>	<b>22936</b>	<b>22890</b>	<b>24,1</b>	<b>3,3</b>	<b>-</b>
<b>20-24</b>	6	8	6	5	12	10	4	7	4	-	-	-
<b>25-29</b>	60	54	43	60	37	53	55	59	59	-	-	-
<b>30-34</b>	157	179	191	198	183	180	175	166	167	<b>-34,0</b>	-	<b>-15,4</b>
<b>35-39</b>	414	399	415	403	365	403	386	393	414	<b>-56,5</b>	<b>-10,6</b>	-
<b>40-44</b>	1081	940	848	858	790	742	704	699	707	<b>-51,9</b>	<b>-43,5</b>	<b>-18,1</b>
<b>45-49</b>	2011	1788	1859	1830	1765	1572	1448	1301	1117	<b>-15,9</b>	<b>-40,4</b>	<b>-37,4</b>
<b>50-54</b>	2801	2651	2763	2720	2756	2667	2594	2408	2316	<b>58,4</b>	<b>-15,9</b>	<b>-15,8</b>
<b>55-59</b>	2854	3045	3159	3293	3372	3162	3232	3228	3072	-	<b>31,2</b>	-
<b>60-64</b>	1979	1893	2062	2218	2751	3222	3389	3488	3557	-	<b>68,4</b>	<b>55,7</b>
<b>65-69</b>	3646	3640	3376	3013	2529	2153	1957	1937	2343	-	<b>-44,7</b>	-
<b>70-74</b>	2351	2403	2702	2928	3291	3625	3646	3408	2931	<b>51,2</b>	<b>42,1</b>	-
<b>75-79</b>	2684	2724	2599	2458	2369	2135	2213	2451	2788	<b>91,7</b>	-	-
<b>80-84</b>	1546	1801	1875	1966	2147	2124	2137	1946	1842	<b>142,0</b>	<b>46,6</b>	-
<b>85 и ст.</b>	870	881	933	987	1147	1232	1379	1445	1573	<b>144,4</b>	<b>118,8</b>	<b>59,5</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 119

**Динамика показателей смертности от ЗНО молочной железы (C50), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 женского населения соответствующего возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>20-29</b>	0,71	0,70	0,54	0,61	0,62	0,50	0,47	0,52	0,54	0,61	0,53	0,50
<b>30-39</b>	7,80	7,78	8,46	7,93	7,72	8,11	7,52	6,92	6,50	6,55	6,12	6,43
<b>40-49</b>	26,69	27,39	27,86	29,05	29,43	28,06	28,26	26,99	27,05	25,87	26,02	24,92
<b>50-59</b>	48,93	53,00	53,18	54,69	56,14	58,18	56,34	55,75	54,71	54,65	55,87	57,27
<b>60-69</b>	58,11	59,46	59,22	60,16	62,82	63,73	66,22	67,70	67,03	70,00	71,80	74,60
<b>70-79</b>	67,33	70,83	69,04	71,60	73,05	76,51	76,37	80,41	79,88	79,99	82,92	82,55
<b>80 и ст.</b>	70,08	67,13	69,79	68,10	76,92	77,04	80,26	88,22	88,56	91,19	96,21	100,69
<b>15-59</b>	17,56	18,41	18,57	18,92	19,13	19,05	18,56	18,05	17,94	17,90	18,28	18,85
<b>«Грубый» показатель</b>	23,47	24,28	24,42	25,06	26,18	26,89	27,36	28,12	28,22	28,73	29,22	29,78
<b>Стандарт. показатель</b>	15,55	16,07	16,00	16,36	16,78	17,04	17,15	17,24	17,06	17,20	17,46	17,65
Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>20-29</b>	0,57	0,53	0,41	0,54	0,40	0,52	0,50	0,56	0,56	-21,5	-	-
<b>30-39</b>	5,79	5,77	5,97	5,83	5,22	5,51	5,17	5,09	5,21	-40,8	-18,8	-
<b>40-49</b>	25,56	22,93	23,38	23,96	23,52	21,65	21,07	19,97	18,44	-30,2	-25,2	-22,4
<b>50-59</b>	54,98	52,73	53,32	52,77	52,85	50,02	48,60	46,82	44,80	-10,7	-19,2	-15,6
<b>60-69</b>	74,43	75,53	76,00	75,15	76,71	77,92	73,95	71,55	72,24	31,2	-	-
<b>70-79</b>	80,35	82,29	84,18	83,77	86,31	86,88	86,58	87,65	88,98	28,9	9,1	5,1
<b>80 и ст.</b>	100,66	105,13	103,54	102,47	108,54	108,30	106,65	101,35	101,70	64,8	-	-
<b>15-59</b>	18,93	18,10	18,58	18,83	18,78	17,86	17,61	17,09	16,42	-5,3	-9,8	-12,9
<b>«Грубый» показатель</b>	29,50	29,30	29,91	30,08	30,83	30,52	30,35	29,81	29,71	27,3	-	-
<b>Стандарт. показатель</b>	17,26	16,92	17,17	17,05	17,20	16,93	16,45	15,94	15,68	-	-9,3	-9,1

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 120

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО молочной железы (C50),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	62,3	62,0	62,0	62,1	62,4	62,8	62,9	63,5	63,5	63,7	64,0	64,3	
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	61,8	61,7	61,7	61,7	62,0	62,2	62,4	63,0	63,0	63,2	63,3	63,5	
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	1,76	1,82	1,82	1,84	1,89	1,92	1,94	1,95	1,92	1,95	1,98	2,01	
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %	1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	64,7	65,3	65,1	64,7	64,5	64,4	64,5	64,6	65,1	5,3	-	-	
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	63,5	64,1	64,1	64,2	64,6	64,8	65,2	65,3	65,7	6,7	3,8	2,2	
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	1,96	1,94	1,98	1,97	1,99	1,97	1,92	1,86	1,84	5,6	-6,1	-7,7	

Таблица 121

## Динамика показателей диагностики ЗНО молочной железы (C50), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	35324	36424	37038	38188	39547	41825	43586	43771	44290	44729	44964
из них доля выявленных активно, %	13,5	14,4	13,8	15,0	15,3	15,4	16,4	17,6	17,8	18,9	18,1
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	92,4	92,2	92,2	92,7	92,6	92,1	92,9	93,0	92,9	93,6	93,7
*I-II ст., %	57,6	57,8	56,5	56,4	56,8	57,6	59,9	60,4	60,0	60,8	61,4
*III ст., %	29,7	29,4	29,8	29,6	28,9	28,1	26,6	26,1	26,1	25,5	25,4
*IV ст., %	11,6	11,4	12,4	12,7	13,0	12,9	12,2	12,4	12,5	12,3	12,2
Показатель одногодичной летальности, %	12,6	12,8	12,5	12,4	12,4	12,6	12,6	11,8	11,6	11,9	12,1
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	47805	47919	48821	49986	50418	52157	54872	55184	56154	57307	
из них доля выявленных активно, %	19,7	20,7	21,9	22,9	23,0	25,0	25,8	27,1	28,0	30,1	
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	94,1	94,4	94,4	95,4	95,2	95,7	95,7	96,6	96,3	96,5	
*I-II ст., %	61,6	61,8	62,1	62,3	62,7	63,0	63,6	65,0	64,5	66,7	
*III ст., %	25,4	25,9	25,7	26,3	26,2	26,1	25,8	24,8	23,8	23,2	
*IV ст., %	11,9	11,5	11,5	10,5	10,3	10,0	10,0	9,1	9,2	8,7	
Показатель одногодичной летальности, %	11,5	10,9	10,3	10,1	9,7	9,5	9,1	8,7	8,3	7,4	

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 122

**Динамика сведений о контингенте больных с ЗНО молочной железы (C50), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных, состоящих на учете на конец года	266497	278331	290350	302170	315507	325215	337356	353201	367632	380201	397058
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	53,6	53,4	53,5	53,5	53,8	53,1	54,2	53,8	54,2	54,2	54,1
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	66,3	66,2	66,3	66,2	66,7	64,8	65,7	65,4	66,0	65,3	66,1
Показатель распространенности на 100 000 населения	179,9	188,1	196,5	205,0	214,7	221,9	231,2	243,3	255,7	266,1	276,8
Индекс накопления контингента	7,5	7,6	7,8	7,9	8,0	7,8	7,7	8,1	8,3	8,5	8,8
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных, состоящих на учете на конец года	408399	421609	437774	453147	466767	484617	504808	524329	544896	562053	
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	55,1	55,8	55,9	56,3	56,0	56,7	57,0	57,6	57,9	58,5	
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	66,7	66,6	66,5	67,1	65,8	67,3	68,2	69,0	69,6	70,5	
Показатель распространенности на 100 000 населения	286,2	297,0	307,2	318,9	328,8	341,5	355,7	366,8	380,5	391,7	
Индекс накопления контингента	8,5	8,8	9,0	9,1	9,3	9,3	9,2	9,5	9,7	9,8	

**Таблица 123**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО шейки матки (C53)  
в зависимости от возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

<b>Возраст</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Всего</b>	<b>11714</b>	<b>11894</b>	<b>11864</b>	<b>11809</b>	<b>11822</b>	<b>11937</b>	<b>12201</b>	<b>12342</b>	<b>12186</b>	<b>12285</b>	<b>12229</b>	<b>12727</b>
<b>15-19</b>	2	8	12	10	19	8	10	13	15	9	18	9
<b>20-24</b>	52	78	98	97	90	111	106	137	121	133	149	120
<b>25-29</b>	214	206	203	239	282	306	350	383	382	428	425	493
<b>30-34</b>	543	552	575	612	518	560	565	580	623	711	743	792
<b>35-39</b>	881	960	979	1057	1000	1058	1088	1025	952	897	979	1014
<b>40-44</b>	1128	1181	1220	1251	1343	1465	1530	1498	1483	1534	1477	1564
<b>45-49</b>	882	1027	1188	1298	1348	1451	1493	1592	1547	1611	1607	1704
<b>50-54</b>	1118	902	841	801	832	949	1192	1281	1437	1443	1554	1672
<b>55-59</b>	1312	1418	1478	1363	1276	1070	936	790	703	796	946	1138
<b>60-64</b>	1425	1347	1202	1175	1211	1261	1378	1471	1457	1310	1046	845
<b>65-69</b>	1694	1738	1616	1509	1382	1254	1107	1043	1071	1072	1076	1250
<b>70-74</b>	1121	1209	1170	1249	1339	1280	1274	1248	1157	1103	934	851
<b>75-79</b>	762	692	652	597	683	663	695	807	794	807	781	816
<b>80-84</b>	455	431	444	388	347	333	297	302	290	283	325	306
<b>85 и ст.</b>	124	145	186	162	151	168	180	170	153	148	167	152

**Продолжение таблицы 123**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО шейки матки (C53)  
в зависимости от возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Всего</b>	<b>12927</b>	<b>13268</b>	<b>13419</b>	<b>13807</b>	<b>14351</b>	<b>14719</b>	<b>14834</b>	<b>15051</b>	<b>15427</b>	<b>33,9</b>	<b>26,1</b>	<b>10,7</b>
<b>15-19</b>	6	8	13	8	8	7	6	3	5	-	-	-
<b>20-24</b>	116	134	125	128	123	147	143	133	118	<b>65,3</b>	-	-
<b>25-29</b>	511	489	530	541	621	660	575	593	604	<b>249,0</b>	<b>38,5</b>	-
<b>30-34</b>	887	1003	989	1081	1176	1193	1175	1207	1278	<b>216,3</b>	<b>69,0</b>	<b>13,8</b>
<b>35-39</b>	1057	1142	1212	1332	1539	1565	1604	1711	1792	<b>101,7</b>	<b>100,4</b>	<b>30,3</b>
<b>40-44</b>	1502	1429	1345	1444	1524	1487	1618	1710	1754	<b>33,6</b>	<b>16,9</b>	<b>22,9</b>
<b>45-49</b>	1834	1909	2001	1877	1822	1844	1733	1679	1641	<b>67,6</b>	-	<b>-12,8</b>
<b>50-54</b>	1613	1745	1803	1858	1853	1973	1990	1989	1982	<b>170,9</b>	<b>29,2</b>	<b>8,1</b>
<b>55-59</b>	1259	1393	1527	1553	1680	1696	1768	1782	1868	<b>62,5</b>	<b>83,1</b>	<b>17,9</b>
<b>60-64</b>	770	750	786	946	1094	1301	1403	1431	1524	-	<b>107,6</b>	<b>60,8</b>
<b>65-69</b>	1300	1250	1112	919	789	676	669	703	833	<b>-56,3</b>	<b>-47,3</b>	-
<b>70-74</b>	808	781	815	917	977	1058	1016	990	810	<b>-32,4</b>	-	-
<b>75-79</b>	782	751	670	658	607	558	579	592	671	-	<b>-28,3</b>	-
<b>80-84</b>	346	347	376	395	394	401	364	339	368	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	133	135	115	150	142	153	189	188	179	-	-	<b>32,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 124

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО шейки матки (C53), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 женского населения соответствующего возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>15-19</b>	0,04	0,15	0,22	0,19	0,35	0,14	0,17	0,22	0,25	0,15	0,29	0,15
<b>20-29</b>	2,76	2,97	3,12	3,45	3,77	4,16	4,47	5,01	4,81	5,30	5,18	5,42
<b>30-39</b>	11,29	12,11	12,68	13,94	13,03	14,36	15,21	15,32	15,60	16,34	17,34	18,35
<b>40-49</b>	21,68	21,91	22,17	22,38	22,96	24,24	24,71	24,98	24,35	25,22	24,69	26,46
<b>50-59</b>	26,13	26,01	27,14	26,17	26,11	25,74	27,51	26,63	27,16	27,21	28,18	29,29
<b>60-69</b>	33,64	34,18	32,01	30,91	29,87	28,71	28,17	28,50	28,85	27,75	25,57	26,44
<b>70-79</b>	39,78	39,44	36,52	34,93	35,85	32,44	31,32	31,47	29,23	28,39	25,91	25,98
<b>80 и ст.</b>	22,61	22,15	24,09	21,49	20,12	20,83	20,27	20,53	19,70	19,21	22,61	20,15
<b>15-59</b>	13,33	13,67	14,14	14,39	14,34	14,92	15,54	15,58	15,52	16,05	16,27	17,31
<b>«Грубый» показатель</b>	14,90	15,15	15,14	15,10	15,15	15,34	15,74	15,99	15,93	16,13	15,94	16,65
<b>Стандарт. показатель</b>	10,56	10,67	10,69	10,74	10,69	10,82	11,09	11,18	11,10	11,30	11,24	11,72
Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>15-19</b>	0,10	0,14	0,25	0,17	0,18	0,17	0,15	0,08	0,15	-	-	-
<b>20-29</b>	5,46	5,30	5,48	5,54	6,13	6,65	6,04	6,21	6,38	118,2	25,5	-
<b>30-39</b>	19,72	21,41	21,69	23,39	25,88	26,08	25,62	26,58	27,51	174,9	60,4	13,3
<b>40-49</b>	27,58	28,06	28,90	29,60	30,80	31,17	32,80	33,84	34,33	62,9	37,3	16,9
<b>50-59</b>	27,92	29,05	29,98	29,93	30,47	31,49	31,35	31,33	32,01	25,4	14,0	6,1
<b>60-69</b>	27,39	27,30	26,53	26,79	27,36	28,66	28,66	28,14	28,86	-15,3	10,8	6,7
<b>70-79</b>	25,37	24,59	23,58	24,50	24,15	24,37	23,57	23,67	23,04	-45,1	-10,1	-5,5
<b>80 и ст.</b>	19,96	18,89	18,10	18,91	17,66	17,88	16,77	15,75	16,29	-27,2	-25,9	-15,1
<b>15-59</b>	17,72	18,47	19,09	19,73	20,93	21,48	21,73	22,36	23,08	80,2	41,8	15,4
<b>«Грубый» показатель</b>	16,98	17,35	17,58	18,10	18,82	19,30	19,30	19,56	20,02	37,5	25,2	9,3
<b>Стандарт. показатель</b>	11,98	12,31	12,48	12,84	13,40	13,71	13,70	13,90	14,17	38,7	26,1	9,0

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 125

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО шейки матки (C53),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	59,0	58,6	57,8	57,0	56,9	55,3	54,0	53,7	53,4	52,8	52,3	52,0
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	57,5	57,2	56,8	56,1	56,1	55,4	55,0	55,0	54,8	54,4	53,9	53,6
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,17	1,18	1,15	1,15	1,13	1,13	1,15	1,15	1,14	1,16	1,14	1,18
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	51,7	51,5	51,4	51,3	51,0	51,2	51,4	51,2	51,3	-14,0	-1,7	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	53,3	52,9	52,6	52,5	52,0	51,9	52,1	51,9	51,9	-10,4	-3,9	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,20	1,23	1,25	1,28	1,32	1,35	1,35	1,37	1,40	23,2	22,5	8,4

**Таблица 126**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО шейки матки (C53) в зависимости от возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Всего</b>	<b>6321</b>	<b>6262</b>	<b>6148</b>	<b>6097</b>	<b>6142</b>	<b>6078</b>	<b>6322</b>	<b>6288</b>	<b>6282</b>	<b>6138</b>	<b>6209</b>	<b>6003</b>
<b>20-24</b>	12	8	12	16	20	19	22	24	27	30	37	32
<b>25-29</b>	53	49	62	76	74	77	87	105	114	108	122	116
<b>30-34</b>	167	173	187	166	157	175	155	151	206	208	228	233
<b>35-39</b>	273	288	335	309	337	333	382	316	301	293	303	301
<b>40-44</b>	357	409	431	437	436	479	538	560	502	536	550	530
<b>45-49</b>	324	372	456	477	495	530	579	605	652	627	656	675
<b>50-54</b>	405	425	355	287	341	359	476	574	617	672	647	698
<b>55-59</b>	615	619	646	646	602	523	469	405	340	355	453	507
<b>60-64</b>	829	690	646	563	594	670	715	746	763	690	624	462
<b>65-69</b>	1056	1058	938	946	908	757	723	619	622	599	670	694
<b>70-74</b>	797	784	816	909	972	946	989	926	880	777	714	577
<b>75-79</b>	715	695	581	583	570	565	628	690	692	717	697	654
<b>80-84</b>	527	496	478	471	448	417	345	348	337	330	313	334
<b>85 и ст.</b>	188	194	203	209	187	228	214	218	227	194	192	187

**Продолжение таблицы 126**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО шейки матки (C53) в зависимости от возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Всего</b>	<b>5966</b>	<b>6047</b>	<b>6171</b>	<b>6057</b>	<b>6187</b>	<b>6193</b>	<b>6376</b>	<b>6340</b>	<b>6522</b>	-	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>
<b>20-24</b>	24	20	22	17	17	15	17	19	15	-	-	-
<b>25-29</b>	133	126	127	119	151	119	130	107	108	<b>115,9</b>	-	-
<b>30-34</b>	235	261	300	280	318	285	260	316	330	<b>131,0</b>	<b>39,2</b>	-
<b>35-39</b>	316	351	361	381	419	458	447	485	487	<b>65,0</b>	<b>76,5</b>	<b>26,6</b>
<b>40-44</b>	509	498	490	440	448	503	553	562	565	<b>26,5</b>	-	<b>34,2</b>
<b>45-49</b>	614	707	709	687	656	621	656	596	629	<b>59,4</b>	-	-
<b>50-54</b>	719	725	770	723	776	787	808	826	815	<b>170,5</b>	<b>23,9</b>	<b>12,3</b>
<b>55-59</b>	539	598	666	705	717	730	787	771	793	<b>45,3</b>	<b>73,8</b>	<b>13,6</b>
<b>60-64</b>	395	328	371	434	529	575	687	683	701	<b>-23,0</b>	<b>65,8</b>	<b>62,3</b>
<b>65-69</b>	767	720	675	568	441	375	356	350	454	<b>-62,4</b>	<b>-53,6</b>	-
<b>70-74</b>	557	508	542	595	678	658	650	638	522	<b>-40,5</b>	-	-
<b>75-79</b>	620	648	612	531	463	457	434	425	525	<b>-28,2</b>	<b>-37,5</b>	-
<b>80-84</b>	369	391	389	404	402	422	373	346	346	<b>-24,7</b>	-	<b>-17,0</b>
<b>85 и ст.</b>	168	163	134	171	172	187	218	215	232	-	-	<b>41,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 127

**Динамика показателей смертности от ЗНО шейки матки (C53), Россия, 1993-2013 гг.**  
*(на 100 000 женского населения соответствующего возраста, мировой стандарт возрастного распределения)*

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>20-29</b>	0,68	0,60	0,77	0,95	0,95	0,96	1,07	1,24	1,35	1,30	1,44	1,31
<b>30-39</b>	3,49	3,69	4,26	3,97	4,24	4,51	4,94	4,46	5,02	5,09	5,35	5,43
<b>40-49</b>	7,34	7,75	8,17	8,02	7,94	8,39	9,13	9,42	9,27	9,33	9,66	9,76
<b>50-59</b>	10,97	11,70	11,72	11,28	11,68	11,24	12,21	12,59	12,14	12,48	12,40	12,56
<b>60-69</b>	20,33	19,37	17,99	17,38	17,30	16,29	16,30	15,47	15,80	15,02	15,59	14,59
<b>70-79</b>	31,94	30,68	28,00	28,23	27,34	25,23	25,72	24,75	23,55	22,21	21,32	19,19
<b>80 и ст.</b>	27,92	26,53	26,04	26,57	25,65	26,82	23,75	24,62	25,09	23,35	23,21	22,92
<b>15-59</b>	4,80	5,06	5,33	5,17	5,27	5,34	5,79	5,85	5,90	6,01	6,17	6,30
<b>«Грубый» показатель</b>	8,04	7,98	7,84	7,80	7,87	7,81	8,15	8,15	8,21	8,06	8,09	7,86
<b>Стандарт. показатель</b>	5,02	5,00	4,99	4,85	4,90	4,84	5,08	5,06	5,09	5,00	5,11	4,96
Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>20-29</b>	1,37	1,24	1,25	1,13	1,38	1,10	1,24	1,08	1,09	<b>51,4</b>	<b>-20,9</b>	-
<b>30-39</b>	5,59	6,11	6,51	6,41	7,03	7,03	6,52	7,30	7,32	<b>113,8</b>	<b>38,6</b>	-
<b>40-49</b>	9,28	10,13	10,36	10,04	10,16	10,52	11,83	11,56	12,07	<b>55,4</b>	<b>27,4</b>	<b>23,1</b>
<b>50-59</b>	12,23	12,25	12,93	12,53	12,88	13,02	13,31	13,27	13,37	<b>18,2</b>	<b>9,3</b>	<b>6,4</b>
<b>60-69</b>	15,38	14,31	14,62	14,39	14,09	13,77	14,43	13,62	14,14	<b>-29,1</b>	<b>-9,3</b>	-
<b>70-79</b>	18,78	18,55	18,33	17,51	17,40	16,82	16,02	15,90	16,29	<b>-53,0</b>	<b>-22,7</b>	<b>-9,2</b>
<b>80 и ст.</b>	22,37	21,72	19,28	19,95	18,91	19,65	17,93	16,77	17,21	<b>-38,1</b>	<b>-27,9</b>	<b>-15,4</b>
<b>15-59</b>	6,23	6,57	6,89	6,74	7,08	7,15	7,49	7,62	7,82	<b>60,4</b>	<b>28,4</b>	<b>15,7</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	7,84	7,91	8,08	7,94	8,11	8,12	8,30	8,24	8,46	<b>4,2</b>	<b>6,0</b>	<b>5,7</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	4,93	4,97	5,11	4,99	5,13	5,12	5,27	5,23	5,35	<b>5,9</b>	<b>6,7</b>	<b>6,4</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 128

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО шейки матки (C53),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	65,6	65,5	64,6	65,4	65,1	64,1	63,2	62,7	62,5	61,7	60,9	59,1
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	63,4	62,9	62,1	62,4	62,1	61,7	61,0	60,9	60,6	60,2	59,6	59,2
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,58	0,57	0,56	0,54	0,55	0,53	0,56	0,55	0,55	0,53	0,54	0,52
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	59,0	57,8	57,3	57,7	57,2	57,1	57,0	56,7	57,0	<b>-16,1</b>	<b>-5,6</b>	<b>-1,3</b>
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	59,2	58,8	58,3	58,6	58,0	58,1	57,9	57,5	57,7	<b>-9,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>-1,5</b>
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,52	0,52	0,54	0,53	0,54	0,53	0,55	0,55	0,56	-	-	<b>5,4</b>

Таблица 129

## Динамика показателей диагностики ЗНО шейки матки (C53), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	11404	11481	11622	11541	11502	11682	11946	12008	11854	11955	11916
из них доля выявленных активно, %	23,8	22,1	22,1	22,7	23,9	24,0	23,2	23,9	24,9	25,5	24,3
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	94,8	94,9	95,5	95,8	95,6	95,1	96,5	96,0	96,3	96,2	96,6
*I-II ст., %	60,1	59,1	59,6	58,6	57,1	56,4	57,5	58,8	57,8	58,1	58,1
*III ст., %	28,6	28,2	27,9	28,6	29,0	29,3	28,5	28,4	29,2	29,2	28,8
*IV ст., %	10,2	10,8	10,6	11,2	11,7	12,0	11,1	10,7	10,4	10,6	10,9
Показатель одногодичной летальности, %	21,0	20,9	21,0	19,2	20,7	21,0	21,5	20,5	20,2	20,3	20,9
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	12377	12542	12814	13038	13375	13867	14311	14276	14536	14808	
из них доля выявленных активно, %	25,6	27,4	28,3	29,5	28,9	28,2	28,9	29,8	31,1	32,2	
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	97,3	97,5	96,5	97,5	96,9	97,6	97,5	98,1	98,2	97,7	
*I-II ст., %	58,7	59,5	59,2	58,3	58,5	59,7	59,8	62,0	60,3	61,2	
*III ст., %	28,9	29,0	28,8	30,0	29,5	28,3	29,0	27,3	28,6	27,0	
*IV ст., %	10,6	9,7	10,1	9,9	10,1	9,6	9,1	8,6	9,1	9,5	
Показатель одногодичной летальности, %	20,8	19,5	19,3	19,0	19,4	18,1	17,2	17,4	17,0	16,5	

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 130

**Динамика сведений о контингенте больных с ЗНО шейки матки (C53), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных, состоящих на учете на конец года	194814	190545	187976	183686	181051	176686	170587	168972	166763	163380	160388
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	75,0	75,4	75,3	75,5	73,6	73,0	73,2	72,4	71,5	69,6	70,8
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	70,9	69,8	69,5	69,1	67,3	66,2	65,5	65,1	64,9	62,8	64,3
Показатель распространенности на 100 000 населения	131,5	128,8	127,2	124,6	123,2	120,6	116,9	116,4	116,0	114,3	111,8
Индекс накопления контингента	17,1	16,6	16,2	15,9	15,7	15,1	14,3	14,1	14,1	13,7	13,5
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных, состоящих на учете на конец года	157399	156628	156697	155726	156586	158349	159774	161727	164669	166326	
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	70,3	70,1	69,0	67,9	68,2	68,0	67,8	67,4	65,4	66,0	
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	64,9	65,0	64,8	64,7	66,6	68,4	69,2	69,6	69,2	70,1	
Показатель распространенности на 100 000 населения	110,3	110,3	110,0	109,6	110,3	111,6	112,6	113,1	115,0	115,9	
Индекс накопления контингента	12,7	12,5	12,2	11,9	11,7	11,4	11,2	11,3	11,3	11,2	

**Таблица 131**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО тела матки (С54)  
в зависимости от возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

<b>Возраст</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Всего</b>	<b>11937</b>	<b>12757</b>	<b>12857</b>	<b>13775</b>	<b>14227</b>	<b>14791</b>	<b>14513</b>	<b>15049</b>	<b>15376</b>	<b>15902</b>	<b>16239</b>	<b>16707</b>
<b>15-19</b>	4	6	7	10	8	15	8	1	6	5	0	4
<b>20-24</b>	11	19	12	23	31	25	17	19	16	20	19	18
<b>25-29</b>	39	37	34	42	47	34	36	41	38	37	41	38
<b>30-34</b>	106	99	106	112	118	93	88	110	98	89	97	107
<b>35-39</b>	244	253	288	292	281	279	251	224	284	253	231	238
<b>40-44</b>	537	580	555	556	657	633	639	685	720	703	687	717
<b>45-49</b>	691	896	995	1152	1211	1285	1182	1308	1318	1379	1388	1359
<b>50-54</b>	1389	1273	1121	1069	1203	1494	1798	2020	2218	2182	2376	2258
<b>55-59</b>	2094	2497	2483	2670	2520	2169	1775	1565	1501	1755	2128	2540
<b>60-64</b>	2085	2151	2081	2304	2477	2806	2941	3059	3046	2903	2528	2166
<b>65-69</b>	2246	2332	2431	2483	2369	2309	2116	2217	2173	2495	2842	3155
<b>70-74</b>	1282	1348	1511	1758	1963	2132	2079	2124	2104	2170	1894	1899
<b>75-79</b>	741	724	661	762	851	966	1033	1091	1283	1352	1413	1494
<b>80-84</b>	323	406	390	372	334	362	342	373	380	386	412	532
<b>85 и ст.</b>	144	135	177	167	156	188	206	211	191	172	182	182

**Продолжение таблицы 131**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО тела матки (С54)  
в зависимости от возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Всего</b>	<b>17108</b>	<b>17885</b>	<b>18302</b>	<b>18789</b>	<b>19595</b>	<b>19784</b>	<b>20821</b>	<b>21302</b>	<b>22242</b>	<b>81,4</b>	<b>37,3</b>	<b>18,2</b>
<b>15-19</b>	4	2	7	4	2	3	5	0	2	-	-	-
<b>20-24</b>	23	23	16	13	19	15	14	10	15	-	-	-
<b>25-29</b>	33	46	61	58	45	45	58	57	59	<b>63,3</b>	<b>53,3</b>	-
<b>30-34</b>	121	118	125	128	141	116	118	137	153	<b>41,4</b>	<b>35,4</b>	-
<b>35-39</b>	239	232	276	269	292	284	276	306	315	-	<b>37,7</b>	<b>14,1</b>
<b>40-44</b>	703	712	619	600	596	542	603	633	645	-	<b>-15,7</b>	-
<b>45-49</b>	1496	1572	1573	1540	1526	1490	1405	1313	1292	<b>54,5</b>	-	<b>-17,6</b>
<b>50-54</b>	2403	2548	2674	2754	2848	2794	2935	2959	2934	<b>190,0</b>	<b>31,2</b>	<b>7,1</b>
<b>55-59</b>	2958	3275	3429	3496	3676	3597	3717	3895	4274	<b>123,7</b>	<b>73,3</b>	<b>19,8</b>
<b>60-64</b>	1797	1833	2051	2643	3127	3733	4107	4157	4352	<b>78,7</b>	<b>174,0</b>	<b>64,6</b>
<b>65-69</b>	3162	3178	2990	2488	2185	1969	1995	2286	2762	-	<b>-30,4</b>	-
<b>70-74</b>	1913	1967	2120	2439	2743	2879	2993	2782	2376	<b>87,3</b>	<b>59,3</b>	-
<b>75-79</b>	1485	1582	1439	1353	1373	1286	1468	1618	1874	<b>139,8</b>	-	<b>42,2</b>
<b>80-84</b>	598	635	709	772	762	780	832	827	831	<b>255,3</b>	<b>81,3</b>	<b>10,3</b>
<b>85 и ст.</b>	172	158	211	229	259	250	294	320	357	<b>122,8</b>	<b>135,0</b>	<b>58,8</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 132

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО тела матки (C54), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 женского населения соответствующего возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>15-19</b>	0,08	0,11	0,13	0,19	0,15	0,27	0,14	0,02	0,10	0,08	0,00	0,07
<b>20-29</b>	0,52	0,58	0,48	0,67	0,79	0,59	0,52	0,58	0,52	0,54	0,54	0,50
<b>30-39</b>	2,78	2,82	3,22	3,37	3,43	3,30	3,12	3,19	3,78	3,47	3,30	3,51
<b>40-49</b>	13,24	14,64	14,27	14,99	15,94	15,94	14,88	16,11	16,38	16,70	16,61	16,81
<b>50-59</b>	37,45	42,26	42,18	45,21	46,12	46,69	46,18	46,09	47,19	47,85	50,78	50,02
<b>60-69</b>	46,71	49,67	51,25	55,12	55,82	58,40	57,32	59,81	59,56	62,89	64,71	67,16
<b>70-79</b>	42,74	42,99	43,54	47,69	49,90	51,73	49,49	49,23	50,75	52,36	49,97	52,89
<b>80 и ст.</b>	18,23	20,80	21,68	21,06	19,79	22,87	23,28	25,40	25,40	24,87	27,30	31,41
<b>15-59</b>	11,12	12,22	12,01	12,68	12,99	12,89	12,39	12,75	13,25	13,63	14,35	14,81
<b>«Грубый» показатель</b>	15,18	16,25	16,40	17,61	18,24	19,01	18,72	19,49	20,10	20,88	21,16	21,86
<b>Стандарт. показатель</b>	10,20	10,93	11,01	11,76	12,13	12,49	12,15	12,55	12,82	13,25	13,46	13,65
Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>15-19</b>	0,07	0,04	0,13	0,08	0,05	0,07	0,13	0,00	0,06	-	-	-
<b>20-29</b>	0,49	0,59	0,64	0,59	0,53	0,49	0,61	0,57	0,65	-	-	-
<b>30-39</b>	3,65	3,49	3,95	3,85	4,13	3,78	3,63	4,03	4,19	<b>37,1</b>	<b>19,3</b>	-
<b>40-49</b>	18,18	19,20	18,93	19,07	19,53	19,01	19,66	19,43	19,59	<b>46,1</b>	<b>15,9</b>	-
<b>50-59</b>	52,12	53,91	54,94	54,85	56,26	54,85	55,49	56,94	59,93	<b>45,3</b>	<b>15,7</b>	<b>7,4</b>
<b>60-69</b>	65,62	68,41	70,45	73,71	77,17	82,66	84,41	84,97	87,11	<b>84,1</b>	<b>40,7</b>	<b>17,8</b>
<b>70-79</b>	54,23	56,96	56,52	58,98	62,76	62,82	65,92	65,82	66,12	<b>55,8</b>	<b>33,7</b>	<b>11,5</b>
<b>80 и ст.</b>	32,08	31,08	33,92	34,73	33,64	33,24	34,15	34,28	35,38	<b>99,3</b>	<b>19,0</b>	-
<b>15-59</b>	16,10	17,02	17,56	17,80	18,50	18,06	18,70	19,26	20,25	<b>85,3</b>	<b>36,2</b>	<b>12,4</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	22,47	23,38	23,98	24,63	25,69	25,94	27,09	27,69	28,86	<b>86,3</b>	<b>36,3</b>	<b>16,7</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	13,90	14,50	14,83	15,15	15,53	15,61	16,00	16,26	16,75	<b>58,3</b>	<b>24,8</b>	<b>10,1</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 133

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО тела матки (C54),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	62,0	61,7	62,0	62,1	62,1	62,4	62,5	62,5	62,4	62,6	62,3	62,5
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	61,5	61,4	61,5	61,6	61,5	61,8	61,8	61,8	61,7	61,9	61,7	62,0
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,25	1,32	1,34	1,43	1,47	1,51	1,47	1,52	1,54	1,62	1,64	1,67
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	61,6	61,1	60,9	61,0	61,0	61,4	61,6	61,6	61,6	-1,6	-	1,2
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	61,7	61,6	61,6	61,7	61,7	61,9	62,1	62,1	62,2	0,9	0,7	0,9
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,70	1,77	1,81	1,85	1,90	1,92	1,97	2,00	2,05	60,8	25,7	10,5

**Таблица 134**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО тела матки (C54, 55) в зависимости от возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Всего</b>	<b>6462</b>	<b>6494</b>	<b>6411</b>	<b>6523</b>	<b>6480</b>	<b>6456</b>	<b>6312</b>	<b>6089</b>	<b>6212</b>	<b>6200</b>	<b>6178</b>	<b>6150</b>
<b>20-24</b>	8	8	8	9	6	10	4	6	8	5	3	7
<b>25-29</b>	21	22	14	22	15	14	17	19	18	15	15	16
<b>30-34</b>	67	47	38	39	41	38	35	41	33	40	35	37
<b>35-39</b>	120	122	99	117	106	92	98	90	79	73	62	60
<b>40-44</b>	189	176	179	204	162	191	184	142	186	182	155	181
<b>45-49</b>	194	249	276	328	321	307	290	280	291	272	304	322
<b>50-54</b>	438	379	336	301	284	303	374	385	459	473	469	490
<b>55-59</b>	689	795	851	852	799	693	551	444	386	360	451	581
<b>60-64</b>	968	906	870	826	841	939	1003	1000	1017	954	850	658
<b>65-69</b>	1262	1286	1283	1294	1178	1184	1055	965	935	1026	1074	1141
<b>70-74</b>	958	971	1051	1090	1222	1262	1280	1214	1232	1174	1102	989
<b>75-79</b>	793	754	630	667	747	729	741	820	929	1013	1054	1008
<b>80-84</b>	546	536	539	532	507	432	428	398	372	389	393	443
<b>85 и ст.</b>	204	241	234	235	247	261	250	282	265	224	209	215

**Продолжение таблицы 134**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО тела матки (C54, 55) в зависимости от возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Всего</b>	<b>6029</b>	<b>6224</b>	<b>6167</b>	<b>6354</b>	<b>6326</b>	<b>6559</b>	<b>6494</b>	<b>6585</b>	<b>6648</b>	<b>0,6</b>	<b>9,5</b>	<b>4,9</b>
<b>20-24</b>	8	7	6	2	3	3	6	2	7	-52,4	-	-
<b>25-29</b>	18	22	18	20	19	9	16	13	16	-18,9	-	-
<b>30-34</b>	29	32	31	44	40	38	37	39	40	-22,7	-	-
<b>35-39</b>	65	73	61	81	61	89	86	85	64	-41,9	-	-
<b>40-44</b>	159	161	122	121	111	111	113	130	119	-41,6	-34,6	-
<b>45-49</b>	295	258	282	272	248	266	252	227	204	-12,3	-29,4	-21,2
<b>50-54</b>	484	432	516	489	514	492	474	512	473	54,7	-	-
<b>55-59</b>	638	732	688	786	704	751	733	719	754	1,4	38,7	-
<b>60-64</b>	525	555	556	657	714	925	1053	1052	1047	-6,8	86,7	68,7
<b>65-69</b>	1170	1201	1115	950	834	696	581	729	813	-41,2	-44,2	-
<b>70-74</b>	910	937	982	1048	1227	1314	1289	1189	1004	4,8	-	-
<b>75-79</b>	998	1047	987	947	857	810	834	843	1001	31,7	-17,6	-
<b>80-84</b>	516	563	582	678	701	741	661	690	668	55,3	67,7	-
<b>85 и ст.</b>	212	203	220	258	291	311	358	354	438	60,8	139,9	68,3

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 135

**Динамика показателей смертности от ЗНО тела матки (C54, 55), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 женского населения соответствующего возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>20-29</b>	0,30	0,31	0,23	0,32	0,21	0,24	0,21	0,24	0,25	0,19	0,16	0,20
<b>30-39</b>	1,48	1,35	1,12	1,30	1,26	1,15	1,22	1,25	1,11	1,15	0,98	0,99
<b>40-49</b>	4,13	4,22	4,19	4,67	4,12	4,14	3,87	3,41	3,83	3,64	3,67	4,07
<b>50-59</b>	12,12	13,16	13,89	13,94	13,42	12,70	11,96	10,66	10,72	10,12	10,37	11,17
<b>60-69</b>	24,05	24,29	24,46	24,41	23,26	24,24	23,33	22,28	22,28	23,07	23,19	22,71
<b>70-79</b>	36,99	35,79	33,70	33,25	34,91	33,24	32,14	31,15	32,38	32,51	32,58	31,13
<b>80 и ст.</b>	29,28	29,88	29,56	29,97	30,46	28,81	28,81	29,58	28,33	27,32	27,67	28,95
<b>15-59</b>	3,76	3,88	3,87	4,01	3,71	3,53	3,32	3,01	3,12	3,01	3,08	3,45
<b>«Грубый» показатель</b>	8,22	8,27	8,18	8,34	8,31	8,30	8,14	7,89	8,12	8,14	8,05	8,05
<b>Стандарт. показатель</b>	4,86	4,88	4,82	4,89	4,73	4,70	4,59	4,38	4,46	4,39	4,38	4,40
Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>20-29</b>	0,23	0,25	0,20	0,18	0,18	0,10	0,18	0,13	0,20	<b>-46,5</b>	-	-
<b>30-39</b>	0,95	1,05	0,91	1,21	0,96	1,20	1,13	1,13	0,93	<b>-23,9</b>	-	-
<b>40-49</b>	3,75	3,52	3,49	3,50	3,30	3,53	3,57	3,57	3,27	<b>-22,1</b>	<b>-11,3</b>	-
<b>50-59</b>	10,91	10,78	10,84	11,19	10,50	10,67	10,07	10,23	10,20	<b>-25,1</b>	<b>-6,4</b>	<b>-8,2</b>
<b>60-69</b>	22,43	23,97	23,35	23,09	22,49	23,50	22,60	23,49	22,77	<b>-5,1</b>	-	-
<b>70-79</b>	30,45	31,84	31,27	31,03	31,78	32,04	31,37	30,40	31,19	<b>-12,7</b>	-	-
<b>80 и ст.</b>	30,33	30,02	29,57	32,48	32,69	33,95	30,91	31,20	32,94	<b>11,8</b>	<b>15,3</b>	-
<b>15-59</b>	3,43	3,43	3,45	3,65	3,44	3,58	3,52	3,57	3,51	-	<b>8,8</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	7,92	8,14	8,08	8,33	8,29	8,60	8,45	8,56	8,63	-	<b>8,8</b>	<b>3,7</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	4,26	4,39	4,30	4,39	4,30	4,46	4,32	4,40	4,31	<b>-12,1</b>	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 136

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО тела матки (C54, 55),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	67,1	67,1	67,1	67,2	67,8	67,7	67,8	68,3	68,4	68,5	68,5	68,2
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	66,1	66,1	66,1	65,9	66,5	66,4	66,5	66,9	66,8	66,9	66,9	66,6
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,54	0,55	0,54	0,54	0,54
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
										Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	68,4	68,5	68,6	68,7	69,5	69,3	69,1	68,5	68,7	3,0	-	-
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	66,9	67,1	67,2	67,2	67,6	67,5	67,4	67,4	67,9	2,6	1,5	-
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,52	0,54	0,53	0,54	0,53	0,55	0,53	0,55	0,53	-	-	-

Таблица 137

## Динамика показателей диагностики ЗНО тела матки (C54), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	11534	12454	12477	13386	13805	14454	14078	14522	14908	15311	15662
из них доля выявленных активно, %	8,6	9,3	8,7	9,0	9,1	9,4	9,6	9,7	10,6	10,4	10,3
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	93,4	93,7	93,8	94,1	94,3	94,2	94,8	94,7	95,2	95,0	94,6
*I-II ст., %	70,2	70,3	70,0	70,1	71,4	72,6	72,2	74,3	74,1	74,7	76,5
*III ст., %	16,9	16,5	16,5	17,1	16,2	15,3	15,1	14,1	14,6	13,8	13,2
*IV ст., %	8,6	8,5	8,6	8,5	8,2	7,5	8,0	7,5	7,2	7,2	7,1
Показатель одногодичной летальности, %	15,5	16,5	15,1	15,8	14,3	15,0	13,9	14,5	13,6	13,4	13,0
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	16031	16352	17131	17444	17843	18523	18731	19602	19907	20663	
из них доля выявленных активно, %	11,6	11,2	10,9	11,8	11,5	12,1	12,2	15,3	14,8	16,4	
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	96,0	96,5	96,0	96,4	96,7	96,5	96,5	97,0	97,5	97,8	
*I-II ст., %	76,4	77,0	76,5	77,4	78,1	77,7	78,6	79,2	81,0	80,6	
*III ст., %	12,9	13,1	12,7	12,8	12,2	12,4	12,2	11,9	10,8	10,9	
*IV ст., %	6,8	6,6	7,0	6,3	6,4	6,4	6,4	5,5	5,5	5,7	
Показатель одногодичной летальности, %	12,4	11,9	11,9	11,8	11,3	11,0	11,0	10,4	9,7	9,4	

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 138

**Динамика сведений о контингенте больных с ЗНО тела матки (C54), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных, состоящих на учете на конец года	105799	110261	114977	119978	124985	129585	132497	138743	143909	148384	153235
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	59,2	60,0	59,4	60,7	59,7	58,9	59,7	59,6	59,8	59,5	60,0
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	74,1	74,6	73,2	74,6	73,6	72,2	71,7	72,0	71,7	70,6	71,0
Показатель распространенности на 100 000 населения	71,4	74,5	77,8	81,4	85,1	88,4	90,8	95,6	100,1	103,8	106,8
Индекс накопления контингента	9,2	8,9	9,2	9,0	9,1	9,0	9,4	9,6	9,7	9,7	9,8
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных, состоящих на учете на конец года	158165	164078	170838	176110	182546	189725	196896	204764	212501	220459	
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	59,9	60,2	60,3	60,0	59,8	60,0	60,3	61,3	60,0	60,3	
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	71,5	71,2	71,5	71,2	71,2	72,0	72,3	73,5	72,4	72,8	
Показатель распространенности на 100 000 населения	110,9	115,6	119,9	123,9	128,6	133,7	138,7	143,2	148,4	153,6	
Индекс накопления контингента	9,9	10,0	10,0	10,1	10,2	10,2	10,5	10,5	10,7	10,7	

**Таблица 139**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО яичника (C56)  
в зависимости от возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

<b>Возраст</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Всего</b>	<b>10611</b>	<b>10892</b>	<b>10700</b>	<b>10832</b>	<b>11093</b>	<b>11475</b>	<b>11437</b>	<b>11742</b>	<b>11788</b>	<b>12116</b>	<b>11966</b>	<b>12082</b>
<b>15-19</b>	57	64	55	60	69	73	62	80	76	94	84	82
<b>20-24</b>	98	86	99	119	108	135	124	136	130	118	129	123
<b>25-29</b>	125	128	112	149	158	147	158	200	183	182	200	192
<b>30-34</b>	258	288	263	261	251	244	234	224	221	234	235	248
<b>35-39</b>	458	478	476	523	502	499	479	422	445	467	390	393
<b>40-44</b>	777	764	771	848	796	877	879	914	940	970	896	879
<b>45-49</b>	783	912	1112	1154	1250	1333	1267	1417	1423	1430	1500	1440
<b>50-54</b>	1145	970	825	839	897	1090	1305	1361	1475	1578	1578	1695
<b>55-59</b>	1438	1702	1675	1617	1493	1292	1077	934	923	982	1092	1349
<b>60-64</b>	1590	1472	1378	1431	1421	1562	1694	1816	1840	1652	1454	1198
<b>65-69</b>	1714	1767	1681	1618	1713	1504	1450	1282	1340	1486	1568	1725
<b>70-74</b>	1001	1105	1156	1183	1359	1544	1497	1545	1467	1424	1319	1158
<b>75-79</b>	677	620	563	541	591	692	725	851	857	984	1038	1010
<b>80-84</b>	334	387	367	333	303	285	280	320	296	326	324	413
<b>85 и ст.</b>	107	117	125	114	147	145	159	187	136	146	132	151

**Продолжение таблицы 139**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО яичника (C56)  
в зависимости от возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Всего</b>	<b>12338</b>	<b>12556</b>	<b>12609</b>	<b>12761</b>	<b>12843</b>	<b>13093</b>	<b>12960</b>	<b>12935</b>	<b>13262</b>	<b>25,5</b>	<b>9,9</b>	<b>3,0</b>
<b>15-19</b>	75	91	72	55	49	49	39	46	53	-	<b>-52,6</b>	-
<b>20-24</b>	148	167	141	128	129	137	103	138	127	<b>29,0</b>	-	-
<b>25-29</b>	176	192	211	197	212	222	251	239	258	<b>101,0</b>	<b>39,6</b>	<b>30,5</b>
<b>30-34</b>	280	270	288	327	275	298	312	302	324	<b>27,5</b>	<b>29,4</b>	-
<b>35-39</b>	399	381	406	423	472	482	517	513	505	-	<b>42,4</b>	<b>18,6</b>
<b>40-44</b>	850	839	779	806	733	727	779	754	752	-	<b>-17,5</b>	<b>-2,9</b>
<b>45-49</b>	1518	1525	1501	1486	1453	1400	1267	1272	1156	<b>30,7</b>	<b>-19,8</b>	<b>-21,6</b>
<b>50-54</b>	1725	1749	1799	1854	1819	1915	1928	1822	1859	<b>130,2</b>	<b>15,8</b>	-
<b>55-59</b>	1587	1676	1796	1962	1960	1980	1862	1870	2004	<b>52,0</b>	<b>56,4</b>	-
<b>60-64</b>	1011	1002	1032	1243	1467	1672	1752	1831	1906	-	<b>81,9</b>	<b>50,9</b>
<b>65-69</b>	1733	1843	1661	1389	1161	958	934	1032	1230	<b>-32,8</b>	<b>-45,1</b>	-
<b>70-74</b>	1166	1178	1191	1343	1477	1636	1572	1482	1285	-	<b>27,6</b>	-
<b>75-79</b>	1078	982	1044	880	855	821	860	900	1015	<b>61,0</b>	-	-
<b>80-84</b>	412	463	498	500	561	545	547	489	491	<b>92,2</b>	<b>41,5</b>	-
<b>85 и ст.</b>	152	164	155	142	190	222	201	219	263	<b>99,3</b>	<b>93,0</b>	<b>64,5</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 140

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО яичника (C56), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 женского населения соответствующего возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>15-19</b>	1,10	1,21	1,03	1,11	1,26	1,30	1,08	1,37	1,29	1,57	1,36	1,36
<b>20-29</b>	2,32	2,24	2,19	2,75	2,70	2,81	2,76	3,24	2,99	2,84	2,97	2,79
<b>30-39</b>	5,68	6,13	6,03	6,55	6,47	6,59	6,56	6,16	6,60	7,12	6,29	6,51
<b>40-49</b>	16,82	16,63	17,34	17,58	17,46	18,37	17,54	18,85	18,99	19,25	19,18	18,78
<b>50-59</b>	27,77	29,95	29,26	29,70	29,60	30,36	30,79	29,51	30,43	31,11	30,10	31,73
<b>60-69</b>	35,63	35,89	34,75	35,11	36,10	35,00	35,64	35,12	36,29	36,56	36,42	36,89
<b>70-79</b>	35,45	35,79	34,46	32,62	34,58	37,33	35,34	36,69	34,82	35,80	35,61	33,79
<b>80 и ст.</b>	17,22	19,38	18,81	17,47	18,18	17,88	18,65	22,06	19,21	21,04	20,96	24,81
<b>15-59</b>	11,17	11,64	11,56	11,91	11,81	12,17	11,94	12,14	12,43	12,85	12,57	13,03
<b>«Грубый» показатель</b>	13,50	13,88	13,65	13,85	14,22	14,75	14,75	15,21	15,41	15,91	15,59	15,81
<b>Стандарт. показатель</b>	9,57	9,71	9,57	9,81	9,89	10,17	10,04	10,2	10,3	10,54	10,28	10,35
Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>15-19</b>	1,28	1,62	1,38	1,15	1,13	1,18	1,00	1,27	1,54	-	-	-
<b>20-29</b>	2,82	3,05	2,95	2,69	2,81	2,96	2,98	3,22	3,40	<b>28,8</b>	<b>13,3</b>	<b>26,4</b>
<b>30-39</b>	6,89	6,50	6,84	7,27	7,12	7,38	7,64	7,42	7,43	<b>25,0</b>	<b>19,5</b>	-
<b>40-49</b>	19,58	19,87	19,70	20,43	20,12	19,90	20,03	20,23	19,29	<b>20,4</b>	-	-
<b>50-59</b>	32,20	31,71	32,37	33,49	32,59	33,43	31,62	30,67	32,12	<b>13,1</b>	-	-
<b>60-69</b>	36,31	38,84	37,64	37,81	38,18	38,12	37,16	37,76	38,40	<b>9,8</b>	-	-
<b>70-79</b>	35,81	34,67	35,49	34,58	35,56	37,06	35,94	35,63	35,78	-	-	-
<b>80 и ст.</b>	23,50	24,58	24,08	22,28	24,75	24,75	22,69	21,16	22,46	<b>37,0</b>	-	-
<b>15-59</b>	13,63	13,75	13,99	14,54	14,37	14,65	14,45	14,39	14,71	<b>34,1</b>	<b>14,6</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	16,21	16,42	16,52	16,73	16,84	17,17	16,86	16,81	17,21	<b>28,8</b>	<b>9,2</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	10,54	10,73	10,68	10,83	10,76	10,91	10,72	10,7	10,87	<b>14,0</b>	<b>4,7</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 141

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО яичника (C56),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	60,4	60,1	59,8	59,4	60,0	60,0	60,3	60,4	60,1	59,8	59,3	58,6
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	58,7	58,8	58,6	58,0	58,4	58,3	58,4	58,4	58,2	58,3	58,4	58,4
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,09	1,10	1,08	1,09	1,11	1,13	1,12	1,13	1,15	1,17	1,14	1,15
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	58,1	58,1	58,0	57,8	58,2	58,3	58,4	58,6	58,9	-3,9	-	1,8
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	58,3	58,3	58,4	58,1	58,5	58,5	58,4	58,5	58,7	-	-	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,17	1,19	1,18	1,21	1,20	1,21	1,18	1,19	1,21	12,1	4,7	-

**Таблица 142**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО яичника (C56) в зависимости от возраста,  
Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Всего</b>	<b>6299</b>	<b>7321</b>	<b>7300</b>	<b>7769</b>	<b>7520</b>	<b>7420</b>	<b>7434</b>	<b>7661</b>	<b>7636</b>	<b>7551</b>	<b>7759</b>	<b>7820</b>
<b>20-24</b>	24	18	19	35	29	25	20	24	18	24	21	20
<b>25-29</b>	26	35	28	33	27	46	43	35	35	22	35	29
<b>30-34</b>	53	62	51	62	51	54	57	50	61	54	58	69
<b>35-39</b>	146	142	142	142	114	123	102	113	115	135	115	106
<b>40-44</b>	281	346	307	364	349	307	324	291	294	283	240	265
<b>45-49</b>	515	599	604	674	643	626	671	641	652	552	592	582
<b>50-54</b>	559	782	834	848	900	815	947	898	879	944	969	977
<b>55-59</b>	677	616	540	608	689	750	898	1001	982	1098	1099	1125
<b>60-64</b>	991	1243	1270	1248	996	893	654	662	649	788	915	1013
<b>65-69</b>	953	988	964	1134	1170	1233	1302	1331	1309	1062	864	725
<b>70-74</b>	1126	1283	1239	1227	1132	1012	932	927	988	1037	1188	1327
<b>75-79</b>	549	712	784	900	962	993	922	991	1000	905	869	768
<b>80-84</b>	247	309	304	308	315	373	400	507	475	488	577	589
<b>85 и ст.</b>	129	156	186	152	123	153	145	169	166	150	197	216

**Продолжение таблицы 142**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО яичника (C56) в зависимости от возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Всего</b>	<b>7582</b>	<b>7789</b>	<b>7713</b>	<b>10,9</b>	<b>4,1</b>	-
<b>20-24</b>	21	13	19	-	<b>-34,6</b>	-
<b>25-29</b>	33	33	30	-	-	-
<b>30-34</b>	65	74	67	<b>28,5</b>	<b>40,6</b>	<b>28,2</b>
<b>35-39</b>	137	130	119	-	-	-
<b>40-44</b>	237	255	237	<b>-29,0</b>	<b>-30,6</b>	-
<b>45-49</b>	520	503	452	-	<b>-27,4</b>	<b>-19,6</b>
<b>50-54</b>	921	883	904	<b>29,0</b>	-	-
<b>55-59</b>	1075	1149	1109	<b>118,6</b>	<b>54,4</b>	-
<b>60-64</b>	1171	1167	1248	-	<b>65,2</b>	<b>59,3</b>
<b>65-69</b>	602	713	781	<b>-31,2</b>	<b>-50,6</b>	-
<b>70-74</b>	1266	1206	1031	-	-	-
<b>75-79</b>	763	844	901	-	<b>-17,8</b>	-
<b>80-84</b>	553	550	530	<b>137,5</b>	<b>63,1</b>	-
<b>85 и ст.</b>	210	261	278	<b>96,7</b>	<b>124,3</b>	<b>79,8</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 143

**Динамика показателей смертности от ЗНО яичника (C56), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 женского населения соответствующего возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010			
<b>20-29</b>	0,49	0,51	0,45	0,64	0,51	0,63	0,55	0,50	0,44	0,38	0,46	0,40			
<b>30-39</b>	1,83	1,95	1,91	2,07	1,66	1,80	1,61	1,63	1,73	1,83	1,65	1,65			
<b>40-49</b>	6,51	7,64	7,32	8,32	7,94	7,55	8,23	7,83	8,17	7,44	7,66	7,93			
<b>50-59</b>	15,98	17,97	17,44	17,69	17,91	16,32	17,94	17,58	16,75	17,92	17,83	18,04			
<b>60-69</b>	22,04	25,29	25,49	27,75	26,10	26,83	25,88	27,21	27,36	26,58	25,85	25,19			
<b>70-79</b>	26,64	30,55	30,31	31,62	31,64	31,25	29,59	30,78	31,57	30,20	31,37	31,60			
<b>80 и ст.</b>	15,98	20,23	21,79	20,50	20,13	23,14	22,71	26,50	23,63	22,14	25,50	25,98			
<b>15-59</b>	4,91	5,59	5,44	5,92	5,80	5,61	6,21	6,12	6,09	6,26	6,36	6,46			
<b>«Грубый» показатель</b>	8,12	9,48	9,54	10,20	9,80	9,71	9,76	10,02	10,00	9,90	10,17	10,25			
<b>Стандарт. показатель</b>	5,04	5,81	5,74	6,14	5,85	5,76	5,75	5,84	5,76	5,72	5,78	5,78			
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль** %</b>											
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>									
<b>20-29</b>	0,45	0,39	0,43	<b>-25,6</b>	<b>-29,9</b>	-									
<b>30-39</b>	1,86	1,86	1,67	-	-	-									
<b>40-49</b>	7,41	7,57	6,97	-	<b>-8,5</b>	-									
<b>50-59</b>	16,65	16,88	16,74	-	-	<b>-8,0</b>									
<b>60-69</b>	24,53	24,79	24,84	-	<b>-8,1</b>	<b>-6,8</b>									
<b>70-79</b>	29,98	30,67	30,06	-	-	-									
<b>80 и ст.</b>	23,14	24,24	24,06	<b>32,2</b>	-	-									
<b>15-59</b>	6,17	6,30	6,15	<b>20,1</b>	<b>8,3</b>	-									
<b>«Грубый» показатель</b>	9,87	10,12	10,01	<b>11,2</b>	<b>3,4</b>	-									
<b>Стандарт. показатель</b>	5,51	5,62	5,50	-	<b>-4,9</b>	-									

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 144

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО яичника (C56),  
Россия, 1999-2013 гг.**

Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	64,3	64,2	64,3	64,3	64,7	65,2	64,9	65,4	65,5	64,2	64,0	63,6
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	62,8	62,9	63,2	62,9	63,1	63,4	63,0	63,6	63,6	63,4	63,7	63,7
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,61	0,70	0,69	0,74	0,70	0,69	0,68	0,69	0,69	0,68	0,69	0,69
<b>Показатель</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	63,3	63,6	63,7	-	<b>-3,0</b>	-						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	63,6	63,9	64,1	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,66	0,67	0,66	-	-	-						

\* ЗНО яичника введены в отчетную форму Росстата с 1999 г.

Таблица 145

## Динамика показателей диагностики ЗНО яичника (C56), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	10231	10488	10362	10412	10681	11079	11053	11258	11261	11595	11410
из них доля выявленных активно, %	7,1	8,1	7,0	7,2	7,8	7,3	7,4	7,8	8,1	7,7	7,8
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	80,8	80,1	79,4	81,6	80,8	82,6	82,7	83,1	84,9	84,2	85,7
*I-II ст., %	30,0	29,8	29,5	30,9	30,4	31,5	31,9	32,3	33,0	31,9	32,6
*III ст., %	36,0	36,5	36,1	35,7	36,0	36,8	37,2	37,9	37,6	39,0	39,5
*IV ст., %	30,2	30,0	30,5	29,4	29,3	27,5	27,0	26,2	25,4	25,2	23,9
Показатель одногодичной летальности, %	36,4	36,7	36,5	35,0	34,8	35,2	33,6	33,2	32,8	31,1	30,8
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	11448	11715	11927	11858	11964	12034	12228	12115	11956	12165	
из них доля выявленных активно, %	8,6	8,9	10,4	8,3	9,2	9,2	10,2	11,7	11,4	12,2	
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	85,4	85,7	86,9	87,7	88,4	88,4	89,1	90,1	91,0	91,3	
*I-II ст., %	33,1	34,5	34,2	35,3	35,1	34,4	35,3	36,2	36,3	35,8	
*III ст., %	39,8	38,6	40,1	39,9	40,3	40,5	40,7	39,9	40,8	40,6	
*IV ст., %	23,3	23,9	22,7	21,6	21,9	22,3	21,7	20,7	20,3	20,8	
Показатель одногодичной летальности, %	29,8	28,8	28,1	27,4	26,2	26,4	26,3	24,6	24,3	23,7	

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 146

**Динамика сведений о контингенте больных с ЗНО яичника (C56), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных, состоящих на учете на конец года	53442	55167	56969	58324	60243	61646	62784	64844	66985	69190	70968
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	54,3	54,3	53,3	54,1	54,9	54,5	54,3	54,6	55,0	54,9	55,6
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	62,9	63,6	61,8	62,4	63,3	62,9	61,8	62,2	63,1	63,1	64,0
Показатель распространенности на 100 000 населения	36,1	37,3	38,6	39,6	41,0	42,1	43,0	44,7	46,6	48,4	49,5
Индекс накопления контингента	5,2	5,3	5,5	5,6	5,6	5,6	5,7	5,8	6,0	6,0	6,2
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных, состоящих на учете на конец года	72421	75195	78546	80908	83827	86319	89505	92200	94304	97523	
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	55,9	56,0	56,1	56,4	55,5	56,5	56,2	57,8	57,5	57,7	
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	64,5	64,9	65,8	65,9	65,6	67,3	66,9	67,8	67,0	67,1	
Показатель распространенности на 100 000 населения	50,8	53,0	55,1	56,9	59,1	60,8	63,1	64,5	65,9	68,0	
Индекс накопления контингента	6,3	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,3	7,6	7,9	8,0	

**Таблица 147**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО предстательной железы (C61)  
в зависимости от возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

<b>Возраст</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Всего</b>	<b>6800</b>	<b>6938</b>	<b>7798</b>	<b>8290</b>	<b>9057</b>	<b>10502</b>	<b>10735</b>	<b>11581</b>	<b>12788</b>	<b>13245</b>	<b>13881</b>	<b>15238</b>
<b>20-24</b>	4	4	4	7	3	0	3	0	3	4	1	4
<b>25-29</b>	5	4	1	11	14	15	3	4	3	5	4	6
<b>30-34</b>	10	5	7	32	14	8	2	4	8	4	6	6
<b>35-39</b>	7	18	20	35	19	11	7	11	12	9	3	5
<b>40-44</b>	27	33	47	77	46	42	34	47	52	38	36	31
<b>45-49</b>	90	84	93	136	155	125	99	136	159	157	131	154
<b>50-54</b>	250	225	222	198	219	261	316	362	426	433	377	471
<b>55-59</b>	568	638	723	751	826	770	604	537	572	631	764	1027
<b>60-64</b>	1195	1107	1196	1175	1325	1592	1788	1951	2181	2049	1862	1666
<b>65-69</b>	1689	1873	2126	2202	2291	2420	2317	2322	2546	2703	3002	3609
<b>70-74</b>	1184	1261	1550	1861	2213	2779	2977	3293	3568	3565	3506	3454
<b>75-79</b>	1038	898	972	954	1081	1410	1519	1784	2124	2488	2961	3335
<b>80-84</b>	514	593	608	640	582	704	716	733	764	790	850	1077
<b>85 и ст.</b>	219	191	227	207	265	357	348	392	369	366	374	389

**Продолжение таблицы 147**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО предстательной железы (C61)  
в зависимости от возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Всего</b>	<b>16861</b>	<b>18092</b>	<b>20223</b>	<b>22129</b>	<b>25215</b>	<b>26268</b>	<b>28552</b>	<b>29082</b>	<b>31569</b>	<b>754,8</b>	<b>146,2</b>	<b>39,9</b>
<b>20-24</b>	2	3	4	5	2	3	3	0	1	-	-	-
<b>25-29</b>	5	7	2	2	1	0	3	2	1	-	-	-
<b>30-34</b>	6	9	2	5	9	2	3	2	5	-	-	-
<b>35-39</b>	10	10	8	8	12	11	17	14	18	-	-	-
<b>40-44</b>	36	45	33	36	39	43	44	32	54	-	-	-
<b>45-49</b>	157	150	170	184	216	212	215	174	190	<b>119,8</b>	<b>46,2</b>	-
<b>50-54</b>	489	570	646	721	892	900	991	930	1036	<b>314,4</b>	<b>194,7</b>	<b>33,5</b>
<b>55-59</b>	1254	1477	1711	1918	2293	2378	2588	2559	2818	<b>396,1</b>	<b>268,8</b>	<b>40,3</b>
<b>60-64</b>	1617	1571	2079	2741	3637	4328	4961	5088	5592	<b>368,0</b>	<b>200,3</b>	<b>100,3</b>
<b>65-69</b>	4147	4447	4538	4347	4084	3658	3817	4395	5532	<b>209,9</b>	<b>33,1</b>	-
<b>70-74</b>	3529	3956	4572	5480	6830	7041	7601	7356	6745	<b>469,7</b>	<b>92,4</b>	-
<b>75-79</b>	3833	3819	4050	3935	4096	4052	4633	4936	6013	<b>479,3</b>	<b>76,5</b>	<b>55,8</b>
<b>80-84</b>	1316	1521	1867	2166	2493	2744	2721	2592	2500	<b>386,3</b>	<b>216,7</b>	-
<b>85 и ст.</b>	459	504	537	579	606	895	954	997	1063	<b>385,4</b>	<b>184,2</b>	<b>97,3</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 148

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО предстательной железы (C61), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 мужского населения соответствующего возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>20-29</b>	0,09	0,08	0,05	0,18	0,16	0,14	0,06	0,04	0,06	0,08	0,04	0,09
<b>30-39</b>	0,13	0,18	0,22	0,56	0,28	0,17	0,08	0,14	0,20	0,13	0,09	0,11
<b>40-49</b>	1,32	1,22	1,36	1,98	1,82	1,48	1,16	1,58	1,81	1,68	1,46	1,64
<b>50-59</b>	10,57	11,74	13,57	14,16	15,95	16,07	14,41	13,90	15,14	15,45	15,56	19,08
<b>60-69</b>	49,09	51,20	57,58	58,59	62,28	68,17	69,23	72,30	81,07	84,26	90,09	104,21
<b>70-79</b>	131,37	124,82	138,65	141,58	148,28	169,88	167,62	178,36	193,12	201,39	213,59	229,25
<b>80 и ст.</b>	114,80	119,92	127,00	131,89	135,70	173,98	176,87	188,57	191,68	194,51	235,44	267,59
<b>15-59</b>	2,15	2,26	2,48	2,77	2,87	2,74	2,36	2,44	2,73	2,82	2,87	3,67
<b>«Грубый» показатель</b>	9,78	9,99	11,24	11,99	13,14	15,28	15,69	17,03	19,01	19,84	20,80	22,99
<b>Стандарт. показатель</b>	9,60	9,52	10,55	10,88	11,59	13,21	13,25	14,09	15,34	15,67	16,51	18,12
Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>20-29</b>	0,06	0,08	0,05	0,06	0,02	0,02	0,05	0,02	0,02	-	-	-
<b>30-39</b>	0,17	0,19	0,10	0,13	0,21	0,13	0,19	0,15	0,21	-	-	-
<b>40-49</b>	1,75	1,80	1,93	2,16	2,58	2,61	2,76	2,23	2,67	<b>109,6</b>	<b>85,4</b>	-
<b>50-59</b>	20,89	23,50	26,38	28,84	34,22	35,04	36,95	35,75	39,36	<b>272,4</b>	<b>155,8</b>	<b>28,2</b>
<b>60-69</b>	121,21	131,40	147,31	160,51	174,21	178,34	180,76	184,97	201,77	<b>311,0</b>	<b>115,2</b>	<b>21,6</b>
<b>70-79</b>	251,82	264,46	288,08	306,95	349,56	351,52	378,09	387,86	423,39	<b>222,3</b>	<b>105,4</b>	<b>34,0</b>
<b>80 и ст.</b>	299,90	307,72	325,02	333,28	346,01	392,75	367,51	348,26	341,15	<b>197,2</b>	<b>43,2</b>	<b>0,8</b>
<b>15-59</b>	4,20	4,83	5,50	6,18	7,49	7,70	8,45	8,19	9,15	<b>325,6</b>	<b>235,1</b>	<b>39,9</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	25,61	27,41	30,74	33,69	38,41	40,02	43,19	43,89	47,51	<b>385,8</b>	<b>145,8</b>	<b>37,8</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	20,08	21,41	23,85	26,03	29,35	30,63	32,26	32,46	34,62	<b>260,6</b>	<b>122,1</b>	<b>29,3</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 149

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО предстательной железы (C61),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	68,7	68,6	68,7	68,9	69,2	70,0	70,3	70,6	70,6	70,8	71,1	70,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	68,9	68,8	68,8	68,5	68,8	69,5	69,8	69,9	69,8	70,1	70,4	70,4
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,21	1,22	1,35	1,41	1,48	1,63	1,64	1,74	1,92	1,97	2,02	2,22
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,1	71,1	70,9	70,4	3,5	-	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	70,6	70,5	70,5	70,3	70,0	70,2	70,0	70,1	69,9	2,3	-0,9	-0,4
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	2,45	2,68	3,01	3,34	3,83	3,89	4,13	4,25	4,55	276,0	125,2	32,2

**Таблица 150**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО предстательной железы (C61) в зависимости от возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Всего</b>	<b>5123</b>	<b>5167</b>	<b>5281</b>	<b>5583</b>	<b>6001</b>	<b>6305</b>	<b>6436</b>	<b>6680</b>	<b>6986</b>	<b>7556</b>	<b>7467</b>	<b>7875</b>
<b>20-24</b>	2	4	2	8	6	7	2	2	0	3	0	2
<b>25-29</b>	6	6	2	4	3	7	1	2	2	1	0	2
<b>30-34</b>	6	7	10	9	10	11	1	1	0	6	2	4
<b>35-39</b>	12	8	13	12	13	8	9	10	3	8	0	3
<b>40-44</b>	27	30	18	29	28	21	18	28	23	19	14	19
<b>45-49</b>	39	55	50	76	86	109	58	85	83	91	70	82
<b>50-54</b>	180	136	119	112	108	156	173	183	228	254	226	231
<b>55-59</b>	379	446	497	465	481	466	428	298	283	314	331	436
<b>60-64</b>	784	748	714	773	740	826	986	1064	1065	1119	875	788
<b>65-69</b>	1234	1302	1420	1473	1532	1453	1351	1291	1328	1393	1517	1633
<b>70-74</b>	844	874	974	1091	1359	1586	1670	1841	1975	2033	1918	1839
<b>75-79</b>	818	721	674	714	801	823	895	1034	1159	1425	1629	1852
<b>80-84</b>	563	560	570	565	549	518	497	528	502	556	546	638
<b>85 и ст.</b>	229	266	216	250	282	312	346	312	333	334	335	344

**Продолжение таблицы 150**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО предстательной железы (C61) в зависимости от возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Всего</b>	<b>8192</b>	<b>8516</b>	<b>8909</b>	<b>9452</b>	<b>9971</b>	<b>10251</b>	<b>10555</b>	<b>10861</b>	<b>11111</b>	<b>140,7</b>	<b>52,1</b>	<b>17,1</b>
<b>20-24</b>	3	0	3	2	1	3	2	3	1	-	-	-
<b>25-29</b>	0	0	1	0	2	1	2	2	1	-	-	-
<b>30-34</b>	4	3	4	2	0	3	3	1	2	-	-	-
<b>35-39</b>	2	3	4	3	8	2	9	7	7	-	-	-
<b>40-44</b>	25	23	12	13	15	11	13	12	18	-	-	-
<b>45-49</b>	76	92	79	73	78	60	63	56	50	-	-	-
<b>50-54</b>	249	258	227	229	249	247	244	265	233	<b>103,9</b>	-	-
<b>55-59</b>	490	602	604	681	654	611	637	664	701	<b>88,4</b>	<b>70,9</b>	-
<b>60-64</b>	707	632	667	815	1003	1164	1360	1341	1394	<b>64,3</b>	<b>130,6</b>	<b>70,9</b>
<b>65-69</b>	1840	1937	1816	1576	1433	1216	1108	1197	1394	-	<b>-31,6</b>	-
<b>70-74</b>	1689	1648	1890	2186	2458	2607	2781	2608	2309	<b>178,3</b>	<b>60,0</b>	-
<b>75-79</b>	1972	2050	2120	2086	2093	2029	1932	2162	2465	<b>201,3</b>	<b>26,8</b>	-
<b>80-84</b>	790	880	1089	1322	1500	1729	1691	1699	1594	<b>183,1</b>	<b>191,9</b>	-
<b>85 и ст.</b>	343	387	388	460	475	568	708	842	942	<b>311,4</b>	<b>181,2</b>	<b>104,8</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 151

**Динамика показателей смертности от ЗНО предстательной железы (С61), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 мужского населения соответствующего возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>20-29</b>	0,08	0,10	0,04	0,12	0,09	0,13	0,03	0,04	0,02	0,04	0,00	0,03
<b>30-39</b>	0,14	0,12	0,19	0,18	0,20	0,17	0,09	0,10	0,03	0,14	0,02	0,07
<b>40-49</b>	0,74	0,89	0,66	0,98	1,03	1,15	0,66	0,98	0,91	0,95	0,73	0,89
<b>50-59</b>	7,22	7,92	8,84	8,61	8,99	9,70	9,41	7,44	7,75	8,25	7,60	8,49
<b>60-69</b>	34,35	35,22	36,99	38,96	39,13	38,72	39,41	39,85	41,04	44,54	44,30	47,83
<b>70-79</b>	98,26	92,21	90,60	90,78	97,24	97,69	95,63	101,00	106,33	115,05	117,15	124,64
<b>80 и ст.</b>	124,04	126,35	119,55	126,91	133,14	136,10	140,14	140,80	141,26	149,75	169,46	179,24
<b>15-59</b>	1,46	1,55	1,58	1,58	1,63	1,74	1,53	1,35	1,38	1,53	1,40	1,68
<b>«Грубый» показатель</b>	7,37	7,44	7,61	8,07	8,71	9,18	9,41	9,82	10,39	11,32	11,19	11,88
<b>Стандарт. показатель</b>	7,27	7,21	7,14	7,43	7,78	8,02	8,09	8,23	8,48	9,02	9,04	9,52
Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>20-29</b>	0,03	0,00	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,02	-	-	-
<b>30-39</b>	0,06	0,06	0,08	0,05	0,08	0,05	0,11	0,07	0,08	-	-	-
<b>40-49</b>	0,92	1,06	0,87	0,84	0,94	0,73	0,81	0,74	0,74	-	-	-
<b>50-59</b>	8,86	9,87	9,30	9,94	9,70	9,17	9,10	9,52	9,54	<b>18,9</b>	-	-
<b>60-69</b>	53,56	56,09	55,28	54,14	54,96	53,15	50,82	49,50	50,57	<b>61,2</b>	-	<b>-9,4</b>
<b>70-79</b>	125,23	125,78	133,98	139,28	145,60	146,91	145,66	150,51	158,43	<b>86,9</b>	<b>33,2</b>	<b>11,3</b>
<b>80 и ст.</b>	191,43	192,53	199,69	216,36	220,51	247,91	239,90	246,57	242,82	<b>95,8</b>	<b>49,5</b>	<b>13,3</b>
<b>15-59</b>	1,82	2,09	2,00	2,16	2,18	2,03	2,13	2,23	2,25	<b>62,3</b>	<b>41,6</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	12,44	12,90	13,54	14,39	15,19	15,62	15,97	16,39	16,72	<b>126,9</b>	<b>52,2</b>	<b>15,5</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	9,86	10,08	10,33	10,88	11,37	11,61	11,63	11,71	11,78	<b>62,0</b>	<b>31,8</b>	<b>7,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 152

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО предстательной железы (C61),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	69,6	69,4	69,3	69,4	70,0	70,3	70,6	71,0	71,2	71,4	71,8	72,0	
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	70,0	69,8	69,7	69,7	70,0	69,9	70,3	70,5	70,6	70,7	71,2	71,3	
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,86	0,84	0,86	0,87	0,91	0,95	0,95	0,97	1,02	1,08	1,05	1,10	
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %	1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	72,1	72,2	72,7	73,0	73,1	73,5	73,3	73,6	73,8	7,1	2,9	1,0	
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	71,4	71,5	71,9	72,2	72,3	72,7	72,6	72,8	72,9	5,1	2,6	1,0	
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	1,12	1,14	1,18	1,23	1,30	1,30	1,32	1,32	1,34	69,5	29,2	7,2	

Таблица 153

## Динамика показателей диагностики ЗНО предстательной железы (C61), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	6529	6685	7425	7950	8727	10066	10253	11039	12294	12736	13263
из них доля выявленных активно, %	2,7	2,3	2,7	3,1	2,7	4,1	4,5	4,5	4,8	6,0	6,6
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	61,7	63,1	65,3	67,0	67,0	71,6	71,5	73,6	75,2	77,2	79,6
*I-II ст., %	34,0	33,6	33,4	32,5	32,4	31,5	32,7	33,7	34,0	33,8	34,7
*III ст., %	37,0	37,4	38,8	38,3	38,9	39,9	40,3	39,0	37,6	38,5	38,8
*IV ст., %	19,3	20,3	21,5	22,5	22,2	22,1	21,2	23,2	23,6	23,3	22,8
Показатель одногодичной летальности, %	31,5	31,0	31,0	26,9	28,8	27,3	26,0	24,4	23,9	23,2	21,2
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	14565	16102	17288	19201	20887	23845	24801	26795	27046	29158	
из них доля выявленных активно, %	9,8	10,3	10,6	12,1	15,4	17,5	18,9	20,7	23,0	25,0	
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	81,8	83,6	84,4	88,1	89,0	91,2	90,2	92,0	91,9	93,9	
*I-II ст., %	35,5	36,6	37,6	40,3	44,0	44,8	44,9	47,7	48,4	49,5	
*III ст., %	38,4	38,6	38,3	37,6	35,4	34,9	35,4	32,8	31,8	31,0	
*IV ст., %	22,7	21,7	21,7	19,7	19,0	18,5	17,8	17,4	17,8	17,2	
Показатель одногодичной летальности, %	19,9	19,0	17,2	16,1	15,0	14,0	12,3	11,2	10,4	10,3	

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 154

**Динамика сведений о контингенте больных с ЗНО предстательной железы (C61), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных, состоящих на учете на конец года	20671	22093	23622	25800	28104	30913	33880	37442	41811	44411	49870
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	30,3	29,1	29,2	27,6	30,1	26,3	28,3	28,7	28,9	29,5	30,1
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	42,0	40,0	40,8	39,3	41,9	39,3	43,3	45,5	46,8	46,6	48,6
Показатель распространенности на 100 000 населения	14,0	14,9	16,0	17,5	19,1	21,1	23,2	25,8	29,1	31,1	34,8
Индекс накопления контингента	3,2	3,3	3,2	3,3	3,2	3,1	3,3	3,4	3,4	3,5	3,8
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных, состоящих на учете на конец года	54756	61121	68150	75888	85215	96613	107942	120976	134005	148987	
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	30,1	30,4	30,7	30,7	30,2	30,0	30,5	31,2	32,2	34,5	
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	48,6	49,7	50,0	52,4	51,6	53,0	53,9	55,4	56,9	60,3	
Показатель распространенности на 100 000 населения	38,4	43,1	47,8	53,4	60,0	68,1	76,1	84,6	93,6	103,8	
Индекс накопления контингента	3,8	3,8	3,9	4,0	4,1	4,1	4,4	4,5	5,0	5,1	

**Таблица 155**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО почки (C64) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>9651</b>	<b>9997</b>	<b>10540</b>	<b>11413</b>	<b>11720</b>	<b>12748</b>	<b>12899</b>	<b>13605</b>	<b>13933</b>	<b>14560</b>	<b>14965</b>	<b>15397</b>
<b>0-14</b>	197	203	168	173	175	152	182	137	141	159	164	205
<b>15-19</b>	12	18	14	25	20	23	26	32	15	14	24	31
<b>20-24</b>	27	27	23	35	39	28	25	36	18	23	28	27
<b>25-29</b>	39	27	49	39	56	50	44	45	39	53	45	42
<b>30-34</b>	98	95	118	119	103	102	83	98	98	105	101	100
<b>35-39</b>	273	244	293	311	328	283	289	322	279	244	251	267
<b>40-44</b>	514	517	539	583	655	664	675	712	727	736	684	674
<b>45-49</b>	651	800	1019	1103	1078	1222	1172	1289	1281	1307	1387	1373
<b>50-54</b>	918	844	870	888	1018	1261	1508	1888	2043	2159	2205	2087
<b>55-59</b>	1432	1640	1684	1702	1573	1486	1333	1175	1258	1468	1849	2332
<b>60-64</b>	1650	1654	1661	1824	1821	2062	2187	2296	2262	2098	1905	1663
<b>65-69</b>	1805	1875	1970	2130	2108	2091	1939	2042	2089	2279	2367	2554
<b>70-74</b>	1042	1074	1186	1411	1590	1971	1946	2009	2009	2050	1979	1880
<b>75-79</b>	611	547	561	622	721	866	964	1004	1135	1248	1334	1461
<b>80-84</b>	295	330	277	320	294	334	326	327	380	448	461	528
<b>85 и ст.</b>	87	102	108	128	141	153	200	193	159	169	181	173

**Продолжение таблицы 155**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО почки (C64) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>15733</b>	<b>16032</b>	<b>16770</b>	<b>17563</b>	<b>18328</b>	<b>18723</b>	<b>19657</b>	<b>19675</b>	<b>20892</b>	<b>115,3</b>	<b>41,5</b>	<b>17,9</b>
<b>0-14</b>	178	179	158	213	193	182	202	194	186	-	-	-
<b>15-19</b>	23	24	22	20	12	10	14	16	12	-	-	-
<b>20-24</b>	33	26	28	26	29	33	39	24	37	-	--	-
<b>25-29</b>	60	56	55	60	60	85	86	72	85	<b>135,5</b>	<b>101,9</b>	-
<b>30-34</b>	101	118	149	117	144	137	182	163	167	<b>80,3</b>	<b>85,2</b>	<b>41,4</b>
<b>35-39</b>	251	262	257	285	292	310	323	346	424	-	<b>62,9</b>	<b>48,7</b>
<b>40-44</b>	649	587	601	550	620	585	612	636	696	-	-	<b>21,0</b>
<b>45-49</b>	1358	1395	1454	1438	1414	1362	1341	1193	1229	<b>49,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>-16,7</b>
<b>50-54</b>	2115	2170	2255	2392	2444	2420	2575	2487	2493	<b>219,7</b>	<b>22,4</b>	-
<b>55-59</b>	2529	2701	2929	3221	3290	3205	3282	3279	3606	<b>250,2</b>	<b>69,5</b>	-
<b>60-64</b>	1573	1535	1906	2372	2900	3352	3754	3833	4077	<b>148,9</b>	<b>256,4</b>	<b>70,5</b>
<b>65-69</b>	2723	2697	2511	2096	1956	1767	1871	2166	2600	-	-	-
<b>70-74</b>	1885	1968	2019	2310	2500	2547	2670	2468	2198	<b>106,0</b>	<b>36,6</b>	-
<b>75-79</b>	1553	1489	1525	1463	1413	1408	1533	1600	1822	<b>221,9</b>	<b>17,6</b>	<b>26,7</b>
<b>80-84</b>	523	606	712	761	770	947	833	804	830	<b>396,2</b>	<b>88,2</b>	-
<b>85 и ст.</b>	179	219	189	239	291	373	340	394	430	<b>467,6</b>	<b>224,5</b>	<b>73,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 155**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО почки (C64) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>5487</b>	<b>5617</b>	<b>6024</b>	<b>6445</b>	<b>6521</b>	<b>7199</b>	<b>7193</b>	<b>7646</b>	<b>7851</b>	<b>8265</b>	<b>8509</b>	<b>8668</b>
<b>0-14</b>	101	100	75	83	96	89	91	72	69	78	81	100
<b>15-19</b>	5	10	3	18	11	14	12	14	6	7	11	19
<b>20-24</b>	11	12	13	16	16	16	7	16	10	15	13	15
<b>25-29</b>	25	15	19	26	29	24	20	19	17	23	22	22
<b>30-34</b>	53	54	71	64	54	62	40	49	55	59	61	51
<b>35-39</b>	167	156	180	194	192	157	184	193	174	163	167	180
<b>40-44</b>	343	311	350	374	422	431	425	432	465	459	447	459
<b>45-49</b>	446	529	700	695	694	788	707	807	802	860	871	895
<b>50-54</b>	574	559	553	576	631	801	916	1160	1279	1373	1402	1302
<b>55-59</b>	883	988	1067	1056	959	899	848	729	778	921	1155	1401
<b>60-64</b>	960	954	930	1042	1019	1210	1245	1320	1309	1165	1108	959
<b>65-69</b>	996	992	1082	1169	1136	1105	1038	1127	1098	1255	1291	1331
<b>70-74</b>	488	492	547	650	756	964	988	1048	1025	1078	1015	915
<b>75-79</b>	267	263	269	286	317	402	426	439	517	561	613	744
<b>80-84</b>	133	142	119	140	141	156	140	136	173	180	181	201
<b>85 и ст.</b>	35	40	46	56	48	81	106	85	74	68	71	74

**Продолжение таблицы 155**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО почки (C64) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>8778</b>	<b>8985</b>	<b>9344</b>	<b>9906</b>	<b>10162</b>	<b>10286</b>	<b>10872</b>	<b>10841</b>	<b>11442</b>	<b>108,0</b>	<b>36,9</b>	<b>15,2</b>
<b>0-14</b>	99	94	80	101	86	93	96	93	80	-	-	-
<b>15-19</b>	6	8	9	15	2	4	5	5	6	-	-	-
<b>20-24</b>	14	9	9	13	14	11	14	9	19	-	-	-
<b>25-29</b>	24	25	29	33	31	41	35	36	44	<b>115,3</b>	<b>109,0</b>	-
<b>30-34</b>	56	70	81	64	74	83	118	95	94	<b>95,2</b>	<b>99,9</b>	-
<b>35-39</b>	158	167	167	170	177	204	173	240	276	<b>27,2</b>	<b>58,0</b>	<b>66,6</b>
<b>40-44</b>	434	395	390	344	408	388	393	431	457	-	-	<b>26,2</b>
<b>45-49</b>	872	924	932	883	941	859	895	772	801	<b>48,6</b>	-	-
<b>50-54</b>	1308	1343	1436	1497	1461	1452	1575	1504	1553	<b>202,8</b>	<b>18,1</b>	-
<b>55-59</b>	1522	1687	1757	1965	1981	1888	1945	1925	2088	<b>220,3</b>	<b>59,5</b>	-
<b>60-64</b>	913	888	1109	1368	1667	1897	2104	2153	2171	<b>136,7</b>	<b>219,3</b>	<b>57,7</b>
<b>65-69</b>	1410	1412	1288	1129	1015	926	1028	1157	1415	-	-	-
<b>70-74</b>	921	952	1000	1215	1241	1256	1280	1191	1089	<b>111,7</b>	<b>33,3</b>	-
<b>75-79</b>	769	676	687	691	611	637	713	723	843	<b>222,7</b>	-	-
<b>80-84</b>	206	236	286	326	333	412	352	357	352	<b>372,7</b>	<b>117,7</b>	-
<b>85 и ст.</b>	66	99	84	92	120	135	146	150	154	<b>311,2</b>	<b>176,6</b>	<b>60,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 155**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО почки (C64) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>4164</b>	<b>4380</b>	<b>4516</b>	<b>4968</b>	<b>5199</b>	<b>5549</b>	<b>5706</b>	<b>5959</b>	<b>6082</b>	<b>6295</b>	<b>6456</b>	<b>6729</b>
<b>0-14</b>	96	103	93	90	79	63	91	65	72	81	83	105
<b>15-19</b>	7	8	11	7	9	9	14	18	9	7	13	12
<b>20-24</b>	16	15	10	19	23	12	18	20	8	8	15	12
<b>25-29</b>	14	12	30	13	27	26	24	26	22	30	23	20
<b>30-34</b>	45	41	47	55	49	40	43	49	43	46	40	49
<b>35-39</b>	106	88	113	117	136	126	105	129	105	81	84	87
<b>40-44</b>	171	206	189	209	233	233	250	280	262	277	237	215
<b>45-49</b>	205	271	319	408	384	434	465	482	479	447	516	478
<b>50-54</b>	344	285	317	312	387	460	592	728	764	786	803	785
<b>55-59</b>	549	652	617	646	614	587	485	446	480	547	694	931
<b>60-64</b>	690	700	731	782	802	852	942	976	953	933	797	704
<b>65-69</b>	809	883	888	961	972	986	901	915	991	1024	1076	1223
<b>70-74</b>	554	582	639	761	834	1007	958	961	984	972	964	965
<b>75-79</b>	344	284	292	336	404	464	538	565	618	687	721	717
<b>80-84</b>	162	188	158	180	153	178	186	191	207	268	280	327
<b>85 и ст.</b>	52	62	62	72	93	72	94	108	85	101	110	99

**Продолжение таблицы 155**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО почки (С64) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>6955</b>	<b>7047</b>	<b>7426</b>	<b>7657</b>	<b>8166</b>	<b>8437</b>	<b>8785</b>	<b>8834</b>	<b>9450</b>	<b>125,1</b>	<b>47,6</b>	<b>21,3</b>
<b>0-14</b>	79	85	78	112	107	89	106	101	106	-	-	-
<b>15-19</b>	17	16	13	5	10	6	9	11	6	-	-	-
<b>20-24</b>	19	17	19	13	15	22	25	15	18	-	-	-
<b>25-29</b>	36	31	26	27	29	44	51	36	41	<b>157,4</b>	<b>95,6</b>	-
<b>30-34</b>	45	48	68	53	70	54	64	68	73	<b>63,1</b>	<b>67,8</b>	-
<b>35-39</b>	93	95	90	115	115	106	150	106	148	-	<b>72,1</b>	-
<b>40-44</b>	215	192	211	206	212	197	219	205	239	-	-	-
<b>45-49</b>	486	471	522	555	473	503	446	421	428	<b>49,7</b>	-	<b>-22,3</b>
<b>50-54</b>	807	827	819	895	983	968	1000	983	940	<b>250,7</b>	<b>29,7</b>	-
<b>55-59</b>	1007	1014	1172	1256	1309	1317	1337	1354	1518	<b>305,7</b>	<b>86,1</b>	<b>17,1</b>
<b>60-64</b>	660	647	797	1004	1233	1455	1650	1680	1906	<b>166,3</b>	<b>316,4</b>	<b>89,1</b>
<b>65-69</b>	1313	1285	1223	967	941	841	843	1009	1185	-	-	-
<b>70-74</b>	964	1016	1019	1095	1259	1291	1390	1277	1109	<b>100,7</b>	<b>39,9</b>	-
<b>75-79</b>	784	813	838	772	802	771	820	877	979	<b>221,2</b>	<b>24,5</b>	<b>25,8</b>
<b>80-84</b>	317	370	426	435	437	535	481	447	478	<b>414,7</b>	<b>70,5</b>	-
<b>85 и ст.</b>	113	120	105	147	171	238	194	244	276	<b>651,1</b>	<b>263,6</b>	<b>82,9</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 156

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО почки (С64), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>0-9</b>	0,84	0,89	0,78	0,82	0,86	0,83	1,02	0,88	0,90	1,10	1,06	1,41
<b>10-19</b>	0,13	0,18	0,13	0,20	0,20	0,17	0,22	0,18	0,15	0,12	0,22	0,24
<b>20-29</b>	0,33	0,28	0,36	0,37	0,47	0,38	0,33	0,38	0,27	0,36	0,33	0,30
<b>30-39</b>	1,47	1,36	1,68	1,80	1,85	1,71	1,71	2,00	1,85	1,76	1,79	1,88
<b>40-49</b>	6,42	6,69	7,37	7,62	7,62	8,08	7,79	8,36	8,34	8,48	8,64	8,65
<b>50-59</b>	13,79	15,27	16,47	17,30	17,71	19,27	20,12	21,50	22,81	24,00	25,02	25,33
<b>60-69</b>	22,81	23,77	24,92	27,37	27,12	28,36	27,97	29,45	29,81	30,78	31,19	32,48
<b>70-79</b>	25,73	24,75	25,66	27,95	29,40	33,55	32,44	32,13	32,68	33,89	34,35	35,63
<b>80 и ст.</b>	11,94	13,27	11,76	13,99	14,03	16,15	17,80	17,96	18,98	21,74	23,82	24,85
<b>15-59</b>	4,37	4,62	5,02	5,23	5,30	5,56	5,60	6,07	6,26	6,60	6,94	7,25
<b>«Грубый» показатель</b>	6,51	6,76	7,13	7,74	7,98	8,70	8,84	9,37	9,69	10,19	10,43	10,79
<b>Стандарт. показатель</b>	4,99	5,16	5,47	5,88	5,99	6,35	6,40	6,71	6,88	7,18	7,33	7,54
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	1,13	1,15	1,04	1,39	1,28	1,15	1,25	1,15	1,14	<b>59,7</b>	-	<b>-16,2</b>
<b>10-19</b>	0,26	0,25	0,21	0,22	0,12	0,15	0,16	0,20	0,09	-	<b>-48,4</b>	-
<b>20-29</b>	0,40	0,35	0,35	0,35	0,36	0,48	0,52	0,41	0,53	<b>38,1</b>	<b>63,9</b>	-
<b>30-39</b>	1,80	1,92	2,03	1,97	2,11	2,14	2,36	2,35	2,68	<b>57,9</b>	<b>46,5</b>	<b>34,1</b>
<b>40-49</b>	8,68	8,72	9,30	9,28	9,80	9,53	9,97	9,51	10,12	<b>47,0</b>	<b>18,1</b>	-
<b>50-59</b>	24,93	24,96	25,86	27,32	27,43	26,77	27,02	26,45	27,95	<b>88,9</b>	<b>11,2</b>	-
<b>60-69</b>	34,89	35,55	37,92	39,27	42,92	45,00	46,54	47,20	48,81	<b>124,7</b>	<b>62,7</b>	<b>22,4</b>
<b>70-79</b>	37,41	37,70	38,15	39,73	40,41	40,42	42,02	41,28	42,58	<b>70,0</b>	<b>22,3</b>	<b>6,7</b>
<b>80 и ст.</b>	23,46	25,71	26,10	26,99	26,99	32,79	27,30	27,37	28,62	<b>172,8</b>	<b>23,3</b>	-
<b>15-59</b>	7,39	7,56	8,00	8,41	8,68	8,55	8,94	8,76	9,42	<b>118,8</b>	<b>34,0</b>	<b>9,8</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	11,08	11,25	11,80	12,37	12,92	13,19	13,75	13,74	14,56	<b>125,4</b>	<b>41,0</b>	<b>16,3</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	7,64	7,75	8,09	8,44	8,70	8,78	9,06	8,99	9,39	<b>86,1</b>	<b>29,1</b>	<b>10,1</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 156**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО почки (С64), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>0-9</b>	0,82	0,88	0,67	0,81	0,93	0,94	1,03	0,91	0,88	1,00	0,94	1,32
<b>10-19</b>	0,14	0,16	0,10	0,21	0,21	0,21	0,19	0,16	0,12	0,15	0,26	0,28
<b>20-29</b>	0,36	0,27	0,32	0,41	0,43	0,38	0,25	0,33	0,25	0,35	0,31	0,32
<b>30-39</b>	1,74	1,68	2,05	2,16	2,12	1,95	2,06	2,29	2,23	2,22	2,33	2,39
<b>40-49</b>	8,89	8,75	10,21	9,95	10,12	10,78	9,86	10,70	10,90	11,35	11,49	11,98
<b>50-59</b>	18,83	21,05	23,26	24,35	24,26	26,50	27,62	29,20	31,21	33,32	34,88	34,42
<b>60-69</b>	33,30	33,44	34,88	38,36	37,11	39,33	38,50	41,40	41,28	42,91	44,43	45,24
<b>70-79</b>	44,64	43,65	44,86	47,08	48,30	55,40	52,72	52,24	52,32	54,53	53,77	56,02
<b>80 и ст.</b>	26,31	27,84	25,10	30,52	30,28	38,86	40,89	37,04	41,79	41,73	48,47	50,20
<b>15-59</b>	5,61	5,86	6,55	6,68	6,66	7,06	6,98	7,55	7,93	8,53	8,99	9,34
<b>«Грубый» показатель</b>	7,89	8,08	8,68	9,32	9,46	10,48	10,52	11,25	11,67	12,38	12,75	13,08
<b>Стандарт. показатель</b>	7,26	7,35	7,81	8,34	8,33	9,07	8,97	9,40	9,66	10,12	10,39	10,57
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	1,32	1,18	0,99	1,27	1,11	1,16	1,19	1,06	0,95	<b>44,4</b>	-	<b>-19,3</b>
<b>10-19</b>	0,16	0,21	0,21	0,28	0,06	0,12	0,09	0,17	0,08	-	<b>-63,6</b>	-
<b>20-29</b>	0,33	0,29	0,31	0,37	0,36	0,42	0,40	0,38	0,54	-	<b>64,1</b>	-
<b>30-39</b>	2,21	2,42	2,50	2,33	2,46	2,79	2,77	3,14	3,40	<b>69,8</b>	<b>47,0</b>	<b>48,2</b>
<b>40-49</b>	11,84	12,19	12,57	12,03	13,63	12,79	13,74	13,05	13,77	<b>52,2</b>	<b>18,8</b>	-
<b>50-59</b>	33,92	34,78	35,73	37,83	36,98	35,70	36,34	35,13	37,18	<b>81,5</b>	<b>6,5</b>	-
<b>60-69</b>	48,85	50,22	53,36	56,54	60,51	63,04	64,49	64,56	65,04	<b>118,8</b>	<b>55,0</b>	<b>13,9</b>
<b>70-79</b>	57,81	55,37	56,37	62,14	59,25	59,99	61,59	60,39	64,12	<b>40,9</b>	<b>15,6</b>	-
<b>80 и ст.</b>	45,96	50,91	50,02	50,75	50,58	59,04	49,80	49,20	48,45	<b>101,8</b>	<b>4,5</b>	-
<b>15-59</b>	9,41	9,84	10,26	10,69	10,99	10,69	11,26	11,05	11,85	<b>115,9</b>	<b>29,6</b>	<b>8,9</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	13,33	13,61	14,20	15,08	15,48	15,67	16,44	16,36	17,22	<b>122,4</b>	<b>37,0</b>	<b>13,6</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	10,69	10,93	11,31	11,85	12,04	12,13	12,51	12,32	12,75	<b>77,7</b>	<b>24,4</b>	<b>6,9</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 156**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО почки (С64), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>0-9</b>	0,86	0,90	0,90	0,83	0,78	0,71	1,02	0,85	0,92	1,20	1,19	1,50
<b>10-19</b>	0,12	0,19	0,16	0,19	0,19	0,14	0,26	0,21	0,18	0,10	0,18	0,20
<b>20-29</b>	0,31	0,28	0,42	0,33	0,51	0,38	0,41	0,44	0,29	0,36	0,34	0,28
<b>30-39</b>	1,20	1,03	1,31	1,44	1,59	1,47	1,36	1,70	1,47	1,29	1,25	1,38
<b>40-49</b>	4,05	4,73	4,68	5,42	5,26	5,54	5,84	6,16	5,95	5,81	6,03	5,61
<b>50-59</b>	9,60	10,50	10,93	11,58	12,40	13,35	13,92	15,09	15,79	16,20	16,88	17,89
<b>60-69</b>	16,17	17,54	18,39	20,07	20,43	20,98	20,89	21,44	22,18	22,80	22,57	24,32
<b>70-79</b>	18,97	17,97	18,66	20,76	21,95	24,56	23,79	23,37	24,00	24,66	25,46	26,22
<b>80 и ст.</b>	8,36	9,61	8,41	9,85	9,94	10,39	11,90	13,01	12,99	16,45	17,93	18,74
<b>15-59</b>	3,17	3,41	3,55	3,82	3,98	4,12	4,27	4,65	4,64	4,73	5,00	5,27
<b>«Грубый» показатель</b>	5,30	5,58	5,76	6,35	6,66	7,13	7,36	7,72	7,95	8,27	8,41	8,80
<b>Стандарт. показатель</b>	3,57	3,76	3,95	4,28	4,45	4,59	4,77	4,95	5,05	5,19	5,29	5,52
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	0,93	1,12	1,09	1,51	1,46	1,14	1,32	1,24	1,33	<b>76,3</b>	-	-
<b>10-19</b>	0,37	0,29	0,21	0,16	0,17	0,18	0,23	0,23	0,09	-	-	-
<b>20-29</b>	0,48	0,41	0,38	0,33	0,36	0,54	0,64	0,44	0,52	<b>45,7</b>	<b>65,0</b>	-
<b>30-39</b>	1,40	1,43	1,56	1,63	1,76	1,51	1,97	1,58	1,98	<b>43,4</b>	<b>47,0</b>	-
<b>40-49</b>	5,80	5,57	6,33	6,78	6,31	6,55	6,51	6,25	6,74	<b>40,9</b>	<b>16,2</b>	-
<b>50-59</b>	17,64	17,04	17,92	18,88	19,77	19,61	19,50	19,42	20,44	<b>104,1</b>	<b>19,7</b>	-
<b>60-69</b>	26,11	26,37	28,23	28,32	31,58	33,28	34,49	35,46	37,85	<b>131,9</b>	<b>68,4</b>	<b>30,5</b>
<b>70-79</b>	27,90	29,35	29,49	29,04	31,43	31,10	32,66	32,22	32,49	<b>82,7</b>	<b>27,8</b>	<b>10,2</b>
<b>80 и ст.</b>	17,92	19,21	19,58	20,19	20,03	24,95	20,47	20,65	22,46	<b>212,7</b>	<b>25,6</b>	-
<b>15-59</b>	5,50	5,41	5,88	6,28	6,51	6,54	6,76	6,62	7,13	<b>127,5</b>	<b>41,8</b>	<b>11,0</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	9,14	9,21	9,73	10,04	10,71	11,06	11,43	11,48	12,26	<b>131,1</b>	<b>46,4</b>	<b>19,7</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	5,60	5,62	5,93	6,19	6,48	6,56	6,77	6,73	7,09	<b>93,0</b>	<b>34,8</b>	<b>12,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 157

## Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО почки (С64), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	62,0	61,8	61,5	62,0	62,2	62,7	62,5	62,3	62,4	62,4	62,0	61,7
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	60,0	60,0	59,8	60,1	60,3	60,9	60,8	60,7	60,9	61,0	61,0	61,0
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,61	0,62	0,65	0,70	0,71	0,76	0,76	0,80	0,82	0,86	0,87	0,89
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	61,8	61,6	61,3	61,0	61,2	61,5	61,6	61,9	61,9	-1,1	-	1,5
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	61,2	61,3	61,3	61,2	61,3	61,7	61,4	61,7	61,7	2,9	1,2	0,8
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,92	0,93	0,97	1,01	1,04	1,04	1,09	1,09	1,13	87,1	30,9	11,5
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	60,7	60,4	59,9	60,6	60,8	61,3	61,4	61,3	61,0	60,8	60,1	59,6
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	59,0	59,0	58,8	59,1	59,1	59,8	60,0	59,8	59,9	59,9	59,8	59,8
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,90	0,89	0,94	1,00	0,99	1,07	1,05	1,12	1,14	1,21	1,23	1,23

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 157**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО почки (С64), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	59,7	59,3	59,4	59,7	59,8	60,3	60,4	60,7	60,7	-	1,9	2,0
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	60,0	59,9	60,0	60,3	60,2	60,4	60,4	60,5	60,5	2,7	1,4	0,6
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,27	1,30	1,35	1,43	1,45	1,44	1,50	1,49	1,55	78,5	28,1	7,9
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Женщины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	63,8	63,6	63,5	63,9	64,1	64,6	64,1	63,8	64,2	64,5	64,5	64,8
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	61,5	61,3	61,1	61,5	61,7	62,3	61,9	61,8	62,2	62,6	62,5	62,5
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,43	0,45	0,47	0,51	0,52	0,55	0,56	0,58	0,60	0,61	0,62	0,66
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	65,1	65,3	64,4	63,0	63,1	63,1	63,0	63,3	63,2	-	-3,4	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	62,7	63,0	62,9	62,4	62,7	63,2	62,7	63,2	63,1	3,1	0,8	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,68	0,68	0,71	0,73	0,77	0,78	0,81	0,81	0,85	95,1	35,4	14,7

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 158

## Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО почки (С64) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>6382</b>	<b>7272</b>	<b>7504</b>	<b>7958</b>	<b>7869</b>	<b>7999</b>	<b>7914</b>	<b>8022</b>	<b>8193</b>	<b>8370</b>	<b>8586</b>	<b>8526</b>
<b>0-14</b>	55	59	58	53	55	48	43	45	44	38	44	31
<b>15-19</b>	10	4	4	7	9	10	4	7	8	3	2	7
<b>20-24</b>	8	14	4	8	11	10	9	12	8	9	8	13
<b>25-29</b>	15	14	14	12	10	13	22	12	16	15	14	24
<b>30-34</b>	29	22	17	22	18	22	21	23	29	24	26	19
<b>35-39</b>	69	62	73	72	64	71	63	60	52	71	56	58
<b>40-44</b>	206	244	225	228	243	196	186	178	175	147	160	130
<b>45-49</b>	435	454	530	488	494	487	501	493	467	450	415	345
<b>50-54</b>	587	765	851	838	881	904	846	833	833	835	805	838
<b>55-59</b>	640	589	581	673	798	992	1090	1216	1269	1272	1372	1192
<b>60-64</b>	1141	1259	1214	1272	1080	929	735	717	816	1024	1273	1441
<b>65-69</b>	1180	1172	1254	1336	1354	1418	1487	1405	1359	1131	973	839
<b>70-74</b>	1152	1405	1363	1469	1325	1220	1129	1162	1205	1357	1455	1509
<b>75-79</b>	507	756	821	953	999	1089	1118	1110	1110	1127	992	962
<b>80-84</b>	221	266	302	362	365	424	484	538	585	629	674	780
<b>85 и ст.</b>	127	187	193	165	157	166	176	211	217	238	317	338

**Продолжение таблицы 158**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО почки (C64) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>						
<b>Всего</b>	<b>8561</b>	<b>8305</b>	<b>8459</b>	<b>22,0</b>	<b>8,7</b>	<b>-</b>
<b>0-14</b>	36	30	32	<b>-48,4</b>	<b>-41,0</b>	<b>-</b>
<b>15-19</b>	7	1	3	-	-	-
<b>20-24</b>	5	1	3	-	-	-
<b>25-29</b>	16	13	15	-	-	-
<b>30-34</b>	26	25	21	-	-	-
<b>35-39</b>	54	52	66	<b>-19,1</b>	-	-
<b>40-44</b>	117	97	118	<b>-55,5</b>	<b>-53,9</b>	<b>-31,4</b>
<b>45-49</b>	364	329	261	<b>-34,8</b>	<b>-42,5</b>	<b>-36,6</b>
<b>50-54</b>	810	732	691	-	<b>-17,7</b>	<b>-15,9</b>
<b>55-59</b>	1185	1161	1157	<b>117,6</b>	<b>25,2</b>	<b>-13,1</b>
<b>60-64</b>	1502	1450	1549	-	<b>111,2</b>	<b>41,9</b>
<b>65-69</b>	810	912	1015	<b>-31,1</b>	<b>-43,5</b>	-
<b>70-74</b>	1495	1290	1159	-	<b>11,1</b>	-
<b>75-79</b>	1035	1036	1154	<b>46,8</b>	<b>-0,9</b>	-
<b>80-84</b>	758	758	743	<b>293,1</b>	<b>110,1</b>	-
<b>85 и ст.</b>	341	418	472	<b>326,9</b>	<b>295,0</b>	<b>92,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 158**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО почки (С64) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>3901</b>	<b>4450</b>	<b>4525</b>	<b>4815</b>	<b>4827</b>	<b>4918</b>	<b>4892</b>	<b>4875</b>	<b>5110</b>	<b>5177</b>	<b>5354</b>	<b>5223</b>
<b>0-14</b>	29	36	30	25	21	26	27	19	25	23	19	17
<b>15-19</b>	5	2	1	2	3	7	3	1	3	1	0	5
<b>20-24</b>	3	7	3	6	7	3	6	5	2	5	3	6
<b>25-29</b>	10	11	8	6	4	4	12	6	7	6	7	12
<b>30-34</b>	15	13	10	13	8	15	14	9	21	15	15	7
<b>35-39</b>	50	50	51	53	44	56	47	43	35	55	34	40
<b>40-44</b>	159	185	163	173	179	149	143	138	127	113	128	105
<b>45-49</b>	344	340	392	366	352	375	390	405	375	339	318	276
<b>50-54</b>	407	581	621	606	646	663	622	620	627	644	589	613
<b>55-59</b>	444	428	410	477	582	712	774	844	905	913	1024	853
<b>60-64</b>	756	823	801	829	720	624	522	472	589	691	886	1000
<b>65-69</b>	705	717	739	825	841	872	906	866	851	716	628	528
<b>70-74</b>	617	747	740	789	742	672	603	642	655	785	803	829
<b>75-79</b>	215	323	344	427	463	530	552	532	557	551	495	458
<b>80-84</b>	86	111	123	144	148	158	192	197	241	242	287	363
<b>85 и ст.</b>	56	76	89	74	61	52	79	76	90	78	118	111

**Продолжение таблицы 158**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО почки (С64) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>						
<b>Всего</b>	<b>5305</b>	<b>5103</b>	<b>5192</b>	<b>23,9</b>	<b>8,9</b>	<b>-</b>
<b>0-14</b>	14	13	16	<b>-55,2</b>	<b>-43,6</b>	<b>-36,7</b>
<b>15-19</b>	5	1	1	-	-	-
<b>20-24</b>	1	0	2	-	-	-
<b>25-29</b>	8	5	7	-	-	-
<b>30-34</b>	15	16	9	-	-	-
<b>35-39</b>	33	39	47	<b>-26,0</b>	-	-
<b>40-44</b>	92	77	83	<b>-54,1</b>	<b>-52,6</b>	<b>-35,6</b>
<b>45-49</b>	274	268	212	<b>-31,0</b>	<b>-39,2</b>	<b>-32,3</b>
<b>50-54</b>	628	552	534	-	<b>-14,2</b>	<b>-14,2</b>
<b>55-59</b>	862	841	845	<b>125,3</b>	-	-
<b>60-64</b>	1007	1003	1063	-	<b>114,9</b>	<b>42,2</b>
<b>65-69</b>	512	595	671	<b>-25,4</b>	<b>-39,6</b>	-
<b>70-74</b>	860	737	646	-	-	-
<b>75-79</b>	535	498	566	<b>68,9</b>	-	-
<b>80-84</b>	336	324	344	<b>415,2</b>	<b>165,6</b>	-
<b>85 и ст.</b>	123	134	146	<b>153,4</b>	<b>186,4</b>	<b>68,0</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 158**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО почки (С64) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>2481</b>	<b>2822</b>	<b>2979</b>	<b>3143</b>	<b>3042</b>	<b>3081</b>	<b>3022</b>	<b>3147</b>	<b>3083</b>	<b>3193</b>	<b>3232</b>	<b>3303</b>
<b>0-14</b>	26	23	28	28	34	22	16	26	19	15	25	14
<b>15-19</b>	5	2	3	5	6	3	1	6	5	2	2	2
<b>20-24</b>	5	7	1	2	4	7	3	7	6	4	5	7
<b>25-29</b>	5	3	6	6	6	9	10	6	9	9	7	12
<b>30-34</b>	14	9	7	9	10	7	7	14	8	9	11	12
<b>35-39</b>	19	12	22	19	20	15	16	17	17	16	22	18
<b>40-44</b>	47	59	62	55	64	47	43	40	48	34	32	25
<b>45-49</b>	91	114	138	122	142	112	111	88	92	111	97	69
<b>50-54</b>	180	184	230	232	235	241	224	213	206	191	216	225
<b>55-59</b>	196	161	171	196	216	280	316	372	364	359	348	339
<b>60-64</b>	385	436	413	443	360	305	213	245	227	333	387	441
<b>65-69</b>	475	455	515	511	513	546	581	539	508	415	345	311
<b>70-74</b>	535	658	623	680	583	548	526	520	550	572	652	680
<b>75-79</b>	292	433	477	526	536	559	566	578	553	576	497	504
<b>80-84</b>	135	155	179	218	217	266	292	341	344	387	387	417
<b>85 и ст.</b>	71	111	104	91	96	114	97	135	127	160	199	227

**Продолжение таблицы 158**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО почки (С64) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>						
<b>Всего</b>	<b>3256</b>	<b>3202</b>	<b>3267</b>	<b>19,1</b>	<b>8,3</b>	<b>-</b>
<b>0-14</b>	22	17	16	<b>-40,7</b>	-	-
<b>15-19</b>	2	0	2	-	-	-
<b>20-24</b>	4	1	1	-	-	-
<b>25-29</b>	8	8	8	-	-	-
<b>30-34</b>	11	9	12	-	-	-
<b>35-39</b>	21	13	19	-	-	-
<b>40-44</b>	25	20	35	<b>-59,5</b>	<b>-58,1</b>	-
<b>45-49</b>	90	61	49	<b>-46,3</b>	<b>-53,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>50-54</b>	182	180	157	-	<b>-27,2</b>	-
<b>55-59</b>	323	320	312	<b>99,6</b>	-	<b>-13,2</b>
<b>60-64</b>	495	447	486	-	<b>103,4</b>	<b>41,3</b>
<b>65-69</b>	298	317	344	<b>-39,6</b>	<b>-49,7</b>	-
<b>70-74</b>	635	553	513	-	-	-
<b>75-79</b>	500	538	588	<b>29,6</b>	-	-
<b>80-84</b>	422	434	399	<b>232,2</b>	<b>79,8</b>	-
<b>85 и ст.</b>	218	284	326	<b>541,5</b>	<b>385,0</b>	<b>107,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 159

**Динамика показателей смертности от ЗНО почки (С64), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>0-9</b>	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,33	0,27	0,30	0,29	0,26	0,29	0,20
<b>10-19</b>	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07	0,02	0,03	0,06
<b>20-29</b>	0,11	0,13	0,09	0,09	0,09	0,10	0,13	0,10	0,10	0,10	0,09	0,15
<b>30-39</b>	0,45	0,40	0,44	0,47	0,42	0,48	0,43	0,42	0,40	0,47	0,40	0,37
<b>40-49</b>	2,70	2,92	3,14	2,97	3,08	2,89	2,97	2,95	2,91	2,79	2,77	2,32
<b>50-59</b>	8,69	9,50	9,90	10,00	10,36	10,87	10,39	10,50	10,49	10,25	10,41	9,66
<b>60-69</b>	15,73	16,50	16,91	18,34	17,77	18,08	18,05	17,82	18,67	18,94	19,85	20,04
<b>70-79</b>	18,50	23,05	22,70	24,88	24,09	24,62	24,45	24,77	24,92	26,16	25,27	25,25
<b>80 и ст.</b>	11,78	15,65	17,43	18,57	19,37	20,91	22,06	23,34	23,23	23,40	25,21	27,77
<b>15-59</b>	2,17	2,35	2,50	2,54	2,67	2,83	2,85	2,92	2,95	2,93	2,99	2,75
<b>«Грубый» показатель</b>	4,37	5,01	5,22	5,57	5,49	5,61	5,57	5,63	5,77	5,90	6,05	6,01
<b>Стандарт. показатель</b>	3,05	3,39	3,51	3,68	3,63	3,67	3,58	3,61	3,67	3,70	3,78	3,68
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>0-9</b>	0,21	0,18	0,17	<b>-50,6</b>	<b>-50,0</b>	<b>-38,7</b>						
<b>10-19</b>	0,07	0,02	0,06	-	-	-						
<b>20-29</b>	0,09	0,06	0,08	-	-	-						
<b>30-39</b>	0,37	0,36	0,39	<b>-16,6</b>	<b>-18,2</b>	-						
<b>40-49</b>	2,46	2,21	1,99	<b>-25,8</b>	<b>-31,3</b>	<b>-27,3</b>						
<b>50-59</b>	9,20	8,68	8,47	-	<b>-19,3</b>	<b>-19,4</b>						
<b>60-69</b>	19,13	18,58	18,74	<b>18,1</b>	<b>8,0</b>	-						
<b>70-79</b>	25,29	23,60	24,50	<b>15,0</b>	-	<b>-7,3</b>						
<b>80 и ст.</b>	25,58	26,87	27,60	<b>96,7</b>	<b>39,7</b>	-						
<b>15-59</b>	2,73	2,57	2,51	-	-	<b>-15,9</b>						
<b>«Грубый» показатель</b>	5,99	5,80	5,89	<b>23,6</b>	<b>8,4</b>	-						
<b>Стандарт. показатель</b>	3,59	3,43	3,42	-	-	<b>-9,5</b>						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 159**

**Динамика показателей смертности от ЗНО почки (С64), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>0-9</b>	0,36	0,40	0,37	0,35	0,25	0,34	0,38	0,25	0,31	0,32	0,25	0,20
<b>10-19</b>	0,05	0,08	0,04	0,03	0,06	0,09	0,04	0,03	0,07	0,01	0,00	0,09
<b>20-29</b>	0,12	0,17	0,10	0,11	0,10	0,06	0,16	0,09	0,07	0,09	0,08	0,15
<b>30-39</b>	0,60	0,60	0,60	0,66	0,53	0,73	0,63	0,53	0,57	0,70	0,48	0,46
<b>40-49</b>	4,38	4,53	4,77	4,64	4,63	4,64	4,83	5,02	4,77	4,43	4,51	3,91
<b>50-59</b>	13,33	15,60	15,64	15,73	16,75	17,51	16,73	16,81	17,14	17,01	17,33	15,67
<b>60-69</b>	24,64	26,06	26,41	29,33	28,91	29,55	30,03	29,22	32,06	31,86	34,16	34,12
<b>70-79</b>	31,02	37,59	36,78	40,46	39,80	40,59	39,51	39,93	40,50	43,56	41,53	40,78
<b>80 и ст.</b>	23,61	31,34	35,87	36,68	40,20	38,33	45,79	41,48	44,75	38,85	45,22	51,16
<b>15-59</b>	3,17	3,57	3,67	3,74	3,95	4,27	4,31	4,40	4,48	4,48	4,57	4,16
<b>«Грубый» показатель</b>	5,70	6,55	6,73	7,21	7,23	7,42	7,43	7,39	7,77	7,88	8,16	7,96
<b>Стандарт. показатель</b>	4,82	5,49	5,58	5,88	5,86	5,97	5,96	5,84	6,14	6,12	6,31	6,09
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>0-9</b>	0,18	0,15	0,17	<b>-55,4</b>	<b>-49,8</b>	<b>-50,4</b>						
<b>10-19</b>	0,07	0,03	0,04	-	-	-						
<b>20-29</b>	0,07	0,04	0,08	-	-	-						
<b>30-39</b>	0,46	0,52	0,51	<b>-22,2</b>	<b>-23,9</b>	-						
<b>40-49</b>	3,91	3,74	3,23	<b>-21,0</b>	<b>-28,1</b>	<b>-25,4</b>						
<b>50-59</b>	15,38	14,27	14,08	-	<b>-16,5</b>	<b>-19,5</b>						
<b>60-69</b>	31,28	31,17	31,45	<b>27,6</b>	<b>10,7</b>	-						
<b>70-79</b>	43,11	38,97	40,22	<b>16,1</b>	-	-						
<b>80 и ст.</b>	45,90	44,44	46,92	<b>59,0</b>	<b>17,8</b>	-						
<b>15-59</b>	4,19	3,96	3,86	<b>18,9</b>	-	<b>-15,1</b>						
<b>«Грубый» показатель</b>	8,02	7,70	7,81	<b>27,2</b>	<b>9,1</b>	-						
<b>Стандарт. показатель</b>	5,94	5,69	5,65	-	-	<b>-9,8</b>						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 159**

**Динамика показателей смертности от ЗНО почки (С64), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>0-9</b>	0,31	0,30	0,35	0,36	0,50	0,31	0,16	0,36	0,27	0,20	0,32	0,19
<b>10-19</b>	0,07	0,03	0,07	0,09	0,07	0,05	0,07	0,09	0,07	0,04	0,05	0,03
<b>20-29</b>	0,10	0,10	0,07	0,08	0,09	0,14	0,11	0,11	0,13	0,11	0,10	0,16
<b>30-39</b>	0,30	0,20	0,29	0,28	0,30	0,22	0,23	0,31	0,25	0,24	0,31	0,28
<b>40-49</b>	1,13	1,40	1,61	1,42	1,65	1,29	1,27	1,08	1,21	1,29	1,19	0,88
<b>50-59</b>	4,86	4,44	5,09	5,20	5,08	5,43	5,25	5,42	5,13	4,83	4,86	4,84
<b>60-69</b>	9,75	10,10	10,59	11,12	10,52	10,74	10,51	10,70	10,27	10,75	10,63	10,90
<b>70-79</b>	13,15	16,71	16,48	17,93	16,91	17,26	17,43	17,62	17,52	17,86	17,52	17,86
<b>80 и ст.</b>	8,75	11,57	12,59	13,77	14,39	16,72	16,21	18,66	17,37	18,98	19,31	20,78
<b>15-59</b>	1,20	1,18	1,37	1,37	1,45	1,47	1,47	1,52	1,51	1,48	1,50	1,44
<b>«Грубый» показатель</b>	3,20	3,66	3,89	4,13	3,96	4,03	3,97	4,11	4,04	4,19	4,24	4,33
<b>Стандарт. показатель</b>	1,87	2,01	2,16	2,25	2,20	2,17	2,06	2,18	2,08	2,13	2,16	2,14
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>0-9</b>	0,25	0,21	0,16	<b>-45,6</b>	<b>-51,8</b>	-						
<b>10-19</b>	0,07	0,01	0,07	-	-	-						
<b>20-29</b>	0,10	0,08	0,08	-	-	-						
<b>30-39</b>	0,30	0,20	0,28	-	-	-						
<b>40-49</b>	1,13	0,81	0,85	<b>-37,8</b>	<b>-41,3</b>	<b>-34,2</b>						
<b>50-59</b>	4,21	4,15	3,90	<b>-15,4</b>	<b>-25,3</b>	<b>-20,8</b>						
<b>60-69</b>	10,97	10,08	10,16	-	-	-						
<b>70-79</b>	16,77	16,32	17,13	-	-	-						
<b>80 и ст.</b>	19,41	21,46	21,59	<b>109,7</b>	<b>42,6</b>	<b>13,9</b>						
<b>15-59</b>	1,36	1,27	1,24	-	<b>-13,8</b>	<b>-18,2</b>						
<b>«Грубый» показатель</b>	4,24	4,16	4,24	<b>19,3</b>	<b>7,7</b>	-						
<b>Стандарт. показатель</b>	2,09	1,96	1,97	-	<b>-7,9</b>	<b>-9,4</b>						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 160

## Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО почки (C64), Россия, 1999-2013 гг.

Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	65,0	65,6	65,7	66,2	66,0	66,1	66,5	66,5	66,4	66,3	65,6	66,0
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	63,4	64,2	64,2	64,6	64,4	64,6	64,8	65,0	65,1	65,4	65,5	66,0
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,38	0,42	0,43	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,45	0,45	0,46	0,45
<b>Показатель</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	66,0	66,4	66,5	<b>1,2</b>	-	-						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	66,1	66,6	66,9	<b>4,7</b>	<b>3,8</b>	<b>2,3</b>						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,44	0,42	0,42	-	-	<b>-8,6</b>						
Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	63,2	63,5	63,6	64,1	63,9	63,6	63,9	63,7	63,6	63,4	63,1	63,4
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	61,8	62,2	62,5	62,9	62,9	62,7	62,9	63,0	63,3	63,4	63,7	64,1
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,60	0,67	0,68	0,73	0,72	0,73	0,71	0,71	0,74	0,76	0,77	0,74

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 160**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО почки (C64), Россия, 1999-2013 гг.**

Показатель	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %								
				1999-2013	2003-2013	2008-2013						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	63,6	63,7	64,0	-	-	<b>1,1</b>						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	64,4	64,5	64,8	<b>4,2</b>	<b>3,4</b>	<b>2,2</b>						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,72	0,70	0,70	-	-	<b>-9,4</b>						
<b>Показатель</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Женщины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	67,8	69,4	69,0	69,5	69,1	69,5	69,7	70,0	70,3	70,9	70,9	71,3
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	65,9	67,2	66,9	67,2	66,8	67,6	68,0	68,1	68,2	68,8	68,6	69,2
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,23	0,25	0,27	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,26
Показатель	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %								
				1999-2013	2003-2013	2008-2013						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	71,2	71,9	71,9	<b>5,1</b>	<b>4,0</b>	<b>1,6</b>						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	69,1	70,1	70,2	<b>5,6</b>	<b>4,5</b>	<b>2,4</b>						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,25	0,23	0,23	-	-	<b>-10,8</b>						

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 161**

**Динамика сведений о диагностике и контингенте больных  
с ЗНО почки (C64), состоящем на учете онкологических учреждений,  
Россия, 2011-2013 гг.**

Показатель	2011	2012	2013
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	18170	18049	18901
из них доля выявленных активно, %	9,6	11,1	12,5
Число впервые выявленных ЗНО (без учтенных посмертно)	19116	19102	20195
из них *доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	75,5	76,5	77,0
*I ст., %	31,9	34,6	36,3
*II ст., %	22,3	21,2	20,3
*III ст., %	21,3	20,1	19,5
*IV ст., %	21,6	21,5	21,5
Показатель одногодичной летальности, %	-	18,3	18,0
Число больных, состоящих на учете на конец года	112171	121095	130223
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	78,5	84,6	90,7
Показатель распространенности на 100 000 населения	50,3	51,0	51,4
Индекс накопления контингента	6,2	6,7	6,9

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 162

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО мочевого пузыря (C67)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>9923</b>	<b>9948</b>	<b>10302</b>	<b>10561</b>	<b>11066</b>	<b>11582</b>	<b>11818</b>	<b>11958</b>	<b>12089</b>	<b>12134</b>	<b>12483</b>	<b>12501</b>
<b>20-24</b>	15	11	18	19	11	15	17	21	18	22	24	33
<b>25-29</b>	17	24	27	33	32	31	21	28	29	28	20	32
<b>30-34</b>	47	71	47	62	58	56	59	50	43	59	47	55
<b>35-39</b>	118	118	120	123	145	124	117	139	116	84	111	103
<b>40-44</b>	245	214	264	235	272	294	294	247	319	286	268	252
<b>45-49</b>	300	336	399	389	516	468	479	469	509	507	533	520
<b>50-54</b>	661	566	495	446	491	562	711	777	850	806	923	916
<b>55-59</b>	1097	1265	1331	1342	1283	1210	969	787	742	810	990	1120
<b>60-64</b>	1831	1589	1615	1508	1625	1779	1960	2085	2155	1903	1695	1363
<b>65-69</b>	2138	2276	2476	2554	2358	2270	2182	2027	2033	2159	2386	2520
<b>70-74</b>	1330	1474	1594	1825	2157	2533	2644	2732	2679	2644	2468	2208
<b>75-79</b>	1191	969	935	994	1097	1158	1297	1538	1628	1795	1938	2130
<b>80-84</b>	632	723	695	685	643	677	612	606	590	643	705	826
<b>85 и ст.</b>	281	290	272	321	366	377	429	426	362	369	360	401

**Продолжение таблицы 162**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО мочевого пузыря (C67)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>12696</b>	<b>12721</b>	<b>13022</b>	<b>13002</b>	<b>13260</b>	<b>13778</b>	<b>13784</b>	<b>14212</b>	<b>14327</b>	<b>41,8</b>	<b>16,2</b>	<b>10,5</b>
<b>20-24</b>	21	23	32	29	22	28	23	32	25	-	-	-
<b>25-29</b>	30	26	40	32	42	40	46	61	48	-	-	-
<b>30-34</b>	50	69	61	39	73	71	73	76	71	<b>32,9</b>	<b>54,9</b>	-
<b>35-39</b>	111	105	106	92	124	106	145	136	140	-	<b>37,7</b>	<b>46,5</b>
<b>40-44</b>	249	242	199	224	203	206	246	224	236	-	-	-
<b>45-49</b>	504	528	558	552	546	549	441	467	423	<b>31,6</b>	-	<b>-24,3</b>
<b>50-54</b>	905	947	965	1007	1000	1052	1009	1134	1072	<b>130,9</b>	<b>22,3</b>	-
<b>55-59</b>	1278	1428	1490	1647	1596	1645	1680	1694	1803	<b>69,1</b>	<b>68,1</b>	<b>10,0</b>
<b>60-64</b>	1190	1138	1260	1410	1727	2049	2100	2225	2337	-	<b>96,7</b>	<b>61,1</b>
<b>65-69</b>	2749	2642	2531	2075	1768	1613	1495	1606	1915	<b>-23,2</b>	<b>-41,7</b>	-
<b>70-74</b>	2107	2105	2333	2461	2720	2825	2883	2722	2302	<b>52,1</b>	-	-
<b>75-79</b>	2234	2089	1997	1886	1685	1775	1765	1928	2112	<b>107,9</b>	--	-
<b>80-84</b>	896	992	1077	1132	1246	1306	1293	1272	1171	<b>158,0</b>	<b>71,3</b>	-
<b>85 и ст.</b>	348	373	359	403	493	496	572	625	658	<b>108,4</b>	<b>107,5</b>	<b>63,8</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 162**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО мочевого пузыря (C67)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>7870</b>	<b>7929</b>	<b>8285</b>	<b>8423</b>	<b>8782</b>	<b>9298</b>	<b>9445</b>	<b>9479</b>	<b>9666</b>	<b>9660</b>	<b>9937</b>	<b>9847</b>
<b>20-24</b>	12	7	14	14	9	11	15	17	14	15	20	24
<b>25-29</b>	15	14	21	21	27	21	15	22	24	22	15	23
<b>30-34</b>	37	58	38	42	48	45	49	33	33	46	36	43
<b>35-39</b>	96	88	104	101	119	99	92	112	82	69	84	81
<b>40-44</b>	207	171	214	191	223	241	245	212	246	227	214	200
<b>45-49</b>	248	288	328	342	433	404	396	394	426	415	463	450
<b>50-54</b>	564	485	419	381	396	469	607	658	715	698	784	759
<b>55-59</b>	943	1092	1129	1158	1106	1028	814	679	642	683	821	927
<b>60-64</b>	1540	1366	1355	1284	1372	1529	1676	1748	1819	1588	1413	1135
<b>65-69</b>	1739	1877	2075	2153	1966	1917	1804	1676	1708	1782	1991	2082
<b>70-74</b>	988	1086	1232	1395	1659	2036	2117	2179	2165	2125	1939	1764
<b>75-79</b>	869	692	688	700	764	811	906	1066	1166	1318	1433	1555
<b>80-84</b>	421	499	478	443	422	452	416	401	386	413	471	532
<b>85 и ст.</b>	175	189	179	181	229	215	272	263	230	246	241	254

**Продолжение таблицы 162**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО мочевого пузыря (C67)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>10007</b>	<b>10042</b>	<b>10336</b>	<b>10231</b>	<b>10432</b>	<b>10731</b>	<b>10752</b>	<b>11037</b>	<b>11113</b>	<b>37,6</b>	<b>13,5</b>	<b>8,8</b>
<b>20-24</b>	17	15	20	21	17	22	16	20	15	-	-	-
<b>25-29</b>	23	17	32	16	27	29	33	46	36	-	-	-
<b>30-34</b>	41	52	42	31	54	51	64	58	52	-	<b>54,3</b>	-
<b>35-39</b>	85	80	82	71	100	80	115	101	108	-	<b>37,7</b>	-
<b>40-44</b>	205	189	163	186	165	154	204	167	189	<b>-19,6</b>	-	-
<b>45-49</b>	414	430	458	463	449	450	369	379	340	<b>26,7</b>	<b>-19,2</b>	<b>-26,6</b>
<b>50-54</b>	779	806	802	832	836	859	805	935	866	<b>118,6</b>	<b>16,0</b>	-
<b>55-59</b>	1070	1190	1245	1335	1342	1375	1411	1407	1482	<b>60,7</b>	<b>67,8</b>	<b>10,5</b>
<b>60-64</b>	970	925	1031	1160	1432	1701	1737	1828	1949	-	<b>97,6</b>	<b>62,0</b>
<b>65-69</b>	2269	2203	2104	1697	1430	1296	1199	1303	1555	<b>-25,2</b>	<b>-43,7</b>	-
<b>70-74</b>	1658	1654	1889	1965	2197	2208	2235	2113	1780	<b>54,7</b>		-
<b>75-79</b>	1686	1608	1509	1445	1244	1313	1309	1408	1527	<b>119,3</b>		-
<b>80-84</b>	566	634	730	767	845	898	895	873	796	<b>167,9</b>	<b>84,5</b>	-
<b>85 и ст.</b>	208	229	216	232	280	279	350	391	411	<b>98,2</b>	<b>99,5</b>	<b>87,3</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 162**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО мочевого пузыря (C67)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>2053</b>	<b>2019</b>	<b>2017</b>	<b>2138</b>	<b>2284</b>	<b>2284</b>	<b>2373</b>	<b>2479</b>	<b>2423</b>	<b>2474</b>	<b>2546</b>	<b>2654</b>
<b>20-24</b>	3	4	4	5	2	4	2	4	4	7	4	9
<b>25-29</b>	2	10	6	12	5	10	6	6	5	6	5	9
<b>30-34</b>	10	13	9	20	10	11	10	17	10	13	11	12
<b>35-39</b>	22	30	16	22	26	25	25	27	34	15	27	22
<b>40-44</b>	38	43	50	44	49	53	49	35	73	59	54	52
<b>45-49</b>	52	48	71	47	83	64	83	75	83	92	70	70
<b>50-54</b>	97	81	76	65	95	93	104	119	135	108	139	157
<b>55-59</b>	154	173	202	184	177	182	155	108	100	127	169	193
<b>60-64</b>	291	223	260	224	253	250	284	337	336	315	282	228
<b>65-69</b>	399	399	401	401	392	353	378	351	325	377	395	438
<b>70-74</b>	342	388	362	430	498	497	527	553	514	519	529	444
<b>75-79</b>	322	277	247	294	333	347	391	472	462	477	505	575
<b>80-84</b>	211	224	217	242	221	225	196	205	204	230	234	294
<b>85 и ст.</b>	106	101	93	140	137	162	157	163	132	123	119	147

**Продолжение таблицы 162**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО мочевого пузыря (C67)  
в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>2689</b>	<b>2679</b>	<b>2686</b>	<b>2771</b>	<b>2828</b>	<b>3047</b>	<b>3032</b>	<b>3175</b>	<b>3214</b>	<b>59,5</b>	<b>26,9</b>	<b>16,9</b>
<b>20-24</b>	4	8	12	8	5	6	7	12	10	-	-	-
<b>25-29</b>	7	9	8	16	15	11	13	15	12	-	-	-
<b>30-34</b>	9	17	19	8	19	20	9	18	19	<b>50,2</b>	-	-
<b>35-39</b>	26	25	24	21	24	26	30	35	32	<b>27,3</b>	<b>37,6</b>	<b>65,3</b>
<b>40-44</b>	44	53	36	38	38	52	42	57	47	-	-	-
<b>45-49</b>	90	98	100	89	97	99	72	88	83	<b>59,8</b>	-	-
<b>50-54</b>	126	141	163	175	164	193	204	199	206	<b>212,4</b>	<b>60,0</b>	<b>23,2</b>
<b>55-59</b>	208	238	245	312	254	270	269	287	321	<b>124,6</b>	<b>69,6</b>	-
<b>60-64</b>	220	213	229	250	295	348	363	397	388	<b>39,2</b>	<b>92,6</b>	<b>57,0</b>
<b>65-69</b>	480	439	427	378	338	317	296	303	360	-	<b>-31,7</b>	-
<b>70-74</b>	449	451	444	496	523	617	648	609	522	<b>43,2</b>	<b>33,8</b>	-
<b>75-79</b>	548	481	488	441	441	462	456	520	585	<b>80,5</b>	<b>-3,2</b>	<b>33,7</b>
<b>80-84</b>	330	358	347	365	401	408	398	399	375	<b>139,6</b>	<b>47,9</b>	-
<b>85 и ст.</b>	140	144	143	171	213	217	222	234	247	<b>126,1</b>	<b>120,9</b>	<b>35,8</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 163

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО мочевого пузыря (С67), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,16	0,18	0,23	0,26	0,21	0,22	0,18	0,23	0,22	0,23	0,20	0,29
<b>30-39</b>	0,65	0,76	0,68	0,77	0,87	0,80	0,81	0,90	0,78	0,72	0,80	0,81
<b>40-49</b>	3,00	2,80	3,14	2,82	3,46	3,27	3,26	2,99	3,44	3,29	3,34	3,26
<b>50-59</b>	10,32	11,25	11,77	11,94	12,13	12,43	11,90	10,98	11,00	10,69	11,81	11,67
<b>60-69</b>	26,20	26,04	28,07	28,11	27,49	27,65	28,08	27,91	28,70	28,56	29,79	29,90
<b>70-79</b>	39,24	37,30	37,15	38,76	41,39	43,65	43,94	45,54	44,76	45,61	45,68	46,26
<b>80 и ст.</b>	28,53	31,13	29,55	31,42	32,55	34,96	35,23	35,64	33,53	35,66	39,51	43,49
<b>15-59</b>	2,77	2,87	2,95	2,89	3,06	3,01	2,91	2,75	2,86	2,82	3,09	3,18
<b>«Грубый» показатель</b>	6,70	6,72	6,97	7,17	7,53	7,90	8,10	8,24	8,41	8,49	8,70	8,76
<b>Стандарт. показатель</b>	4,67	4,64	4,79	4,84	5,02	5,18	5,25	5,25	5,31	5,29	5,45	5,42
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,22	0,21	0,30	0,25	0,26	0,28	0,29	0,39	0,32	<b>74,6</b>	<b>57,2</b>	-
<b>30-39</b>	0,82	0,88	0,83	0,64	0,95	0,85	1,02	0,98	0,96	<b>30,1</b>	<b>25,6</b>	-
<b>40-49</b>	3,26	3,39	3,43	3,62	3,61	3,69	3,51	3,59	3,46	<b>21,7</b>	<b>9,5</b>	-
<b>50-59</b>	11,72	12,17	12,25	12,92	12,42	12,84	12,41	12,97	13,18	<b>15,8</b>	<b>12,2</b>	-
<b>60-69</b>	31,99	31,75	32,55	30,63	30,89	32,19	29,75	30,14	31,08	<b>19,5</b>	-	-
<b>70-79</b>	47,24	45,73	46,61	45,77	45,49	47,01	46,47	47,19	46,76	<b>23,0</b>	-	-
<b>80 и ст.</b>	41,58	42,53	41,60	41,42	44,24	44,77	43,40	43,35	41,55	<b>54,4</b>	-	-
<b>15-59</b>	3,28	3,47	3,57	3,76	3,78	3,88	3,88	4,08	4,12	<b>53,5</b>	<b>34,3</b>	<b>10,5</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	8,94	8,93	9,16	9,16	9,34	9,71	9,64	9,92	9,98	<b>48,1</b>	<b>15,8</b>	<b>9,0</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	5,49	5,51	5,62	5,56	5,65	5,85	5,69	5,80	5,80	<b>24,4</b>	<b>7,7</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 163**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО мочевого пузыря (С67), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,27	0,21	0,35	0,34	0,35	0,30	0,28	0,36	0,36	0,34	0,31	0,41
<b>30-39</b>	1,05	1,17	1,16	1,19	1,44	1,28	1,30	1,37	1,12	1,15	1,23	1,28
<b>40-49</b>	5,13	4,78	5,27	4,96	5,95	5,71	5,58	5,23	5,78	5,52	5,90	5,75
<b>50-59</b>	19,47	21,46	22,23	22,96	22,92	23,34	22,25	20,67	20,59	20,06	21,89	21,47
<b>60-69</b>	55,82	55,72	59,45	59,63	57,49	58,55	58,69	57,93	60,49	59,76	63,05	63,55
<b>70-79</b>	109,79	102,79	105,55	105,37	109,07	115,46	112,70	114,00	113,01	114,55	111,37	112,08
<b>80 и ст.</b>	93,35	105,24	99,93	97,17	104,30	109,37	114,37	111,30	104,21	110,89	136,96	143,47
<b>15-59</b>	4,77	4,93	5,04	5,00	5,24	5,14	4,96	4,72	4,83	4,79	5,30	5,41
<b>«Грубый» показатель</b>	11,32	11,41	11,94	12,18	12,74	13,53	13,81	13,94	14,37	14,47	14,89	14,86
<b>Стандарт. показатель</b>	10,65	10,57	10,87	10,84	11,12	11,54	11,63	11,55	11,66	11,58	12,02	11,91
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,34	0,27	0,43	0,30	0,36	0,41	0,40	0,55	0,44	<b>58,7</b>	-	-
<b>30-39</b>	1,30	1,35	1,25	1,01	1,51	1,27	1,70	1,49	1,47	-	--	
<b>40-49</b>	5,61	5,72	5,90	6,36	6,20	6,19	6,11	5,92	5,79	<b>20,0</b>		<b>-8,4</b>
<b>50-59</b>	22,16	22,91	22,91	23,68	23,40	23,88	22,88	24,00	23,98	<b>12,1</b>	<b>10,5</b>	-
<b>60-69</b>	68,11	68,30	69,79	64,70	64,58	66,93	60,46	61,07	63,56	<b>16,1</b>	-	-
<b>70-79</b>	114,38	110,95	113,53	111,17	110,09	111,58	109,53	111,10	109,75	-	-	-
<b>80 и ст.</b>	130,77	131,14	127,90	121,29	125,61	127,03	124,50	122,65	115,57	<b>30,1</b>	<b>-14,4</b>	-
<b>15-59</b>	5,65	5,92	6,08	6,35	6,48	6,56	6,60	6,87	6,86	<b>50,2</b>	<b>31,3</b>	<b>8,5</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	15,20	15,21	15,71	15,58	15,89	16,35	16,26	16,66	16,72	<b>46,5</b>	<b>13,6</b>	<b>7,3</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	11,97	11,96	12,22	11,96	12,18	12,46	12,11	12,21	12,13	<b>15,3</b>	<b>2,4</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 163**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО мочевого пузыря (С67), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,05	0,15	0,10	0,17	0,07	0,14	0,08	0,10	0,09	0,12	0,08	0,16
<b>30-39</b>	0,25	0,34	0,20	0,35	0,31	0,32	0,32	0,42	0,44	0,28	0,38	0,35
<b>40-49</b>	0,97	0,90	1,11	0,80	1,13	0,97	1,08	0,89	1,25	1,21	0,99	0,99
<b>50-59</b>	2,70	2,85	3,25	3,01	3,37	3,51	3,35	2,92	2,98	2,86	3,47	3,65
<b>60-69</b>	7,44	6,89	7,51	7,20	7,43	6,88	7,50	7,80	7,54	8,06	8,16	8,41
<b>70-79</b>	14,03	13,80	12,21	13,70	14,74	14,09	14,60	15,70	14,62	14,81	15,62	15,88
<b>80 и ст.</b>	12,38	12,50	11,85	14,93	14,46	16,09	15,00	16,01	14,94	15,73	16,23	19,40
<b>15-59</b>	0,82	0,87	0,94	0,86	0,96	0,95	0,93	0,84	0,96	0,92	0,99	1,07
<b>«Грубый» показатель</b>	2,61	2,57	2,57	2,73	2,93	2,94	3,06	3,21	3,17	3,25	3,32	3,47
<b>Стандарт. показатель</b>	1,46	1,42	1,44	1,47	1,58	1,55	1,60	1,63	1,61	1,64	1,69	1,73
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>20-29</b>	0,10	0,14	0,17	0,20	0,16	0,14	0,17	0,23	0,19	<b>123,0</b>	<b>87,8</b>	-
<b>30-39</b>	0,36	0,42	0,42	0,28	0,41	0,43	0,36	0,48	0,46	<b>54,8</b>	-	-
<b>40-49</b>	1,11	1,27	1,17	1,13	1,24	1,41	1,12	1,45	1,31	<b>43,2</b>	<b>34,5</b>	-
<b>50-59</b>	3,25	3,51	3,67	4,27	3,60	3,97	3,95	4,04	4,38	<b>46,1</b>	<b>24,6</b>	-
<b>60-69</b>	9,26	8,90	9,17	9,02	9,20	9,64	9,12	9,23	9,16	<b>39,2</b>	<b>10,0</b>	-
<b>70-79</b>	15,91	14,96	14,80	14,57	14,70	16,27	16,31	16,89	17,22	<b>22,2</b>	-	<b>19,9</b>
<b>80 и ст.</b>	19,58	19,68	18,07	18,60	20,23	20,17	18,81	18,92	18,52	<b>60,1</b>	-	-
<b>15-59</b>	1,05	1,18	1,22	1,34	1,25	1,38	1,33	1,47	1,53	<b>89,2</b>	<b>51,8</b>	<b>17,8</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	3,53	3,50	3,52	3,63	3,71	3,99	3,95	4,13	4,17	<b>63,8</b>	<b>26,0</b>	<b>15,6</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	1,77	1,79	1,78	1,82	1,82	1,96	1,90	1,99	1,99	<b>40,8</b>	<b>18,0</b>	<b>10,3</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 164

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО мочевого пузыря (C67),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	66,4	66,7	66,7	67,2	67,3	67,7	67,9	68,3	68,1	68,6	68,4	68,6
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	65,9	65,9	65,7	66,1	66,1	66,3	66,5	66,8	66,6	67,0	66,9	67,1
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,59	0,59	0,61	0,62	0,64	0,66	0,67	0,67	0,68	0,68	0,69	0,68
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	68,6	68,5	68,5	68,5	68,6	68,5	68,7	68,3	67,6	2,6	-	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	67,2	67,1	67,0	67,0	67,0	67,0	67,1	67,0	67,0	2,1	-	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,69	0,69	0,72	0,70	0,71	0,73	0,72	0,73	0,73	22,4	7,5	4,1
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	65,7	66,0	66,2	66,5	66,7	67,0	67,2	67,5	67,4	68,0	67,8	68,0
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	65,2	65,2	65,2	65,4	65,4	65,7	65,9	66,1	66,1	66,4	66,3	66,5
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,32	1,33	1,38	1,37	1,38	1,46	1,44	1,42	1,45	1,45	1,45	1,43

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 164**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО мочевого пузыря (C67),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	68,1	68,0	68,0	67,9	67,7	67,4	67,6	67,2	66,7	<b>2,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,7</b>
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	66,6	66,5	66,5	66,5	66,4	66,4	66,5	66,4	66,4	<b>2,2</b>	-	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,46	1,46	1,53	1,48	1,52	1,54	1,49	1,51	1,51	<b>13,5</b>	<b>5,4</b>	-
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	69,4	69,8	68,9	70,4	70,5	70,9	70,8	71,4	71,0	71,1	71,1	71,5
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	68,6	68,4	67,9	68,9	68,8	68,9	69,0	69,4	68,6	69,0	69,0	69,4
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,21	0,20
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	71,4	71,1	70,9	70,9	71,6	71,5	71,6	71,4	71,2	<b>2,5</b>	-	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	69,6	69,1	69,0	68,9	69,5	69,2	69,5	69,1	69,1	<b>1,2</b>	-	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,21	0,21	0,21	0,22	0,21	0,23	0,23	0,24	0,24	-	-	<b>12,8</b>

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 165

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО мочевого пузыря (C67) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>6679</b>	<b>7067</b>	<b>7254</b>	<b>7467</b>	<b>7365</b>	<b>7228</b>	<b>6933</b>	<b>7126</b>	<b>7055</b>	<b>6872</b>	<b>6933</b>	<b>6701</b>
<b>20-24</b>	1	0	1	1	2	2	1	1	0	2	0	0
<b>25-29</b>	3	2	3	2	4	4	3	1	5	4	3	3
<b>30-34</b>	5	5	6	12	9	4	11	13	7	9	4	11
<b>35-39</b>	30	36	36	39	20	18	26	24	21	18	18	18
<b>40-44</b>	81	95	80	52	89	68	78	58	53	51	46	47
<b>45-49</b>	166	180	175	183	181	182	174	163	152	145	141	122
<b>50-54</b>	242	302	351	323	353	314	300	329	315	317	318	248
<b>55-59</b>	511	426	344	358	376	450	479	583	539	564	573	523
<b>60-64</b>	989	1130	1184	1119	904	766	556	485	515	577	702	743
<b>65-69</b>	1238	1248	1135	1278	1355	1377	1361	1407	1352	1119	855	752
<b>70-74</b>	1668	1696	1854	1810	1705	1425	1297	1273	1377	1342	1519	1518
<b>75-79</b>	871	1012	1165	1355	1419	1598	1627	1610	1447	1406	1238	1191
<b>80-84</b>	497	514	521	562	577	663	661	799	886	945	1054	1070
<b>85 и ст.</b>	370	415	395	363	363	352	352	375	382	371	460	452

**Продолжение таблицы 165**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО мочевого пузыря (C67) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>						
<b>Всего</b>	<b>6845</b>	<b>6587</b>	<b>6561</b>	<b>-7,4</b>	<b>-9,7</b>	<b>-5,0</b>
<b>20-24</b>	2	0	0	-	-	-
<b>25-29</b>	4	6	2	-	-	-
<b>30-34</b>	11	9	4	-	-	-
<b>35-39</b>	18	13	24	<b>-54,1</b>	-	-
<b>40-44</b>	49	51	42	<b>-51,9</b>	<b>-48,6</b>	-
<b>45-49</b>	99	95	97	<b>-46,0</b>	<b>-50,6</b>	<b>-38,0</b>
<b>50-54</b>	291	272	267	-	<b>-20,9</b>	-
<b>55-59</b>	589	584	544	<b>50,5</b>	<b>33,0</b>	-
<b>60-64</b>	825	825	793	<b>-37,3</b>	-	<b>35,7</b>
<b>65-69</b>	610	565	724	<b>-48,9</b>	<b>-60,7</b>	<b>-41,6</b>
<b>70-74</b>	1530	1366	1204	<b>-24,9</b>	-	-
<b>75-79</b>	1185	1187	1286	-	<b>-26,4</b>	-
<b>80-84</b>	1090	1041	984	<b>160,9</b>	<b>82,5</b>	<b>2,5</b>
<b>85 и ст.</b>	537	570	585	<b>60,4</b>	<b>84,5</b>	<b>57,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 165**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО мочевого пузыря (C67) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>5339</b>	<b>5691</b>	<b>5878</b>	<b>6028</b>	<b>5909</b>	<b>5846</b>	<b>5550</b>	<b>5701</b>	<b>5663</b>	<b>5514</b>	<b>5490</b>	<b>5335</b>
<b>20-24</b>	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
<b>25-29</b>	1	1	2	1	3	2	3	1	4	3	2	2
<b>30-34</b>	4	4	5	9	8	3	8	11	4	6	2	5
<b>35-39</b>	24	29	28	33	18	11	18	19	14	11	13	12
<b>40-44</b>	72	81	71	42	71	54	65	48	42	42	40	35
<b>45-49</b>	152	162	149	168	157	164	155	140	128	122	116	104
<b>50-54</b>	218	268	324	289	307	268	267	300	275	276	275	212
<b>55-59</b>	451	386	310	317	336	407	426	512	478	504	510	463
<b>60-64</b>	885	1006	1059	989	806	673	479	425	447	496	611	646
<b>65-69</b>	1052	1064	952	1115	1159	1198	1198	1208	1184	977	726	661
<b>70-74</b>	1344	1400	1550	1488	1375	1215	1060	1057	1142	1123	1278	1279
<b>75-79</b>	614	680	879	996	1065	1239	1246	1252	1120	1107	932	921
<b>80-84</b>	301	354	327	360	367	412	399	515	598	647	745	738
<b>85 и ст.</b>	215	252	220	211	231	194	222	208	224	198	239	254

**Продолжение таблицы 165**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО мочевого пузыря (C67) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>						
<b>Всего</b>	<b>5426</b>	<b>5174</b>	<b>5144</b>	<b>-9,6</b>	<b>-12,0</b>	<b>-6,9</b>
<b>20-24</b>	2	0	0	-	-	-
<b>25-29</b>	4	3	2	<b>119,3</b>	-	-
<b>30-34</b>	9	6	4	-	-	-
<b>35-39</b>	10	9	15	<b>-67,9</b>	-	-
<b>40-44</b>	37	37	37	<b>-57,0</b>	<b>-50,0</b>	-
<b>45-49</b>	81	70	79	<b>-52,4</b>	<b>-56,3</b>	<b>-42,1</b>
<b>50-54</b>	253	230	224	-	<b>-23,7</b>	-
<b>55-59</b>	520	524	473	<b>48,3</b>	<b>31,1</b>	-
<b>60-64</b>	721	736	686	<b>-39,2</b>	-	<b>37,8</b>
<b>65-69</b>	521	483	630	<b>-48,0</b>	<b>-60,8</b>	<b>-41,8</b>
<b>70-74</b>	1269	1093	971	<b>-24,7</b>	-	-
<b>75-79</b>	934	927	977	-	<b>-25,5</b>	-
<b>80-84</b>	759	727	689	<b>208,7</b>	<b>110,9</b>	-
<b>85 и ст.</b>	303	326	355	<b>54,2</b>	<b>77,6</b>	<b>84,4</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 165**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО мочевого пузыря (C67) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>1340</b>	<b>1376</b>	<b>1376</b>	<b>1439</b>	<b>1456</b>	<b>1382</b>	<b>1383</b>	<b>1425</b>	<b>1392</b>	<b>1358</b>	<b>1443</b>	<b>1366</b>
<b>20-24</b>	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0
<b>25-29</b>	2	1	1	1	1	2	0	0	1	1	1	1
<b>30-34</b>	1	1	1	3	1	1	3	2	3	3	2	6
<b>35-39</b>	6	7	8	6	2	7	8	5	7	7	5	6
<b>40-44</b>	9	14	9	10	18	14	13	10	11	9	6	12
<b>45-49</b>	14	18	26	15	24	18	19	23	24	23	25	18
<b>50-54</b>	24	34	27	34	46	46	33	29	40	41	43	36
<b>55-59</b>	60	40	34	41	40	43	53	71	61	60	63	60
<b>60-64</b>	104	124	125	130	98	93	77	60	68	81	91	97
<b>65-69</b>	186	184	183	163	196	179	163	199	168	142	129	91
<b>70-74</b>	324	296	304	322	330	210	237	216	235	219	241	239
<b>75-79</b>	257	332	286	359	354	359	381	358	327	299	306	270
<b>80-84</b>	196	160	194	202	210	251	262	284	288	298	309	332
<b>85 и ст.</b>	155	163	175	152	132	158	130	167	158	173	221	198

**Продолжение таблицы 165**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО мочевого пузыря (C67) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>						
<b>Всего</b>	<b>1419</b>	<b>1413</b>	<b>1417</b>	-	-	-
<b>20-24</b>	0	0	0	-	<b>-110,2</b>	-
<b>25-29</b>	0	3	0	-	-	-
<b>30-34</b>	2	3	0	-	-	-
<b>35-39</b>	8	4	9	-	-	-
<b>40-44</b>	12	14	5	-	-	-
<b>45-49</b>	18	25	18	-	-	-
<b>50-54</b>	38	42	43	<b>37,6</b>	-	-
<b>55-59</b>	69	60	71	<b>69,7</b>	<b>48,9</b>	-
<b>60-64</b>	104	89	107	-	-	-
<b>65-69</b>	89	82	94	<b>-54,1</b>	<b>-60,1</b>	<b>-39,8</b>
<b>70-74</b>	261	273	233	<b>-25,8</b>	-	-
<b>75-79</b>	251	260	309	-	<b>-29,2</b>	-
<b>80-84</b>	331	314	295	<b>92,6</b>	<b>38,2</b>	-
<b>85 и ст.</b>	234	244	230	<b>69,4</b>	<b>94,4</b>	<b>30,4</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 166

**Динамика показателей смертности от ЗНО мочевого пузыря (С67), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>20-29</b>	0,02	0,01	0,02	0,01	0,03	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
<b>30-39</b>	0,16	0,19	0,21	0,26	0,15	0,11	0,19	0,19	0,14	0,13	0,11	0,14
<b>40-49</b>	1,04	1,15	1,06	0,98	1,13	1,06	1,09	0,97	0,93	0,91	0,90	0,83
<b>50-59</b>	5,33	5,11	4,80	4,51	4,50	4,38	4,18	4,67	4,26	4,29	4,26	3,67
<b>60-69</b>	15,10	16,14	15,89	16,85	16,49	16,50	15,57	15,89	16,03	14,91	13,76	13,14
<b>70-79</b>	28,31	28,88	31,38	32,52	32,39	32,24	31,82	31,44	30,40	28,94	28,47	27,68
<b>80 и ст.</b>	29,34	32,09	32,26	32,59	34,87	35,98	33,86	36,58	36,73	35,51	38,52	37,81
<b>15-59</b>	1,13	1,14	1,08	1,05	1,09	1,09	1,11	1,21	1,13	1,15	1,15	1,02
<b>«Грубый» показатель</b>	4,58	4,87	5,05	5,23	5,13	5,07	4,88	5,00	4,96	4,84	4,89	4,72
<b>Стандарт. показатель</b>	2,83	2,99	3,01	3,08	3,02	2,95	2,80	2,83	2,79	2,69	2,68	2,57
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>20-29</b>	0,02	0,03	0,01	-	-	-						
<b>30-39</b>	0,14	0,10	0,13	<b>-42,2</b>	-	-						
<b>40-49</b>	0,76	0,76	0,73	<b>-33,4</b>	<b>-35,9</b>	<b>-21,3</b>						
<b>50-59</b>	4,06	3,93	3,72	<b>-25,8</b>	<b>-16,0</b>	-						
<b>60-69</b>	11,87	10,94	11,09	<b>-30,1</b>	<b>-35,2</b>	<b>-27,3</b>						
<b>70-79</b>	27,14	25,91	26,38	<b>-14,3</b>	<b>-21,5</b>	<b>-10,3</b>						
<b>80 и ст.</b>	37,87	36,81	35,64	<b>21,3</b>	-	-						
<b>15-59</b>	1,12	1,10	1,06	-	-	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	4,79	4,60	4,57	-	<b>-9,9</b>	<b>-6,2</b>						
<b>Стандарт. показатель</b>	2,53	2,38	2,36	<b>-20,8</b>	<b>-21,0</b>	<b>-13,4</b>						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 166**

**Динамика показателей смертности от ЗНО мочевого пузыря (С67), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>20-29</b>	0,02	0,01	0,03	0,01	0,04	0,03	0,03	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02
<b>30-39</b>	0,26	0,31	0,32	0,42	0,27	0,14	0,27	0,31	0,18	0,17	0,15	0,17
<b>40-49</b>	1,95	2,10	1,89	1,81	1,99	1,93	1,99	1,74	1,62	1,61	1,58	1,43
<b>50-59</b>	10,48	10,11	9,62	8,80	8,77	8,60	8,31	9,32	8,43	8,52	8,43	7,21
<b>60-69</b>	32,67	35,02	34,49	37,31	36,39	36,96	35,27	35,66	36,31	33,36	30,17	29,19
<b>70-79</b>	73,00	73,07	82,41	82,64	80,59	82,87	78,88	78,54	75,58	72,70	70,70	69,72
<b>80 и ст.</b>	85,78	101,58	92,54	96,08	115,03	110,61	104,92	109,87	111,13	102,60	109,86	107,06
<b>15-59</b>	2,04	2,05	1,97	1,89	1,95	1,96	2,02	2,19	2,02	2,07	2,07	1,81
<b>«Грубый» показатель</b>	7,80	8,37	8,74	9,03	8,86	8,82	8,43	8,64	8,61	8,40	8,36	8,13
<b>Стандарт. показатель</b>	6,62	7,03	7,08	7,22	7,19	7,05	6,67	6,70	6,63	6,33	6,28	6,11
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>20-29</b>	0,05	0,03	0,02	-	-	-						
<b>30-39</b>	0,18	0,14	0,17	<b>-56,5</b>	-	-						
<b>40-49</b>	1,26	1,16	1,27	<b>-40,2</b>	<b>-41,8</b>	<b>-27,1</b>						
<b>50-59</b>	7,98	7,73	7,12	<b>-26,6</b>	<b>-17,0</b>	-						
<b>60-69</b>	25,58	23,78	23,87	<b>-29,9</b>	<b>-37,5</b>	<b>-29,8</b>						
<b>70-79</b>	68,08	63,74	64,65	<b>-17,7</b>	<b>-22,9</b>	<b>-12,2</b>						
<b>80 и ст.</b>	106,20	102,18	99,96	-	<b>-9,0</b>	-						
<b>15-59</b>	2,00	1,94	1,85	-	-	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	8,21	7,81	7,74	-	<b>-11,8</b>	<b>-8,2</b>						
<b>Стандарт. показатель</b>	5,94	5,51	5,46	<b>-21,4</b>	<b>-23,1</b>	<b>-15,0</b>						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 166**

**Динамика показателей смертности от ЗНО мочевого пузыря (С67), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>20-29</b>	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
<b>30-39</b>	0,06	0,08	0,09	0,09	0,03	0,08	0,11	0,07	0,10	0,10	0,07	0,11
<b>40-49</b>	0,19	0,26	0,28	0,20	0,34	0,26	0,26	0,28	0,30	0,29	0,29	0,28
<b>50-59</b>	1,09	0,95	0,77	0,91	0,97	0,93	0,84	0,93	0,91	0,89	0,91	0,82
<b>60-69</b>	3,29	3,49	3,51	3,41	3,54	3,43	3,18	3,54	3,30	3,20	3,20	2,73
<b>70-79</b>	9,24	9,62	8,84	10,12	10,33	8,87	9,86	9,21	8,92	8,06	8,34	7,68
<b>80 и ст.</b>	14,91	14,05	16,41	15,78	15,72	17,99	16,33	17,68	16,44	16,34	17,46	17,10
<b>15-59</b>	0,25	0,25	0,23	0,24	0,27	0,27	0,26	0,28	0,29	0,29	0,30	0,28
<b>«Грубый» показатель</b>	1,73	1,78	1,80	1,89	1,90	1,81	1,82	1,86	1,82	1,78	1,89	1,79
<b>Стандарт. показатель</b>	0,79	0,81	0,80	0,81	0,83	0,78	0,78	0,78	0,77	0,74	0,77	0,71
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>20-29</b>	0,00	0,03	0,00	-	-	-						
<b>30-39</b>	0,09	0,06	0,08	-	-	-						
<b>40-49</b>	0,29	0,39	0,23	-	-	-						
<b>50-59</b>	0,89	0,85	0,95	<b>-8,1</b>	-	-						
<b>60-69</b>	2,67	2,26	2,46	<b>-28,8</b>	<b>-32,6</b>	<b>-28,3</b>						
<b>70-79</b>	7,57	7,97	8,43	<b>-20,2</b>	<b>-21,8</b>	-						
<b>80 и ст.</b>	17,14	16,68	15,64	-	-	-						
<b>15-59</b>	0,30	0,31	0,31	<b>30,7</b>	-	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	1,85	1,84	1,84	-	-	-						
<b>Стандарт. показатель</b>	0,73	0,70	0,70	<b>-13,9</b>	<b>-14,0</b>	-						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 167

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО мочевого пузыря (C67),  
Россия, 1999-2013 гг.**

Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	70,2	70,3	70,8	71,0	71,1	71,5	71,8	71,9	72,1	72,3	72,7	72,9
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	69,2	69,3	69,5	69,8	69,9	70,3	70,5	70,7	70,9	71,0	71,3	71,5
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,36	0,38	0,38	0,39	0,38	0,36	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32	0,31
Показатель	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				1999-2013	2003-2013	2008-2013						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	73,0	73,2	73,2	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,2</b>						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	71,5	71,7	71,7	<b>4,0</b>	<b>2,6</b>	<b>1,0</b>						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,30	0,28	0,28	<b>-27,0</b>	<b>-24,7</b>	<b>-14,3</b>						
Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	69,1	69,3	70,1	70,1	70,3	70,6	70,7	70,9	71,1	71,4	71,8	72,1
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	68,1	68,3	68,6	68,9	69,1	69,5	69,6	69,7	70,1	70,1	70,3	70,7
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,82	0,85	0,86	0,89	0,85	0,83	0,77	0,77	0,78	0,74	0,74	0,71

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 167**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО мочевого пузыря (C67),  
Россия, 1999-2013 гг.**

Показатель	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %								
				1999-2013	2003-2013	2008-2013						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	72,2	72,2	72,2	4,6	3,0	1,0						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	70,6	70,7	70,9	4,1	2,5	1,0						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,68	0,62	0,63	-26,9	-25,2	-						
<b>Показатель</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Женщины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	74,0	74,4	74,5	74,9	74,5	76,1	76,1	76,4	76,2	76,5	76,9	77,2
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	73,3	73,2	73,5	73,6	73,1	73,9	73,9	74,4	74,1	74,3	74,9	74,9
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07
Показатель	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %								
				1999-2013	2003-2013	2008-2013						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	77,1	77,1	77,0	4,6	2,7	77,1						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	75,0	75,1	74,9	2,8	2,3	75,0						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,07	0,07	0,07	-	-	0,1						

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 168

## Динамика показателей диагностики ЗНО мочевого пузыря (C67), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	9591	9589	9842	10135	10660	11084	11267	11379	11575	11540	11842
из них доля выявленных активно, %	1,3	1,0	1,8	1,9	1,6	1,8	2,1	2,2	2,2	2,6	2,8
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	71,1	71,8	75,5	74,9	75,7	76,3	76,3	76,9	78,4	78,5	79,3
*I-II ст., %	37,6	38,7	37,8	39,2	40,8	41,3	42,4	45,8	47,5	48,1	50,8
*III ст., %	41,6	40,3	41,2	40,1	38,1	38,0	36,9	35,2	34,5	32,7	31,3
*IV ст., %	13,6	14,6	15,7	15,5	15,1	14,5	14,5	13,7	12,4	13,2	12,5
Показатель одногодичной летальности, %	33,1	32,1	33,5	31,9	32,2	31,7	29,3	29,3	28,2	26,7	26,7
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	11803	11939	11973	12215	12129	12328	12725	12623	13015	12992	
из них доля выявленных активно, %	3,0	3,6	3,5	3,8	4,0	4,5	5,0	6,2	7,6	8,6	
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	80,5	81,9	82,3	83,8	84,2	86,1	86,6	87,6	88,4	89,5	
*I-II ст., %	53,2	55,0	57,4	58,0	59,8	61,3	64,6	66,9	69,1	69,6	
*III ст., %	30,4	28,7	26,8	25,1	25,0	23,9	21,2	19,4	17,5	17,0	
*IV ст., %	11,6	11,1	11,4	12,2	11,3	10,8	10,2	9,6	10,1	10,3	
Показатель одногодичной летальности, %	26,1	23,9	23,1	23,5	22,4	22,6	21,3	19,5	18,9	17,9	

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 169

**Динамика сведений о контингенте больных с ЗНО мочевого пузыря (C67), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных, состоящих на учете на конец года	40500	42665	44711	46157	48534	48042	50398	53338	55862	58019	60520
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	39,7	38,7	39,1	40,1	39,1	40,7	41,5	42,0	42,4	43,3	44,2
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	51,8	51,1	51,1	50,9	49,3	48,3	49,1	50,1	51,3	51,8	55,7
Показатель распространенности на 100 000 населения	27,3	28,8	30,3	31,3	33,0	32,8	34,5	36,7	38,9	40,6	42,2
Индекс накопления контингента	4,2	4,5	4,5	4,6	4,6	4,3	4,5	4,7	4,8	5,0	5,1
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных, состоящих на учете на конец года	62779	65339	68129	70544	73176	76303	79959	83478	87086	90491	
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	44,3	45,2	45,9	47,2	47,1	47,6	47,7	48,9	48,9	49,4	
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	55,2	55,3	55,9	57,4	57,0	57,8	58,3	59,9	60,4	61,1	
Показатель распространенности на 100 000 населения	44,0	46,0	47,8	49,6	51,6	53,8	56,3	58,4	60,8	63,1	
Индекс накопления контингента	5,3	5,5	5,7	5,8	6,0	6,2	6,3	6,6	6,7	7,0	

**Таблица 170**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО головного мозга (C70-72) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>4145</b>	<b>4263</b>	<b>4369</b>	<b>4606</b>	<b>4794</b>	<b>5112</b>	<b>5226</b>	<b>5316</b>	<b>5137</b>	<b>5350</b>	<b>5443</b>	<b>5568</b>
<b>0-14</b>	452	482	461	530	498	515	531	519	472	470	423	432
<b>15-19</b>	111	104	119	132	121	138	180	163	173	181	159	183
<b>20-24</b>	102	109	99	107	97	130	153	144	135	122	148	188
<b>25-29</b>	106	114	134	133	152	153	190	168	178	198	207	197
<b>30-34</b>	238	207	221	247	203	245	200	195	196	211	227	204
<b>35-39</b>	296	302	316	330	343	352	318	316	306	312	304	304
<b>40-44</b>	333	416	393	379	422	462	450	448	453	458	460	450
<b>45-49</b>	336	420	479	546	564	559	557	621	563	604	600	612
<b>50-54</b>	457	403	333	343	417	510	569	628	654	666	722	729
<b>55-59</b>	571	623	661	616	615	563	462	414	397	452	550	628
<b>60-64</b>	489	446	405	478	522	603	720	731	673	643	530	497
<b>65-69</b>	388	385	446	457	445	465	424	451	434	504	569	592
<b>70-74</b>	146	155	171	201	266	263	301	339	311	321	315	326
<b>75-79</b>	78	63	77	67	82	109	118	139	139	166	178	162
<b>80-84</b>	29	22	39	27	33	27	33	26	36	32	38	50
<b>85 и ст.</b>	13	12	15	13	14	18	20	14	17	10	14	14

**Продолжение таблицы 170**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО головного мозга (C70-72) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>5631</b>	<b>6110</b>	<b>6262</b>	<b>6578</b>	<b>6969</b>	<b>7245</b>	<b>7227</b>	<b>7423</b>	<b>7895</b>	<b>90,2</b>	<b>47,9</b>	<b>17,3</b>
<b>0-14</b>	428	424	428	461	477	499	506	468	496	-	<b>20,8</b>	-
<b>15-19</b>	171	135	167	141	137	126	129	98	103	-	<b>-40,0</b>	<b>-29,3</b>
<b>20-24</b>	164	186	161	189	183	191	177	176	153	<b>87,3</b>	-	<b>-15,6</b>
<b>25-29</b>	194	204	207	247	256	250	225	265	297	<b>143,6</b>	<b>47,3</b>	-
<b>30-34</b>	263	308	276	281	291	321	346	349	358	<b>78,2</b>	<b>63,9</b>	<b>30,4</b>
<b>35-39</b>	260	315	302	340	330	382	360	403	376	<b>18,5</b>	<b>40,5</b>	-
<b>40-44</b>	438	409	405	396	407	383	399	411	387	-	<b>-14,0</b>	-
<b>45-49</b>	606	632	641	660	684	633	569	571	538	<b>34,3</b>	-	<b>-20,8</b>
<b>50-54</b>	747	796	820	837	887	842	832	871	903	<b>161,4</b>	<b>23,7</b>	-
<b>55-59</b>	791	850	892	920	982	980	980	1033	1064	<b>134,0</b>	<b>74,4</b>	<b>13,6</b>
<b>60-64</b>	394	436	502	655	744	921	1009	978	1083	<b>116,0</b>	<b>222,0</b>	<b>64,7</b>
<b>65-69</b>	597	721	628	631	542	518	488	532	712	<b>56,9</b>	-	-
<b>70-74</b>	296	359	418	449	598	651	658	628	626	<b>482,9</b>	<b>165,5</b>	-
<b>75-79</b>	198	242	266	229	255	308	320	359	460	<b>490,0</b>	<b>179,0</b>	<b>108,3</b>
<b>80-84</b>	56	66	116	109	158	189	163	199	225	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	28	27	33	33	38	51	66	82	114	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 170**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО головного мозга (C70-72) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	2211	2197	2264	2432	2517	2708	2719	2824	2666	2756	2803	2858
<b>0-14</b>	232	263	246	294	267	286	296	297	274	265	239	229
<b>15-19</b>	61	45	57	78	69	79	90	92	93	97	91	104
<b>20-24</b>	51	53	49	52	48	65	80	81	78	69	86	102
<b>25-29</b>	61	69	64	69	90	76	104	87	108	105	109	113
<b>30-34</b>	126	108	116	144	115	134	96	106	106	111	120	112
<b>35-39</b>	164	166	165	173	176	183	163	189	148	162	171	159
<b>40-44</b>	188	217	215	208	225	251	249	244	255	258	256	242
<b>45-49</b>	196	226	248	297	309	299	313	334	300	332	321	284
<b>50-54</b>	248	211	183	179	227	286	301	337	323	351	370	384
<b>55-59</b>	318	324	358	353	331	324	252	213	214	245	290	332
<b>60-64</b>	265	222	203	239	274	309	369	393	341	310	257	255
<b>65-69</b>	189	183	219	229	229	240	210	228	229	238	280	320
<b>70-74</b>	62	65	80	81	112	120	132	162	132	142	135	133
<b>75-79</b>	34	25	35	25	27	36	49	45	48	61	65	72
<b>80-84</b>	10	14	20	8	13	11	10	8	14	7	9	13
<b>85 и ст.</b>	6	6	6	3	5	9	5	8	3	3	5	4

**Продолжение таблицы 170**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО головного мозга (C70-72) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>2880</b>	<b>3084</b>	<b>3277</b>	<b>3342</b>	<b>3525</b>	<b>3688</b>	<b>3567</b>	<b>3719</b>	<b>3915</b>	<b>77,8</b>	<b>42,1</b>	<b>14,2</b>
<b>0-14</b>	243	222	251	260	278	284	267	250	289	-	22,2	-
<b>15-19</b>	98	78	85	83	73	75	70	66	61	-	-36,5	-23,4
<b>20-24</b>	89	105	95	101	102	107	97	90	100	<b>119,0</b>	-	-
<b>25-29</b>	103	112	121	129	127	144	129	142	154	<b>138,7</b>	<b>43,9</b>	
<b>30-34</b>	143	154	145	161	161	186	190	182	198	<b>83,4</b>	<b>70,6</b>	<b>22,8</b>
<b>35-39</b>	133	167	170	190	200	193	208	238	211	<b>28,8</b>	<b>51,9</b>	-
<b>40-44</b>	225	212	221	211	194	205	190	237	204	<b>-6,2</b>	<b>-16,2</b>	-
<b>45-49</b>	324	318	340	345	350	332	311	299	299	<b>29,3</b>	-	<b>-16,2</b>
<b>50-54</b>	407	413	431	454	462	459	440	452	470	<b>155,7</b>	<b>23,7</b>	-
<b>55-59</b>	408	456	463	444	519	523	502	539	550	<b>113,4</b>	<b>72,3</b>	<b>17,5</b>
<b>60-64</b>	207	215	259	354	362	462	465	508	532	<b>103,4</b>	<b>207,7</b>	<b>57,1</b>
<b>65-69</b>	275	348	317	297	256	249	217	233	333	<b>43,0</b>	-	-
<b>70-74</b>	124	163	203	188	271	280	289	241	254	<b>425,2</b>	<b>142,8</b>	-
<b>75-79</b>	73	87	119	89	100	121	116	157	175	<b>414,7</b>	<b>182,1</b>	<b>113,2</b>
<b>80-84</b>	17	25	49	29	60	58	56	68	65	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	11	9	8	7	10	10	20	17	20	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 170**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО головного мозга (C70-72) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>1934</b>	<b>2066</b>	<b>2105</b>	<b>2174</b>	<b>2277</b>	<b>2404</b>	<b>2507</b>	<b>2492</b>	<b>2471</b>	<b>2594</b>	<b>2640</b>	<b>2710</b>
<b>0-14</b>	220	219	215	236	231	229	235	222	198	205	184	203
<b>15-19</b>	50	59	62	54	52	59	90	71	80	84	68	79
<b>20-24</b>	51	56	50	55	49	65	73	63	57	53	62	86
<b>25-29</b>	45	45	70	64	62	77	86	81	70	93	98	84
<b>30-34</b>	112	99	105	103	88	111	104	89	90	100	107	92
<b>35-39</b>	132	136	151	157	167	169	155	127	158	150	133	145
<b>40-44</b>	145	199	178	171	197	211	201	204	198	200	204	208
<b>45-49</b>	140	194	231	249	255	260	244	287	263	272	279	328
<b>50-54</b>	209	192	150	164	190	224	268	291	331	315	352	345
<b>55-59</b>	253	299	303	263	284	239	210	201	183	207	260	296
<b>60-64</b>	224	224	202	239	248	294	351	338	332	333	273	242
<b>65-69</b>	199	202	227	228	216	225	214	223	205	266	289	272
<b>70-74</b>	84	90	91	120	154	143	169	177	179	179	180	193
<b>75-79</b>	44	38	42	42	55	73	69	94	91	105	113	90
<b>80-84</b>	19	8	19	19	20	16	23	18	22	25	29	37
<b>85 и ст.</b>	7	6	9	10	9	9	15	6	14	7	9	10

**Продолжение таблицы 170**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО головного мозга (C70-72) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>2751</b>	<b>3026</b>	<b>2985</b>	<b>3236</b>	<b>3444</b>	<b>3557</b>	<b>3660</b>	<b>3704</b>	<b>3980</b>	<b>104,6</b>	<b>54,3</b>	<b>20,5</b>
<b>0-14</b>	185	202	177	201	199	215	239	218	207	-8,7	19,1	7,8
<b>15-19</b>	73	57	82	58	64	51	59	32	42	-14,9	-44,3	-36,7
<b>20-24</b>	75	81	66	88	81	84	80	86	53	56,9	-1,1	-25,3
<b>25-29</b>	91	92	86	118	129	106	96	123	143	149,7	51,4	12,5
<b>30-34</b>	120	154	131	120	130	135	156	167	160	72,3	56,4	40,8
<b>35-39</b>	127	148	132	150	130	189	152	165	165	7,4	27,8	14,0
<b>40-44</b>	213	197	184	185	213	178	209	174	183	5,1	-11,4	-6,9
<b>45-49</b>	282	314	301	315	334	301	258	272	239	40,3	-14,0	-25,7
<b>50-54</b>	340	383	389	383	425	383	392	419	433	168,0	23,8	8,9
<b>55-59</b>	383	394	429	476	463	457	478	494	514	160,8	76,8	9,6
<b>60-64</b>	187	221	243	301	382	459	544	470	551	130,1	237,4	72,7
<b>65-69</b>	322	373	311	334	286	269	271	299	379	71,7	5,2	13,4
<b>70-74</b>	172	196	215	261	327	371	369	387	372	534,5	184,8	36,7
<b>75-79</b>	125	155	147	140	155	187	204	202	285	547,0	177,0	105,3
<b>80-84</b>	39	41	67	80	98	131	107	131	160	-	-	-
<b>85 и ст.</b>	17	18	25	26	28	41	46	65	94	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 171

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО головного мозга (C70-72), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>0-9</b>	1,38	1,52	1,52	1,78	1,80	1,95	1,96	2,17	2,15	2,18	2,10	1,97
<b>10-19</b>	1,22	1,23	1,25	1,45	1,32	1,43	1,75	1,57	1,53	1,61	1,39	1,69
<b>20-29</b>	1,06	1,14	1,18	1,20	1,23	1,38	1,65	1,48	1,48	1,50	1,59	1,69
<b>30-39</b>	2,12	2,04	2,19	2,41	2,35	2,65	2,38	2,43	2,47	2,63	2,70	2,60
<b>40-49</b>	3,69	4,25	4,12	4,18	4,33	4,38	4,25	4,46	4,22	4,41	4,42	4,49
<b>50-59</b>	6,03	6,31	6,41	6,41	7,06	7,53	7,30	7,31	7,26	7,40	7,85	7,78
<b>60-69</b>	5,79	5,60	5,84	6,47	6,67	7,29	7,75	8,02	7,59	8,06	8,02	8,39
<b>70-79</b>	3,49	3,33	3,64	3,68	4,43	4,40	4,67	5,10	4,68	5,00	5,11	5,20
<b>80 и ст.</b>	1,31	1,04	1,65	1,25	1,52	1,49	1,79	1,38	1,87	1,48	1,93	2,27
<b>15-59</b>	2,81	2,96	3,00	3,08	3,19	3,38	3,34	3,36	3,32	3,46	3,57	3,65
<b>«Грубый» показатель</b>	2,80	2,88	2,96	3,13	3,26	3,49	3,58	3,66	3,57	3,74	3,79	3,90
<b>Стандарт. показатель</b>	2,49	2,56	2,60	2,79	2,89	3,09	3,16	3,20	3,14	3,28	3,28	3,36
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	2,18	2,05	2,20	2,32	2,32	2,28	2,38	2,25	2,32	<b>51,5</b>	<b>15,1</b>	-
<b>10-19</b>	1,57	1,48	1,65	1,65	1,77	1,90	1,85	1,49	1,59	<b>34,4</b>	-	-
<b>20-29</b>	1,55	1,65	1,53	1,79	1,79	1,80	1,67	1,86	1,96	<b>67,4</b>	<b>20,3</b>	-
<b>30-39</b>	2,68	3,15	2,88	3,05	3,00	3,37	3,30	3,47	3,33	<b>65,3</b>	<b>31,7</b>	<b>13,0</b>
<b>40-49</b>	4,51	4,58	4,73	4,93	5,25	4,97	4,94	5,11	4,86	<b>28,1</b>	<b>14,9</b>	-
<b>50-59</b>	8,26	8,44	8,54	8,55	8,94	8,67	8,36	8,74	9,02	<b>46,1</b>	<b>12,5</b>	-
<b>60-69</b>	8,05	9,72	9,70	11,30	11,37	12,65	12,39	11,88	13,12	<b>152,1</b>	<b>71,8</b>	-
<b>70-79</b>	5,38	6,55	7,36	7,14	8,81	9,80	9,78	10,02	11,50	<b>340,3</b>	<b>154,5</b>	<b>49,5</b>
<b>80 и ст.</b>	2,81	2,90	4,32	3,83	4,99	5,96	5,33	6,42	7,70	-	-	<b>88,1</b>
<b>15-59</b>	3,77	3,95	4,00	4,16	4,34	4,31	4,25	4,46	4,50	<b>61,3</b>	<b>26,5</b>	<b>6,9</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	3,97	4,29	4,41	4,63	4,91	5,11	5,06	5,18	5,50	<b>99,0</b>	<b>47,4</b>	<b>15,8</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	3,39	3,60	3,68	3,88	4,02	4,14	4,08	4,07	4,25	<b>70,7</b>	<b>31,4</b>	<b>7,1</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 171**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО головного мозга (C70-72), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>0-9</b>	1,42	1,60	1,62	1,90	1,90	2,14	2,23	2,38	2,28	2,33	2,28	1,97
<b>10-19</b>	1,25	1,25	1,23	1,65	1,42	1,57	1,77	1,78	1,77	1,78	1,57	1,87
<b>20-29</b>	1,11	1,21	1,12	1,18	1,33	1,34	1,73	1,57	1,74	1,62	1,74	1,88
<b>30-39</b>	2,30	2,19	2,29	2,65	2,50	2,82	2,38	2,79	2,48	2,73	2,98	2,80
<b>40-49</b>	4,33	4,62	4,50	4,70	4,84	4,87	4,90	4,99	4,77	5,08	5,03	4,65
<b>50-59</b>	7,31	7,28	7,77	7,94	8,51	9,51	8,66	8,50	8,15	8,66	9,00	9,12
<b>60-69</b>	7,73	6,96	7,31	8,12	8,66	9,33	9,76	10,51	9,78	9,72	9,95	11,36
<b>70-79</b>	5,68	5,20	6,32	5,33	6,26	6,33	6,75	7,27	6,11	6,75	6,61	6,92
<b>80 и ст.</b>	2,51	3,06	3,95	1,71	2,88	3,28	2,49	2,68	2,88	1,68	2,69	3,10
<b>15-59</b>	3,16	3,16	3,22	3,44	3,52	3,75	3,64	3,71	3,59	3,81	3,93	3,94
<b>«Грубый» показатель</b>	3,18	3,16	3,26	3,52	3,65	3,94	3,97	4,15	3,96	4,13	4,20	4,31
<b>Стандарт. показатель</b>	2,94	2,92	2,98	3,23	3,34	3,62	3,65	3,76	3,62	3,75	3,78	3,84
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	2,25	2,11	2,51	2,44	2,62	2,55	2,43	2,28	2,64	<b>53,4</b>	<b>19,4</b>	-
<b>10-19</b>	1,86	1,59	1,76	1,96	1,95	2,14	1,95	1,81	1,82	<b>47,0</b>	-	-
<b>20-29</b>	1,65	1,83	1,79	1,87	1,85	2,03	1,86	1,94	2,19	<b>81,3</b>	<b>19,2</b>	-
<b>30-39</b>	2,86	3,28	3,18	3,49	3,54	3,68	3,78	3,94	3,76	<b>80,2</b>	<b>40,6</b>	<b>10,9</b>
<b>40-49</b>	4,98	4,90	5,33	5,45	5,50	5,51	5,35	5,81	5,51	<b>25,3</b>	<b>18,1</b>	-
<b>50-59</b>	9,77	9,98	10,00	9,81	10,54	10,50	9,73	10,15	10,42	<b>40,7</b>	<b>12,4</b>	-
<b>60-69</b>	10,14	12,29	12,82	14,74	13,94	15,88	14,04	14,45	15,69	<b>132,4</b>	<b>54,7</b>	-
<b>70-79</b>	6,74	8,50	10,76	9,03	11,87	12,71	12,52	12,56	14,24	<b>212,7</b>	<b>136,2</b>	<b>40,9</b>
<b>80 и ст.</b>	4,73	5,17	7,71	4,37	7,82	7,34	7,60	8,25	8,14	-	-	-
<b>15-59</b>	4,13	4,28	4,42	4,54	4,73	4,82	4,67	4,94	4,99	<b>62,5</b>	<b>28,9</b>	<b>8,6</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	4,38	4,67	4,98	5,09	5,37	5,62	5,40	5,61	5,89	<b>90,1</b>	<b>42,2</b>	<b>12,6</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	3,91	4,11	4,39	4,51	4,66	4,87	4,60	4,68	4,93	<b>70,2</b>	<b>31,5</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 171**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО головного мозга (C70-72), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>0-9</b>	1,34	1,45	1,41	1,64	1,69	1,75	1,68	1,95	2,01	2,02	1,91	1,97
<b>10-19</b>	1,20	1,21	1,27	1,26	1,23	1,29	1,72	1,36	1,28	1,44	1,20	1,51
<b>20-29</b>	1,00	1,05	1,25	1,22	1,13	1,42	1,56	1,39	1,21	1,38	1,45	1,50
<b>30-39</b>	1,93	1,88	2,09	2,17	2,19	2,48	2,38	2,06	2,46	2,54	2,42	2,41
<b>40-49</b>	3,07	3,90	3,77	3,69	3,86	3,91	3,64	3,97	3,70	3,78	3,87	4,34
<b>50-59</b>	4,97	5,50	5,30	5,16	5,87	5,90	6,18	6,33	6,52	6,34	6,90	6,68
<b>60-69</b>	4,56	4,72	4,87	5,38	5,34	5,93	6,40	6,36	6,13	6,98	6,77	6,49
<b>70-79</b>	2,70	2,66	2,67	3,07	3,71	3,61	3,79	4,15	4,05	4,22	4,43	4,41
<b>80 и ст.</b>	1,02	0,54	1,07	1,13	1,17	1,04	1,61	1,04	1,60	1,43	1,75	2,07
<b>15-59</b>	2,47	2,76	2,79	2,74	2,87	3,03	3,06	3,02	3,06	3,13	3,22	3,38
<b>«Грубый» показатель</b>	2,46	2,63	2,69	2,78	2,92	3,09	3,23	3,23	3,23	3,41	3,44	3,55
<b>Стандарт. показатель</b>	2,15	2,31	2,34	2,45	2,54	2,68	2,78	2,77	2,76	2,89	2,88	3,00
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	2,10	1,99	1,88	2,19	2,01	2,01	2,33	2,21	2,00	<b>49,7</b>	-	-
<b>10-19</b>	1,26	1,38	1,53	1,33	1,58	1,64	1,73	1,15	1,34	-	-	-
<b>20-29</b>	1,45	1,47	1,27	1,70	1,73	1,56	1,48	1,79	1,73	<b>53,8</b>	<b>21,5</b>	-
<b>30-39</b>	2,51	3,01	2,59	2,62	2,48	3,06	2,84	3,02	2,91	<b>51,0</b>	<b>22,0</b>	-
<b>40-49</b>	4,09	4,30	4,19	4,46	5,04	4,48	4,57	4,45	4,27	<b>32,3</b>	-	-
<b>50-59</b>	7,03	7,19	7,36	7,54	7,66	7,21	7,26	7,59	7,87	<b>53,2</b>	<b>12,7</b>	-
<b>60-69</b>	6,74	8,11	7,74	9,12	9,70	10,55	11,27	10,14	11,39	<b>174,1</b>	<b>88,0</b>	<b>20,8</b>
<b>70-79</b>	4,74	5,63	5,75	6,24	7,35	8,42	8,47	8,81	10,22	<b>425,9</b>	<b>167,5</b>	<b>56,4</b>
<b>80 и ст.</b>	2,33	2,31	3,39	3,68	4,15	5,55	4,64	5,86	7,56	-	-	<b>104,9</b>
<b>15-59</b>	3,44	3,63	3,60	3,80	3,98	3,83	3,85	4,00	4,04	<b>60,2</b>	<b>23,8</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	3,61	3,96	3,91	4,24	4,52	4,66	4,76	4,81	5,17	<b>110,1</b>	<b>53,1</b>	<b>19,1</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	2,99	3,23	3,14	3,39	3,53	3,58	3,69	3,60	3,70	<b>70,2</b>	<b>30,9</b>	<b>7,8</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 172

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО головного мозга (C70-72),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	51,1	49,7	49,6	49,1	50,0	50,0	50,3	50,7	50,7	50,9	51,3	51,5
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	46,6	46,2	46,7	46,1	47,2	47,1	47,1	47,7	47,7	48,0	48,5	48,4
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,23	0,24	0,24	0,26	0,27	0,29	0,29	0,30	0,29	0,31	0,31	0,32
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	52,0	52,8	53,3	53,4	54,1	55,0	55,4	55,5	56,6	13,8	10,3	5,5
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	48,7	49,7	50,3	50,1	50,8	51,4	51,5	52,0	53,0	14,3	9,4	5,2
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,32	0,35	0,36	0,38	0,39	0,41	0,40	0,40	0,43	87,1	39,1	10,2
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	50,5	48,9	49,4	48,3	49,3	49,7	49,5	49,7	49,5	49,7	50,1	51,1
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	46,3	45,5	46,4	45,2	46,4	46,4	46,2	46,6	46,3	46,6	47,0	47,6
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,29	0,28	0,29	0,31	0,33	0,35	0,35	0,36	0,35	0,36	0,37	0,38

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 172**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО головного мозга (C70-72),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
	1993-2013	2003-2013	2008-2013									
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	51,0	52,1	52,4	52,1	53,0	53,5	53,7	53,9	54,7	<b>11,5</b>	<b>8,2</b>	<b>4,4</b>
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	47,4	48,7	49,1	48,5	49,3	49,5	49,8	50,2	50,5	<b>11,1</b>	<b>7,2</b>	<b>3,9</b>
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,38	0,41	0,44	0,45	0,47	0,49	0,46	0,47	0,50	<b>80,1</b>	<b>35,8</b>	<b>6,9</b>
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	51,7	50,7	49,8	50,0	51,0	50,5	51,2	51,8	51,8	52,2	52,6	51,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	47,1	46,9	47,0	47,2	48,1	47,8	48,0	48,9	49,1	49,4	50,0	49,3
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,25	0,27	0,27	0,28
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	53,1	53,5	54,3	55,0	55,2	56,5	57,0	57,0	58,6	<b>15,7</b>	<b>12,1</b>	<b>6,2</b>
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	50,2	50,8	51,5	51,8	52,3	53,3	53,2	53,8	55,4	<b>17,3</b>	<b>11,2</b>	<b>6,3</b>
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,28	0,31	0,30	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	<b>91,8</b>	<b>40,7</b>	<b>11,7</b>

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 173**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО головного мозга (C70-72) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>5029</b>	<b>5676</b>	<b>5654</b>	<b>5871</b>	<b>5845</b>	<b>5817</b>	<b>5893</b>	<b>6085</b>	<b>6193</b>	<b>6277</b>	<b>6558</b>	<b>6796</b>
<b>0-14</b>	352	334	331	312	255	260	253	234	234	242	241	241
<b>15-19</b>	99	128	125	123	122	128	96	108	64	97	94	69
<b>20-24</b>	87	107	114	105	113	111	119	106	117	123	109	107
<b>25-29</b>	139	170	165	128	154	180	143	155	162	134	153	135
<b>30-34</b>	207	182	172	207	199	182	195	199	202	196	217	215
<b>35-39</b>	277	339	295	291	283	284	243	247	264	248	252	272
<b>40-44</b>	432	481	491	521	477	438	428	411	397	337	344	313
<b>45-49</b>	583	632	656	636	619	617	638	602	615	633	595	574
<b>50-54</b>	569	695	779	792	867	808	801	786	805	808	857	835
<b>55-59</b>	549	489	469	500	602	718	847	957	959	1000	1011	1000
<b>60-64</b>	779	904	872	880	705	571	526	496	545	652	817	971
<b>65-69</b>	470	580	542	628	708	752	781	854	827	746	618	558
<b>70-74</b>	299	424	428	458	419	390	412	422	457	556	661	789
<b>75-79</b>	126	147	154	227	242	265	269	341	350	292	330	399
<b>80-84</b>	37	38	31	45	56	79	107	128	148	153	183	252
<b>85 и ст.</b>	24	26	30	18	20	36	35	39	47	60	76	66

**Продолжение таблицы 173**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО головного мозга (C70-72) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>						
<b>Всего</b>	<b>6986</b>	<b>7000</b>	<b>7326</b>	<b>36,4</b>	<b>27,6</b>	<b>13,9</b>
<b>0-14</b>	265	257	268	-27,6	-	-
<b>15-19</b>	57	55	54	-55,3	-	-30,3
<b>20-24</b>	94	95	86	-	-14,6	-
<b>25-29</b>	145	172	143	-	-23,1	-
<b>30-34</b>	227	234	215	20,9	-	-
<b>35-39</b>	273	294	286	-	-	9,5
<b>40-44</b>	364	330	316	-37,6	-11,1	-
<b>45-49</b>	530	507	472	-18,7	-	-4,3
<b>50-54</b>	811	763	807	16,5	-13,9	-
<b>55-59</b>	1007	1027	980	138,4	-	-10,5
<b>60-64</b>	1080	1036	1175	-	34,6	-
<b>65-69</b>	517	619	734	-	48,7	27,0
<b>70-74</b>	801	783	762	174,3	109,7	41,6
<b>75-79</b>	411	428	584	330,9	153,8	76,6
<b>80-84</b>	283	264	282	-	-	79,5
<b>85 и ст.</b>	121	136	162	-	-	90,5

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 173**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО головного мозга (C70-72) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>2664</b>	<b>2986</b>	<b>2983</b>	<b>3060</b>	<b>3058</b>	<b>3013</b>	<b>3001</b>	<b>3141</b>	<b>3182</b>	<b>3209</b>	<b>3393</b>	<b>3457</b>
<b>0-14</b>	192	177	197	171	143	145	143	124	121	136	130	128
<b>15-19</b>	50	83	66	68	78	76	48	64	27	53	48	47
<b>20-24</b>	46	60	68	55	63	69	67	65	71	76	65	60
<b>25-29</b>	81	100	98	73	83	96	79	88	102	81	91	82
<b>30-34</b>	125	96	95	115	116	102	108	113	120	120	141	124
<b>35-39</b>	151	189	171	158	156	169	122	120	156	137	142	152
<b>40-44</b>	249	249	275	313	274	241	248	225	224	174	200	167
<b>45-49</b>	332	345	364	371	351	308	346	329	336	344	327	322
<b>50-54</b>	309	415	424	425	464	451	448	445	438	460	464	464
<b>55-59</b>	308	254	259	293	337	402	445	516	505	535	555	541
<b>60-64</b>	394	475	429	430	351	285	264	253	284	339	426	501
<b>65-69</b>	248	285	285	286	348	366	371	401	405	352	305	282
<b>70-74</b>	117	192	184	202	175	169	185	197	206	234	287	336
<b>75-79</b>	45	43	51	77	93	105	96	145	128	116	121	150
<b>80-84</b>	12	16	8	17	17	20	24	43	48	46	67	90
<b>85 и ст.</b>	5	7	9	6	5	9	7	13	11	6	24	11

**Продолжение таблицы 173**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО головного мозга (C70-72) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>						
<b>Всего</b>	<b>3487</b>	<b>3552</b>	<b>3599</b>	<b>28,2</b>	<b>22,4</b>	<b>9,3</b>
<b>0-14</b>	135	135	140	-32,8	-	-
<b>15-19</b>	33	37	31	-53,8	-18,1	-
<b>20-24</b>	60	52	49	-	-16,9	-20,9
<b>25-29</b>	75	96	70	-	-25,3	-
<b>30-34</b>	131	121	132	26,2	-	-
<b>35-39</b>	170	177	170	-	-	22,0
<b>40-44</b>	208	197	178	-37,0	-	-
<b>45-49</b>	287	260	261	-21,7	-	-7,0
<b>50-54</b>	440	431	447	16,3	-13,6	-9,7
<b>55-59</b>	551	583	527	136,1	-	-
<b>60-64</b>	551	548	603	-	36,4	-
<b>65-69</b>	241	278	352	-	41,6	14,1
<b>70-74</b>	342	334	298	157,0	97,9	35,3
<b>75-79</b>	142	181	221	416,2	127,0	77,7
<b>80-84</b>	96	93	87	-	-	57,1
<b>85 и ст.</b>	25	29	33	-	-	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 173**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО головного мозга (C70-72) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>2365</b>	<b>2690</b>	<b>2671</b>	<b>2811</b>	<b>2787</b>	<b>2804</b>	<b>2892</b>	<b>2944</b>	<b>3011</b>	<b>3068</b>	<b>3165</b>	<b>3339</b>
<b>0-14</b>	160	157	134	141	112	115	110	110	113	106	111	113
<b>15-19</b>	49	45	59	55	44	52	48	44	37	44	46	22
<b>20-24</b>	41	47	46	50	50	42	52	41	46	47	44	47
<b>25-29</b>	58	70	67	55	71	84	64	67	60	53	62	53
<b>30-34</b>	82	86	77	92	83	80	87	86	82	76	76	91
<b>35-39</b>	126	150	124	133	127	115	121	127	108	111	110	120
<b>40-44</b>	183	232	216	208	203	197	180	186	173	163	144	146
<b>45-49</b>	251	287	292	265	268	309	292	273	279	289	268	252
<b>50-54</b>	260	280	355	367	403	357	353	341	367	348	393	371
<b>55-59</b>	241	235	210	207	265	316	402	441	454	465	456	459
<b>60-64</b>	385	429	443	450	354	286	262	243	261	313	391	470
<b>65-69</b>	222	295	257	342	360	386	410	453	422	394	313	276
<b>70-74</b>	182	232	244	256	244	221	227	225	251	322	374	453
<b>75-79</b>	81	104	103	150	149	160	173	196	222	176	209	249
<b>80-84</b>	25	22	23	28	39	59	83	85	100	107	116	162
<b>85 и ст.</b>	19	19	21	12	15	27	28	26	36	54	52	55

**Продолжение таблицы 173**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО головного мозга (C70-72) в зависимости от пола и возраста,  
Россия, 1999-2013 гг.**

Возраст	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
				1999-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>						
<b>Всего</b>	<b>3499</b>	<b>3448</b>	<b>3727</b>	<b>45,7</b>	<b>33,5</b>	<b>19,0</b>
<b>0-14</b>	130	122	128	-20,9	10,6	-
<b>15-19</b>	24	18	23	-57,3	-	-
<b>20-24</b>	34	43	37	-	-	-
<b>25-29</b>	70	76	73	-	-	<b>35,8</b>
<b>30-34</b>	96	113	83	-	-	-
<b>35-39</b>	103	117	116	-18,6	-18,5	-
<b>40-44</b>	156	133	138	-38,3	-12,4	-
<b>45-49</b>	243	247	211	-14,9	-	-
<b>50-54</b>	371	332	360	-	-14,6	-
<b>55-59</b>	456	444	453	141,2	-	-12,6
<b>60-64</b>	529	488	572	-	31,6	-
<b>65-69</b>	276	341	382	-	55,2	37,5
<b>70-74</b>	459	449	464	188,4	121,2	47,4
<b>75-79</b>	269	247	363	290,3	166,6	75,2
<b>80-84</b>	187	171	195	-	-	<b>90,0</b>
<b>85 и ст.</b>	96	107	129	-	-	<b>88,5</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 174

**Динамика показателей смертности от ЗНО головного мозга (C70-72), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>0-9</b>	1,37	1,43	1,48	1,50	1,35	1,30	1,37	1,18	1,15	1,22	1,20	1,26
<b>10-19</b>	1,03	1,09	1,10	1,05	0,90	1,03	0,85	0,96	0,79	1,00	1,03	0,82
<b>20-29</b>	1,09	1,32	1,32	1,09	1,20	1,28	1,13	1,10	1,16	1,06	1,07	0,99
<b>30-39</b>	2,23	2,48	2,29	2,51	2,45	2,39	2,24	2,25	2,32	2,18	2,27	2,33
<b>40-49</b>	4,28	4,65	4,77	4,80	4,57	4,46	4,61	4,46	4,58	4,53	4,52	4,34
<b>50-59</b>	7,92	8,31	8,62	8,55	9,07	8,75	8,85	8,93	8,80	8,80	8,94	8,73
<b>60-69</b>	8,47	10,07	9,69	10,60	10,32	10,19	10,62	11,34	11,78	12,29	12,68	13,44
<b>70-79</b>	4,74	6,09	6,05	7,04	6,85	6,99	7,41	8,32	8,69	8,93	10,23	12,14
<b>80 и ст.</b>	2,06	2,21	2,15	2,22	2,82	4,08	4,75	5,20	5,65	5,75	6,59	7,90
<b>15-59</b>	3,20	3,50	3,55	3,57	3,63	3,62	3,65	3,68	3,70	3,71	3,79	3,69
<b>«Грубый» показатель</b>	3,45	3,91	3,93	4,11	4,07	4,08	4,15	4,27	4,36	4,42	4,62	4,79
<b>Стандарт. показатель</b>	2,92	3,24	3,26	3,34	3,28	3,27	3,29	3,31	3,35	3,39	3,49	3,53
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>0-9</b>	1,25	1,22	1,25	<b>-17,5</b>	-	-						
<b>10-19</b>	0,89	0,85	0,85	<b>-20,6</b>	-	-						
<b>20-29</b>	0,99	1,13	1,00	<b>-18,4</b>	<b>-17,4</b>	-						
<b>30-39</b>	2,34	2,44	2,27	-	-	-						
<b>40-49</b>	4,56	4,35	4,14	-	<b>-6,0</b>	-						
<b>50-59</b>	8,39	8,21	8,19	-	<b>-8,2</b>	<b>-8,8</b>						
<b>60-69</b>	13,21	13,02	13,95	<b>55,2</b>	<b>38,7</b>	<b>10,5</b>						
<b>70-79</b>	12,12	12,29	14,26	<b>199,4</b>	<b>128,7</b>	<b>53,0</b>						
<b>80 и ст.</b>	9,40	9,14	10,09	-	<b>264,3</b>	<b>80,1</b>						
<b>15-59</b>	3,71	3,71	3,62	<b>9,0</b>	-	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	4,89	4,89	5,10	<b>38,2</b>	<b>27,6</b>	<b>13,9</b>						
<b>Стандарт. показатель</b>	3,55	3,54	3,61	<b>15,8</b>	<b>11,6</b>	<b>5,3</b>						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 174**

**Динамика показателей смертности от ЗНО головного мозга (C70-72), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>0-9</b>	1,47	1,39	1,75	1,55	1,44	1,46	1,47	1,14	1,11	1,27	1,22	1,33
<b>10-19</b>	1,06	1,32	1,20	1,17	1,10	1,15	0,91	1,13	0,77	1,15	1,10	0,96
<b>20-29</b>	1,20	1,50	1,55	1,19	1,30	1,44	1,26	1,29	1,43	1,28	1,26	1,15
<b>30-39</b>	2,54	2,70	2,59	2,73	2,78	2,80	2,38	2,38	2,79	2,56	2,77	2,68
<b>40-49</b>	5,06	5,13	5,50	5,89	5,45	4,86	5,38	5,12	5,32	5,08	5,32	5,01
<b>50-59</b>	9,66	10,34	10,36	10,43	10,93	10,86	10,70	11,03	10,55	10,87	10,95	10,74
<b>60-69</b>	10,83	12,86	12,25	12,70	12,95	12,86	13,35	14,28	15,34	15,65	16,49	17,49
<b>70-79</b>	6,04	8,26	7,97	9,28	8,85	9,25	9,61	11,63	11,16	11,41	13,05	15,40
<b>80 и ст.</b>	2,83	3,86	2,88	3,87	4,23	5,29	5,24	8,51	7,98	6,31	10,16	10,90
<b>15-59</b>	3,65	3,95	4,02	4,12	4,16	4,12	4,09	4,18	4,22	4,25	4,39	4,25
<b>«Грубый» показатель</b>	3,89	4,39	4,44	4,58	4,58	4,55	4,56	4,76	4,84	4,89	5,17	5,27
<b>Стандарт. показатель</b>	3,47	3,83	3,91	3,96	3,93	3,90	3,88	3,99	4,03	4,07	4,27	4,30
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>0-9</b>	1,17	1,24	1,24	<b>-24,7</b>	-	-						
<b>10-19</b>	1,02	0,99	0,95	<b>-19,5</b>	-	<b>-16,0</b>						
<b>20-29</b>	1,11	1,24	1,02	<b>-19,1</b>	<b>-20,0</b>	-						
<b>30-39</b>	2,86	2,79	2,78	-	-	-						
<b>40-49</b>	5,28	4,96	4,81	-	-	-						
<b>50-59</b>	10,23	10,39	9,95	-	<b>-6,9</b>	<b>-8,7</b>						
<b>60-69</b>	16,31	16,11	17,32	<b>54,9</b>	<b>36,7</b>	-						
<b>70-79</b>	14,96	16,25	17,22	<b>173,3</b>	<b>110,4</b>	<b>47,7</b>						
<b>80 и ст.</b>	12,10	11,84	11,49	-	<b>202,2</b>	<b>59,5</b>						
<b>15-59</b>	4,27	4,30	4,14	<b>10,7</b>	<b>3,2</b>	-						
<b>«Грубый» показатель</b>	5,27	5,36	5,42	<b>31,9</b>	<b>22,4</b>	<b>9,3</b>						
<b>Стандарт. показатель</b>	4,22	4,25	4,27	<b>17,0</b>	<b>11,8</b>	-						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 174**

**Динамика показателей смертности от ЗНО головного мозга (C70-72), Россия, 1999-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>0-9</b>	1,26	1,48	1,20	1,45	1,25	1,14	1,26	1,21	1,19	1,18	1,18	1,19
<b>10-19</b>	0,99	0,85	1,01	0,93	0,70	0,91	0,79	0,80	0,81	0,85	0,96	0,67
<b>20-29</b>	0,97	1,13	1,08	0,99	1,09	1,11	1,01	0,92	0,89	0,83	0,87	0,82
<b>30-39</b>	1,91	2,25	1,99	2,29	2,11	1,98	2,11	2,13	1,87	1,81	1,77	2,00
<b>40-49</b>	3,55	4,20	4,08	3,79	3,77	4,10	3,90	3,86	3,90	4,03	3,79	3,72
<b>50-59</b>	6,48	6,62	7,17	6,98	7,53	7,02	7,34	7,24	7,39	7,13	7,32	7,12
<b>60-69</b>	6,88	8,21	7,99	9,23	8,60	8,48	8,89	9,50	9,55	10,16	10,23	10,81
<b>70-79</b>	4,18	5,15	5,20	6,04	5,94	5,94	6,38	6,76	7,51	7,75	8,89	10,59
<b>80 и ст.</b>	1,87	1,78	1,96	1,78	2,48	3,78	4,62	4,35	5,01	5,59	5,54	7,00
<b>15-59</b>	2,76	3,06	3,09	3,04	3,12	3,16	3,23	3,21	3,21	3,21	3,23	3,17
<b>«Грубый» показатель</b>	3,05	3,48	3,49	3,69	3,63	3,67	3,80	3,85	3,94	4,02	4,15	4,38
<b>Стандарт. показатель</b>	2,49	2,79	2,73	2,86	2,77	2,78	2,83	2,83	2,85	2,88	2,93	2,97
<b>Возраст</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				<b>1999-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>						
<b>0-9</b>	1,34	1,19	1,27	-	-	-						
<b>10-19</b>	0,75	0,70	0,74	<b>-22,8</b>	-	-						
<b>20-29</b>	0,87	1,02	0,97	-	-	-						
<b>30-39</b>	1,83	2,09	1,78	<b>-12,7</b>	-	-						
<b>40-49</b>	3,91	3,79	3,53	-	<b>-6,4</b>	-						
<b>50-59</b>	6,90	6,45	6,76	--	<b>-9,4</b>	<b>-9,1</b>						
<b>60-69</b>	11,14	10,93	11,68	<b>55,3</b>	<b>38,9</b>	<b>14,4</b>						
<b>70-79</b>	10,76	10,41	12,87	<b>213,9</b>	<b>141,7</b>	<b>56,9</b>						
<b>80 и ст.</b>	8,58	8,31	9,65	-	<b>281,3</b>	<b>88,8</b>						
<b>15-59</b>	3,18	3,15	3,12	<b>7,4</b>	-	<b>-3,0</b>						
<b>«Грубый» показатель</b>	4,55	4,48	4,84	<b>45,9</b>	<b>33,5</b>	<b>19,0</b>						
<b>Стандарт. показатель</b>	3,06	3,01	3,12	<b>16,2</b>	<b>12,4</b>	<b>7,6</b>						

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 175

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО головного мозга (C70-72),  
Россия, 1999-2013 гг.**

Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	53,0	53,4	53,1	53,9	54,0	54,4	55,2	56,0	56,2	56,6	57,1	58,2
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	50,1	50,9	50,9	51,8	52,2	52,4	53,1	53,9	54,3	54,5	55,0	56,1
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,29	0,33	0,33	0,34	0,34	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,38
Показатель	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>								
				1999-2013	2003-2013	2008-2013						
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	58,6	58,9	60,2	13,7	10,8	6,0						
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	56,4	56,5	57,6	14,4	10,2	5,4						
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,38	0,38	0,39	25,4	18,0	7,1						
Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	51,7	52,3	51,9	52,4	52,8	53,3	53,8	55,0	55,0	55,2	55,8	56,7
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	49,0	49,8	49,4	50,4	50,7	50,9	51,6	52,7	52,8	52,6	53,3	54,2
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,35	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,43	0,43	0,44	0,46	0,47

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 175**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО головного мозга (C70-72),  
Россия, 1999-2013 гг.**

Показатель	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %										
				1999-2013	2003-2013	2008-2013								
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	56,9	57,3	58,1	<b>12,7</b>	<b>9,6</b>	<b>4,9</b>								
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	54,3	54,7	55,4	<b>13,0</b>	<b>9,1</b>	<b>4,9</b>								
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,46	0,47	0,47	<b>27,2</b>	<b>18,1</b>	-								
<b>Показатель</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>		
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>														
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	54,5	54,8	54,5	56,0	55,6	55,8	56,7	57,2	57,7	58,2	58,6	60,0		
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	51,4	52,1	52,6	53,4	53,9	54,0	54,7	55,2	55,9	56,4	56,7	58,0		
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,24	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	0,31	0,32		
Показатель	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %										
				1999-2013	2003-2013	2008-2013								
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	60,6	60,8	62,1	<b>14,1</b>	<b>11,7</b>	<b>6,7</b>								
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	58,4	58,4	59,7	<b>15,5</b>	<b>11,0</b>	<b>5,6</b>								
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,32	0,32	0,34	-	<b>21,1</b>	<b>11,0</b>								

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 176**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО щитовидной железы (C73) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>4369</b>	<b>4720</b>	<b>4950</b>	<b>5470</b>	<b>5932</b>	<b>6466</b>	<b>7008</b>	<b>7506</b>	<b>8118</b>	<b>8258</b>	<b>7988</b>	<b>8258</b>
<b>0-14</b>	34	60	49	39	54	51	45	45	34	45	40	41
<b>15-19</b>	57	68	60	63	85	102	122	130	98	111	111	94
<b>20-24</b>	90	120	106	120	104	144	175	166	165	168	185	177
<b>25-29</b>	148	165	177	161	190	206	227	244	283	291	233	255
<b>30-34</b>	264	303	306	288	297	287	308	362	383	379	330	413
<b>35-39</b>	407	398	405	438	513	522	540	599	597	517	479	456
<b>40-44</b>	456	500	485	602	645	711	797	870	905	926	805	827
<b>45-49</b>	395	518	650	724	781	900	978	983	1118	1158	1136	1132
<b>50-54</b>	415	397	383	453	544	656	902	1109	1270	1310	1318	1265
<b>55-59</b>	482	564	552	706	666	609	540	515	564	674	807	1020
<b>60-64</b>	451	474	495	531	624	762	832	924	998	874	779	685
<b>65-69</b>	491	521	537	584	590	629	595	586	682	771	824	882
<b>70-74</b>	283	304	369	403	478	490	537	525	524	538	460	483
<b>75-79</b>	221	160	174	178	188	237	231	291	336	324	323	337
<b>80-84</b>	127	119	135	122	103	98	110	90	95	110	104	134
<b>85 и ст.</b>	48	49	67	58	70	62	69	67	66	62	54	57

**Продолжение таблицы 176**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО щитовидной железы (C73) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>8505</b>	<b>8932</b>	<b>9238</b>	<b>8984</b>	<b>8835</b>	<b>8879</b>	<b>9636</b>	<b>9825</b>	<b>9742</b>	<b>108,7</b>	<b>20,2</b>	<b>12,4</b>
<b>0-14</b>	31	32	33	27	37	26	31	40	35	<b>-38,1</b>	-	-
<b>15-19</b>	99	99	95	84	57	77	75	70	85	-	<b>-32,9</b>	-
<b>20-24</b>	178	197	181	189	189	187	211	186	155	<b>77,9</b>	-	-
<b>25-29</b>	274	328	342	312	326	349	384	395	379	<b>170,7</b>	<b>61,6</b>	<b>26,8</b>
<b>30-34</b>	391	423	442	423	446	424	487	525	541	<b>97,9</b>	<b>46,6</b>	<b>31,9</b>
<b>35-39</b>	497	537	557	523	528	579	679	590	612	<b>40,2</b>	<b>35,7</b>	-
<b>40-44</b>	752	753	784	704	694	658	702	716	772	-	<b>-11,9</b>	-
<b>45-49</b>	1159	1263	1309	1205	1076	975	1039	952	909	<b>71,6</b>	<b>-21,9</b>	<b>-21,7</b>
<b>50-54</b>	1249	1398	1467	1451	1363	1420	1475	1514	1377	<b>277,9</b>	<b>13,4</b>	-
<b>55-59</b>	1217	1269	1420	1434	1397	1329	1471	1495	1445	<b>350,9</b>	<b>53,9</b>	-
<b>60-64</b>	623	635	681	817	987	1181	1266	1360	1390	<b>164,7</b>	<b>167,9</b>	<b>71,1</b>
<b>65-69</b>	933	922	811	676	569	522	556	649	741	-	<b>-35,1</b>	-
<b>70-74</b>	533	505	538	581	611	632	658	689	606	<b>87,0</b>	<b>44,6</b>	-
<b>75-79</b>	389	374	325	329	283	268	337	350	417	<b>101,7</b>	-	-
<b>80-84</b>	133	143	175	157	195	168	181	198	176	<b>91,6</b>	<b>63,5</b>	-
<b>85 и ст.</b>	47	54	78	72	77	84	84	96	102	<b>69,4</b>	<b>114,6</b>	<b>43,4</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 176**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО щитовидной железы(С73) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>711</b>	<b>807</b>	<b>849</b>	<b>885</b>	<b>892</b>	<b>997</b>	<b>1037</b>	<b>1075</b>	<b>1169</b>	<b>1152</b>	<b>1094</b>	<b>1141</b>
<b>0-14</b>	12	15	23	10	13	18	10	10	11	9	11	12
<b>15-19</b>	14	11	13	14	16	23	41	32	18	21	33	30
<b>20-24</b>	14	25	14	16	16	17	27	27	28	20	39	29
<b>25-29</b>	26	28	21	29	32	25	31	29	43	39	25	30
<b>30-34</b>	33	43	46	41	33	41	38	38	44	41	33	56
<b>35-39</b>	52	48	61	57	60	56	73	67	79	69	62	50
<b>40-44</b>	63	71	72	72	85	82	101	104	96	120	108	125
<b>45-49</b>	60	83	103	112	118	123	111	121	125	154	122	148
<b>50-54</b>	64	82	53	83	75	105	130	144	170	171	170	152
<b>55-59</b>	85	109	119	118	106	107	80	85	90	100	127	142
<b>60-64</b>	88	105	102	104	123	147	132	156	164	112	98	82
<b>65-69</b>	86	98	113	110	109	133	119	108	132	132	121	132
<b>70-74</b>	40	44	62	74	62	76	89	97	90	96	76	80
<b>75-79</b>	41	21	20	27	26	29	32	36	56	45	45	44
<b>80-84</b>	27	19	19	14	13	7	14	12	15	12	15	20
<b>85 и ст.</b>	6	5	8	4	5	8	9	9	8	11	9	9

**Продолжение таблицы 176**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО щитовидной железы(С73) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>1168</b>	<b>1228</b>	<b>1322</b>	<b>1404</b>	<b>1350</b>	<b>1412</b>	<b>1457</b>	<b>1436</b>	<b>1505</b>	<b>97,7</b>	<b>37,4</b>	<b>8,5</b>
<b>0-14</b>	9	12	8	11	12	6	9	10	11	<b>-42,0</b>	-	-
<b>15-19</b>	19	21	21	15	15	16	17	21	16	-	<b>-47,3</b>	-
<b>20-24</b>	37	29	37	40	27	37	37	27	23	<b>102,8</b>	-	-
<b>25-29</b>	36	45	56	47	46	48	62	62	50	<b>168,1</b>	<b>100,0</b>	-
<b>30-34</b>	51	44	52	59	70	70	83	75	86	<b>162,6</b>	<b>126,7</b>	<b>38,9</b>
<b>35-39</b>	72	78	80	102	85	96	113	79	102	<b>101,9</b>	<b>73,3</b>	-
<b>40-44</b>	78	99	109	119	111	109	90	112	122	<b>58,9</b>	-	-
<b>45-49</b>	151	148	180	149	173	143	143	154	142	<b>80,2</b>	-	-
<b>50-54</b>	166	190	183	205	206	207	218	194	226	<b>258,8</b>	<b>37,7</b>	-
<b>55-59</b>	153	192	214	216	197	204	217	213	211	<b>213,9</b>	<b>56,8</b>	-
<b>60-64</b>	84	92	111	150	153	193	187	223	203	<b>94,1</b>	<b>244,0</b>	<b>46,3</b>
<b>65-69</b>	125	116	118	119	84	95	90	96	112	-	<b>-26,2</b>	-
<b>70-74</b>	99	65	70	92	86	106	102	92	103	<b>73,9</b>	<b>35,7</b>	-
<b>75-79</b>	65	58	58	52	46	40	44	45	49	<b>92,2</b>	-	-
<b>80-84</b>	16	29	18	19	35	32	29	25	32	<b>123,3</b>	<b>93,7</b>	-
<b>85 и ст.</b>	7	10	7	9	4	10	16	8	17	<b>113,2</b>	<b>82,2</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 176**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО щитовидной железы(С73) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>3658</b>	<b>3913</b>	<b>4101</b>	<b>4585</b>	<b>5040</b>	<b>5469</b>	<b>5971</b>	<b>6431</b>	<b>6949</b>	<b>7106</b>	<b>6894</b>	<b>7117</b>
<b>0-14</b>	22	45	26	29	41	33	35	35	23	36	29	29
<b>15-19</b>	43	57	47	49	69	79	81	98	80	90	78	64
<b>20-24</b>	76	95	92	104	88	127	148	139	137	148	146	148
<b>25-29</b>	122	137	156	132	158	181	196	215	240	252	208	225
<b>30-34</b>	231	260	260	247	264	246	270	324	339	338	297	357
<b>35-39</b>	355	350	344	381	453	466	467	532	518	448	417	406
<b>40-44</b>	393	429	413	530	560	629	696	766	809	806	697	702
<b>45-49</b>	335	435	547	612	663	777	867	862	993	1004	1014	984
<b>50-54</b>	351	315	330	370	469	551	772	965	1100	1139	1148	1113
<b>55-59</b>	397	455	433	588	560	502	460	430	474	574	680	878
<b>60-64</b>	363	369	393	427	501	615	700	768	834	762	681	603
<b>65-69</b>	405	423	424	474	481	496	476	478	550	639	703	750
<b>70-74</b>	243	260	307	329	416	414	448	428	434	442	384	403
<b>75-79</b>	180	139	154	151	162	208	199	255	280	279	278	293
<b>80-84</b>	100	100	116	108	90	91	96	78	80	98	89	114
<b>85 и ст.</b>	42	44	59	54	65	54	60	58	58	51	45	48

**Продолжение таблицы 176**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО щитовидной железы(С73) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>7337</b>	<b>7704</b>	<b>7916</b>	<b>7580</b>	<b>7485</b>	<b>7467</b>	<b>8179</b>	<b>8389</b>	<b>8237</b>	<b>110,7</b>	<b>17,5</b>	<b>13,1</b>
<b>0-14</b>	22	20	25	16	25	20	22	30	24	-36,4	-	-
<b>15-19</b>	80	78	74	69	42	61	58	49	69	-	-	-
<b>20-24</b>	141	168	144	149	162	150	174	159	132	73,4	-	-
<b>25-29</b>	238	283	286	265	280	301	322	333	329	171,1	56,3	27,3
<b>30-34</b>	340	379	390	364	376	354	404	450	455	90,0	37,3	30,7
<b>35-39</b>	425	459	477	421	443	483	566	511	510	32,5	30,1	-
<b>40-44</b>	674	654	675	585	583	549	612	604	650	-	-14,7	-
<b>45-49</b>	1008	1115	1129	1056	903	832	896	798	767	70,3	-25,4	-23,7
<b>50-54</b>	1083	1208	1284	1246	1157	1213	1257	1320	1151	281,2	-	-
<b>55-59</b>	1064	1077	1206	1218	1200	1125	1254	1282	1234	386,2	53,4	-
<b>60-64</b>	539	543	570	667	834	988	1079	1137	1187	182,5	157,1	76,4
<b>65-69</b>	808	806	693	557	485	427	466	553	629	34,2	-36,6	-
<b>70-74</b>	434	440	468	489	525	526	556	597	503	89,7	46,3	-
<b>75-79</b>	324	316	267	277	237	228	293	305	368	103,3	-	-
<b>80-84</b>	117	114	157	138	160	136	152	173	144	86,7	58,7	-
<b>85 и ст.</b>	40	44	71	63	73	74	68	88	85	64,1	120,3	34,1

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 177

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО щитовидной железы (C73), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>0-9</b>	0,05	0,09	0,04	0,04	0,02	0,04	0,04	0,03	0,05	0,05	0,07	0,05
<b>10-19</b>	0,37	0,49	0,45	0,41	0,58	0,62	0,68	0,72	0,54	0,67	0,64	0,61
<b>20-29</b>	1,21	1,45	1,43	1,41	1,45	1,70	1,93	1,95	2,12	2,15	1,88	1,90
<b>30-39</b>	2,66	2,80	2,90	3,03	3,48	3,59	3,90	4,57	4,82	4,51	4,11	4,45
<b>40-49</b>	4,69	5,17	5,37	5,99	6,27	6,90	7,49	7,74	8,40	8,65	8,10	8,28
<b>50-59</b>	5,26	5,91	6,03	7,74	8,27	8,87	10,21	11,40	12,67	13,13	13,12	13,10
<b>60-69</b>	6,22	6,70	7,08	7,72	8,38	9,50	9,67	10,25	11,51	11,57	11,70	12,07
<b>70-79</b>	7,84	7,08	7,98	7,99	8,47	8,60	8,56	8,70	8,94	8,86	8,12	8,75
<b>80 и ст.</b>	5,47	5,16	6,17	5,62	5,58	5,31	6,06	5,42	5,67	6,06	5,86	6,77
<b>15-59</b>	2,99	3,32	3,40	3,87	4,16	4,50	4,99	5,40	5,85	5,98	5,71	5,90
<b>«Грубый» показатель</b>	2,95	3,19	3,35	3,71	4,04	4,41	4,80	5,17	5,65	5,78	5,57	5,79
<b>Стандарт. показатель</b>	2,37	2,58	2,69	2,95	3,20	3,45	3,72	3,96	4,29	4,37	4,20	4,32
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	0,03	0,03	0,02	0,04	0,04	0,03	0,03	0,05	0,07	-	-	-
<b>10-19</b>	0,63	0,67	0,70	0,64	0,57	0,65	0,70	0,73	0,79	<b>55,5</b>	-	<b>32,1</b>
<b>20-29</b>	1,96	2,22	2,18	2,06	2,10	2,19	2,48	2,46	2,33	<b>77,8</b>	<b>28,8</b>	<b>19,1</b>
<b>30-39</b>	4,55	4,85	4,98	4,65	4,71	4,81	5,46	5,15	5,23	<b>86,2</b>	<b>22,9</b>	<b>15,2</b>
<b>40-49</b>	8,26	8,87	9,47	8,91	8,53	7,99	8,89	8,67	8,84	<b>68,7</b>	-	-
<b>50-59</b>	13,24	13,67	14,40	14,04	13,20	13,09	13,59	13,80	12,93	<b>123,1</b>	-	-
<b>60-69</b>	12,64	13,08	12,81	13,12	13,75	14,97	15,08	15,81	15,58	<b>147,4</b>	<b>37,1</b>	<b>20,2</b>
<b>70-79</b>	10,03	9,58	9,29	9,58	9,23	9,20	9,95	10,54	10,84	<b>35,2</b>	<b>20,9</b>	<b>17,5</b>
<b>80 и ст.</b>	6,02	6,14	7,33	6,18	6,92	6,26	6,17	6,72	6,32	<b>23,1</b>	-	-
<b>15-59</b>	6,04	6,45	6,81	6,56	6,35	6,29	6,90	6,87	6,76	<b>111,9</b>	<b>16,9</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	5,99	6,27	6,50	6,33	6,23	6,26	6,74	6,86	6,79	<b>117,8</b>	<b>19,7</b>	<b>10,9</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	4,42	4,65	4,80	4,63	4,52	4,55	4,87	4,91	4,85	<b>90,5</b>	<b>13,7</b>	<b>8,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 177**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО щитовидной железы (C73), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>0-9</b>	0,05	0,08	0,01	0,02	0,01	0,04	0,03	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>10-19</b>	0,19	0,16	0,30	0,19	0,24	0,32	0,41	0,34	0,23	0,24	0,37	0,37
<b>20-29</b>	0,40	0,53	0,35	0,44	0,46	0,40	0,55	0,52	0,66	0,55	0,57	0,52
<b>30-39</b>	0,67	0,73	0,87	0,82	0,80	0,86	1,02	0,99	1,20	1,10	0,97	1,10
<b>40-49</b>	1,39	1,60	1,70	1,71	1,84	1,81	1,85	1,94	1,90	2,36	2,01	2,42
<b>50-59</b>	1,93	2,60	2,47	3,00	2,76	3,31	3,29	3,54	3,95	3,94	4,05	3,74
<b>60-69</b>	2,96	3,49	3,73	3,71	4,00	4,76	4,23	4,47	5,08	4,33	4,06	4,23
<b>70-79</b>	4,79	3,76	4,51	5,08	3,96	4,26	4,51	4,67	4,95	4,69	4,00	4,19
<b>80 и ст.</b>	5,17	3,67	4,11	2,80	2,88	2,46	3,82	3,52	3,89	3,87	4,62	5,29
<b>15-59</b>	0,92	1,11	1,11	1,20	1,20	1,28	1,40	1,43	1,53	1,62	1,56	1,64
<b>«Грубый» показатель</b>	1,02	1,16	1,22	1,28	1,29	1,45	1,52	1,58	1,74	1,73	1,64	1,72
<b>Стандарт. показатель</b>	0,93	1,04	1,07	1,14	1,12	1,24	1,28	1,31	1,43	1,40	1,34	1,38
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	0,04	0,03	0,01	0,04	0,04	0,01	0,00	0,01	0,05	-	-	-
<b>10-19</b>	0,25	0,32	0,31	0,27	0,30	0,27	0,35	0,42	0,33	<b>50,5</b>	-	-
<b>20-29</b>	0,63	0,62	0,77	0,71	0,59	0,69	0,82	0,74	0,63	<b>85,3</b>	<b>26,9</b>	-
<b>30-39</b>	1,27	1,25	1,33	1,60	1,52	1,61	1,86	1,44	1,73	<b>169,0</b>	<b>69,0</b>	-
<b>40-49</b>	2,08	2,28	2,75	2,63	2,87	2,58	2,49	2,88	2,89	<b>97,2</b>	<b>35,0</b>	-
<b>50-59</b>	3,82	4,39	4,44	4,60	4,33	4,39	4,49	4,17	4,46	<b>91,3</b>	<b>13,0</b>	-
<b>60-69</b>	4,40	4,54	5,10	6,09	5,35	6,43	5,70	6,22	5,71	<b>82,3</b>	<b>54,2</b>	-
<b>70-79</b>	5,61	4,18	4,28	4,69	4,22	4,63	4,51	4,32	5,04	-	-	-
<b>80 и ст.</b>	3,89	5,93	3,38	3,40	4,35	4,53	4,50	3,20	4,69	-	-	-
<b>15-59</b>	1,63	1,80	1,99	2,04	2,01	2,02	2,14	2,06	2,17	<b>127,4</b>	<b>38,7</b>	<b>6,6</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	1,77	1,86	2,01	2,14	2,06	2,15	2,20	2,17	2,26	<b>111,4</b>	<b>37,4</b>	<b>6,7</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	1,42	1,50	1,60	1,71	1,60	1,69	1,71	1,68	1,73	<b>78,1</b>	<b>29,5</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 177**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО щитовидной железы (C73), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>0-9</b>	0,06	0,11	0,06	0,06	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,06	0,11	0,06
<b>10-19</b>	0,55	0,83	0,60	0,65	0,93	0,94	0,96	1,11	0,86	1,11	0,92	0,86
<b>20-29</b>	2,06	2,42	2,57	2,42	2,49	3,07	3,37	3,41	3,60	3,78	3,20	3,30
<b>30-39</b>	4,65	4,88	4,93	5,25	6,16	6,32	6,78	8,17	8,49	7,99	7,19	7,75
<b>40-49</b>	7,85	8,57	8,84	10,03	10,43	11,69	12,78	13,16	14,48	14,51	13,70	13,65
<b>50-59</b>	8,04	8,63	8,93	11,58	12,75	13,42	15,92	17,94	19,97	20,82	20,61	20,76
<b>60-69</b>	8,28	8,78	9,28	10,38	11,31	12,68	13,33	14,13	15,79	16,32	16,68	17,08
<b>70-79</b>	8,94	8,28	9,24	9,08	10,25	10,39	10,29	10,46	10,70	10,72	10,00	10,85
<b>80 и ст.</b>	5,54	5,54	6,69	6,33	6,26	6,03	6,63	5,92	6,14	6,64	6,16	7,13
<b>15-59</b>	5,01	5,47	5,62	6,44	7,02	7,61	8,46	9,25	10,02	10,18	9,65	9,93
<b>«Грубый» показатель</b>	4,65	4,99	5,23	5,86	6,46	7,03	7,70	8,33	9,08	9,33	8,98	9,31
<b>Стандарт. показатель</b>	3,60	3,89	4,07	4,51	4,97	5,35	5,83	6,26	6,75	6,91	6,59	6,75
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,06	0,05	0,09	0,09	-	-	-
<b>10-19</b>	1,03	1,03	1,12	1,02	0,84	1,05	1,07	1,05	1,28	<b>58,2</b>	-	-
<b>20-29</b>	3,30	3,84	3,60	3,43	3,64	3,71	4,17	4,21	4,07	<b>73,7</b>	<b>29,9</b>	<b>22,5</b>
<b>30-39</b>	7,76	8,37	8,54	7,61	7,81	7,91	8,94	8,75	8,65	<b>72,9</b>	<b>16,1</b>	<b>17,2</b>
<b>40-49</b>	13,91	14,87	15,58	14,63	13,68	12,92	14,76	14,00	14,33	<b>61,9</b>	-	-
<b>50-59</b>	20,87	21,15	22,42	21,62	20,33	20,06	20,95	21,62	19,83	<b>126,9</b>	-	-
<b>60-69</b>	17,82	18,42	17,65	17,58	19,16	20,51	21,37	22,29	22,24	<b>164,3</b>	<b>37,1</b>	<b>27,2</b>
<b>70-79</b>	12,10	12,13	11,67	11,91	11,62	11,37	12,55	13,49	13,55	<b>49,3</b>	<b>24,3</b>	<b>19,2</b>
<b>80 и ст.</b>	6,54	6,19	8,41	6,97	7,68	6,78	6,67	7,80	6,82	<b>26,2</b>	-	-
<b>15-59</b>	10,19	10,82	11,33	10,79	10,41	10,30	11,35	11,39	11,07	<b>105,4</b>	<b>13,2</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	9,64	10,07	10,37	9,94	9,81	9,79	10,64	10,90	10,69	<b>115,8</b>	<b>16,6</b>	<b>11,7</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	6,90	7,26	7,43	7,03	6,92	6,92	7,49	7,58	7,44	<b>89,4</b>	<b>11,0</b>	<b>9,6</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 178

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО щитовидной железы (C73),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	54,0	52,9	53,1	53,3	52,7	52,4	51,7	51,6	51,9	52,0	52,6	52,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	53,2	52,2	52,9	52,9	52,7	52,6	52,2	52,0	52,4	52,5	52,8	52,9
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,25	0,27	0,28	0,31	0,33	0,36	0,38	0,40	0,44	0,45	0,44	0,45
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	53,5	53,0	53,0	53,5	53,9	54,1	54,1	54,8	55,0	3,3	4,3	2,7
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	53,3	52,8	52,8	53,1	53,3	53,3	53,2	53,7	53,8	1,9	1,6	1,2
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,47	0,49	0,50	0,49	0,48	0,48	0,51	0,52	0,51	95,0	14,3	7,5
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	56,0	54,9	55,8	55,4	54,9	55,4	53,3	53,8	54,1	53,0	53,4	53,0
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	53,9	52,5	53,1	53,6	53,0	53,5	52,5	53,1	53,7	53,3	52,6	52,6
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,10	0,11	0,12	0,13	0,12	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14	0,15

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 178**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО щитовидной железы (C73),  
Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
	1993-2013	2003-2013	2008-2013									
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	54,0	53,6	53,2	53,9	53,3	54,4	54,0	54,6	54,4	-2,7	2,3	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	53,5	53,0	52,3	52,8	52,7	53,2	52,7	53,0	53,5	-	-	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,16	0,16	0,17	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	-	-	-
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	53,6	52,4	52,5	52,8	52,4	51,8	51,5	51,3	51,5	51,9	52,4	52,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	53,1	52,1	52,8	52,8	52,6	52,4	52,2	51,8	52,2	52,3	52,8	53,0
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,36	0,39	0,41	0,45	0,50	0,54	0,58	0,62	0,68	0,70	0,67	0,70
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	53,4	52,9	53,0	53,5	54,0	54,1	54,1	54,8	55,1	4,6	4,6	2,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	53,3	52,8	52,9	53,2	53,4	53,3	53,2	53,8	53,9	2,3	1,8	1,3
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,72	0,75	0,76	0,73	0,72	0,71	0,77	0,79	0,77	98,6	11,7	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Таблица 179**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО щитовидной железы (C73) в зависимости от пола и возраста, Россия, 2012-2013 гг.**

Возраст	Оба пола		Мужчины		Женщины	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>Всего</b>	1164	1095	335	308	829	787
<b>0-14</b>	0	0	0	0	0	0
<b>15-19</b>	0	0	0	0	0	0
<b>20-24</b>	2	1	2	1	0	0
<b>25-29</b>	2	6	1	1	1	5
<b>30-34</b>	4	6	4	3	0	3
<b>35-39</b>	12	4	7	4	5	0
<b>40-44</b>	20	14	8	10	12	4
<b>45-49</b>	39	24	23	6	16	18
<b>50-54</b>	62	64	30	40	32	24
<b>55-59</b>	99	89	44	26	55	63
<b>60-64</b>	143	141	52	52	91	89
<b>65-69</b>	96	111	35	41	61	70
<b>70-74</b>	217	186	57	50	160	136
<b>75-79</b>	204	204	40	38	164	166
<b>80-84</b>	159	136	21	21	138	115
<b>85 и ст.</b>	105	109	11	15	94	94

**Таблица 180**

**Динамика показателей смертности от ЗНО щитовидной железы (С73), Россия, 2012-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	Оба пола		Мужчины		Женщины	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>0-9</b>	0	0	0	0	0	0
<b>10-19</b>	0	0	0	0	0	0
<b>20-29</b>	0,02	0,03	0,03	0,02	0,01	0,04
<b>30-39</b>	0,07	0,05	0,10	0,06	0,05	0,03
<b>40-49</b>	0,31	0,20	0,34	0,18	0,28	0,22
<b>50-59</b>	0,74	0,70	0,76	0,67	0,72	0,72
<b>60-69</b>	1,88	1,84	1,70	1,69	2,00	1,95
<b>70-79</b>	4,27	4,13	3,06	2,92	4,85	4,70
<b>80 и ст.</b>	6,03	5,57	3,11	3,45	6,93	6,22
<b>15-59</b>	0,26	0,22	0,26	0,20	0,25	0,24
<b>«Грубый» показатель</b>	0,81	0,76	0,51	0,46	1,08	1,02
<b>Стандарт. показатель</b>	0,44	0,41	0,37	0,34	0,46	0,44

**Таблица 181**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО щитовидной железы (C73),  
Россия, 2011-2013 гг.**

Показатель	Оба пола		Мужчины		Женщины	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	72,4	72,4	64,7	66,3	74,4	74,3
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	70,1	70,4	64,3	65,7	72,4	72,3
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05

Таблица 182

## Динамика показателей диагностики ЗНО щитовидной железы (C73), Россия, 1993-2013 гг.

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	4216	4575	4779	5283	5781	6284	6794	7283	7868	7996	7750
из них доля выявленных активно, %	8,4	8,8	10,7	10,5	10,2	11,1	9,7	12,1	12,3	15,5	12,7
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	90,9	92,8	93,0	93,8	92,5	94,3	94,6	94,8	95,5	95,1	96,1
*I-II ст., %	56,9	57,6	58,5	60,7	61,8	61,7	67,4	69,0	71,8	72,6	73,3
*III ст., %	28,2	27,7	25,0	22,7	22,1	22,1	19,1	18,1	16,5	16,3	16,1
*IV ст., %	11,4	11,8	13,4	13,3	13,2	13,2	11,3	10,3	9,1	8,5	8,5
Показатель одногодичной летальности, %	15,4	14,4	13,4	12,7	11,9	11,1	9,8	8,5	7,9	7,6	7,4
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	7984	8180	8582	8882	8571	8424	8488	9161	9203	9092	
из них доля выявленных активно, %	14,8	15,8	16,7	17,4	17,4	17,9	17,6	18,5	19,2	21,5	
*доля морфологически подтвержденных диагнозов, %	97,0	97,0	96,7	96,8	96,8	97,5	97,5	97,9	97,9	97,9	
*I-II ст., %	74,7	73,7	75,0	74,9	74,9	73,9	73,8	74,7	74,8	73,9	
*III ст., %	16,0	16,4	15,4	15,9	15,5	16,4	16,5	15,5	15,8	16,4	
*IV ст., %	7,4	8,6	8,5	8,0	8,4	8,6	8,6	8,0	7,8	8,2	
Показатель одногодичной летальности, %	6,8	6,4	6,2	5,9	6,0	5,7	5,2	5,3	4,4	4,7	

\* начиная с 2011 г., в формах статистической отчетности диагностической единицей является злокачественное новообразование (ранее больной)

Таблица 183

**Динамика сведений о контингенте больных с ЗНО щитовидной железы (C73), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных, состоящих на учете на конец года	37167	39921	42616	45894	49755	53358	57735	62878	68015	73224	78936
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	58,9	59,7	58,1	57,7	56,7	56,5	56,3	56,1	55,3	55,7	55,6
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	-	84,6	82,0	80,8	80,9	81,1	81,4	82,7	81,9	81,9	82,3
Показатель распространенности на 100 000 населения	25,1	27,0	28,8	31,1	33,9	36,4	39,6	43,3	47,3	51,2	55,0
Индекс накопления контингента	8,8	8,7	8,9	8,7	8,6	8,5	8,5	8,6	8,6	9,2	10,2
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных, состоящих на учете на конец года	83546	88587	94478	100044	106220	111493	116741	122742	127758	133391	
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	57,1	59,3	60,6	61,4	61,6	62,0	63,4	65,1	65,2	67,1	
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	82,6	83,5	84,2	83,9	82,9	82,8	83,6	84,6	83,3	84,3	
Показатель распространенности на 100 000 населения	58,6	62,4	66,3	70,4	74,8	78,6	82,3	85,9	89,2	93,0	
Индекс накопления контингента	10,5	10,8	11,0	11,3	12,4	13,2	13,8	13,4	13,9	14,7	

Таблица 184

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (С81-96) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>17506</b>	<b>17956</b>	<b>18241</b>	<b>18972</b>	<b>18918</b>	<b>19107</b>	<b>19348</b>	<b>19848</b>	<b>19767</b>	<b>20632</b>	<b>20776</b>	<b>21808</b>
<b>0-14</b>	1587	1632	1568	1494	1418	1345	1306	1269	1163	1100	1150	1123
<b>15-19</b>	654	676	737	693	773	714	799	817	718	776	728	787
<b>20-24</b>	646	713	711	825	726	747	709	717	745	793	799	797
<b>25-29</b>	605	645	642	645	709	653	695	748	711	705	702	728
<b>30-34</b>	711	733	681	699	696	677	653	596	683	650	740	697
<b>35-39</b>	818	803	763	813	875	776	775	813	740	742	734	725
<b>40-44</b>	889	907	899	982	1022	958	992	1024	1069	1107	1045	1063
<b>45-49</b>	809	1003	1114	1256	1235	1245	1249	1277	1342	1352	1379	1480
<b>50-54</b>	1227	1125	964	907	999	1181	1319	1552	1706	1862	1865	1922
<b>55-59</b>	1734	1984	2090	2098	1934	1678	1335	1232	1148	1324	1557	1930
<b>60-64</b>	2295	2168	1986	2065	2180	2331	2556	2748	2738	2450	2197	1935
<b>65-69</b>	2457	2537	2709	2759	2570	2503	2343	2344	2169	2457	2708	3077
<b>70-74</b>	1393	1528	1759	2063	2150	2503	2599	2666	2609	2724	2506	2424
<b>75-79</b>	990	810	928	993	989	1116	1296	1329	1531	1767	1837	2162
<b>80-84</b>	518	528	521	505	450	462	513	461	481	574	611	724
<b>85 и ст.</b>	173	164	169	175	192	218	209	255	214	249	218	234

**Продолжение таблицы 184**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (С81-96) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>22020</b>	<b>22435</b>	<b>22834</b>	<b>23640</b>	<b>24388</b>	<b>24470</b>	<b>24325</b>	<b>24361</b>	<b>24829</b>	<b>45,6</b>	<b>18,5</b>	<b>3,4</b>
<b>0-14</b>	1080	1126	1093	1092	1180	1218	1147	1280	1316	-26,9	16,4	17,7
<b>15-19</b>	711	714	600	588	543	542	421	458	415	-35,4	-47,2	-29,5
<b>20-24</b>	829	884	799	901	835	791	775	690	614	-	-17,3	-29,0
<b>25-29</b>	768	741	822	799	881	900	913	913	899	51,1	33,1	-
<b>30-34</b>	723	770	777	779	859	827	840	812	928	31,4	25,4	-
<b>35-39</b>	702	705	748	809	852	821	873	869	900	-	30,1	9,9
<b>40-44</b>	964	996	958	895	932	892	833	955	905	-	-15,4	-
<b>45-49</b>	1485	1482	1458	1459	1538	1474	1321	1247	1267	34,5	-	-18,3
<b>50-54</b>	1949	1957	2011	2161	2302	2280	2139	2216	2161	151,6	20,1	-
<b>55-59</b>	2165	2369	2466	2702	2683	2639	2686	2748	2908	86,6	61,5	-
<b>60-64</b>	1628	1548	1832	2186	2559	3019	3259	3169	3274	36,2	116,4	47,3
<b>65-69</b>	3361	3380	3149	2757	2348	2000	1838	2025	2498	-	-36,7	-
<b>70-74</b>	2342	2360	2703	2909	3314	3386	3450	3214	2701	87,8	39,3	-
<b>75-79</b>	2203	2134	2046	2104	1969	1933	2045	2068	2322	176,9	-	-
<b>80-84</b>	825	993	1063	1138	1209	1295	1275	1212	1141	329,7	85,9	-
<b>85 и ст.</b>	285	276	309	361	384	453	510	485	580	369,8	202,0	61,6

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 184**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (С81-96) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>9020</b>	<b>9231</b>	<b>9304</b>	<b>9584</b>	<b>9620</b>	<b>9592</b>	<b>9780</b>	<b>10040</b>	<b>9910</b>	<b>10361</b>	<b>10183</b>	<b>10609</b>
<b>0-14</b>	936	963	905	910	844	785	772	726	660	670	667	649
<b>15-19</b>	362	380	416	377	415	414	418	437	404	441	390	432
<b>20-24</b>	331	355	351	426	400	347	359	379	385	405	395	416
<b>25-29</b>	292	346	335	322	345	317	356	360	314	342	324	340
<b>30-34</b>	354	347	341	338	361	336	314	303	333	317	342	336
<b>35-39</b>	415	413	410	420	460	413	421	424	400	398	383	365
<b>40-44</b>	507	504	466	540	556	510	555	550	576	582	570	571
<b>45-49</b>	445	556	635	658	697	694	718	700	743	764	775	791
<b>50-54</b>	682	633	510	502	547	628	758	870	947	1038	993	1018
<b>55-59</b>	964	1075	1136	1113	1076	921	719	698	611	709	855	1027
<b>60-64</b>	1219	1149	1033	1099	1096	1179	1352	1429	1391	1210	1074	981
<b>65-69</b>	1219	1250	1340	1358	1256	1277	1096	1154	1073	1201	1269	1389
<b>70-74</b>	595	658	765	864	942	1076	1172	1239	1224	1266	1118	1044
<b>75-79</b>	422	328	381	415	378	444	492	519	575	708	725	885
<b>80-84</b>	198	219	223	186	174	172	196	162	193	212	217	273
<b>85 и ст.</b>	79	55	57	56	73	79	82	90	81	98	86	92

**Продолжение таблицы 184**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (С81-96) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>10704</b>	<b>10807</b>	<b>11186</b>	<b>11640</b>	<b>11898</b>	<b>11904</b>	<b>11875</b>	<b>11738</b>	<b>11858</b>	<b>35,6</b>	<b>17,0</b>	<b>-</b>
<b>0-14</b>	617	662	628	646	688	742	647	760	780	-27,3	19,5	-
<b>15-19</b>	397	391	316	328	284	283	248	255	211	-37,1	-47,9	-30,7
<b>20-24</b>	411	430	408	460	433	401	390	331	303	-	-18,4	-32,7
<b>25-29</b>	391	328	394	376	461	427	470	416	412	42,1	34,1	-
<b>30-34</b>	346	368	408	385	422	404	452	403	478	36,5	37,6	-
<b>35-39</b>	371	340	380	448	415	427	455	452	448	-	29,4	-
<b>40-44</b>	521	529	511	498	501	503	461	498	476	-	-16,2	-
<b>45-49</b>	789	776	784	766	879	824	724	659	685	30,5	-	-
<b>50-54</b>	1035	1087	1081	1162	1276	1248	1156	1196	1167	144,7	22,3	-
<b>55-59</b>	1134	1257	1329	1457	1404	1335	1423	1447	1526	75,2	56,7	-
<b>60-64</b>	844	722	954	1051	1272	1495	1581	1589	1594	-	111,8	48,3
<b>65-69</b>	1527	1573	1477	1264	1085	913	880	940	1189	-	-35,0	-
<b>70-74</b>	1026	1030	1199	1337	1422	1460	1490	1360	1106	81,4	31,8	-
<b>75-79</b>	900	883	818	886	756	788	850	847	899	178,9	-	-
<b>80-84</b>	278	338	391	443	453	499	476	416	397	271,2	86,5	-
<b>85 и ст.</b>	117	93	108	133	147	155	172	169	187	283,2	137,2	38,7

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 184**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (С81-96) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Всего</b>	<b>8486</b>	<b>8725</b>	<b>8937</b>	<b>9388</b>	<b>9298</b>	<b>9515</b>	<b>9568</b>	<b>9808</b>	<b>9857</b>	<b>10271</b>	<b>10593</b>	<b>11199</b>
<b>0-14</b>	651	669	663	584	574	560	534	543	503	430	483	474
<b>15-19</b>	292	296	321	316	358	300	381	380	314	335	338	355
<b>20-24</b>	315	358	360	399	326	400	350	338	360	388	404	381
<b>25-29</b>	313	299	307	323	364	336	339	388	397	363	378	388
<b>30-34</b>	357	386	340	361	335	341	339	293	350	333	398	361
<b>35-39</b>	403	390	353	393	415	363	354	389	340	344	351	360
<b>40-44</b>	382	403	433	442	466	448	437	474	493	525	475	492
<b>45-49</b>	364	447	479	598	538	551	531	577	599	588	604	689
<b>50-54</b>	545	492	454	405	452	553	561	682	759	824	872	904
<b>55-59</b>	770	909	954	985	858	757	616	534	537	615	702	903
<b>60-64</b>	1076	1019	953	966	1084	1152	1204	1319	1347	1240	1123	954
<b>65-69</b>	1238	1287	1369	1401	1314	1226	1247	1190	1096	1256	1439	1688
<b>70-74</b>	798	870	994	1199	1208	1427	1427	1427	1385	1458	1388	1380
<b>75-79</b>	568	482	547	578	611	672	804	810	956	1059	1112	1277
<b>80-84</b>	320	309	298	319	276	290	317	299	288	362	394	451
<b>85 и ст.</b>	94	109	112	119	119	139	127	165	133	151	132	142

**Продолжение таблицы 184**

**Динамика абсолютного числа впервые выявленных ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (С81-96) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>11316</b>	<b>11628</b>	<b>11648</b>	<b>12000</b>	<b>12490</b>	<b>12566</b>	<b>12450</b>	<b>12623</b>	<b>12971</b>	<b>56,3</b>	<b>20,0</b>	<b>6,1</b>
<b>0-14</b>	463	464	465	446	492	476	500	520	536	-26,3	12,3	17,8
<b>15-19</b>	314	323	284	260	259	259	173	203	204	-33,3	-46,5	-
<b>20-24</b>	418	454	391	441	402	390	385	359	311	-	-16,2	-25,0
<b>25-29</b>	377	413	428	423	420	473	443	497	487	60,3	32,1	18,0
<b>30-34</b>	377	402	369	394	437	423	388	409	450	26,6	14,6	-
<b>35-39</b>	331	365	368	361	437	394	418	417	452	-	30,8	-
<b>40-44</b>	443	467	447	397	431	389	372	457	429	-	-14,5	-
<b>45-49</b>	696	706	674	693	659	650	597	588	582	39,5	-12,3	-16,8
<b>50-54</b>	914	870	930	999	1026	1032	983	1020	994	160,3	17,7	-
<b>55-59</b>	1031	1112	1137	1245	1279	1304	1263	1301	1382	100,9	67,2	8,2
<b>60-64</b>	784	826	878	1135	1287	1524	1678	1580	1680	49,0	121,1	46,3
<b>65-69</b>	1834	1807	1672	1493	1263	1087	958	1085	1309	-	-38,1	-
<b>70-74</b>	1316	1330	1504	1572	1892	1926	1960	1854	1595	93,0	45,5	-
<b>75-79</b>	1303	1251	1228	1218	1213	1145	1195	1221	1423	175,6	-	-
<b>80-84</b>	547	655	672	695	756	796	799	796	744	371,6	85,6	-
<b>85 и ст.</b>	168	183	201	228	237	298	338	316	393	434,5	250,5	76,0

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 185

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (C81-96), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>0-9</b>	5,03	5,37	5,35	5,26	5,33	5,37	5,57	5,28	5,08	5,22	5,50	5,79
<b>10-19</b>	5,33	5,43	5,56	5,30	5,44	5,04	5,32	5,64	5,16	5,27	5,22	5,47
<b>20-29</b>	6,35	6,92	6,85	7,36	7,09	6,82	6,74	6,96	6,89	7,02	6,74	6,71
<b>30-39</b>	6,06	6,14	5,89	6,32	6,75	6,45	6,57	6,70	6,99	7,01	7,48	7,29
<b>40-49</b>	9,36	9,71	9,52	10,11	9,92	9,44	9,45	9,61	10,02	10,21	10,12	10,75
<b>50-59</b>	17,38	19,11	19,69	20,07	20,05	20,05	18,79	19,54	19,72	21,08	21,12	22,08
<b>60-69</b>	31,37	31,69	32,22	33,39	32,79	33,01	33,21	34,57	33,62	34,50	35,81	38,60
<b>70-79</b>	37,09	35,69	39,47	42,02	39,93	42,80	43,42	42,60	43,03	46,14	45,02	48,91
<b>80 и ст.</b>	21,60	21,26	21,08	21,24	20,71	22,55	24,43	24,73	24,48	29,00	30,76	33,96
<b>15-59</b>	8,93	9,41	9,37	9,70	9,75	9,38	9,26	9,52	9,63	10,06	10,08	10,59
<b>«Грубый» показатель</b>	11,82	12,14	12,34	12,87	12,87	13,04	13,26	13,67	13,75	14,44	14,48	15,28
<b>Стандарт. показатель</b>	10,03	10,37	10,45	10,78	10,73	10,71	10,77	11,02	10,93	11,33	11,40	11,89
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	5,75	5,77	5,91	5,65	6,14	6,00	5,65	6,21	6,18	<b>19,3</b>	<b>8,9</b>	-
<b>10-19</b>	5,19	5,58	4,96	5,33	5,32	5,78	4,81	5,36	5,22	-	-	-
<b>20-29</b>	6,92	6,87	6,74	6,98	7,01	6,90	7,02	6,77	6,59	-	-	-5,1
<b>30-39</b>	7,30	7,45	7,61	7,80	8,27	7,90	8,02	7,76	8,29	<b>38,5</b>	<b>12,1</b>	-
<b>40-49</b>	10,59	10,91	10,93	10,99	11,90	11,58	11,00	11,45	11,42	<b>25,3</b>	<b>11,2</b>	-
<b>50-59</b>	22,08	22,17	22,34	23,67	23,85	23,41	22,26	22,77	23,23	<b>28,8</b>	<b>7,5</b>	-
<b>60-69</b>	40,52	41,39	42,77	43,45	43,37	44,12	42,18	40,87	42,19	<b>46,5</b>	<b>12,2</b>	-
<b>70-79</b>	49,46	49,00	51,12	52,79	54,56	54,35	54,93	53,60	53,21	<b>52,2</b>	<b>17,5</b>	-
<b>80 и ст.</b>	37,10	39,54	39,75	40,45	40,53	43,43	41,54	38,78	39,09	<b>146,5</b>	<b>21,8</b>	-
<b>15-59</b>	10,69	10,93	10,98	11,51	11,93	11,71	11,42	11,64	11,84	<b>34,6</b>	<b>15,6</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	15,51	15,75	16,07	16,65	17,19	17,24	17,02	17,01	17,30	<b>52,2</b>	<b>18,2</b>	<b>2,1</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	11,94	12,13	12,32	12,62	13,00	13,00	12,53	12,66	12,78	<b>30,0</b>	<b>11,0</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 185**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (C81-96), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>0-9</b>	5,83	6,43	6,06	6,25	6,08	6,08	6,42	6,12	5,54	6,33	5,82	6,49
<b>10-19</b>	5,97	5,93	6,22	5,96	6,08	5,80	5,73	5,95	5,76	5,94	5,90	6,01
<b>20-29</b>	6,18	6,97	6,77	7,31	7,19	6,32	6,73	6,91	6,54	6,95	6,42	6,61
<b>30-39</b>	6,09	6,08	6,12	6,33	7,06	6,66	6,76	6,88	7,15	7,14	7,42	7,25
<b>40-49</b>	10,73	11,04	10,70	11,15	11,36	10,65	11,09	10,80	11,34	11,58	11,73	12,05
<b>50-59</b>	21,27	23,24	23,63	24,10	24,77	24,15	23,13	24,24	23,64	25,37	25,21	26,04
<b>60-69</b>	41,50	41,22	41,13	42,62	40,51	41,73	41,28	43,70	42,26	42,75	43,40	46,82
<b>70-79</b>	60,13	57,01	63,00	64,33	59,42	61,64	62,04	61,76	61,04	65,68	60,87	65,14
<b>80 и ст.</b>	43,38	41,91	42,59	37,68	39,57	41,16	46,21	42,24	46,36	52,16	58,28	66,62
<b>15-59</b>	9,75	10,26	10,19	10,39	10,75	10,13	10,20	10,42	10,42	10,99	10,89	11,39
<b>«Грубый» показатель</b>	12,97	13,29	13,41	13,86	13,96	13,96	14,30	14,77	14,73	15,52	15,26	16,01
<b>Стандарт. показатель</b>	12,44	12,70	12,72	13,02	12,90	12,81	13,00	13,29	13,00	13,66	13,41	14,02
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	6,44	6,62	6,72	6,51	6,78	7,02	6,21	7,20	7,23	<b>17,1</b>	<b>14,9</b>	-
<b>10-19</b>	5,70	6,13	5,19	5,94	5,86	6,38	5,46	5,98	5,44	-	-	-
<b>20-29</b>	6,91	6,38	6,63	6,81	7,24	6,69	7,09	6,24	6,15	-	-	-
<b>30-39</b>	7,42	7,23	7,96	8,29	8,20	8,07	8,62	8,01	8,51	<b>41,2</b>	<b>17,7</b>	-
<b>40-49</b>	11,87	12,06	12,31	12,39	13,94	13,61	12,64	12,55	12,71	<b>25,0</b>	<b>10,7</b>	-
<b>50-59</b>	26,00	26,91	26,97	28,62	28,80	27,61	26,63	27,08	27,50	<b>25,5</b>	-	-
<b>60-69</b>	49,86	50,11	54,12	52,42	53,18	53,77	50,68	49,33	50,48	<b>35,7</b>	-	-
<b>70-79</b>	65,88	65,07	67,39	72,48	69,68	71,24	72,32	69,64	66,54	<b>20,2</b>	<b>11,4</b>	-
<b>80 и ст.</b>	66,74	65,49	67,46	69,94	66,99	70,58	64,80	56,77	55,92	<b>80,5</b>	-	<b>-20,8</b>
<b>15-59</b>	11,55	11,70	11,97	12,61	13,12	12,69	12,63	12,46	12,67	<b>33,8</b>	<b>15,9</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	16,26	16,37	17,00	17,72	18,13	18,14	17,96	17,71	17,84	<b>44,5</b>	<b>17,1</b>	-
<b>Стандарт. показатель</b>	14,17	14,14	14,69	15,08	15,40	15,42	14,88	14,76	14,75	<b>24,2</b>	<b>9,9</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 185**

**Динамика показателей заболеваемости ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (C81-96), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>0-9</b>	4,20	4,26	4,61	4,21	4,55	4,63	4,68	4,41	4,60	4,04	5,17	5,05
<b>10-19</b>	4,67	4,91	4,88	4,61	4,78	4,27	4,89	5,32	4,53	4,58	4,51	4,90
<b>20-29</b>	6,52	6,86	6,92	7,42	6,99	7,34	6,75	7,00	7,24	7,10	7,06	6,80
<b>30-39</b>	6,03	6,21	5,66	6,30	6,44	6,25	6,38	6,51	6,83	6,88	7,54	7,33
<b>40-49</b>	8,05	8,43	8,40	9,13	8,57	8,30	7,91	8,50	8,78	8,92	8,64	9,56
<b>50-59</b>	14,14	15,71	16,48	16,81	16,23	16,70	15,21	15,63	16,45	17,49	17,75	18,84
<b>60-69</b>	24,96	25,55	26,38	27,26	27,62	27,15	27,78	28,44	27,88	29,08	30,87	33,35
<b>70-79</b>	28,86	28,05	30,89	33,63	32,25	35,05	35,48	34,25	35,08	37,42	37,77	41,42
<b>80 и ст.</b>	16,16	16,07	15,68	17,11	15,96	17,84	18,87	20,18	18,73	22,86	24,18	26,09
<b>15-59</b>	8,13	8,59	8,58	9,03	8,79	8,66	8,35	8,66	8,87	9,16	9,31	9,84
<b>«Грубый» показатель</b>	10,79	11,12	11,40	12,00	11,92	12,23	12,34	12,70	12,88	13,49	13,81	14,65
<b>Стандарт. показатель</b>	8,56	8,87	9,04	9,34	9,32	9,37	9,29	9,52	9,60	9,76	10,12	10,53
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	5,03	4,88	5,07	4,74	5,48	4,93	5,06	5,17	5,07	<b>22,3</b>	-	-
<b>10-19</b>	4,65	5,00	4,71	4,69	4,76	5,15	4,13	4,72	4,99	-	-	-
<b>20-29</b>	6,92	7,37	6,86	7,15	6,77	7,11	6,96	7,32	7,05	-	-	-
<b>30-39</b>	7,18	7,66	7,26	7,32	8,33	7,73	7,43	7,52	8,08	<b>35,9</b>	-	-
<b>40-49</b>	9,42	9,86	9,68	9,71	10,03	9,72	9,49	10,44	10,22	<b>26,4</b>	<b>11,7</b>	-
<b>50-59</b>	18,91	18,35	18,61	19,69	19,88	20,05	18,74	19,28	19,76	<b>33,6</b>	<b>7,9</b>	-
<b>60-69</b>	34,64	35,94	35,64	37,75	37,05	37,85	36,46	35,15	36,60	<b>57,7</b>	<b>12,7</b>	-
<b>70-79</b>	41,80	41,42	43,39	43,39	47,35	46,32	46,62	46,00	46,96	<b>69,6</b>	<b>21,4</b>	-
<b>80 и ст.</b>	29,79	32,85	32,19	32,03	32,72	35,31	34,49	33,24	33,86	<b>181,9</b>	<b>32,9</b>	-
<b>15-59</b>	9,89	10,20	10,06	10,47	10,82	10,80	10,28	10,86	11,06	<b>36,0</b>	<b>15,2</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	14,86	15,20	15,26	15,73	16,38	16,47	16,20	16,41	16,83	<b>60,5</b>	<b>19,2</b>	<b>4,8</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	10,51	10,83	10,76	11,01	11,39	11,36	10,96	11,24	11,42	<b>34,0</b>	<b>10,9</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 186

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (C81-96), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	57,3	56,9	57,5	57,8	57,6	58,8	59,4	59,5	59,4	59,6	59,0	59,1
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	51,1	50,7	51,3	51,8	51,7	52,7	53,0	53,1	53,5	54,1	54,0	54,5
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,00	1,03	1,04	1,08	1,07	1,08	1,07	1,11	1,10	1,15	1,15	1,20
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	59,2	58,9	59,4	59,3	59,2	59,7	60,3	60,0	60,2	4,6	2,2	1,7
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	55,0	54,9	55,4	55,6	55,5	55,7	56,3	55,8	56,0	11,2	3,5	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,21	1,23	1,27	1,30	1,33	1,32	1,29	1,29	1,31	34,6	12,6	-
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	56,0	55,6	56,3	56,3	55,9	56,9	56,5	56,9	56,6	56,6	56,5	56,9
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	49,6	49,1	49,8	50,0	50,0	51,1	51,2	51,6	52,1	52,4	52,4	52,8
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,28	1,31	1,31	1,34	1,31	1,31	1,31	1,36	1,33	1,4	1,36	1,41

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 186**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных при выявлении ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (C81-96), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
	1993-2013	2003-2013	2008-2013									
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	57,1	57,0	57,6	57,6	57,1	57,6	58,3	58,1	58,2	<b>4,0</b>	<b>2,9</b>	<b>1,7</b>
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	53,1	53,1	53,7	53,9	53,5	53,7	54,3	53,9	54,0	<b>10,6</b>	<b>2,9</b>	-
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,44	1,45	1,53	1,56	1,59	1,58	1,54	1,52	1,53	<b>25,4</b>	<b>12,4</b>	-
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	59,0	58,4	59,0	59,4	59,8	60,6	61,4	61,2	61,0	61,6	61,3	61,5
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	52,6	52,3	52,8	53,6	53,5	54,3	54,7	54,6	54,9	55,9	55,5	56,2
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	0,84	0,87	0,88	0,92	0,91	0,93	0,91	0,94	0,94	0,98	1,01	1,06
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных с ЗНО, лет</b>	61,9	61,4	61,9	61,5	61,6	61,6	62,1	61,7	62,0	<b>5,2</b>	-	-
<b>Средний возраст больных при выявлении ЗНО, лет</b>	56,7	56,5	57,1	57,2	57,3	57,6	58,1	57,6	57,9	<b>11,3</b>	<b>4,0</b>	<b>1,3</b>
<b>Кумулятивный риск развития ЗНО до 75 лет, %</b>	1,06	1,09	1,09	1,12	1,16	1,15	1,11	1,14	1,16	<b>40,5</b>	<b>12,4</b>	-

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 187

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (C81-96) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>14488</b>	<b>14348</b>	<b>14173</b>	<b>14024</b>	<b>14030</b>	<b>14265</b>	<b>14541</b>	<b>14575</b>	<b>14079</b>	<b>14221</b>	<b>14222</b>	<b>14549</b>
<b>0-14</b>	1000	896	851	763	707	637	610	531	487	475	413	435
<b>15-19</b>	332	379	360	350	354	347	335	352	315	324	311	279
<b>20-24</b>	357	415	384	385	372	402	380	358	360	377	331	358
<b>25-29</b>	370	403	358	378	359	376	403	356	368	377	339	377
<b>30-34</b>	496	518	473	437	420	389	395	344	340	362	381	377
<b>35-39</b>	599	543	572	564	571	570	564	516	437	435	432	427
<b>40-44</b>	664	710	691	692	610	673	707	682	656	671	658	603
<b>45-49</b>	601	697	765	869	828	897	935	886	800	846	876	925
<b>50-54</b>	1055	899	718	576	651	767	970	1059	1126	1168	1170	1182
<b>55-59</b>	1485	1633	1725	1640	1621	1312	1076	979	887	824	1006	1274
<b>60-64</b>	2017	1872	1690	1645	1711	1867	2063	2137	2072	1963	1759	1358
<b>65-69</b>	2359	2414	2442	2394	2301	2244	2069	2050	1831	1893	2068	2281
<b>70-74</b>	1374	1336	1523	1764	1905	2094	2216	2318	2317	2229	2107	2014
<b>75-79</b>	1004	871	835	865	913	1008	1129	1277	1403	1536	1608	1818
<b>80-84</b>	595	551	603	533	450	468	441	493	464	499	532	608
<b>85 и ст.</b>	180	211	183	169	207	214	248	237	216	242	230	235

**Продолжение таблицы 187**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (C81-96) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Всего</b>	<b>14324</b>	<b>14308</b>	<b>14171</b>	<b>14309</b>	<b>14519</b>	<b>14296</b>	<b>14148</b>	<b>14011</b>	<b>14297</b>	<b>-1,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>0-14</b>	415	373	350	272	390	313	298	289	291	<b>-70,9</b>	<b>-34,3</b>	<b>-</b>
<b>15-19</b>	303	247	209	177	193	139	149	136	109	<b>-67,2</b>	<b>-65,0</b>	<b>-37,0</b>
<b>20-24</b>	360	337	319	321	302	287	233	228	226	<b>-36,7</b>	<b>-37,2</b>	<b>-32,5</b>
<b>25-29</b>	356	343	336	343	336	340	294	319	298	<b>-19,5</b>	<b>-15,6</b>	<b>-13,2</b>
<b>30-34</b>	351	352	370	319	340	341	312	328	345	<b>-30,4</b>	<b>-13,2</b>	<b>-</b>
<b>35-39</b>	380	399	340	375	366	365	359	355	395	<b>-34,1</b>	<b>-12,8</b>	<b>-</b>
<b>40-44</b>	557	542	489	454	433	434	393	410	436	<b>-34,3</b>	<b>-38,6</b>	<b>-</b>
<b>45-49</b>	846	835	818	778	738	714	646	591	586	<b>-2,5</b>	<b>-35,7</b>	<b>-26,2</b>
<b>50-54</b>	1121	1165	1107	1177	1155	1138	1119	1053	1072	<b>1,6</b>	<b>-7,8</b>	<b>-10,2</b>
<b>55-59</b>	1427	1401	1592	1586	1503	1517	1550	1536	1508	<b>1,5</b>	<b>29,8</b>	<b>-</b>
<b>60-64</b>	1174	1118	1108	1240	1562	1765	1875	1826	1946	<b>-3,5</b>	<b>50,9</b>	<b>47,9</b>
<b>65-69</b>	2451	2420	2235	2024	1600	1368	1195	1272	1623	<b>-31,2</b>	<b>-46,3</b>	<b>-</b>
<b>70-74</b>	1873	1835	1894	2100	2370	2454	2495	2346	2041	<b>48,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>75-79</b>	1796	1877	1802	1765	1724	1595	1560	1650	1774	<b>76,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>80-84</b>	682	819	927	1056	1132	1098	1203	1127	1048	<b>76,1</b>	<b>109,2</b>	<b>-</b>
<b>85 и ст.</b>	232	245	275	322	375	428	467	545	599	<b>232,8</b>	<b>264,0</b>	<b>95,2</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 187**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (C81-96) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>7665</b>	<b>7685</b>	<b>7325</b>	<b>7329</b>	<b>7316</b>	<b>7443</b>	<b>7583</b>	<b>7519</b>	<b>7276</b>	<b>7351</b>	<b>7172</b>	<b>7318</b>
<b>0-14</b>	572	543	499	461	436	354	376	306	279	275	240	260
<b>15-19</b>	209	239	205	211	200	238	201	220	188	201	196	173
<b>20-24</b>	202	241	213	243	214	235	227	210	207	221	180	197
<b>25-29</b>	217	235	206	224	213	206	214	203	214	225	172	227
<b>30-34</b>	277	271	263	223	239	227	212	190	198	207	213	200
<b>35-39</b>	357	308	313	324	320	309	323	297	245	249	243	234
<b>40-44</b>	385	411	390	401	321	374	396	399	367	386	372	324
<b>45-49</b>	343	401	453	492	470	537	559	480	448	454	507	528
<b>50-54</b>	616	520	409	325	389	453	567	599	667	684	661	661
<b>55-59</b>	864	942	998	915	923	734	625	548	490	450	564	732
<b>60-64</b>	1142	1047	914	940	940	1044	1124	1161	1118	1106	959	700
<b>65-69</b>	1198	1253	1199	1271	1203	1182	1034	1049	964	976	1051	1123
<b>70-74</b>	557	588	627	713	783	921	1038	1088	1070	1040	947	937
<b>75-79</b>	420	372	327	347	370	372	417	486	570	601	617	723
<b>80-84</b>	241	235	238	188	162	173	167	188	175	189	165	216
<b>85 и ст.</b>	65	79	71	51	83	84	103	95	76	87	85	84

**Продолжение таблицы 187**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (C81-96) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Мужчины</b>												
<b>Всего</b>	<b>7233</b>	<b>7208</b>	<b>7120</b>	<b>7170</b>	<b>7200</b>	<b>7134</b>	<b>6994</b>	<b>6944</b>	<b>7248</b>	<b>-5,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>0-14</b>	239	222	200	161	210	199	185	170	166	<b>-71,0</b>	<b>-33,6</b>	
<b>15-19</b>	182	154	126	112	121	76	90	82	68	<b>-67,5</b>	<b>-66,3</b>	<b>-38,7</b>
<b>20-24</b>	211	191	193	190	193	161	146	139	154	<b>-23,8</b>	<b>-26,9</b>	<b>-26,2</b>
<b>25-29</b>	204	204	207	185	196	187	163	179	185	<b>-14,7</b>	-	-
<b>30-34</b>	186	188	220	189	215	182	183	184	199	<b>-28,2</b>	-	-
<b>35-39</b>	218	209	196	221	204	202	193	205	220	<b>-38,4</b>	<b>-12,4</b>	-
<b>40-44</b>	305	311	251	271	241	256	230	221	242	<b>-37,1</b>	<b>-37,1</b>	-
<b>45-49</b>	499	493	455	431	442	420	378	324	347	<b>1,2</b>	<b>-35,6</b>	<b>-25,3</b>
<b>50-54</b>	617	669	654	667	671	664	630	600	642	<b>4,2</b>	-	-
<b>55-59</b>	782	803	875	893	812	846	888	881	874	<b>1,2</b>	<b>32,8</b>	-
<b>60-64</b>	639	570	602	664	819	931	981	1009	1064	<b>-6,8</b>	<b>54,1</b>	<b>54,5</b>
<b>65-69</b>	1200	1182	1100	969	764	675	586	655	861	<b>-28,1</b>	<b>-44,6</b>	-
<b>70-74</b>	879	833	865	990	1047	1110	1083	1041	907	<b>62,8</b>	-	-
<b>75-79</b>	749	824	776	743	704	657	648	684	731	<b>74,0</b>	-	-
<b>80-84</b>	237	270	319	385	429	413	466	395	381	<b>58,1</b>	<b>137,6</b>	-
<b>85 и ст.</b>	86	85	81	99	132	155	144	175	207	<b>218,5</b>	<b>224,5</b>	<b>98,3</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 187**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (C81-96) в зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>6823</b>	<b>6663</b>	<b>6848</b>	<b>6695</b>	<b>6714</b>	<b>6822</b>	<b>6958</b>	<b>7056</b>	<b>6803</b>	<b>6870</b>	<b>7050</b>	<b>7231</b>
<b>0-14</b>	428	353	352	302	271	283	234	225	208	200	173	175
<b>15-19</b>	123	140	155	139	154	109	134	132	127	123	115	106
<b>20-24</b>	155	174	171	142	158	167	153	148	153	156	151	161
<b>25-29</b>	153	168	152	154	146	170	189	153	154	152	167	150
<b>30-34</b>	219	247	210	214	181	162	183	154	142	155	168	177
<b>35-39</b>	242	235	259	240	251	261	241	219	192	186	189	193
<b>40-44</b>	279	299	301	291	289	299	311	283	289	285	286	279
<b>45-49</b>	258	296	312	377	358	360	376	406	352	392	369	397
<b>50-54</b>	439	379	309	251	262	314	403	460	459	484	509	521
<b>55-59</b>	621	691	727	725	698	578	451	431	397	374	442	542
<b>60-64</b>	875	825	776	705	771	823	939	976	954	857	800	658
<b>65-69</b>	1161	1161	1243	1123	1098	1062	1035	1001	867	917	1017	1158
<b>70-74</b>	817	748	896	1051	1122	1173	1178	1230	1247	1189	1160	1077
<b>75-79</b>	584	499	508	518	543	636	712	791	833	935	991	1095
<b>80-84</b>	354	316	365	345	288	295	274	305	289	310	367	392
<b>85 и ст.</b>	115	132	112	118	124	130	145	142	140	155	145	151

**Продолжение таблицы 187**

**Динамика абсолютного числа умерших от ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (C81-96) зависимости от пола и возраста, Россия, 1993-2013 гг.**

Возраст	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Женщины</b>												
<b>Всего</b>	<b>7091</b>	<b>7100</b>	<b>7051</b>	<b>7139</b>	<b>7319</b>	<b>7162</b>	<b>7154</b>	<b>7067</b>	<b>7049</b>	<b>3,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>0-14</b>	176	151	150	111	180	114	113	119	125	<b>-70,8</b>	<b>-35,4</b>	
<b>15-19</b>	121	93	83	65	72	63	59	54	41	<b>-66,7</b>	<b>-62,7</b>	<b>-34,2</b>
<b>20-24</b>	149	146	126	131	109	126	87	89	72	<b>-53,5</b>	<b>-49,9</b>	<b>-41,4</b>
<b>25-29</b>	152	139	129	158	140	153	131	140	113	<b>-26,1</b>	<b>-19,0</b>	<b>-22,0</b>
<b>30-34</b>	165	164	150	130	125	159	129	144	146	<b>-33,3</b>	<b>-20,6</b>	-
<b>35-39</b>	162	190	144	154	162	163	166	150	175	<b>-27,7</b>	-	-
<b>40-44</b>	252	231	238	183	192	178	163	189	194	<b>-30,5</b>	<b>-40,4</b>	-
<b>45-49</b>	347	342	363	347	296	294	268	267	239	<b>-7,4</b>	<b>-35,7</b>	<b>-27,4</b>
<b>50-54</b>	504	496	453	510	484	474	489	453	430	<b>-2,1</b>	<b>-12,7</b>	<b>-13,3</b>
<b>55-59</b>	645	598	717	693	691	671	662	655	634	<b>2,1</b>	<b>26,0</b>	<b>-8,4</b>
<b>60-64</b>	535	548	506	576	743	834	894	817	882	<b>0,8</b>	<b>47,4</b>	<b>40,7</b>
<b>65-69</b>	1251	1238	1135	1055	836	693	609	617	762	<b>-34,4</b>	<b>-48,0</b>	-
<b>70-74</b>	994	1002	1029	1110	1323	1344	1412	1305	1134	<b>38,8</b>	<b>26,8</b>	-
<b>75-79</b>	1047	1053	1026	1022	1020	938	912	966	1043	<b>78,6</b>	-	-
<b>80-84</b>	445	549	608	671	703	685	737	732	667	<b>88,4</b>	<b>95,4</b>	-
<b>85 и ст.</b>	146	160	194	223	243	273	323	370	392	<b>240,9</b>	<b>287,2</b>	<b>93,7</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 188

**Динамика показателей смертности от ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (С81-96), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>0-9</b>	3,20	3,05	3,05	2,55	2,67	2,46	2,50	2,23	2,05	2,15	1,76	2,10
<b>10-19</b>	2,96	2,92	2,72	2,79	2,57	2,48	2,39	2,39	2,27	2,29	2,22	2,08
<b>20-29</b>	3,69	4,17	3,76	3,82	3,61	3,79	3,76	3,39	3,44	3,54	3,01	3,23
<b>30-39</b>	4,34	4,24	4,26	4,18	4,26	4,26	4,41	4,09	3,82	4,01	4,13	4,12
<b>40-49</b>	6,97	7,15	6,89	7,05	6,32	6,73	6,92	6,55	6,05	6,30	6,40	6,46
<b>50-59</b>	14,91	15,56	15,75	14,80	15,53	14,58	14,49	14,31	13,91	13,18	13,43	14,08
<b>60-69</b>	28,89	28,87	28,36	27,95	27,69	28,07	28,01	28,42	26,74	27,11	27,94	28,03
<b>70-79</b>	37,01	33,69	34,64	36,15	35,85	36,69	37,29	38,34	38,66	38,68	38,51	40,87
<b>80 и ст.</b>	24,22	23,41	24,02	21,93	21,20	22,62	23,32	25,21	23,95	26,11	28,27	29,88
<b>15-59</b>	6,57	6,79	6,59	6,41	6,29	6,23	6,26	6,00	5,75	5,81	5,81	6,07
<b>«Грубый» показатель</b>	9,78	9,70	9,59	9,52	9,55	9,73	9,96	10,04	9,79	9,95	9,91	10,20
<b>Стандарт. показатель</b>	7,89	7,84	7,66	7,47	7,42	7,47	7,57	7,49	7,20	7,23	7,14	7,31
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	1,99	1,87	1,78	1,41	1,93	1,53	1,40	1,40	1,29	<b>-59,7</b>	<b>-33,0</b>	-
<b>10-19</b>	2,29	1,93	1,77	1,51	1,94	1,49	1,60	1,45	1,37	<b>-53,7</b>	<b>-38,4</b>	-
<b>20-29</b>	3,10	2,88	2,72	2,73	2,61	2,56	2,19	2,31	2,28	<b>-38,2</b>	<b>-30,4</b>	<b>-18,3</b>
<b>30-39</b>	3,74	3,79	3,54	3,41	3,41	3,38	3,14	3,15	3,36	<b>-22,6</b>	<b>-23,3</b>	-
<b>40-49</b>	6,07	6,06	5,91	5,75	5,64	5,62	5,30	5,20	5,37	<b>-23,0</b>	<b>-19,2</b>	<b>-8,7</b>
<b>50-59</b>	13,68	13,15	13,47	13,45	12,72	12,64	12,31	11,88	11,82	<b>-20,7</b>	<b>-14,7</b>	<b>-11,7</b>
<b>60-69</b>	29,44	29,72	28,70	28,69	27,94	27,54	25,40	24,38	26,09	<b>-9,7</b>	<b>-12,6</b>	<b>-12,8</b>
<b>70-79</b>	39,93	40,48	39,78	40,70	42,28	41,38	40,54	40,55	40,41	-	-	-
<b>80 и ст.</b>	30,55	33,15	34,82	37,19	38,34	37,91	38,87	38,21	37,41	<b>54,5</b>	<b>36,5</b>	-
<b>15-59</b>	5,92	5,79	5,76	5,74	5,61	5,53	5,34	5,29	5,36	<b>-18,4</b>	<b>-11,7</b>	<b>-7,6</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	10,09	10,04	9,97	10,08	10,23	10,07	9,90	9,78	9,96	-	-	-
<b>Стандарт. показатель</b>	7,19	7,06	6,88	6,79	6,97	6,76	6,47	6,34	6,45	<b>-18,3</b>	<b>-12,4</b>	<b>-8,0</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 188**

**Динамика показателей смертности от ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (C81-96), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>0-9</b>	3,57	3,66	3,50	2,99	3,15	2,69	2,82	2,59	2,24	2,36	1,92	2,51
<b>10-19</b>	3,53	3,53	3,08	3,33	3,01	3,07	2,97	2,80	2,64	2,75	2,72	2,47
<b>20-29</b>	4,16	4,74	4,14	4,56	4,12	4,19	4,15	3,86	3,94	4,15	3,14	3,71
<b>30-39</b>	5,02	4,63	4,70	4,57	4,81	4,77	4,92	4,61	4,32	4,55	4,67	4,49
<b>40-49</b>	8,21	8,46	8,20	8,31	7,17	8,06	8,32	7,59	7,01	7,23	7,66	7,54
<b>50-59</b>	19,13	19,89	20,20	18,50	20,02	18,51	18,67	17,73	17,56	16,47	16,71	17,74
<b>60-69</b>	39,83	39,52	36,63	38,36	36,91	37,82	36,39	37,39	35,71	36,92	37,23	36,01
<b>70-79</b>	57,76	55,50	52,45	53,31	51,90	52,44	54,25	55,29	55,64	54,60	51,65	56,06
<b>80 и ст.</b>	47,93	48,03	47,00	37,22	39,25	42,14	44,88	47,44	42,46	46,44	48,09	54,76
<b>15-59</b>	7,77	7,94	7,64	7,43	7,28	7,33	7,34	6,94	6,68	6,77	6,74	7,05
<b>«Грубый» показатель</b>	11,02	11,06	10,56	10,60	10,61	10,83	11,09	11,06	10,82	11,01	10,75	11,04
<b>Стандарт. показатель</b>	10,38	10,39	9,79	9,65	9,55	9,63	9,75	9,63	9,26	9,30	9,06	9,31
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	2,10	2,12	1,94	1,63	2,02	1,88	1,65	1,56	1,34	<b>-62,5</b>	<b>-33,4</b>	-
<b>10-19</b>	2,75	2,36	2,09	1,83	2,27	1,72	1,95	1,74	1,73	<b>-51,0</b>	<b>-38,1</b>	-
<b>20-29</b>	3,57	3,32	3,31	3,06	3,15	2,81	2,55	2,66	2,92	<b>-29,8</b>	<b>-24,2</b>	-
<b>30-39</b>	4,18	4,06	4,20	4,08	4,10	3,73	3,58	3,65	3,85	<b>-23,3</b>	<b>-20,0</b>	-
<b>40-49</b>	7,29	7,43	6,71	6,88	6,90	6,93	6,49	5,91	6,45	<b>-21,4</b>	<b>-18,6</b>	-
<b>50-59</b>	16,77	16,90	17,11	17,05	15,93	16,14	15,67	15,17	15,48	<b>-19,1</b>	<b>-11,6</b>	<b>-9,0</b>
<b>60-69</b>	38,67	38,26	37,89	36,98	35,72	35,86	32,27	32,46	34,92	<b>-12,3</b>	<b>-12,2</b>	-
<b>70-79</b>	55,69	56,36	54,83	56,50	56,02	55,99	53,50	54,43	54,36	<b>-5,9</b>	-	<b>-4,5</b>
<b>80 и ст.</b>	54,57	53,95	54,08	58,76	62,64	61,30	61,00	55,31	56,30	<b>17,5</b>	<b>15,0</b>	-
<b>15-59</b>	6,86	6,85	6,78	6,77	6,68	6,49	6,34	6,20	6,51	<b>-16,2</b>	<b>-9,0</b>	-
<b>«Грубый» показатель</b>	10,99	10,92	10,82	10,92	10,97	10,87	10,58	10,48	10,91	-	-	-
<b>Стандарт. показатель</b>	9,20	9,03	8,82	8,75	8,88	8,74	8,27	8,13	8,43	<b>-18,8</b>	<b>-10,9</b>	-

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 188**

**Динамика показателей смертности от ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (С81-96), Россия, 1993-2013 гг.  
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, мировой стандарт возрастного распределения)**

Возраст	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>0-9</b>	2,82	2,41	2,57	2,09	2,16	2,21	2,16	1,85	1,85	1,93	1,59	1,67
<b>10-19</b>	2,37	2,30	2,35	2,24	2,12	1,88	1,79	1,97	1,88	1,80	1,71	1,69
<b>20-29</b>	3,20	3,57	3,35	3,04	3,08	3,36	3,35	2,90	2,93	2,91	2,87	2,75
<b>30-39</b>	3,66	3,86	3,83	3,79	3,71	3,75	3,90	3,56	3,31	3,46	3,59	3,76
<b>40-49</b>	5,79	5,90	5,64	5,86	5,52	5,48	5,62	5,57	5,15	5,43	5,24	5,47
<b>50-59</b>	11,40	11,99	12,13	11,80	11,89	11,37	11,04	11,46	10,86	10,43	10,72	11,08
<b>60-69</b>	21,96	22,01	22,93	21,05	21,53	21,52	22,38	22,41	20,78	20,67	21,90	22,92
<b>70-79</b>	29,60	25,87	28,14	29,69	29,52	30,20	30,06	30,95	31,17	31,57	32,50	33,86
<b>80 и ст.</b>	18,31	17,23	18,24	18,09	16,64	17,67	17,80	19,45	19,08	20,73	23,53	23,89
<b>15-59</b>	5,41	5,67	5,57	5,42	5,34	5,17	5,22	5,09	4,84	4,90	4,94	5,14
<b>«Грубый» показатель</b>	8,68	8,49	8,74	8,56	8,61	8,77	8,97	9,14	8,89	9,02	9,19	9,46
<b>Стандарт. показатель</b>	6,32	6,20	6,30	6,01	6,01	6,03	6,13	6,10	5,85	5,89	6,00	
<b>Возраст</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										<b>1993-2013</b>	<b>2003-2013</b>	<b>2008-2013</b>
<b>0-9</b>	1,87	1,61	1,61	1,18	1,84	1,16	1,13	1,23	1,24	<b>-56,0</b>	<b>-32,6</b>	-
<b>10-19</b>	1,81	1,48	1,44	1,17	1,59	1,26	1,23	1,14	0,99	<b>-58,2</b>	<b>-39,5</b>	
<b>20-29</b>	2,62	2,42	2,14	2,39	2,05	2,30	1,83	1,96	1,63	<b>-49,1</b>	<b>-38,2</b>	<b>-26,9</b>
<b>30-39</b>	3,32	3,53	2,90	2,75	2,74	3,04	2,72	2,68	2,88	<b>-21,3</b>	<b>-27,1</b>	-
<b>40-49</b>	4,95	4,82	5,19	4,72	4,49	4,42	4,22	4,55	4,38	<b>-24,4</b>	<b>-19,8</b>	-
<b>50-59</b>	11,17	10,13	10,53	10,56	10,13	9,83	9,60	9,21	8,85	<b>-22,4</b>	<b>-18,2</b>	<b>-15,4</b>
<b>60-69</b>	23,63	24,38	22,93	23,43	22,94	22,14	20,79	18,91	20,13	<b>-8,3</b>	<b>-14,3</b>	<b>-17,9</b>
<b>70-79</b>	32,57	32,98	32,63	33,16	35,73	34,42	34,34	33,97	33,87	<b>14,4</b>	-	-
<b>80 и ст.</b>	24,62	27,79	29,57	31,02	31,17	30,92	32,15	32,94	31,54	-	-	-
<b>15-59</b>	5,04	4,79	4,81	4,76	4,59	4,63	4,41	4,43	4,27	<b>-21,1</b>	<b>-15,2</b>	<b>-9,4</b>
<b>«Грубый» показатель</b>	9,31	9,28	9,24	9,36	9,60	9,39	9,31	9,19	9,15	<b>5,4</b>	-	<b>-3,5</b>
<b>Стандарт. показатель</b>	5,89	5,78	5,61	5,51	5,73	5,48	5,27	5,17	5,13	<b>-18,8</b>	<b>-14,2</b>	<b>-9,5</b>

\* при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 189

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (C81-96), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>ОБА ПОЛА</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	60,7	60,2	60,6	61,1	61,5	62,0	62,2	62,9	63,1	63,2	63,4	63,8
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	54,9	54,6	55,2	55,6	56,1	56,6	56,8	57,8	58,1	58,2	58,6	58,8
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,84	0,82	0,81	0,80	0,80	0,80	0,81	0,82	0,79	0,79	0,78	0,80
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>Прирост/убыль*, %</b>		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	64,5	65,1	65,1	65,3	64,8	64,4	64,6	64,8	64,8	<b>6,8</b>	-	-
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	59,1	59,8	60,3	61,1	60,9	61,3	62,0	62,1	62,1	<b>13,2</b>	<b>6,6</b>	<b>2,2</b>
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,79	0,78	0,76	0,76	0,76	0,75	0,72	0,71	0,73	<b>-13,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>-6,2</b>
Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Мужчины</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	58,8	58,6	58,6	59,2	59,5	60,3	60,4	61,3	61,5	61,5	61,2	60,9
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	53,0	52,9	53,2	53,4	54,1	54,6	54,9	55,9	56,3	56,2	56,6	56,7
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	1,12	1,11	1,05	1,05	1,03	1,05	1,06	1,05	1,02	1,02	1,00	1,02

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

**Продолжение таблицы 189**

**Динамика показателей, связанных с возрастом больных, умерших от ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (C81-96), Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Прирост/убыль*, %		
										1993-2013	2003-2013	2008-2013
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	61,4	61,4	61,5	62,0	61,8	62,0	62,1	62,4	62,5	6,3	2,4	1,0
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	57,2	57,6	58,0	58,8	58,5	59,2	59,5	59,8	59,7	12,7	6,2	2,1
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	1,01	0,99	0,97	0,98	0,97	0,97	0,91	0,91	0,96	-14,3	-8,7	-
<b>Показатель</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>ЖЕНЩИНЫ</b>												
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	62,8	62,1	63,1	63,6	63,8	64,3	64,3	64,7	64,9	65,4	65,8	66,1
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	57,0	56,6	57,3	58,0	58,3	58,7	59,0	59,8	60,1	60,3	60,7	61,0
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,67	0,65	0,66	0,64	0,64	0,64	0,65	0,66	0,63	0,63	0,64	0,65
<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	Прирост/убыль*, %		
<b>Медиана возрастного распределения больных, умерших от ЗНО, лет</b>	66,4	66,8	67,1	67,4	67,8	67,5	68,4	68,7	68,1	8,4	4,2	-
<b>Средний возраст умерших от ЗНО, лет</b>	61,2	62,0	62,5	63,3	63,3	63,5	64,3	64,4	64,6	13,3	6,9	2,4
<b>Кумулятивный риск умереть от ЗНО до 75 лет, %</b>	0,64	0,63	0,61	0,61	0,63	0,61	0,59	0,57	0,58	-13,4	-11,0	-8,0

\*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за рассматриваемый период методом наименьших квадратов

Таблица 190

**Динамика сведений о контингенте больных с ЗНО лимфатической и кроветворной ткани (C81-96), состоящем на учете онкологических учреждений, Россия, 1993-2013 гг.**

Показатель	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	16775	17297	17541	17801	18083	18306	18375	18664	18853	19323	19519
Число больных, состоящих на учете на конец года	69489	72854	76904	80474	85674	89494	92322	97205	101285	105321	111418
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	40,8	41,5	41,7	42,7	43,4	43,8	46,0	46,7	47,7	48,0	48,8
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	52,8	53,1	54,8	54,5	56,2	56,4	58,3	59,1	60,0	59,0	60,7
Показатель распространенности на 100 000 населения	46,9	49,2	52,0	54,6	58,3	61,1	63,3	67,0	70,5	73,7	77,7
Индекс накопления контингента	4,1	4,2	4,4	4,5	4,7	4,9	5,0	5,2	5,4	5,5	5,7
Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО	20495	20586	21128	21408	21994	22678	22582	22456	22454	22581	
Число больных, состоящих на учете на конец года	116771	122159	128428	134066	139630	146916	154368	161377	168555	173901	
из них доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, %	49,3	49,9	49,7	50,6	50,4	50,2	51,5	51,6	52,2	53,7	
Доля больных, состоящих на учете 5 лет и более от контингента, состоявшего на учете <b>5 лет назад</b> , %	62,4	62,6	63,0	64,4	63,1	63,2	65,1	64,8	65,7	66,9	
Показатель распространенности на 100 000 населения	81,8	86,1	90,1	94,3	98,4	103,5	108,8	112,9	117,7	121,2	
Индекс накопления контингента	5,7	5,9	6,1	6,3	6,4	6,5	6,8	7,2	7,5	7,7	

Галина Вениаминовна Петрова  
Андрей Дмитриевич Каприн  
Ольга Петровна Грецова  
Валерий Владимирович Старинский

Злокачественные новообразования в России  
обзор статистической информации за 1993-2013 гг.  
под общей редакцией чл.-корр. РАН, проф. А.Д. Каприна, проф. В.В. Старинского

ЛР № 020529. 24.04.92 г.

---

Формат бум. 60x84/16  
Усл. печ. л. 28,8      Уч. изд. л. 31,9  
Тираж 400 экз.

---

Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена –  
филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России  
125284, Москва, 2-й Боткинский пр., 3

---

Отпечатано в РИИС ФИАН, Москва, Ленинский проспект, 53, тел. (499) 7833640

---

ISBN 978-5-85502-215-5

