




بمناسبة اليوم العالمى "من أجل تنمية صحة المرأة" ٢٥,٢٪ من السيدات المتزوجات مصابات بالأنيميا

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق ٢٨ / ٥ / ٢٠١٦ بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى " من أجل تنمية صحة المرأة " والذي يحتفل به فى يوم ٢٨ مايو من كل عام ويستعرض فيه الوضع الصحى الراهن للمرأة ، وقد بدأ الإحتفال بهذا اليوم بمناسبة إجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنجابية فى كوستاريكا عام ١٩٨٧.

ومن أهم المؤشرات ما يلى :

• العمر المتوقع عند الميلاد للإناث

(٧٢,٩ سنة) العمر المتوقع عند الميلاد للإناث عام ٢٠١٥




ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من ٧٠,٥

سنة عام ٢٠٠٩ إلى ٧٢,٩ سنة عام ٢٠١٥.

• معدل وفيات الإناث

٥,٦ معدل الوفيات لكل ألف من الإناث عام ٢٠١٤



شهد معدل وفيات الإناث تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض،


حيث ارتفع من ٥,٦ لكل ألف من الإناث عام ٢٠٠٨ ليصل

إلى ٥,٨ عام ٢٠١٢ ثم انخفض مرة أخرى ليصل إلى ٥,٦

عام ٢٠١٤.

• أسباب وفيات الإناث


٥٠,٣٪ وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدوري عام ٢٠١٤



- سجلت أمراض الجهاز الدوري أعلى نسبة وفيات للإناث ، حيث بلغت ٥٠,٣٪ من إجمالي وفيات الإناث عام ٢٠١٤ مقابل ٤٠,٧٪ عام ٢٠١٠ ، يليها نسبة الوفيات بسبب أمراض الجهاز الهضمي حيث بلغت ٩,٤٪ من إجمالي وفيات الإناث عام ٢٠١٤ مقابل ٨,٦٪ عام ٢٠١٠ ، كما تلاحظ ارتفاع نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز التنفسي ٨,٢٪ عام ٢٠١٤ مقابل ٥,٧٪ عام ٢٠١٠ ، وكانت أقل نسبة لوفيات الإناث بسبب الحمل والولادة والنفاس حيث بلغت ٠,٢٪ عامي ٢٠١٠ ، ٢٠١٤ .

• معدل وفيات الأمهات

معدل وفيات الأمهات ٥٢ سيدة لكل ١٠٠ ألف مولود حي عام ٢٠١٤



بلغ معدل وفيات الأمهات ٨٤ سيدة لكل ١٠٠ ألف مولود حي عام ٢٠٠٠ ، انخفض إلى ٥٢ سيدة في كلا من عامي ٢٠١٣ ، ٢٠١٤ .

• الصحة العامة

وفقا لبيانات المسح السكاني الصحى عام ٢٠١٤

٢٥,٢ ٪ من السيدات المتزوجات مصابات بالأنيميا عام ٢٠١٤

- ٨٨,٣ ٪ من الولادات تمت بمساعدة طبيب، ٣,٢ ٪ من الولادات تمت بمساعدة ممرضة أو قابلة بينما ٧,٥ ٪ تمت بمساعدة الداية .
- ٩١ ٪ من النساء حصلن على رعاية ما بعد الولادة إما داخل المنشأة التي وضعن أطفالهن فيها أو خارجها خلال اليومين التاليين للولادة مباشرة .
- حوالى ثلث السيدات (٦١,٩ ٪) اللاتي أنجبن خلال الخمس سنوات السابقة أخذن أقراص أو شراب حديد خلال حمل آخر مولود حتى للوقاية من الأنيميا ، وثلث السيدات (٣٦,١ ٪) حصلن على عنصر الحديد التكميلى لفترة ٩٠ يوم أو أكثر .
- بلغت نسبة السيدات المتزوجات المصابات بالأنيميا ٢٥,٢ ٪ (٢٣,١ ٪ لديهن أنيميا بسيطة و ٢,١ ٪ منهن لديهن أنيميا متوسطة) .
- ثلث السيدات (٦٨ ٪) اللاتي تعرضن للأمراض المنقولة جنسيا بحثن عن علاج (٥٥ ٪ منهن عن طريق مقدم خدمة خاصة ، ١٣ ٪ منهن عن طريق مقدم خدمة حكومية) .
- ٨ ٪ فقط من السيدات فى الفئة العمرية (١٥-٤٩ سنة) اللاتي سبق لهن الزواج ولديهن أى نوع من أنواع التأمين الصحى .
- ارتفعت نسبة السيدات فى الفئة العمرية (١٥-٤٩ سنة) اللاتي يعانين من زيادة فى الوزن أو السمنة من ٧٨ ٪ عام ٢٠٠٨ إلى ٨٤,٦ ٪ عام ٢٠١٤ .
- ٨٣ ٪ من السيدات المتزوجات حاليا يشاركن فى اتخاذ قرار رعايتهن الصحية (١٥ ٪ يتخذن القرار بمفردهن ، ٦٨ ٪ بمشاركة الزوج) .

ص.ب. ٢٠٨٦ صلاح سالم – مدينة نصر / القاهرة P.O. Box ٢٠٨٦ Salah Salem , Nasr City, Cairo, Egypt
تليفون: العلاقات العامة ٢٤٠٢٠٢٣١ (٠٢) المركز القومى للمعلومات ٢٤٠٢٠٥٧٤ (٠٢) فاكس رئاسة الجهاز ٢٤٠٢٤٠٩٩ (٠٢)

البريد الإلكتروني: [Email: pres_capmas@capmas.gov.eg](mailto:pres_capmas@capmas.gov.eg) موقع الجهاز: [http:// www.capmas.gov.eg](http://www.capmas.gov.eg)