



شلل الاطفال

شلل الأطفال أو التهاب سنجابية النخاع (بالإنجليزية: Poliomyelitis) هو مرض معدٍ تسببه الفيروسات السنجابية، حوالي 0.5% من حالات شلل الأطفال تعاني من وهن عضلي يؤدي إلى شلل رخو، ويمكن أن يحدث هذا على مدى بضع ساعات إلى بضعة أيام، غالبًا ما يشمل الوهن الساقين، وبصورة أقل شيوعًا قد يشمل عضلات الرأس والعنق والحجاب الحاجز.

My Health
Digest

اسباب شلل الاطفال

شلل الأطفال هو فيروس مُعدٍ جدًّا

ينتشر شلل الأطفال عن طريق اتصال شخص بآخر، فيهاجم الفيروس الجهاز العصبي وقد يسبب في غضون ساعات قليلة إلى إصابة الشخص بالشلل الذي لا يمكن علاجه. يدخل فيروس شلل الأطفال إلى الجسم عن طريق الفم ويتكاثر في الأمعاء، ومن هناك يهاجم الجهاز العصبي وقد يسبب الشلل

اعراض شلل الاطفال

معظم المصابين بشلل الأطفال لن تظهر عليهم أعراض يعاني بعض الأشخاص من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، مثل الحمى ، والتعب ، والغثيان ، وكذلك الصداع ، وتيبس الرقبة والظهر ، وآلام في الأطراف

قلة قليلة من حالات شلل الأطفال تؤدي إلى شلل دائم في الأطراف.

قلة من الناس يموتون عندما يصيب الشلل عضلات الجهاز التنفسي.

وقت زيارة الطبيب

استشر طبيبك للحصول على توصيات التطعيم ضد شلل الأطفال قبل السفر إلى المناطق التي لا تزال تحدث فيها حالات إصابة بشلل الأطفال بشكل طبيعي، أو حيث يُستخدم لقاح شلل الأطفال الفموي.

لم يكمل طفلك سلسلة اللقاحات

تعرض طفلك لرد فعل تحسسي تجاه لقاح شلل الأطفال

ظهرت مشاكل لدى طفلك غير الاحمرار أو الألم الخفيف في موضع أخذ حقنة اللقاح

إذا أصبت بشلل الأطفال منذ أعوام وبدأت تشعر الآن بضعف وإرهاق بلا سبب واضح

الوقاية

التطعيم هو الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من مرض شلل الأطفال

علاج شلل الاطفال

لا يوجد لشلل الأطفال علاجًا؛ ولذلك، ينصب التركيز على زيادة الراحة، وإسراع معدل الشفاء، والوقاية من المضاعفات. تشمل العلاجات الداعمة ما يلي: مسكنات الألم أجهزة التنفس الاصطناعي المحمولة للمساعدة على التنفس

