

التهاب التامور

نبذة عن المرض

التهاب التأمور هو تورم وتهيئج في الغشاء الرقيق الشبيه بالجيب المحيط بالقلب (التأمور). عادة ما يسبب التهاب التأمور ألمًا حادًا في الصدر. وقد تشعر بألم حاد في الصدر عندما تحتك طبقات التأمور المتهيّجة بعضها ببعض. وعادة ما تكون حالات التهاب غشاء التأمور خفيفة وتشفى من القاء نفسها.

أسباب وعوامل خطر التهاب التأمور

غالبًا ما يكون سبب التهاب التامور غير معروف ، على الرغم من أن الالتهابات الفيروسية هي سبب شائع. قد يحدث التهاب التامور بعد عدوى بالجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي

قد يحدث التهاب التامور المزمن والمتكرر بسبب اضطرابات المناعة الذاتية مثل الذئبة وتصلب الجلد والتهاب المفاصل الروماتويدي. هذه هي الاضطرابات التي يصنع فيها الجهاز المناعي للجسم أجسامًا مضادة تهاجم عن طريق الخطأ أنسجة أو خلايا الجسم.

الاعراض:

ألم الصدر هو أكثر الأعراض شيوعًا. يبدو وكأنه ألم حاد أو طعن ومع ذلك ، يعاني بعض . الأشخاص من ألم خفيف أو مؤلم أو يشبه الضغط في الصدر

يحدث ألم التهاب التامور عادة خلف عظم القص أو على الجانب الأيسر من الصدر. قد يؤدي : الألم إلى

ينتشر إلى الكتف الأيسر والرقبة

يزداد سوءًا عند السعال أو الاستلقاء أو التنفس بعمق

تحسن عند الجلوس أو الانحناء إلى الأمام

مضاعفات التهاب التأمور

تراكم السوائل حول القلب يمكن أن يؤدي تراكم السوائل إلى مزيد من مضاعفات القلب

سماكة وتندب بطانة القلب يعاني بعض الأشخاص المصابين بالتهاب التامور طويل الأمد من سماكة دائمة وتندب في التامور. التغييرات تمنع القلب من الامتلاء والتفريغ بشكل صحيح. غالبًا ما تؤدي هذه المضاعفات غير العادية إلى تورم شديد في الساقين والبطن وضيق في

ضغط على القلب بسبب تراخم السوائل . هذه الحالة التي تهدد الحياة تمنع القلب من الامتلاء بشكل صحيح (يخراج دم أقل من القلب ، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم. يتطلب المداد والماد الماد ا

تشخيص التهاب التأمور

لتشخيص التهاب التأمور، يجري الطبيب في العادة فحصًا جسديًا كما تجرى اختبارات أخرى لتشخيص التهاب التأمور، وتشمل

رسم قلب ـ

ايكو

بعض التحاليل مثل CRP

العلاج

في البداية قد ينصحك الطبيب بالراحة حتى تشعر بتحسن ولا تصاب بالحمى إذا كان التهاب التامور ناتجًا عن عدوى فيروسية ، فقد يُطلب منك تناول الأدوية لتقليل الألم و الالتهاب

إذا تسببت عدوى بكتيرية في الإصابة بالتهاب التامور ، فسيصف لك الطبيب مضادًا حيويًا أو دواءً آخر. قد تحتاج إلى البقاء في المستشفى أثناء العلاج حتى يتمكن طبيبك من فحصك بحثًا عن المضاعفات.

الوقاية

لا يمكن منع التهاب التامور الحاد. ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل فرصتك في الإصابة بنوبة حادة أخرى أو مضاعفات أو التهاب غشاء التامور المزمن. تتضمن هذه الخطوات الحصول على العلاج الفوري واتباع خطة العلاج الخاصة بك والحصول على رعاية طبية مستمرة حسب الحاجة.

