

القيءعندالرضعوالأطفال

القيء عندالر ضعتحتسنسنة هو حالة متكررة ومزعجة تشكومنها الكثير منالأمها ت، لكنمعظم حالاتالقيء عندالرضعمؤقتة، ولاتدلعلى مرضخطير، وغالبًا ماتزول فيغضون 6

أشهر، وقديحدثالقيء علىشكلبصقأوار تجاعو هولونفاتحو أبيض، حيثيفرزالر ضيعبعضدفعاتمتتالية منحليبالثدي.



أعراضمع القئ مدعاة للقلق:

هذهبعضالعلاماتالتيتظهر على الرضيعبعدالقيء وهيمدعاة للقلق يترافقالقيء عندالرضيعبالبكاء نتيجة الشعور بالحرقانفي أسفلالمريء يعانيالرضيعمنالسعالو البصقو الصفير المتكرر و الالتهابالرئوي فيهذه الحالة، يجبأنيعاينا ختصاصيالطفل

الأسباب

يمكن للعديد من الأشياء المختلفة أن تجعل الأطفال يتقيأون. في معظم الأحيان ، يكون ذلك بسبب التهاب المعدة والأمعاء ، وهو التهاب في المعدة والأمعاء ، الذي يُطلق عليه غالبًا "أنفلونزا المعدة" ، بسبب الفيروسات يمكن أن تسبب الجراثيم الأخرى ، مثل البكتيريا والطفيليات ، التهاب المعدة والأمعاء إلى جانب القيء ، قد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المعدة والأمعاء أيضًا من الغثيان وآلام البطن والإسهال عادة ما يستمر القيء بسبب التهاب المعدة والأمعاء أيام والأمعاء أقل من 24 ساعة وتتحسن الأعراض الأخرى في غضون أيام قلبلة



متى يجب علي الاتصال بالطبيب؟

اتصل بالطبيب إذا كان طفلك:

لا يستطيع أن تشرب لعدة ساعات

لديه علامات الجفاف ، مثل التبول في كثير من الأحيان ، البكاء مع القليل من الدموع أو عدم وجود دموع على الإطلاق ، وجود فم جاف أو تشقق الشفتين ، الشعور بالدوار أو الدوار ، النعاس الشديد أو أقل يقظة

يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة

يتقيأ دماً ، أو لديه قيء أخضر أو بني

يعاني من آلام شديدة في المعدة أو الظهر

لديه صداع أو تصلب في الرقبة

يتقيأ بعد إصابة في الرأس

يتقيأ لأكثر من 24 ساعة

