

Suite et séries de fonctions

Chapitre 1: Suites de fonctions

Table des matières

1. Introduction.	1
2. Convergence simple.	1
3. Convergence uniforme.	2
3.1. Propriétés de la $\ \cdot\ _{+\infty}$	4
4. Intégration sur un segment et convergence uniforme.	7
5. Dérivation et convergence uniforme.	8
6. Modes de convergence d'une série de fonctions.	11

1. Introduction.

On considère un ensemble X non vide (en général $X \subset \mathbb{R}$ ou \mathbb{C}).

Définition 1.1 (suite de fonctions): On appelle suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur X la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par la fonction $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto f_n(x)$.

Exemple: $X = \mathbb{R}$

$\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) = \ln(1 + nx^2)$.

2. Convergence simple.

On cherche à étudier le comportement d'une suite de fonction quand n tend vers $+\infty$, il faut définir une notion de convergence. Le plus simple c'est d'utiliser la convergence des suites numériques.

Définition 2.1 (convergence simple): Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions sur X . On dit que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge simplement** sur X , si pour tout $x \in X$, la suite numérique $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. Dans ce cas on note $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$ la limite et on dit que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers f sur X et on note $f_n \xrightarrow{\text{CS}} f$ sur X . i.e :

$$f_n \xrightarrow{\text{CS}} f \text{ sur } X \Leftrightarrow \forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

Remarques:

1. Le N de la définition dépend de x et de ε .
2. La convergence simple est une propriété locale.

Remarque (méthode): Pour étudier la convergence simple d'une suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur X on doit :

1. Fixer $x \in X$.
2. Etudier la suite numérique $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$.
3. S'il y a convergence, on construit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ tq $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$ et on dit $f_n \xrightarrow{\text{CS}} f$ sur X .

Exemples:

1. On considère $(f_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus 0}$ sur $I =]0, +\infty[$ définie par $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \frac{1}{x + \frac{1}{n}}$. Soit $x > 0$ fixé, on a $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}$. On pose $f : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \frac{1}{x}$ et on a $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{CS}} f$ sur X .
2. Même suite mais sur $I = [0; +\infty[$. Pour $x = 0$, $f_n(0) = n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus 0}$ ne converge pas simplement sur I .
3. On considère $(f_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus 0}$ sur $I = [0, +\infty[$ où $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$
 - * pour $x = 0$ fixé, $f_n(0) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.
 - * pour $x > 0$ fixé, $f_n(x) = e^{n \ln(1 + \frac{x}{n})} = e^{n(\frac{x}{n} + o(\frac{1}{n}))} = e^{x + o(1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^x$
 On pose $f : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto e^x$, on a $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{CS}} f$ sur I .
4. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur $I = [0, 1]$ définie par $f_n(x) = x^n$.
 - * Si $x \in [0, 1[$ fixé, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$
 - * Si $x = 1$, $f_n(1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.
 On pose $f : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x=1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$. On a $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f$.
 On veut définir une convergence qui conserve la continuité à la limite. On suppose $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{CS}} f$ sur I un intervalle de \mathbb{R} . On suppose $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n \in C^0(I, \mathbb{R})$. Soit $\alpha \in I, \varepsilon > 0$. On veut majorer $|f(x) - f(\alpha)|$ par ε . On a :

$$\begin{aligned} |f(x) - f(\alpha)| &= |f(x) - f_n(x) + f_n(x) + f_n(\alpha) - f_n(\alpha) - f(\alpha)| \\ &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(\alpha)| + |f_n(\alpha) - f(\alpha)| \end{aligned}$$

1^{er} terme: $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue en α donc

$$\exists \eta_n \in \mathbb{R}, x \in]\alpha - \eta, \alpha + \eta[\Rightarrow |f_n(x) - f_n(\alpha)| < \varepsilon.$$

2^{eme} terme: Comme f_n tend vers f quand $n \rightarrow (+\infty)$,

$$\exists N_{x,\varepsilon}, n \geq N_{x,\varepsilon} \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

3^{eme} terme: Comme $f_n(\alpha)$ tend vers $f(\alpha)$ quand $n \rightarrow (+\infty)$,

$$\exists \eta_n \in \mathbb{R}, x \in]\alpha - \eta, \alpha + \eta[\Rightarrow |f_n(\alpha) - f(\alpha)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Le problème est dû au fait que on doit satisfaire les deux conditions $x \in]\alpha - \eta; \alpha + \eta[$ et $x \geq N_{x,\varepsilon}$ pour une infinité de x .

3. Convergence uniforme.

Définition 3.1 (Convergence uniforme): Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonction sur X . Soit f une fonction sur X . On dit que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur X si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow \forall x \in X, |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

On note $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{CU}} f$ sur X .

Remarques:

1. Le N ne dépend que de ε .
2. La convergence uniforme est une propriété globale.

Définition 3.2: Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On appelle **norme sup** ou **norme infinie** sur X la valeur :

$$\|f\|_{+\infty, X} = \sup\{|f(x)|, x \in X\} \in \mathbb{R}_+ \cup \{\pm\infty\}.$$

Exemples:

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$
On a $\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq f(x) \leq 1$ et $f(0) = 1$ donc $\|f\|_{+\infty, \mathbb{R}} = 1$.
2. $f : I = [0, 1[\rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto x^2$
On a $f'(x) = 2x \geq 0$ Donc $f(x)$ est croissante sur I et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} 1$. D'où $\{f(x), x \in I\} = [0, 1[$ donc $\|f\|_{+\infty, I} = 1$.
3. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto x$,
 $\|f\|_{+\infty, \mathbb{R}} = +\infty$.

3.1. Propriétés de la $\|\cdot\|_{+\infty}$

Proposition 3.1.1: Soient $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions.

1. S'il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall x \in X, |f(x)| \leq M$ alors $\|f\|_{+\infty, X} \leq M$.
2. $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \|\alpha f\|_{+\infty, X} = |\alpha| \|f\|_{+\infty, X}$.
3. $\|f + g\|_{+\infty, X} \leq \|f\|_{+\infty, X} + \|g\|_{+\infty, X}$.
4. $\|fg\|_{+\infty, X} \leq \|f\|_{+\infty, X} \|g\|_{+\infty, X}$.

Démonstration:

1. exercice
2. exercice
3. $|f + g| \leq |f| + |g| \leq \|f\|_{+\infty, X} + |g| \leq \|f\|_{+\infty, X} + \|g\|_{+\infty, X}$ d'où d'après 1),

$$\|f + g\|_{+\infty, X} \leq \|f\|_{+\infty, X} + \|g\|_{+\infty, X}.$$

□

Proposition 3.1.2 (Convergence uniforme avec la norme infinie): Soient $(f_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus 0}$ une suite de fonctions sur X et f une fonction sur X . Alors

$$f_n \xrightarrow{\text{CU}} f \Leftrightarrow \|f_n - f\|_{+\infty, X} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Démonstration:

\Rightarrow Si $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur X , $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tq $n \geq N \Rightarrow \forall x \in X, |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ donc $\|f_n - f\|_{+\infty, X} \leq \varepsilon$.

D'où $\|f_n - f\|_{+\infty, X} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

\Leftarrow Si $\|f_n - f\|_{+\infty, X} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ Alors

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow \forall x \in X, |f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n(x) - f(x)\|_{+\infty, X} \leq \varepsilon.$$

Donc $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur X .

□

Théorème 3.1.1: Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus 0}$ une suite de fonctions et soit f une fonction sur X . On a

$$f_n \xrightarrow{\text{CU}} f \text{ sur } X \Rightarrow f_n \xrightarrow{\text{CS}} f \text{ sur } X.$$

Démonstration: Immédiat.

□

Remarque (Méthode): Plan pour étudier la convergence uniforme d'une suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus 0}$ sur X .

1. **Etudier la convergence simple.**
2. S'il y a convergence simple, on définit la fonction $f : X \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto f_n(x)$ quand $n \rightarrow +\infty$.
3. Etudier la convergence uniforme: s'il y a convergence uniforme, **cela ne peut être que vers f !**
4. Pour montrer la **convergence uniforme** : on majore $\|f_n - f\|_{+\infty, X}$ par une suite numérique (sans x) qui tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$.

Pour montrer la **non-convergence uniforme** : on minore $\|f_n - f\|_{+\infty, X}$ par une suite numérique positive (sans x) qui ne tend pas vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$.

On pourra étudier la suite: $g_n = f_n - f$.

Exemples:

1. $(f_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus 0}$ définie par $f_n : I = [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \frac{1}{x + \frac{1}{n}}$.
On a vu que $f_n \xrightarrow{\text{CS}} f$ sur I où $f : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \frac{1}{x}$. On pose:

$$g_n = f_n - f = \frac{1}{x} - \frac{1}{x + \frac{1}{n}} = \frac{\frac{1}{n}}{x(x + \frac{1}{n})} = \frac{1}{nx^2 + x}.$$

1^{ère} méthode: Majoration de $|g_n|$ par une expression qui ne dépend pas de x et qui tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$.

Lorsque $x \geq 1$; $nx^2 + x \geq nx^2 + 1 \geq n + 1$ Donc $\forall x \in I, 0 \leq g_n(x) \leq \frac{1}{n+1}$ Donc

$$\|f_n - f\|_{+\infty, I} \leq \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

. D'où $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur I .

2^e méthode: (en général plus couteuse): On étudie g_n . On a $g_n'(x) = -\frac{2nx+1}{(nx^2+x)^2} \leq 0$ donc g_n est décroissante sur I et $\|f\|_{+\infty, I} = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. D'où $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur I .

2. $(f_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus 0}$ définie par $f_n : I = [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto x^n$. On a vu $f_n \xrightarrow{\text{CS}} f$ sur I où $f : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0, 1[\\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

1^{ère} méthode: On veut minorer $|f_n(x) - f(x)|$. Pour cela, on utilise une suite de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où $\forall n, x_n \in I, x_n = 1 - \frac{1}{n}$. Ainsi, on a bien $|f_n(x_n) - f(x_n)| \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = f_n(x_n) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{n \ln(1 - \frac{1}{n})} = e^{n(-\frac{1}{n} + o(\frac{1}{n}))} = e^{-1 + o(1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{e}$$

On a $\|f_n - f\|_{+\infty, I} \geq |f_n(x_n) - f(x_n)| \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. d'où $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas uniformément sur I .

2^e méthode: $g_n(x) = f_n(x) - f(x) = \begin{cases} f_n(x) = x^n & \text{si } x \neq 1 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$ donc $\|g_n\|_{+\infty, I} = 1 \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas uniformément sur I .

Théorème 3.1.2 (convergence uniforme + continuité): Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions définies sur I . Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $x_0 \in I$. On suppose

1. $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est continue en x_0 ($f_n \in C^0(I, \mathbb{R})$).
2. $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur I .

Alors f est continue en x_0 .

Démonstration: Soit $\varepsilon > 0$.

On a $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur I donc $\exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

De plus, f_n est continue en x_0 donc $\exists \eta > 0, |x - x_0| \leq \eta \Rightarrow |f_n(x) - f_n(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

Soit $n \geq N$ et $x \in I$ tq $|x - x_0| \leq \eta$.

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |f(x) - f_N(x) + f_N(x) - f_N(x_0) + f_N(x_0) - f(x_0)| \\ &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Ainsi, f est continue en x_0 . □

Remarques:

1. Il n'y a pas réciprocity.
2. Le théorème nous donne un critère supplémentaire pour justifier la non-convergence uniforme.
3. On remarque que l'on a pas besoin de la continuité uniforme sur I en entier, c'est suffisant de l'avoir sur un voisinage de x_0 (ou un intervalle fermé et borné contenant x_0).

Proposition 3.1.3 (Continuité uniforme sur tout segment + continuité): Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle. Soient $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions sur I et f une fonction définie sur I . On suppose :

1. $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est continue en x_0 .
2. $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur tout segment $K = [a, b] \subset I$.

Alors f est continue sur I .

Démonstration: Soit $x_0 \in I, \exists K = [a, b]$ avec $a \neq b \neq x_0$ tel que $x_0 \in [a, b]$ On applique le théorème sur K donc f est continue en x_0 . D'où f continue sur I . □

Remarques: Soit I un intervalle de \mathbb{R} .

1. f est continue sur $I \Leftrightarrow f$ est continue sur n'importe quel segment $K \subset I$.
2. $f_n \xrightarrow{\text{CS}} f$ sur $I \Leftrightarrow f_n \xrightarrow{\text{CS}} f$ sur $K \subset I$ pour tout segment $K \subset I$.
3. $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur $I \Leftrightarrow f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur $K \subset I$ pour tout segment $K \subset I$.

Exemple: Considérons pour $n \in \mathbb{N} \setminus 0, f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{nx}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ Comme

$$\left| x^2 \sin\left(\frac{1}{nx}\right) \right| \leq x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0,$$

f_n est continue en 0.

Convergence simple: Si $x = 0, f_n(0) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Si $x \in \mathbb{R} \setminus 0, f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x^2 \frac{1}{nx} = \frac{x}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Convergence uniforme sur tout segment $K = [-\alpha, \alpha] \forall \alpha \in \mathbb{R}_+ \setminus 0$:

$g(x) = \sin x - x$ et $g'(x) = \cos(x) - 1 \leq 0$. De plus, $\forall x \in K, g(x) \leq 0$ donc $|\sin(x)| \leq |x|$.

Donc $\forall x \in \mathbb{R}, |f_n(x)| \leq x^2 \left(\frac{1}{nx}\right) \leq \frac{|x|}{n}$.

D'où: $\forall x \in [-\alpha, \alpha] = K, |f_n(x)| \leq \frac{\alpha}{n}$ donc $\|f_n - f\|_{+\infty, K} = 0$. et $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur K . Ainsi, il y a convergence uniforme sur tout segment.

Montrons qu'il n'y a **pas** de convergence uniforme sur \mathbb{R} :

On prend $x_n = n$ et $f_n(x_n) = n^2 \sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n^2 \frac{1}{n^2} = 1$ On a

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = 1 \leq \|f_n - f\|_{+\infty, \mathbb{R}} \not\rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$$

Remarque: La convergence uniforme ne se conserve pas lors d'une réunion infinie. Mais se conserve si elle l'est.

4. Intégration sur un segment et convergence uniforme.

On veut étudier une suite d'intégrales par exemple, on veut chercher la limite quand $n \rightarrow +\infty$ de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $I_n = \int_0^1 \frac{n^4 + x^4}{(n+x)^4} dx$. La tentation serait de dire qu'à x fixé, $\frac{n^4 + x^4}{(n+x)^4} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ et donc $I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 1 dx = 1$. En faisant cela, on dit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx$$

ce qui est généralement **faux**.

Théorème 4.1 (Convergence uniforme + intégration sur un segment): Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions sur un **segment** $I = [a, b]$. On suppose que:

1. $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est continue sur I .
2. $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur I .

Alors f est continue sur I et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Démonstration: f est continue sur I par le théorème de CU+continuité donc $\forall n \in \mathbb{N}, \left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| = \left| \int_a^b f_n(x) - f(x) dx \right|$

$$\leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx$$

$$\leq \int_a^b \|f_n - f\|_{+\infty, I} dx = \|f_n - f\|_{+\infty, I} (b - a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \quad \square$$

Remarque: Le théorème peut être utilisé pour montrer la non convergence uniforme.

Exemple: Soit $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)$.

On montre que $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur $[0, 1]$ où $f(x) = x$ (en exercice) et donc on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$$

5. Dérivation et convergence uniforme.

On a vu que si $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur I , et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ continue sur I alors f est continue sur I .

Exemple: $f_n(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$.

$(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est continue sur \mathbb{R} . On a $f_n \xrightarrow{\text{CS}^n} f$ sur \mathbb{R} où $f(x) = |x|$ (C^0 sur \mathbb{R} pas C^1 sur \mathbb{R}).

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{x^2} = \frac{x^2 + \frac{1}{n} - x^2}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2}} = \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2}} \\ &\leq \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}} \leq \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n}}} = \sqrt{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

Donc $\|f_n - f\|_{+\infty, \mathbb{R}} \leq \sqrt{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. D'où $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur \mathbb{R} .

Théorème 5.1 (Convergence uniforme + primitive): Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions sur un **segment** $I = [a, b]$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, par le théorème fondamental de l'analyse, on introduit la fonction $F_n : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \int_a^x f_n(t) dt$. Si $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur I , alors $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I vers $F : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ qui est C^1 sur I .

Démonstration:

$$\begin{aligned} \forall x \in I, n \in \mathbb{N}, |F_n(x) - F(x)| &= \left| \int_a^x f_n(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right| \\ &= \int_a^x |f_n(t) - f(t)| dt \\ &\leq \int_a^b |f_n(t) - f(t)| dt \\ &\leq \|f_n - f\|_{+\infty, I} (b - a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ voir thm précédent.} \end{aligned}$$

Donc $f_n \xrightarrow{\text{CU}} F$ sur I . □

Théorème 5.2 (Convergence uniforme + dérivation hypothèses minimales): Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie sur un **intervalle** I . On suppose :

1. $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est C^1 sur I .
2. $\exists \alpha \in I$ tel que $f_n(\alpha)$ converge.
3. $\exists g$ définie sur I telle que $f'_n \xrightarrow{\text{CU}} g$ sur tout segment $K \subset I$.

Alors :

1. La suite $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur tout segment $K \subset I$.
2. $f' = g$

Démonstration: On note $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(\alpha)$. Par 3. on déduit que g est C^0 sur tout segment $K \subset I$ donc C^0 sur I . On pose $G_n : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \int_a^x f'_n(t) dt$.

Remarquons que $\forall x \in I, G_n(x) = f_n(x) - f_n(\alpha)$. Par 3. + le thm de convergence uniforme + primitive $f_n \xrightarrow{\text{CU}} G$ sur tout segment $K \subset I$ où □

Corollaire 5.1 (Dérivation et continuité uniforme): Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie sur un **intervalle** I . On suppose :

1. $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est C^1 sur I .
2. $\exists f$ définie sur I telle que $f_n \xrightarrow{CS} f$ sur I .
3. La suite de fonctions $(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers une fonction $g : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Alors :

1. La suite $f_n \xrightarrow{CU} f$ sur tout segment $K \subset I$.
2. La fonction f est C^1 sur I .
3. $f' = g$

Théorème 5.3: Soit $k > 1$, $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} : I \rightarrow \mathbb{R}$ une suite de fonctions. On suppose :

1. $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est C^k sur I .
2. $\forall i \in \{0, \dots, k-1\}$ la suite $(f_n^{(i)})$ converge simplement sur I .
3. La suite des dérivées k -ième converge uniformément sur I (ou sur tout segment $K \subset I$) vers une fonction $g : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Alors il existe une fonction f, C^k sur I telle que :

1. $f^{(k)} = g$
2. $\forall i \in \{0, \dots, k\}, f_n \xrightarrow{CU} f^{(i)}$ sur tout segment $K \subset I$ **PROBLEME FONCTION**

Démonstration: par récurrence. □

Remarque: Si $f_n \xrightarrow{CU} f$ sur I et $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est C^1 sur I alors f n'est pas forcément C^1 sur I .

Théorème 5.4 (double limite): Soit $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ une borne d'un intervalle I , $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions définies sur I , et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On suppose :

1. $\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l_n \in \mathbb{R}$.
2. $f_n \xrightarrow{CU} f$ sur I .

Alors :

1. La suite numérique $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $l \in \mathbb{R}$.
2. $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$.

On a donc

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = l_n \right) = l$$

Démonstration:

1. Montrons que la suite (l_n) converge, donc est de Cauchy. Soit $\varepsilon > 0$ Par 2.,

$$\exists N \text{ tel que } \forall n \geq N, \text{ on a } \|f_n - f\|_{+\infty, I} \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Soit $n \geq N$ et $p \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_{n+p}(x)| &= |f_n(x) - f(x) + f(x) - f_{n+p}(x)| \\ &\leq |f_n(x) - f(x)| + |f_{n+p}(x) - f(x)| \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

On passe à la limite quand $x \rightarrow a$ et $l_n - l_{n+p} \leq \varepsilon$. donc (l_n) est de Cauchy donc converge.

2. Montrons $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$.

Comme $f_n \xrightarrow{\text{CU}} f$ sur I , $\exists N_1 \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N_1 \Rightarrow \|f_n - f\|_{+\infty, I} \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

Comme $l_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$, $\exists N_2 \in \mathbb{N}$, tel que $n \geq N_2 \Rightarrow |l_n - l| \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

Posons $N = \max\{N_1, N_2\}$. Puisque $f_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l_n$,

$$\exists \alpha > 0 \text{ tel que } \forall x \in I, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow |f_n(x) - l_n| \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

Soit $x \in I$ tel que $|x - a| \leq \alpha$ et soit $n \geq N$. On a :

$$\begin{aligned} |f(x) - l| &= |f(x) - f_n(x) + f_n(x) - l_n + l_n - l| \\ &= |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - l_n| + |l_n - l| \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$.

□

Remarque: La conclusion du théorème est vraie même si $l_n = +\infty$.

Exemple (Pour montrer la non convergence uniforme): On considère $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}_+; x \mapsto \frac{x}{n+x}, n \geq 1$.

1. $\forall n \in \mathbb{N}, f_{n(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1 = l_n$ donc $l_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 = l$.

2. CS de (f_n) : pour $x = 0$ $f_n(0) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. pour $x > 0$ fixé, $f_{n(x)} = \frac{x}{n+x} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $f_n \xrightarrow{\text{CS}} 0$.

Or

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x) \right) = 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} l_n \right) = 1.$$

Faux donc 2. n'est pas vrai et il n'y a pas convergence uniforme.

Chapitre 2: Séries de fonctions.

6. Modes de convergence d'une série de fonctions.

Remarque: On considérera un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ et des fonctions $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ mais il est possible de généraliser aux fonctions $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ en remplaçant la valeur absolue par le module.

Définition 6.1: Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions sur I . On appelle série de fonctions de terme général f_n la suite de fonctions

$$(S_n)_{n \in \mathbb{N}} := S_n : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \sum_{k=0}^n f_k(x).$$

On note $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$ une telle série de fonctions. La fonction S_n s'appelle la n -ième somme partielle de $\sum f_n$.

Définition 6.2 (Convergence simple): On dit qu'une série de fonctions $\sum f_n$ converge simplement sur I si pour tout $x \in I$, la série numérique $\sum f_n(x)$ converge. (\Leftrightarrow la suite numérique $(S_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge).

Si $\sum f_n$ converge simplement sur I , on définit la fonction limite

$$S : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$$

1. La fonction S est appelée la fonction somme de $\sum f_n$ et est notée $S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $S - S_n$ notée R_n s'appelle la fonction reste d'ordre n de $\sum f_n$, on note $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k$. On a $R_n \xrightarrow{\text{cs}} 0$ sur I .

Définition 6.3 (Reste):

Remarques:

1. Montrer que $\sum f_n$ converge simplement sur I c'est montrer que $S_n \xrightarrow{\text{cs}} S$.
2. Si $\sum f_n$ converge simplement sur I , alors $S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est définie sur I .
3. En général, il n'est pas possible de calculer explicitement S .