

🔧 การวินิจฉัย & การรักษา

📋 แนวทางวินิจฉัย

1. ชักประวัติ
2. ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน (ANA / Anti-dsDNA)
3. ตรวจปัสสาวะ และตัดเนื้อเยื่อตรวจในเคสไตอักเสบ

แนวทางการรักษา

1. ยาต้านการอักเสบ

ควบคุมอาการทางผิวหนัง ข้อ และลดโอกาสกำเริบ

2. ยาสเตียรอยด์ (Corticosteroids)

ลดการอักเสบรุนแรงเฉียบพลันที่มีผลต่ออวัยวะสำคัญ

3. ยากดภูมิ & ยาชีววัตถุ

ใช้ยับยั้งการทำงานของภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ

👤 ข้อควรปฏิบัติ & ติดตาม

การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง

⚙️ หลีกเลี่ยงแสงแดด: ทากันแดด SPF 50+ สวมหมวก/เสื้อ

💊 ยาว

🚫 ทานยาต่อเนื่อง: ห้ามหยุดหรือปรับลดยาเองเด็ดขาด

👤 ป้องกันติดเชื้อ: ทานอาหารสุกสะอาด ล้างมือบ่อยๆ

🏠 สังเกตอาการ: หากมีไข้ ปัสสาวะเป็นฟอง ริมฝีปากบวม

⚠️ สัญญาณเตือนโรคกำเริบ:

หากมีไข้สูง ขาบวม ปัสสาวะเป็นฟอง ผื่นเห่อขึ้น หรือเหนื่อยหอบ ให้รีบมาพบแพทย์ทันที



คณะแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โรคแพ้ภูมิตัวเอง Systemic Lupus Erythematosus (SLE) (โรคฟุ่มพวง)



คู่มือความรู้ สัญญาณเตือน
และการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง

โรค SLE คืออะไร?

นิยามโรค

โรคแพ้ภูมิตัวเอง (หรือ "โรคฟุ่มพวง") เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ แทนที่จะทำลายเชื้อโรค กลับสร้างภูมิมาทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของตนเอง ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายระบบ เช่น **ไตวาย และ ลิ้มเลือดอุดตันเส้นเลือด**

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ

- เพศ & อายุ: พบในผู้หญิงมากกว่าชาย 9 เท่าในช่วงวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ
- พันธุกรรม: มีประวัติคนในครอบครัว
- สิ่งแวดล้อมกระตุ้น: รังสี UV จากแสงแดด, การติดเชื้อ, ฮอร์โมน และความเครียด

สัญญาณเตือน & อาการที่พบบ่อย



ผื่นหนัง & ผม

ผื่นแดงบริเวณแก้มคล้ายปีกผีเสื้อ (Butterfly Rash), แดงแดงง่าย และผรุสว่สเป็นหย่อม



ข้อ & กล้ามเนื้อ

ปวด บวม ตึง บริเวณข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ หรือข้อนิ้วมือ โดยเฉพาะช่วงเช้าหลังตื่นนอน



อาการทั่วไป

ไข้ต่ำเรื้อรัง อ่อนเพลีย น้ำหนักลด และพบแผลในปากบ่อยโดยมักไม่รู้สึกรังเกียจ



ภาวะแทรกซ้อนสำคัญ



ระบบไต (Lupus Nephritis)

ปัสสาวะเป็นฟอง/เลือด หน้าบวม ขาบวม

เสี่ยงไตวายเรื้อรัง



หัวใจ & ปอด & เลือด

เยื่อหุ้มหัวใจ/ปอดอักเสบ เสี่ยงลิ้มเลือดอุดตัน เกร็ดเลือดต่ำ โลหิตจาง



สมอง & ระบบประสาท

มีอาการชัก สับสน หรืออาการทางจิตประสาทโดยไม่มีสาเหตุอื่น

