

คู่มือความรู้สุขภาพ

โรคแพ้ภูมิตัวเอง

Systemic Lupus Erythematosus (SLE) / โรคฟุ่มพวง

คู่มือความรู้ สัญญาณเตือน และการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง

จัดทำโดย: คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โรค SLE คืออะไร?

นิยามโรค

โรคแพ้ภูมิตัวเอง (หรือ "โรคฟุ่มพวง") เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ แทนที่จะทำลายเชื้อโรค กลับสร้างภูมิมาทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของตนเอง ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายระบบ เช่น ไตวาย และ ลิ้มเลือดอุดตัน
เส้นเลือด

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ



เพศ & อายุ: พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 9 เท่า ในช่วงวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ

พันธุกรรม: มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติ



สิ่งแวดล้อมกระตุ้น: รังสี UV จากแสงแดด, การติดเชื้อ, ฮอร์โมน และความเครียด



สัญญาณเตือน & อาการที่พบบ่อย

- ✿ ผื่นหนัง & ผม: ผื่นแดงบริเวณแก้มพาดผ่านสันจมูกคล้ายปีกผีเสื้อ (Butterfly Rash), ไวต่อแสงแดดง่าย และผมร่วงเป็นหย่อม
- 🦴 ข้อ & กล้ามเนื้อ: ปวด บวม ตึง บริเวณข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ หรือข้อนิ้วมือ โดยเฉพาะช่วงเช้าหลังตื่นนอน
- 💔 อาการทั่วไป: ไข้ต่ำเรื้อรัง อ่อนเพลีย น้ำหนักลดลง และพบแผลตุ่มในปากบ่อย โดยมักไม่รู้สึเจ็บ



สัญญาณเตือน & อาการที่พบบ่อย




ภาวะแทรกซ้อนสำคัญ



ระบบไต (Lupus Nephritis)

ปัสสาวะเป็นฟอง/เลือด หน้าบวม ขาบวม **เสี่ยงไตวาย**
เรื้อรัง



ภาวะแทรกซ้อนสำคัญ



สมอง & ระบบประสาท

ส่งผลให้มีอาการชัก สับสน สติพร่ามัว หรือเกิดอาการทางจิตประสาทโดยไม่อาจหาสาเหตุอื่นอธิบายได้



หัวใจ ปอด & เลือด

เยื่อหุ้มหัวใจ/ปอดอักเสบ

เสี่ยงลิ่มเลือดอุดตัน เกร็ดเลือดต่ำ โลหิตจาง

การวินิจฉัยโรค

-  การซักประวัติอย่างละเอียด
-  ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน: ค้นหาแอนติบอดีจำเพาะ เช่น ANA และ Anti-dsDNA
-  ตรวจปัสสาวะ & ตัดเนื้อเยื่อ: ตรวจการรั่วของโปรตีน และตัดเนื้อเยื่อไต
ตรวจกรณีมีไตอักเสบ



แนวทางการรักษา

1. ยาต้านการอักเสบ

ควบคุมอาการทางผิวหนัง ข้อ และลดโอกาสกำเริบ

2. ยาสเตียรอยด์ (Corticosteroids)

ลดการอักเสบรุนแรงเฉียบพลันที่มีผลต่ออวัยวะสำคัญ

3. ยากดภูมิ & ยาชีววัตถุ

ใช้ยับยั้งการทำงานของภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ

การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง



หลีกเลี่ยงแสงแดด: ทากันแดด SPF 50+ สวมหมวก/เสื้อยาว



ทานยาต่อเนื่อง: ห้ามหยุดหรือปรับลดยาเองเด็ดขาด



ป้องกันติดเชื้อ: ทานอาหารสุกสะอาด ล้างมือบ่อยๆ

สัญญาณเตือนโรคกำเริบ

ข้อควรระวังสำคัญ!

หากมีอาการผิดปกติเหล่านี้เกิดขึ้น ให้สงสัยว่าอาจเกิดภาวะโรคกำเริบเฉียบพลัน:

 มีไข้สูงโดยไม่ทราบสาเหตุ

 ปัสสาวะเป็นฟองมากผิดปกติ

 ขาบวม หรือหน้าบวม

 ผื่นเห่อขึ้น หรือเหนื่อยหอบ



กรุณารีบเดินทางมาพบแพทย์ทันที

มีคำถามอะไรไหมครับ?