

专题练习_圆锥曲线_3

本次专题练习是针对双曲线而写的

椭圆和双曲线尽管在图像上差别很大，但是它们的性质是对称的。椭圆中成立的结论，一般在双曲线中也成立。因此，下面的题目中，我会倾向于选择那些与双曲线特有的性质相关的题目，涵盖了**等轴双曲线**、**焦点三角形的内切圆**、**双曲线的渐近线**这三个元素。

题一

已知等轴双曲线 Π 的左顶点为 P ， AB 是双曲线右支的一条弦，过 P 作 AB 的垂线，与 Π 交于 Q 。

H2 证明： Q 是 $\triangle PAB$ 的垂心。


注：

- ▶ 等轴双曲线指的是长轴和短轴长度相等的双曲线。
- ▶ Π 是希腊字母 π 的大写形式。除了用作取名，它还是**求积符号**： $\Pi_{i=1}^n a_i = a_1 a_2 a_3 \dots a_n$ 。

这道题目来源于下面这个美妙的定理，我作了简化，之前是直接把原定理作为题目，然而我做了之后发现难度太大。下面是之前写的解析，后面没有算完，但基本思路是一样的。

A, B, C 是等轴双曲线 Π 上的三点，证明： $\triangle ABC$ 的垂心也在 Π 上。

解析：



如上图所示，不妨设双曲线 Π 的方程为 $x^2 - y^2 = a^2 (a > 0)$ 。

我们要证明这个三角形的垂心位于 Π 上，所以需要求出两条垂线的交点坐标，并证明这个交点坐标满足双曲线的方程 $x^2 - y^2 = a^2$ 。

之前说过，椭圆和双曲线的题目一般用设线法。本题的三角形有三条边，那么我们应该设出哪一条边的直线方程呢？答案是随便。因为三条边的地位是等价的。不妨设 AB 的方程为 $y = kx + m$ ，点 A, B, C 的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ 。注意，直线 AB 是可以垂直 x 轴的，当然也可以垂直 y 轴，因此无论如何，都要分类讨论一下，这一步留给读者。下面的解析，主要叙述的是一般性的情况，也就是 AB 不垂直于 x 轴时。

接下来，我们求出 A, B 到对边的垂线 AM, BN ，那么两条垂线的交点就是垂心。但是在此之前，需要先把直线 AB 和双曲线联立，求出韦达定理的两个式子。（不止一次地强调过，不管题目会不会做，这一步的两分是必须要拿到的）

$$\begin{aligned} x^2 - (kx + m)^2 &= a^2 \\ (1 - k^2)x^2 - 2kmx - m^2 - a^2 &= 0 \end{aligned}$$

于是根据韦达定理，我们有

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{2km}{1 - k^2} \\ x_1 x_2 = \frac{-m^2 - a^2}{1 - k^2} \end{cases}$$

好了两分到手，可以做下一题了，然后我们首先求 AM ，为此，需要先求出直线 BC 的方程：

$$BC : y = \frac{y_2 - y_3}{x_2 - x_3}(x - x_2) + y_2$$

先别急着求 AM ，这里有个疑点：直线 BC 也有可能垂直于 x 轴！当然它也可能垂直于 y 轴，所以这里又要分类讨论了.....吗？其实不用，因为之前我们已经分类讨论过（虽然在这个解析里面没有写），当直线 AB 垂直于 x 轴的时候，题目的结论是成立的。现在你想想，既然 AB 垂直于 x 轴的时候结论成立，那么 BC 垂直于 x 轴的时候结论是不是也一定成立？ AC 垂直于 x 轴的时候呢？这是当然的。因为这三条边的地位是等价的。所以这里就不需要分类讨论了。下面求 AM 。

$$AM: y = \frac{x_3 - x_2}{y_2 - y_3}(x - x_1) + y_1$$

好了，两条垂线求出了一条，还留下一条 BN 。那么我们还需要把上面求 AM 的过程重复一遍吗？其实不需要，我们可以直接写出：

$$BN: y = \frac{x_3 - x_1}{y_1 - y_3}(x - x_2) + y_2$$

为什么？其实很简单，还是利用 AB, BC, CA 三条边地位等价这一事实。 AM 是 $B(x_2, y_2)C(x_3, y_3)$ 边上的垂线，它经过 $A(x_1, y_1)$ ； BN 是 $A(x_1, y_1), C(x_3, y_3)$ 边上的垂线，它经过 $B(x_2, y_2)$ 。比较一下，我们只需要把 B 和 A 换个位置就行了，也就是把 AM 方程中的 x_2 换成 x_1 ， x_1 换成 x_2 ， y_2 换成 y_1 ， y_1 换成 y_2 ，就能得到直线 BN 的方程。如果是考试，答题卡上就写一个 **同理**，然后直接把 BN 方程美美写出来。**同理**这个东西是各种数学证明的常客，在高中阶段，我们只在像本题这样有明显规律和对称性的情况下使用。

好了，下面求 AM 和 BN 的交点，也就是我们心心念念的垂心，不妨给它取个名字叫做 P 。 P 是 *point* 的首字母，常用来给点取名。

联立

$$\begin{cases} y = \frac{x_3 - x_2}{y_2 - y_3}(x - x_1) + y_1 \\ y = \frac{x_3 - x_1}{y_1 - y_3}(x - x_2) + y_2 \end{cases}$$

解得 P 点坐标为

$$\left\{ \begin{aligned} x_P &= \frac{y_2 - y_1 + \frac{x_1(x_3 - x_2)}{y_2 - y_3} - \frac{x_2(x_3 - x_1)}{y_1 - y_3}}{\frac{x_3 - x_2}{y_2 - y_3} - \frac{x_3 - x_1}{y_1 - y_3}} \\ &= \frac{(y_2 - y_1)(y_2 - y_3)(y_1 - y_3) + x_1(x_3 - x_2)(y_1 - y_3) - x_2(x_3 - x_1)(y_2 - y_3)}{(x_3 - x_2)(y_1 - y_3) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_3)} \\ &= \frac{k(x_2 - x_1)(kx_2 + m - y_3)(kx_1 + m - y_3) + x_1(x_3 - x_2)(kx_1 + m - y_3) - x_2(x_3 - x_1)(kx_2 + m - y_3)}{(x_3 - x_2)(kx_1 + m - y_3) - (x_3 - x_1)(kx_2 + m - y_3)} \\ &= \frac{k(x_2 - x_1)[k^2x_1x_2 + k(m - y_3)(x_1 + x_2) + (m - y_3)^2] + k[(x_1 - x_2)(x_3(x_1 + x_2) - x_1x_2)] - (kx_3 + m - y_3)(x_1 - x_2)}{(kx_3 + m - y_3)(x_1 - x_2)} \\ &= \frac{k(x_2 - x_1)[k^2 \cdot \frac{-m^2 - a^2}{1 - k^2} + k(m - y_3) \cdot \frac{2km}{1 - k^2} + (m - y_3)^2] + k[(x_1 - x_2)(x_3 \cdot \frac{2km}{1 - k^2} + \frac{m^2 + a^2}{1 - k^2})] - (kx_3 + m - y_3)(x_1 - x_2)}{(kx_3 + m - y_3)(x_1 - x_2)} \\ &= \frac{k(x_2 - x_1)[-k^2m^2 - k^2a^2 + 2k^2m^2 - 2k^2my_3 + (1 - k^2)(m - y_3)^2] + k(x_1 - x_2)(2kmx_3 + (1 - k^2)(kx_3 + m - y_3))}{(1 - k^2)(kx_3 + m - y_3)} \\ &= \frac{[k^3m^2 + k^3a^2 - 2k^3m^2 + 2k^3my_3 + k^3m^2 - 2k^3my_3 + k^3y_3^2 - km^2 + 2kmy_3 - ky_3^2 + 2k^2ma - k^2m^2 - k^2a^2 + 2k^2m^2 - 2k^2my_3 + (1 - k^2)(m - y_3)^2] + k(x_1 - x_2)(2kmx_3 + (1 - k^2)(kx_3 + m - y_3))}{(1 - k^2)(kx_3 + m - y_3)} \\ &= \frac{[k^3(m^2 + a^2 - 2m^2 + 2my_3 + m^2 - 2my_3 + y_3^2) + k^2(2mx_3 - mx_3 + x_3y_3) + k(-m^2 + 2my_3 - y_3^2 + 2k^2ma - k^2m^2 - k^2a^2 + 2k^2m^2 - 2k^2my_3 + (1 - k^2)(m - y_3)^2)] + k(x_1 - x_2)(2kmx_3 + (1 - k^2)(kx_3 + m - y_3))}{(1 - k^2)(kx_3 + m - y_3)} \\ &= \frac{[(a^2 + y_3^2)k^3 + x_3(m + y_3)k^2 + (2my_3 - y_3^2 + a^2)k + mx_3 - x_3y_3]}{(1 - k^2)(kx_3 + m - y_3)} \\ &= \end{aligned} \right.$$

上面的公式貌似只有在线浏览能看全，PDF版只能看到一部分，因为太长了。

计算量实在很大，连我都坚持不下去。

题2

H2