

集萃_1

题1

类型：组合数学

定义：三维欧氏空间中的点称为整点，当且仅当 x, y, z 坐标都是整数，例如 $(1, 1, 2)$ ， $(-2, 6, -2)$ 。从空间中任取 n 个整点

$P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ ，再从它们之中任取两个不同的点 $P_i, P_j (i \neq j)$ ， P_i, P_j 的中点不会^是整点。
问： n 的最大值为_____

答案：8

解答：

如果两个整点的中点还是整点，说明 x, y, z 坐标的奇偶性相同（因为奇加奇得偶，偶加偶得偶，而偶数除以二一定是整

数）。 x, y, z 的奇偶性一共能组合出8种情况：（奇，奇，奇），（奇，偶，奇），（偶，奇，奇），（奇，奇，偶），（奇，偶，偶），（偶，奇，偶），（偶，偶，奇），（偶，偶，偶）。那么 $n > 8$ 时，也就是任取空间中至少9个整点

时，其中必然存在两个整点的奇偶性相同，从而它们两个的中点也是整点。现在题目要求所有的中点都不能是整点，所以 n 最大为8（也就是取遍了所有奇偶性的组合）。

题2

类型：直线与圆

平面直角坐标系中有三条直线：

$$l_1 : \cos \theta_1 \cdot x + \sin \theta_1 \cdot y = 1, l_2 : \cos \theta_2 \cdot x + \sin \theta_2 \cdot y = 1, l_3 : \cos \theta_3 \cdot x + \sin \theta_3 \cdot y = 1$$

，其中 $\theta_1 \neq \theta_2 \neq \theta_3$ 。若 l_1, l_2, l_3 围成一个等边三角形，其面积为 S ，则 S 的取值集合为_____

答案: $\{\frac{\sqrt{3}}{3}, 3\sqrt{3}\}$

解答:

观察三条直线的结构,容易注意到它们到原点的距离都为1。所以,它们都是单位圆的切线。又因为围成了等边三角形,所以有两种

情形:要么单位圆作为等边三角形的内切圆,要么单位圆作为等边三角形的外切圆(注意不是外接圆)。如下图所示:



题3

类型: 古典概型

考察: 逻辑能力

任取一户有两个孩子的家庭,已知其中一个是女孩,则另一个是女孩的概率为_____

答案: $\frac{1}{2}$还是 $\frac{1}{3}$?

本题是一道争议很大的题目,被称为两孩悖论。在著名的概率论科普读物《醉汉的脚步》中,作者认为本题的答案是 $\frac{1}{3}$,同时他还

得到了一个更加违反常识的结论:如果把条件“已知其中一个是女孩”改为“已知其中一个是女孩,名字叫佛罗里达”,则结果变成 $\frac{1}{2}$ 。

我知道,第一次看到上面的答案时,你会感到惊讶。实际上,上面的答案虽然有一定的道理,但也并不完全正确。迄今为止,包括

《醉汉的脚步》作者蒙洛迪诺在内的很多人都对上面的答案提出了质疑。

我们先来看看蒙洛迪诺在书中写提出的解法:

- 这是一个古典概型问题,考虑出生顺序,样本空间为{男,男},{男,女},{女,男},{女,女},现在已知有一个是女孩,那么{男,男}这种情况就不可能了,样本空间缩小为{女,女},{男,女},{女,男},因此概率为 $\frac{1}{3}$ 。

- 如果把条件改成“已知其中一个是女孩，名字叫佛罗里达”，我们可以用女F表示叫佛罗里达的女孩，女NF表示不叫佛罗里达的女孩，这样样本空间就变成{男，男}，{女F，男}，{男，女F}，{女NF，男}，{男，女NF}，{女F，女NF}，{女NF，女F}，现在已知有一个叫佛罗里达的女孩，那么样本空间缩小为{女F，男}，{男，女F}，{女F，女NF}，{女NF，女F}，因此概率为 $\frac{1}{2}$ 。

上面的解答看起来天衣无缝，但得到的结果非常违反直觉。到底错在哪？

严格来说，本题的题干是模糊不清的，因而对题干的的不同理解，会导出不同的答案。

如果你认为本题的答案是 $\frac{1}{2}$ ，你应该是这么想的：这是一个古典概型问题，不考虑出生顺序，样本空间为{男，男}，{男，女}，

{女，女}，现在已知有一个是女孩，那么{男，男}这种情况就不可能了，样本空间变成{女，女}，{男，女}，因此概率为 $\frac{1}{2}$ 。

问题在于样本空间上面，究竟有没有先后顺序之分？

在本题中，这个争议是解决不了的，因为本题的条件：“已知其中一个是女孩”叙述模糊。