

Деление рациональных чисел

Чтобы разделить два числа с одинаковыми знаками, надо модуль делимого разделить на модуль делителя и результат записать со знаком «+».

$$\left\{ \begin{array}{l} \ominus : \ominus = \oplus \\ \oplus : \oplus = \oplus \end{array} \right\}$$

$$\begin{array}{l} (-6) : (-3) = +2; \\ (+6) : (+3) = +2. \end{array}$$

Чтобы разделить два числа с разными знаками, надо модуль делимого разделить на модуль делителя и результат записать со знаком «-».

$$\left\{ \begin{array}{l} \ominus : \oplus = \ominus \\ \oplus : \ominus = \ominus \end{array} \right\}$$

$$\begin{array}{l} (-6) : (+3) = -2; \\ (+6) : (-3) = -2. \end{array}$$

Если a — любое рациональное число, то

$$\begin{array}{l} a : 1 = a; \\ a : (-1) = -a; \\ a : a = 1; \\ 0 : a = 0. \end{array}$$

$$\begin{array}{l} -1,7 : 1 = -1,7; \\ 1,7 : (-1) = -1,7; \quad -1,7 : (-1) = 1,7; \\ -1,7 : (-1,7) = 1; \\ 0 : (-1,7) = 0. \end{array}$$

52



Координатная плоскость

Чтобы найти координаты произвольной точки на координатной плоскости, нужно опустить из этой точки перпендикуляры на оси координат.

Каждой точке на координатной плоскости соответствует пара чисел: абсцисса (x) и ордината (y):

$$\begin{array}{ll} A(2; -2), & C(-5; 2), \\ B(1; 3), & D(-3; -3). \end{array}$$

Пример. Начертите треугольник по точкам $A(2; -2)$, $B(3; 2)$, $C(-2; 1)$.



53