

CENG 481 GRAF TEORİ VE UYGULAMALARI

Hafta 13

Prof. Dr. Tufan TURACI
tturaci@pau.edu.tr

Hafta 13

Konular

1-Graflarda Zedelenebilirlik Kavramı

2-Graflarda Zedelenebilirlik Parametreleri

- Kimyasal sistemler, sinir ağıları, sosyal ağlar ya da internet gibi farklı sistemleri modellemek için iletişim ağıları ve karmaşık sistemler kullanılır. Fizik bilimleri, biyoloji bilimleri, bilgisayar bilimleri ve matematik gibi çeşitli araştırma alanlarında iletişim ağlarının topolojisini çalışma giderek artmaktadır ve büyük bir ilgi görmektedir.

- Çizge Teorisi, bir iletişim ağının mimarisinin analizi ve çalışmasında en güçlü matematiksel araçlardan biri haline gelmiştir. Bir iletişim ağının altında yatan topoloji bir $G(V(G), E(G))$ çizgesi ile modellenir. Bu G çizgesinin $V(G)$ tepeler kümesi iletişim ağındaki işlemciler kümesidir, $E(G)$ ayrıtlar kümesi ise iletişim ağındaki iletişim hatlarının bir kümesidir.

- Karmaşık sistemlerdeki ana konu, onun zedelenebilirlik ve dayanıklılığının değerlendirilmesidir. Zedelenebilirlik iletişim ağının analizinde önemli bir kavramdır. Bir iletişim ağının zedelenebilirliği o iletişim ağının altında yatan çizgenin global gücünün ölçümü olarak tanımlanmaktadır.

- Bir iletişim ağında bazı merkezlerin veya bağlantı hatlarının bozulmasıyla iletişim kesilene kadar ağın gösterdiği dayanma gücünün ölçümüne “ağın zedelenebilirlik sayısı ” denir.

- İletişim sistemleri, genellikle kopmalara ve saldırılara maruz kalırlar. İletişim ağının dayanıklılığını ölçmek için literatürde çeşitli ölçümler varken iletişim ağının güvenirliliğini hesaplayacak formülleri türetmek için de birçok çizge teorik parametreleri kullanılmaktadır.

- Çizgelerdeki ilk zedelenebilirlik parametresi Bağlantılılık sayısı (Connectivity)' dir. Daha sonra birçok zedelenebilirlik parametresi tanımlanmıştır. Bunlardan bazıları; dayanıklılık (toughness), saçılma sayısı (scattering number), bütünlük (integrity), baskınlık sayısı (domination number), bağımlılık sayısı (bondage number)' dir.

2. BAZI ÖNEMLİ ZEDELENEBİLİRLİK PARAMETRELERİ


Tanım 2.1: [14] Bir G çizgesini bağlantısız veya sadece izole tepelerden oluşan bir çizge haline getirmek için çizgeden çıkarılması gereken en az tepe sayısına çizgenin *tepe bağlantılılık sayısı* (*connectivity*) denir ve $k(G)$ ile gösterilir. Bir G çizgesinin bileşenlerinin sayısı $w(G)$ olmak üzere, connectivity tanımı;

$$k(G) = \min_{S \subseteq V(G)} \{|S| : w(G - S) \geq 2\}$$

şeklinde de yazılır.





Örnek 1:



$$k(K_{1,5}) = 1$$





Örnek 2:



$$k(C_6) = 2$$


Örnek 3:

-- Aşağıdaki grafları bağlantısız yapmak için graftan atılması gerekli tepele




Tanım 1: Bağlantılı bir G grafini bağlantısız yapmak veya tek izole tepe elde etmek için graftan çıkarılması gereken en az tepe sayısına grafin **bağlantılılığı (connectivity)** denir ve $k(G)$ ile gösterilir. Önemli grafların connectivity değerleri aşağıdadır.

1) Yol Graf




$$> k(P_n) = 1$$



2) Çevre Graf



$$> k(C_n) = 2$$




3) Yıldız Graf



$$k(K_{1,n}) = 1$$

4) Tom Graf



K_4

$$k(k_n) = n - 1$$


izole tepe

kolmenya kodar
tepe atilir.




K_3

3) Tekerlek Graf




$W_{1,4}$

$$\Rightarrow k(W_{1,n}) = 3$$



$W_{1,5}$

6) iki parçalı tam graf



$$\Rightarrow k(K_{m,n}) = \min\{n, m\}$$

Tanım: G grafi eğer $\chi(G)=n$ n -bağlı graftır denir.

Teorem: G , 2-bağlı bir graf ve u ve v bu grafın 2 tepesi olsun. Bu durumda G 'de bir C çevrini vardır öyleki u ve v bu döngüde yer alırlar.


- K_n den bir tepe çıkarılır ise K_{n-1} elde edilir.
Öyleyse $\chi(K_n)=n-1$


Bir Grafin Connectivity Değerlerinin Bulunması

Ağlardaki maksimum akış minimum kesme ye dayanan Menger'in teoremi birleştirilmişlik konusundaki en temel teoremdir ve bu teoreme göre bir grafta bitişik olmayan u ve v tepeleri arasındaki tepe tekrarsız yolların maksimum sayısı u ve v yi bağlantısız yapmak için çizgeden atılması gereken minimum tepe sayısına eşittir. Tepe birleştirilmişlik için ifade edilen bu teorem ayrıt tekrarsız yollar kullanılarak ayrıt birleştirilmişlik için de geçerlidir. Bu haliyle teorem grafin bağlantısız olmasını sağlayan tepelerin hangileri olduğu ile ilgili bir bilgi vermemektedir.

Teorem . *Bağlantılı bir G grafında ayrık ve komşu olmayan iki tepe u ve v olsun. Buna göre, G 'deki içten ayrık $u - v$ yollarının maksimum sayısı, u 'yu v 'den ayırmak için atılması gerekli tepelerin minimum sayısına eşittir.*

ÖRNEK: Aşağıda 10 tepeli bir G grafı verilmiştir. İçten ayrık yolların sayısı nedir?






$\left. \begin{array}{l} 1, 2, 5, 7, 10 \\ 1, 4, 6, 9, 10 \end{array} \right\}$ yellow 5 ve 6
 tepelerini kullanan
 içten çukuk yollarıdır.



5 ve 6 tepelerini kullanan farklı
iken aynı yollarla bulunabilir.
Fakat bunların sayısı maksimum
2'dir.

Böylece $k(G) = 2$ elde edilir.

5 ತರಸ್ಸು ಸಿಗಬೇಡಿತ್ತೆ.



5 ve 6 tepeleri silindiğinde:




✱ iktisadî-yolun seçimi
Ford-Fulkerson (en büyük akış)
algoritması yardımıyla bulunabilir.

Ford-Fulkerson Sözdə Kodu

```
ford-fulkerson (G, s, t)
  for each edge (u, v)  $\in E(G)$ 
     $f[u, v] = 0$ 
     $f[v, u] = 0$ 
  while (s'dən t'ye P yolu var isə)
     $C_f(P) = \min \{ C_f(u, v) \mid (u, v) \in P \}$ 
    for each edge (u, v) in P
       $f(u, v) = f(u, v) + C_f(P)$ 
       $f(v, u) = -f(u, v)$ 
    end
  end
```

Örnek




$A \rightarrow F$ 'ye en büyük çıkış?

1. adım: DFS ile $A \rightarrow F$ ye gide
bulunur.


ADF yolu

$$\min \{ \underset{3}{A-D}, \underset{7}{D-F} \} = 3 //$$



2. edim: $A \subset E \supset f$ yolu


$$\min \left\{ \begin{array}{cccc} A-C & C-E & E-D & D-f \\ 5 & 2 & 4 & 3 \end{array} \right\} = 2$$



3. adım


ABF yolu

$$\min \left\{ \begin{array}{cc} A-B & B-F \\ 4 & 6 \end{array} \right\} = 4$$




A'dan F'ye $4+5=9$ birim cıkıyor oldu.

* Tüm akış değerlerine 1
verildiğini zede, aşağıdaki graf
elde edilir.



1. a2m: ADF gets


$$\min \{ \min_{1 \leq i \leq n} A-D_i, \min_{1 \leq i \leq n} D_i-F \} = 1$$



2. exam: ACE of govt

$$\min \{ \underset{1}{A-C}, \underset{1}{C-E}, \underset{1}{E-D}, \underset{0}{D-F} \} = 0$$


3.02 min) A B F $\text{goh } \min \{ \underset{1}{A-B}, \underset{1}{B-F} \} = 1$



1+1=2
mek. okk
isten ayrık
hollann
sagış

Sıra olarak:

İstenen en kısa yolun sayısı 2'dir.



Böylece $k(6) = 2$ dir.

~~İstenen en kısa yollarda en az 2 yol vardır!!!~~


- Connectivity değeri polinom zamanda hesaplanır...**
- Connectivity değeri tanımlandıktan sonra connectivity değerine bağlı bir çok Zedelenebilirlik parametresi tanımlanmıştır.**
- Ortalama Alt Connectivity (Average Lower Connectivity) değeri bu parametrelerin önemlilerinden biridir.**

Ortalama Alt Connectivity Değeri

$$k_{av}(G) = \frac{1}{|V(G)|} \sum_{v \in V(G)} S_v(G)$$

$S_v(G)$: v tepesini içeren minimum elemanlı kümedir. Bu kümeyi graftan attığımızda graf ya bağlantısız kalır ya da izole tepe kalır.

Örnek: $k_{au}(K_{1,5}) = ?$



$$S_a(K_{1,5}) = 1 \quad \{a\}$$

$$S_b(K_{1,5}) = 2 \quad \{a, b\}$$

$$S_c(K_{1,5}) = 2 \quad \{a, c\}$$

$$S_d(K_{1,5}) = 2 \quad \{a, d\}$$

$$S_e(K_{1,5}) = 2 \quad \{a, e\}$$


$$S_f(K_{1,5}) = 2 \quad \{a, f\}$$

Böylece: $k_{av}(K_{1,5}) = \frac{1+2+2+2+2+2}{6}$
 $= \frac{11}{6} \approx 1.83$

$k(K_{1,5}) = 1$

$\star) k_{av}(K_{1,5}) > k(K_{1,5})$

Örnek:



$K_{1,5}$

6 tedi, 5 ayrıtlı,

$$k(K_{1,5}) = 1$$

$$k_{av}(K_{1,5}) = ?$$




$$\approx 1.83$$



hogy, 3: de ki

değeri? P_6



P_6

6 tedi, 5 ayrıtlı,

$$k(P_6) = 1$$

$$k_{av}(P_6) = ?$$

$$k_{av}(P_6) = \frac{2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2}{6}$$

$$= \frac{8}{6} \approx 1.33$$



Örnek: Önemli grafların artıklama
alt connectivity değerlerini bulunuz.


$$k_{\text{alt}}(P_n) = ? \quad k_{\text{alt}}(C_n) = ? \quad k_{\text{alt}}(K_n) = ?$$

$$k_{\text{alt}}(W_{1,n}) = ? \quad k_{\text{alt}}(K_{1,n}) = ?$$

n tepeli Yol graf:

$$k_{av}(P_n) = ?$$

\nwarrow
 n tepeli:





$$k_{av}(P_n) = \frac{2 \cdot 2 + (n-2) \cdot 1}{n} = \boxed{\frac{n+2}{n}}$$

$$k_{av}(P_6) = \frac{8}{6}$$

$n+1$ tepeli Yıldız graf:

$$k_{av}(K_{1,n}) = ?$$





$$k_{av}(K_{1,n}) = \frac{1 \cdot 1 + n \cdot 2}{n+1} = \boxed{\frac{2n+1}{n+1}}$$

$$k_{av}(K_{1,5}) = \frac{11}{6} \approx \underline{\underline{1.83}}$$

\nwarrow
 $n=5$

n tepeli Çevre graf:

$$k_{av}(C_n) = ?$$



$$\forall v \in V(G) \text{ için } \sum_v(G) = 2$$

$$k_{av}(C_n) = 2$$

n tepeli Tam graf için nedir? 

$n+1$ tepeli Tekerlek graf için nedir? 



Önemli Graf Parametre Değerleri


- 1- Integrity (Bütünlük) değeri**
- 2- Toughness (Dayanıklılık) değeri**
- 3- Tenacity (Kararlılık) değeri**
- 4- Scattering (Saçılım) değeri**
- 5- Rupture Degree (Parçalanma derecesi) değeri**

Tanım: G bir çizge ve G çizgesinin tepelerinin herhangi bir kümesi S olsun. $G - S$ çizgesinin en büyük boyutlu bileşeninin tepe sayısı $m(G - S)$ olmak üzere, G çizgesinin *tepe bütünlük değeri* (*integrity*) denir.

$$I(G) = \min_{S \subseteq V(G)} \{|S| + m(G - S)\} \text{ 'dir.}$$

Ques:

$$I(K_{1,5}) = ?$$



$\frac{5}{ a }$	$\frac{ S }{1}$	$\frac{n(G-S)}{1}$	$\frac{I^*}{2}$
$\{a, b\}$	2	1	3
$\{a, b, c\}$	3	1	4
$\{b, c\}$	2	4	6
		\vdots	


$$I(K_{1,5}) = 2$$

Tüm alt kümeler bakılırsa: $O(2^n)$

~~Polinom zamanda hesaplanmaz.~~

~~Sezgisel yaklaşımlar ile hesaplanabilir.~~

$$I(P_n) = ?$$




$$\frac{|S|}{1}$$

$$\frac{v-s}{2}$$

$$2$$

$$3$$

⋮



en cod.



#) Teoremi) G graf. n tere: bir graf den.

Bu durumda $\underline{m(G-S)} \geq \frac{n-|S|}{w(G-S)}$

S , atılabilen

sona geriye kalan
grafteki en büyük
parçanın eleman sayısı.

$n-|S|$ \rightarrow grafteki
atılabilir
min tere.
 $w(G-S)$ \rightarrow parçanın
sayısı

you graf için

$$n(6-s) \geq \frac{n-r}{r+1}$$

$$I(P_n) \geq \min_r \left\{ r + \frac{n-r}{r+1} \right\}$$

fork size

$f(r)$

$$f'(r) = 1 + \frac{-1 \cdot (\overbrace{r+1}) - 1 \cdot (n-r)}{(r+1)^2}$$

$$\frac{r^2 + 2r + 1 - r - 1 - n + r}{(r+1)^2}$$

$$f(r) \equiv 2\sqrt{n+1} - 2$$


min

$$I(p_n) = \lceil 2\sqrt{n+1} \rceil - 2.$$

P₆ idm: $I(P_6) = \left\lceil 2\sqrt{\frac{7}{2.6}} \right\rceil - 2$

$= \left\lceil 2 \cdot (2.6) \right\rceil - 2$

$= 6 - 2 = 4$



$$\frac{s}{\{2\}}$$

$$\frac{|s|}{1}$$

$$\frac{n(6-s)}{4}$$

$$\frac{I^*}{5}$$

$$\{2, 5\}$$

↓

$$2$$

$$2$$

$$4$$

$$1 \cdot \boxed{1 \cdot 5} \cdot 6$$

$$\{2, 4\}$$

$$2$$

$$2$$

$$4$$



$\{2, 4, 5\}$


3

1

4

\vdots

$$I(P_6) = 4$$



$$I(P_n) = \lceil 2\sqrt{n+1} \rceil - 2$$

Calculus Sorusu:

$$I(n) = ?$$

0

Yant: $I(n) = \int 2\sqrt{n} - 1$.

KAYNAKLAR

- [1] Chartrand, G.-Lesniak, L., (1986) : *Graphs and Digraphs*, Wadsworth & Brooks, California
- [2] West D.B. (2001) : *Introduction to Graph Theory*, Prentice Hall, USA.
- [3] Graf Teoriye Giriş, Şerife Büyükköse ve Gülistan Kaya Gök, Nobel Yayıncılık
- [4] Discrete Mathematical Structures for Computer Science, Ronald E. Prather, Houghton Mifflin Company, (1976).
- [5] Christofides, N., 1986. Graph Theory an Algorithmic Approach, Academic Press, London
- [6] Algoritmalar (Teoriden Uygulamalara), Vasif V. NABİYEV, Seçkin Yayıncılık