

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ (“МАЛЫЕ”) ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Теория типов, ИТМО, М3334-М3339, осень 2018 года

Домашнее задание №1: «знакомство с лямбда-исчислением»

1. Расставьте скобки:

$\lambda f.\lambda x.f\ x\ (\lambda c.g\ f)\ x\ a\ \lambda b.\lambda a.x$

2. Проведите бета-редукции и приведите выражения к нормальной форме:

(a) $(\lambda f.\lambda x.f\ (f\ x))\ (\lambda f.\lambda x.f\ (f\ x))$

(b) $(\lambda a.\lambda b.b)\ ((\lambda x.x\ x)\ (\lambda x.x\ x))$

3. Выразите следующие функции в лямбда-исчислении:

(a) Or, Xor

(b) isZero (T, если аргумент равен 0, иначе F)

(c) isEven (T, если аргумент чётный)

(d) умножение на 2, умножение

(e) возведение в степень

(f) вычитание 1, вычитание

Домашнее задание №2: «пропущенные теоремы лямбда-исчисления»

Докажите следующие леммы, упомянутые, но недоказанные на лекции:

1. Если отношение R обладает ромбовидным свойством, то и отношение R^* (транзитивное и рефлексивное замыкание R) также им обладает.
2. Отношение альфа-эквивалентности является отношением эквивалентности.
3. Если $P_1 \Rightarrow_\beta P_2$ и $Q_1 \Rightarrow_\beta Q_2$, то $P_1[x := Q_1] \Rightarrow_\beta P_2[x := Q_2]$.
4. (\Rightarrow_β) обладает ромбовидным свойством.
5. $(\Rightarrow_\beta) \subseteq (\rightarrow_\beta)^*$
6. $(\rightarrow_\beta) \subseteq (\Rightarrow_\beta)$

Домашнее задание №3: «просто типизированное лямбда-исчисление»

1. Докажите лемму о промежуточных типах (Generation lemma, 3.1.6 из Morten Heine B. Sørensen, Pawel Urzyczyn: Lectures on the Curry-Howard Isomorphism). А именно, покажите, что:
 - (a) $\Gamma \vdash x : \tau$ влечёт $x : \tau \in \Gamma$.
 - (b) $\Gamma \vdash MN : \sigma$ влечёт существование типа τ , такого, что $\Gamma \vdash M : \tau \rightarrow \sigma$ и $\Gamma \vdash N : \tau$.
 - (c) $\Gamma \vdash \lambda x.M : \sigma$ влечёт существование типов τ и ρ , таких, что $\Gamma, x : \tau \vdash M : \rho$ и $\sigma = \tau \rightarrow \rho$
2. Докажите лемму о подстановке (Substitution lemma, 3.1.8):
 - (a) Обозначим за $\sigma[\alpha := \tau]$ (за $\Gamma[\alpha := \tau]$) замену всех элементарных типов α на тип τ в типе σ (во всех типах в Γ). Тогда, если $\Gamma \vdash M : \sigma$, то $\Gamma[\alpha := \tau] \vdash M : \sigma[\alpha := \tau]$.
 - (b) Если $\Gamma, x : \tau \vdash M : \sigma$ и $\Gamma \vdash N : \tau$, то $\Gamma \vdash M[x := N] : \sigma$.
3. Докажите лемму о редукции терма (Subject reduction proposition, 3.1.9): если $\Gamma \vdash M : \sigma$ и $M \rightarrow_\beta N$, то $\Gamma \vdash N : \sigma$.
4. Пользуясь предыдущими пунктами, покажите, что Y нетипизируем в просто типизированном лямбда-исчислении.

5. Найдите терм M и два различных типа σ и τ , что $\vdash M : \sigma$ и $\vdash M : \tau$. А существует ли терм M , имеющий в точности один тип?
6. Покажите, что лемма о редукции терма не работает «в обратную сторону». А именно, что:
 - (a) Найдутся M , N и τ , что $\vdash N : \tau$, $M \rightarrow_{\beta} N$, но M не имеет типа.
 - (b) Найдутся M , N , σ и τ , что $\vdash M : \sigma$, $\vdash N : \tau$ и $M \rightarrow_{\beta} N$, но $\nvdash M : \tau$.

Домашнее задание №4: «просто типизированное лямбда-исчисление; алгебраические типы»

1. Списки и алгебраические типы. В данном задании потребуется строить и преобразовывать довольно сложные лямбда-выражения. Для проверки рекомендуем пользоваться интерпретатором, например, можно взять LCI: <https://chatziko.github.io/lci/>. Возможно, для демонстрации домашнего задания вам потребуется использовать свой ноутбук и проектор.
 - (a) Определите алгебраический тип для списка целых чисел в вашем любимом языке программирования. На Окамле это будет `type int_list = Nil | Cons of (int * int_list)`. Вы можете использовать и не функциональный язык (C++, Kotlin и т.п.), но вы должны применять именно алгебраический тип или его аналог (то есть, `union` в C++, `sealed class` в Kotlin и т.п.).
 - (b) Напишите функции вычисления длины списка, подсчёта суммы списка, произведения списка.
 - (c) Определите функцию высшего порядка `map` (применяющую переданную параметром функцию к каждому элементу списка), и примените её для построения списка нулей (превратить список чисел в список нулей той же длины), удвоенных значений (превратить список $[1, 3, 5]$ в $[2, 6, 10]$), списка остатков от деления на 2 ($[2, 3, 5]$ в $[0, 1, 1]$).
 - (d) Перепишите весь код из предыдущих пунктов в чистых лямбда-выражениях, используя рассмотренные на лекции представления в лямбда-исчислении для упорядоченных пар и алгебраических типов.
2. Ещё немного алгебраических типов. Аналогично предыдущему пункту, определите на языке высокого уровня алгебраический тип для корней квадратного уравнения. Варианты значений: «нет решений» без параметров, «одно решение» с одним параметром, «два решения» с двумя параметрами. Определите функции вычисления корней по коэффициентам квадратного уравнения и печати корней.
3. Деревья с помощью алгебраических типов. Определите на языке высокого уровня тип для дерева двоичного поиска, варианты для узла: «лист» без параметров и «ветвь» с двумя сыновьями и целочисленным значением. Определите:
 - (a) функцию печати дерева;
 - (b) функцию поиска значения в дереве;
 - (c) функцию добавления значения в дерево двоичного поиска;
 - (d) функцию удаления значения из дерева.
4. Доопределите бета-редукцию для просто типизированного лямбда-исчисления по Чёрчу.
5. Докажите теорему Чёрча-Россера для просто типизированного лямбда-исчисления по Чёрчу.
6. Докажите лемму о поднятии с лекции, а именно, что для всех $M, N \in \Lambda_{\mathbf{q}}$:
 - (a) если $M \rightarrow_{\beta} N$, то для любого $M' \in \Lambda_{\mathbf{q}}$, такого, что $|M'| = M$, найдётся такой $N' \in \Lambda_{\mathbf{q}}$, что $|N'| = N$ и $M' \rightarrow_{\beta} N'$;
 - (b) если $\Gamma \vdash M : \sigma$, то найдётся такой $M' \in \Lambda_{\mathbf{q}}$, что $\Gamma \vdash_{\mathbf{q}} M' : \sigma$.