

Nedtrapping av syrepumpehemmere (PPI)

Syrepumpehemmere (PPI) som lansoprazol, pantoprazol, omeprazol m.fl. brukes ofte for å behandle syreplager som halsbrann og magesår. Selv om disse medisinene er effektive, kan langvarig bruk medføre uønskede bivirkninger. Det anbefales derfor å trappe ned bruken når det er medisinsk forsvarlig.

Hvorfor unngå langvarig bruk av PPI?

Langvarig bruk av PPI kan gi økt risiko for:

- **Malabsorpsjon** av viktige næringsstoffer som magnesium, jern og kalsium
- **Lav vitamin B12-status**, noe som kan føre til nevrologiske symptomer og anemi
- **Økt risiko for infeksjoner**, inkludert tarminfeksjoner og lungebetennelse
- **Økt risiko for beinbrudd**, spesielt hos eldre

Ikke-medikamentelle behandlingsråd

For mange pasienter kan livsstilsendringer bidra til å redusere behovet for PPI:

- **Kosthold:** Unngå store, fettrike måltider, kaffe, alkohol og sterkt krydret mat.
- **Spisevaner:** Spis mindre porsjoner og unngå å spise rett før sengetid.
- **Hodeleie:** Hev hodeenden av sengen for å redusere refluks. Man kan gjøre dette ved å legge noe under sengebenene.
- **Vektnedgang:** Reduserer trykket på magesekken og minsker refluksplager.
- **Unngå røyking**, da dette svekker lukkemuskelen mellom spiserøret og magesekken.

Råd for nedtrapping

Når man slutter med syrepumpehemmende medisin, vil man kunne få midlertidig økt produksjon av magesyre. Trapp ned over f.eks. 4 uker. Derfor anbefales følgende plan:

- **Reduser dosen:** Gå over til en lavere dose eller ta medisinen annenhver dag
- **Suppler med reseptfrie alternativer**

Uke	Dose

Bruk av reseptfrie medisiner ved nedtrapping og etterpåk

Under og etter nedtrapping kan reseptfrie alternativer brukes ved behov:

- **Antacida** (Novaluzid) kan gi rask, kortvarig lindring. Det nøytraliserer syren som allerede finnes.
- **H2-blokkere** (Pepcid) kan brukes i perioder med økt syreplager inntil 7-14 dager. Kjøpes reseptfritt på apotek.

Dersom symptomer vedvarer eller forverres etter nedtrapping, bør lege kontaktes for vurdering av videre behandling.