

Informasjon om Sarotex (Amitriptylin)

Sarotex (virkestoff: amitriptylin) er et legemiddel som opprinnelig ble utviklet som et antidepressiv, men som i lavere doser brukes for sin smertemodulerende effekt. Det kan være effektivt ved behandling av kroniske smerter, spesielt nevropatiske smerter, fibromyalgi og ulike typer hodepine.

Hvordan virker Sarotex?

Sarotex påvirker signalstoffer i hjernen, blant annet serotonin og noradrenalin, som er involvert i smerteoppfattelse. Dette bidrar til å redusere smertefølsomhet og forbedre søvnkvaliteten, noe som kan være gunstig for pasienter med kroniske smerter.

Vanlige bivirkninger og råd for å håndtere dem:

- **Tretthet og søvnighet** – Derfor tas tabletten om kvelden, ca. 12 timer før du skal stå opp. Kroppen tilpasser seg ofte etter noen uker.
- **Muntørhet** – Sukkerfri tyggegummi, hyppig drikking av vann eller bruk av fuktgivende munnspray kan hjelpe. Klebetablett mot munntørhet kan kjøpes på apoteket.
- **Forstoppelse** – Fiberrik kost, rikelig væskeinntak og fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge dette.

Opptrappingsplan:

- Start med **10 mg** daglig, tas ca. **12 timer før du skal stå opp**.
- Dosen kan økes gradvis etter 1-2 uker ved behov, vanligvis med **10 mg per uke**, inntil ønsket effekt oppnås. Man kan stoppe på f.eks. 30 om man opplever god effekt på denne dosen.
- Vedlikeholdsdosen ligger ofte mellom **10-50 mg per dag**, men noen kan trenge høyere doser.

Annet å merke seg:

- Effekten kommer gradvis over **2-8 uker**, så det er viktig å være tålmodig.
- Brå seponering bør unngås. Ved behov for seponering skal dosen trappes ned gradvis for å unngå bivirkninger som søvnproblemer og ubehag.

Eksempel på opptrapping

Uke	Dose
1	10 mg
2 eller 3	20 mg
3 eller 5	30 mg
4 eller 7	40 mg
5 eller 9	50 mg