

Vorter

Vorter er ufarlige, men smittsomme hudutvekster forårsaket av humant papillomavirus (HPV). De oppstår ofte på hender, føtter og andre trykkbelastede områder.

Hvordan behandle vorter?

Vortemidler kan hjelpe kroppen med å bekjempe vorten og fjerne den gradvis. Behandlingen kan ta flere uker, så tålmodighet er viktig.

Fremgangsmåte

1. **Bløtgjøring av huden:**
 - o Før påføring av vortemiddelet, bløtgjør området i lunkent vann i ca. **5–10 minutter**.
 - o Dette gjør at middelet absorberes bedre og virker mer effektivt.
2. **Påføring av vortemiddel (f.eks. NAF vortemiddel eller andre salisylsyre):**
 - o Oppløsningen pensles direkte på vortene **hver kveld i 4–6 uker**.
3. **Fjerning av løs hud:**
 - o Ca. **to ganger per uke**, fjern løs hud og tidligere påført vortemiddel.
 - o Dette gjøres best etter et varmt bad og ved forsiktig **filing med en fotfil, pimpstein eller engangs neglfil**.
4. **Beskyttelse med plaster:**
 - o Etter påføring av vortemiddelet, dekk vorten med et **fuktighetsbevarende plaster**.
 - o Eksempler på passende plaster: **hydrokolloid-plaster som Compeed, Duoderm eller Tegaderm**.
 - o Dette hjelper til med å forsegle behandlingen, holde området fuktig og forhindre smitte.
5. **Kombinasjonsbehandling med kryoterapi:**
 - o For **best effekt**, kan vortemiddel kombineres med **kryoterapi (nedfrysing av vorten)**.
 - o Kryoterapi kan utføres hos lege og kan bidra til raskere fjerning av vorten.
 - o Behandlingen innebærer vanligvis flere økter med 2–4 ukers mellomrom.

Andre viktige råd

☒ **Unngå å plukke på vorten**, da dette kan spre viruset. ☒ **Vask hendene godt etter behandling** for å redusere smittefare. ☒ **Bruk egne håndklær og neglefiler** for å unngå å spre vorten til andre områder. ☒ **Dekk til fotvorter i fellesområder** (f.eks. svømmehall, treningssenter) for å unngå smitte til andre.

Når bør du kontakte lege?

☒ Hvis vorten ikke blir mindre etter **3 måneder med behandling**. ☒ Hvis du får **smerte, infeksjon eller kraftig irritasjon** i området. ☒ Hvis vorten **endrer form, farge eller begynner å blø**.

Med tålmodighet og riktig behandling kan de fleste vorter forsvinne innen noen uker til måneder.