

Instruksjon: Sett ett kryss per punkt (0–6). Oddetall (1, 3, 5) brukes ved tvil mellom nivåene. Punkt 1 fylles ut etter intervjuet. Vektlegg tilstanden de siste tre dagene.

1	Synlig tristhet <i>Dysterhet, tungsinn, fortvilelse slik det avspeiler seg i tale, mimikk og holdning. Grader på grunnlag av dybde og manglende evne til å lysne opp.</i>	Skår: (0–6)
	0 Ingen tristhet.	
	2 Ser trist og humørløs ut, men kan leilighetsvis lysne opp.	
	4 Virker trist og ulykkelig hele tiden.	
	6 Ekstrem og vedvarende tristhet og fortvilelse.	
2	Tristhet <i>Subjektivt opplevet sinnsstemning. Senket stemningsleie, tristhet, oppgitthet, håpløshet, hjelpeløshet. Oppstemthet skåres 0.</i>	Skår: (0–6)
	0 Stort sett indifferent stemningsleie. Leilighetsvis tristhet.	
	2 Overveiende følelse av nedstemthet, men lysere øyeblikk forekommer.	
	4 Gjennomtrengende følelse av tristhet og dysterhet. Knappt påvirket av ytre omstendigheter.	
	6 Konstant opplevelse av sterk tristhet og fortvilelse.	
3	Indre spenning <i>Vag ulystfølelse, ubehagelig indre spenning, uro, angst, stigende til panikk. Skilles fra tristhet (2).</i>	Skår: (0–6)
	0 Rolig, bare antydning til indre spenning.	
	2 Leilighetsvis følelse av ubehagelig psykisk spenning og vag uro.	
	4 Vedvarende følelse av indre spenning eller panikkepisoder som bare kan mestres med vanskelighet.	
	6 Vedvarende frykt og angst. Overveldende panikkfølelse.	
4	Redusert nattesøvn <i>Subjektiv opplevelse av kortvarig eller mindre dyp søvn sammenlignet med vanlig tilstand.</i>	Skår: (0–6)
	0 Sover som vanlig.	
	2 Moderate innsovningstvanger eller moderat, redusert, lett eller urolig søvn.	
	4 Søvnens redusert eller avbrutt med minst to timer sammenlignet med vanlig.	
	6 Mindre enn to til tre timers søvn om natten.	
5	Svekket appetitt <i>Følelsen av at appetitten er svekket i forhold til tidligere.</i>	Skår: (0–6)
	0 Normal eller øket appetitt.	
	2 Moderat redusert appetitt.	
	4 Nesten ingen appetitt, maten smaker ikke, må tvinge seg selv til å spise.	
	6 Næringsvegrende. Må overtales av andre til å spise.	
6	Konsentrasjonsvansker <i>Vansker med å samle tankene, stigende til invaliderende mangel på konsentrasjonsevne.</i>	Skår: (0–6)
	0 Ingen konsentrasjonsvansker.	
	2 Leilighetsvis vansker med å samle tankene.	
	4 Vansker med konsentrasjon som forstyrrer lesing eller konversasjon.	
	6 Invaliderende mangel på konsentrasjonsevne.	
7	Initiativløshet <i>Vanskelighet med å komme i gang, treghet med å ta initiativ og utføre dagligdagse aktiviteter.</i>	Skår: (0–6)
	0 Ingen spesielle vansker med å komme i gang, ingen treghet.	
	2 Visse vansker med å komme i gang med aktiviteter.	
	4 Vanskeligheter med enkle rutineaktiviteter som kan utføres bare med betydelig anstrengelse.	
	6 Helt manglende evne til å ta initiativ. Uten evne til å igangsette aktiviteter uten hjelp.	
8	Svekkede følelsesmessige reaksjoner <i>Svekket interesse for omgivelsene eller aktiviteter som normalt gir glede. Skilles fra initiativløshet (7).</i>	Skår: (0–6)
	0 Normal interesse for omgivelsene og andre mennesker.	
	2 Redusert evne til å glede seg over ting som vanligvis gleder. Redusert evne til å føle sinne.	
	4 Tap av interesse for omverdenen. Tap av følelser for venner og bekjente.	
	6 Følelsesmessig lammet. Smertefull opplevelse av ikke å kunne føle noe for nære slektninger eller venner.	
9	Depressivt tankeinnhold <i>Tanker om skyld, mindreverdighet, selvbekreidelser, anger og tanker om økonomisk ruin.</i>	Skår: (0–6)
	0 Ingen depressive tanker.	
	2 Fluktuerende tanker om ikke å strekke til, selvbekreidelser og mindreverdighetsfølelse.	
	4 Vedvarende selvbekreidelser eller rasjonelle tanker om skyld og synd. Uttalt pessimisme.	
	6 Vrangforestillinger om ruin eller utilgivelige synder. Absurde selvanklager.	
10	Suicidaltanker <i>Følelsen av at livet ikke er verd å leve, at naturlig død ville være velkommen, suicidale tanker og forberedelser.</i>	Skår: (0–6)
	0 Ordinær livsløst, tar det som det kommer.	
	2 Lei av livet, men bare flyktige suicidaltanker.	
	4 Ville helst være død. Suicidaltanker opptrer hyppig, ansees som mulig løsning uten konkrete planer.	
	6 Uttalte planer om suicid når anledningen byr seg. Aktive forberedelser for suicid.	
TOTALSKÅR (maks. 60):		

MADRS – veiledning

Om skalaen MADRS er et 10-punkts klinisk intervju for fagpersonell. Opplysninger fra pårørende og pleiepersonell kan brukes ved skåringen. Skalaen måler dybden av en depressiv tilstand og er et hjelpemiddel for å følge opp behandling – ikke et diagnostisk verktøy. Kan brukes ved lette demenstilstander; ved moderat til alvorlig demens kan resultatet bli upålitelig.

Gjennomføring Semistrukturert intervju, 10–15 minutter. Still spørsmålene i den rekkefølgen de forekommer. Sett kun ett kryss per symptom. Vektlegg tilstanden de siste tre dagene. Ved døgnvariasjon, vektlegg det tidspunktet pasienten er mest depriment. Punkt 1 (synlig tristhet) fylles ut etter intervjuet basert på observasjon. Vektlegg pasientens svar uten å tolke dem.

Skåring Hvert punkt skåres 0–6. Velg 1, 3 eller 5 ved tvil mellom to nivåer. Skåre 5–6 på punkt 8 eller 9 peker mot melankoli – ta kontakt med psykisk helsevern og vær oppmerksom på mulig suicidalfare.

Alvorlighetsgrad

0–6 Ikke depriment	7–19 Lett depriment	20–34 Moderat depriment	35–60 Alvorlig – vurder innleggelse
Ingen behandling nødvendig. Psykoedukasjon og støttesamtale ved behov.	Samtaleterapi. Vurder antidepressiva ved skåre >15 eller hos eldre.	Samtaleterapi. Vurder medikament. Vurder DPS.	Antidepressiva. Henviss DPS / øyeblikkelig hjelp. Vurder innleggelse. Tett suicidalt vurdering.

Forslag til spørsmål *(ikke obligatoriske – utarbeidet av prof. Odd Lingjærde)*

Tristhet

- Hvordan er det med humøret ditt?
- Kan du forsøke å beskrive hvor depriment, trist og fortvilet du føler deg nå?
- Har du lysere øyeblikk innimellom, f.eks. hvis det skjer noe oppmuntrende?

Indre spenning

- Føler du deg for tiden engstelig, anspent eller urolig innvendig?

Redusert søvn

- Hvordan har det vært med søvnen de siste nettene? Har du sovet mindre enn du pleier, eller tvert imot mer?

Svekket appetitt

- Hvordan har det vært med matlysten de siste dagene?

Konsentrasjonsvansker

- Har du de siste dagene hatt vanskelig for å samle tankene og konsentrere deg?

Initiativløshet

- Synes du det er vanskelig å komme i gang med ting – f.eks. dagligdagse gjøremål som å stelle seg, kle seg, lage mat?

Svekkede følelser og interesser

- Synes du at du har mindre evne til å føle noe for ting rundt deg – mindre interesse for eller glede av TV, musikk, lesing, turer?
- Synes du at du har mistet noe av evnen til å føle noe for andre mennesker – venner og pårørende?

Depressivt tankeinnhold

- Er du for tiden plaget av triste tanker – om at du ikke strekker til, at du har gjort ting du angrer på, eller at du er et dårlig menneske?
- Ser du optimistisk på fremtiden?

Suicidaltanker

- Hvordan er det med livslysten din for tiden – synes du fortsatt at livet er verd å leve?
- Hvis nei: Har du tanker om at du like gjerne ville ha vært død?
- Hvis ja: Har du tanker om at det ville være en mulig løsning å ta ditt eget liv?