

Måling av blodtrykk hjemme

Apparatene som selges på norske apotek er CE-merket og godkjent som medisinsk utstyr. Det er anbefalt med et apparat som måler på overarmen og *ikke* rundt håndleddet.

Forberedelser

- ✓ Koble på utstyret i hjertehøyde og hvile i 5 minutter før måling.
- ✓ Sitt rolig og avslappet i en stol med føttene flatt på gulvet og ryggen støttet.
- ✓ Unngå kaffe, røyking, alkohol og fysisk aktivitet minst 30 minutter før måling.
- ✓ Første gang måler man hvilken arm som har høyest blodtrykk og forsetter med denne.

Hvordan måle

1. Plasser mansjetten på overarmen, ca. 2 cm over albueleddet. Du skal få plass til én finger mellom mansjetten og huden.
2. Start målingen mens du sitter stille og puster rolig. Du skal ikke snakke mens du måler.
3. Ta tre målinger: Det første etter 5 minutter, det andre 1 minutt senere og det tredje 1 minutt etter dette.
4. Noter alle verdiene. Ha resultatene tilgjengelig til neste legetime for vurdering.
5. Gjennomfør en *måleserie* (to tidspunkter på en dag, f.eks. morgen og kveld). Tre målinger ved hver måleseanse) i 2-3 dager. Mål gjerne på varierte tidspunkter.
6. Det anbefales å gjenta dette to ganger i året, f.eks. hvert år 01.06 og 01.12.

Ditt blodtrykksmål: _____

Måleråd

Ved stabil behandling:

Anbefalt med "måleserie" to ganger i året, f.eks. hvert år 01.06 og 01.12. Møt opp på fast årskontroll med hjemmemålingene!

Etter justering av blodtryksmedisin:

Anbefalt med en "måleserie" ca. 6 uker etter medisinendringen, om ikke annet er avtalt med legen.

Ved forhøyet blodtrykk ved målinger hjemme:

Gi beskjed til legen. Enten via e-konsultasjon på Helsenorge (du kan sende bilde av blodtrykkskjemaet) eller bestill time.

Puls og blodtrykk

Navn: _____

Behandlingsmål

Dato	Overtrykk (SBT ↑)	Undertrykk (DBT ↓)	Puls

[illegible][illegible]