

Halsbrann

Sure oppstøt, ofte kalt halsbrann, er en tilstand der magesyre beveger seg opp i spiserøret og gir en ubehagelig (noen ganger brennende) følelse bak brystbenet. Dette skjer fordi lukkemuskelen mellom spiserøret og magesekken ikke fungerer optimalt. Sure oppstøt kan forverres etter store måltider, ved inntak av fet eller sterkt krydret mat, kaffe, alkohol eller ved å legge seg ned rett etter et måltid. Noen opplever også en sur smak i munnen og hyppige rapninger.

Ikke-medikamentell behandling

Mange kan redusere sure oppstøt ved å gjøre livsstilsendringer:

- **Unngå store og tunge måltider**, spesielt før leggetid. Spis heller små og hyppige porsjoner. Ikke spis f.eks. nærmere enn fire timer før leggetid.
- **Unngå mat og drikke som kan trigge symptomer**, som kaffe, sjokolade, fet mat, sitrusfrukter, alkohol og kullsyreholdige drikker.
- **Sov med hevet overkropp**, for eksempel med en ekstra pute eller ved å heve hodeenden av sengen.
- **Unngå stramme klær** som kan øke trykket på magen.
- **Unngå røyking og alkohol**, da dette kan svekke lukkemuskelen mellom spiserøret og magesekken.
- **Gå ned i vekt** hvis du har overvekt, da dette kan redusere presset på magesekken.

Medikamentell behandling

Dersom livsstilsendringer ikke er tilstrekkelig, finnes det flere medisiner som kan hjelpe.

- **Antacida (f.eks. Novaluzid)**: Nøytraliserer magesyren som allerede finnes og gir rask, men kortvarig lindring. Kan kjøpes reseptfritt og brukes ved symptomer.
- **H2-blokkere (f.eks. Famotidin)**: Reduserer syreproduksjonen i magesekken og kan gi lengre lindring enn antacida.
- **Protonpumpehemmere (f.eks. Pantoprazol)**: Reduserer syreproduksjonen kraftig og brukes ofte ved hyppige eller alvorlige symptomer.

Behandlingsforsøk

Symptomene forsøkes behandlet med ikke-medikamentell behandling, gjerne samtidig med medisiner, i 2-4 uker. Dersom symptomene forsvinner har man en god forklaring på hva de skyldes. Svært ofte kan man brukes episodisk behandling med kurer på 7-14 dager dersom symptomene gjenoppstår. Om symptomene ikke blir bedre av behandlingsforsøk kan det bli aktuelt med henvisning til gastroskopi (videundersøkelse av spiserøret).

Eksempler på behandlingsforsøk

Behandlingsforsøk #1: Pepciduo en tablett, inntil to ganger i døgnet i to uker.

Behandlingsforsøk #2: Somac 40 mg en gang om dagen i to-fire uker.