

MEDISINPAUSE VED SYKDOM		MEDISINPAUSE VED SYKDOM	
VED AKUTT SYKDOM: Oppkast/diaré (2+ episoder) · Feber, svetting		VED AKUTT SYKDOM: Oppkast/diaré (2+ episoder) · Feber, svetting	
SKAL FØLGENDE MEDISINER PAUSES:		SKAL FØLGENDE MEDISINER PAUSES:	
Legevakt 116 117		Legevakt 116 117	
ACEI/ARB -pril / -sartan	Ramipril · Enalapril · Losartan · Kandesartan · Valsartan	ACEI/ARB -pril / -sartan	Ramipril · Enalapril · Losartan · Kandesartan · Valsartan
Diuretika vanndrivende	Furosemid · Hydroklortiazid · Spironolakton	Diuretika vanndrivende	Furosemid · Hydroklortiazid · Spironolakton
Metformin diabetes	Metformin · Glucophage · Janumet	Metformin diabetes	Metformin · Glucophage · Janumet
SGLT-2 -flozin	Empagliflozin (Jardiance) · Dapagliflozin (Forxiga)	SGLT-2 -flozin	Empagliflozin (Jardiance) · Dapagliflozin (Forxiga)
NSAIDs betennelsesdemp.	Ibuprofen · Naproksen · Voltaren · Vimovo	NSAIDs betennelsesdemp.	Ibuprofen · Naproksen · Voltaren · Vimovo
Andre legemidler		Andre legemidler	
TA MEDISINEN IGJEN NÅR: Spist og drukket normalt i 24–48 timer. Ikke ta ekstra doser.		TA MEDISINEN IGJEN NÅR: Spist og drukket normalt i 24–48 timer. Ikke ta ekstra doser.	
MEDISINPAUSE VED SYKDOM		MEDISINPAUSE VED SYKDOM	
VED AKUTT SYKDOM: Oppkast/diaré (2+ episoder) · Feber, svetting		VED AKUTT SYKDOM: Oppkast/diaré (2+ episoder) · Feber, svetting	
SKAL FØLGENDE MEDISINER PAUSES:		SKAL FØLGENDE MEDISINER PAUSES:	
Legevakt 116 117		Legevakt 116 117	
ACEI/ARB -pril / -sartan	Ramipril · Enalapril · Losartan · Kandesartan · Valsartan	ACEI/ARB -pril / -sartan	Ramipril · Enalapril · Losartan · Kandesartan · Valsartan
Diuretika vanndrivende	Furosemid · Hydroklortiazid · Spironolakton	Diuretika vanndrivende	Furosemid · Hydroklortiazid · Spironolakton
Metformin diabetes	Metformin · Glucophage · Janumet	Metformin diabetes	Metformin · Glucophage · Janumet
SGLT-2 -flozin	Empagliflozin (Jardiance) · Dapagliflozin (Forxiga)	SGLT-2 -flozin	Empagliflozin (Jardiance) · Dapagliflozin (Forxiga)
NSAIDs betennelsesdemp.	Ibuprofen · Naproksen · Voltaren · Vimovo	NSAIDs betennelsesdemp.	Ibuprofen · Naproksen · Voltaren · Vimovo
Andre legemidler		Andre legemidler	
TA MEDISINEN IGJEN NÅR: Spist og drukket normalt i 24–48 timer. Ikke ta ekstra doser.		TA MEDISINEN IGJEN NÅR: Spist og drukket normalt i 24–48 timer. Ikke ta ekstra doser.	
MEDISINPAUSE VED SYKDOM		MEDISINPAUSE VED SYKDOM	
VED AKUTT SYKDOM: Oppkast/diaré (2+ episoder) · Feber, svetting		VED AKUTT SYKDOM: Oppkast/diaré (2+ episoder) · Feber, svetting	
SKAL FØLGENDE MEDISINER PAUSES:		SKAL FØLGENDE MEDISINER PAUSES:	
Legevakt 116 117		Legevakt 116 117	
ACEI/ARB -pril / -sartan	Ramipril · Enalapril · Losartan · Kandesartan · Valsartan	ACEI/ARB -pril / -sartan	Ramipril · Enalapril · Losartan · Kandesartan · Valsartan
Diuretika vanndrivende	Furosemid · Hydroklortiazid · Spironolakton	Diuretika vanndrivende	Furosemid · Hydroklortiazid · Spironolakton
Metformin diabetes	Metformin · Glucophage · Janumet	Metformin diabetes	Metformin · Glucophage · Janumet
SGLT-2 -flozin	Empagliflozin (Jardiance) · Dapagliflozin (Forxiga)	SGLT-2 -flozin	Empagliflozin (Jardiance) · Dapagliflozin (Forxiga)
NSAIDs betennelsesdemp.	Ibuprofen · Naproksen · Voltaren · Vimovo	NSAIDs betennelsesdemp.	Ibuprofen · Naproksen · Voltaren · Vimovo
Andre legemidler		Andre legemidler	
TA MEDISINEN IGJEN NÅR: Spist og drukket normalt i 24–48 timer. Ikke ta ekstra doser.		TA MEDISINEN IGJEN NÅR: Spist og drukket normalt i 24–48 timer. Ikke ta ekstra doser.	