

Prova di Analisi Matematica II - 29 Aprile 2020

Ing. Informatica

Prof.ssa Virginia De Cicco

ESERCIZIO 1. Per ciascuna delle seguenti questioni, si indichi la (sola) risposta corretta.

1) La successione di funzioni $f_n(x) = e^{-nx^2}$ converge puntualmente alla funzione $f(x) = 0$

- (a) $\forall x \in \mathbb{R}$
- (b) per $x = 0$
- (c) $\forall x \geq 0$
- (d) $\forall x \neq 0$.

Risposta giusta è la (d), perchè $f_n(0) = 1 \rightarrow 1$.

2) L'integrale

$$\int_{\gamma} \bar{z} dz$$

dove $\gamma(t) = -it$, $t \in [0, 1]$ vale

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) $-\frac{i}{2}$
- (c) 1
- (d) $-2i$.

Risposta giusta è la (a), perchè

$$\int_{\gamma} \bar{z} dz = \int_0^1 f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_0^1 \overline{\gamma(t)} \gamma'(t) dt = \int_0^1 it(-i) dt = 1/2.$$

3) Una delle seguenti identità è vera. Quale?

- (a) $Arg(z^2) = 2Arg z$
- (b) $Arg(z^2) = Arg(2z)$
- (c) $Arg(z^2) = (Arg z)^2$

(d) $Arg(z^2) = Argz$.

Risposta giusta è la (a), perchè

$$z^n = |z|^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

e quindi

$$z^2 = |z|^2(\cos(2Argz) + i\sin(2Argz)).$$

ESERCIZIO 2.

- (i) Si dia la definizione di antitrasformata di Laplace.
(ii) Si determini l'antitrasformata di

$$F(s) = \frac{s(s-2)}{(s^2-4)(s+1)}.$$

Con i fratti semplici

$$F(s) = \frac{s(s-2)}{(s^2-4)(s+1)} = \frac{s}{(s+2)(s+1)} = \frac{2}{s+2} - \frac{1}{s+1}.$$

e quindi si ha

$$f(t) = 2e^{-2t} - e^{-t}.$$

Oppure con i residui

$$f(t) = \operatorname{res}\left(\frac{e^{st}s}{(s+2)(s+1)}, -2\right) + \operatorname{res}\left(\frac{e^{st}s}{(s+2)(s+1)}, -1\right) = 2e^{-2t} - e^{-t}.$$

ESERCIZIO 3.

- (i) Sia dia la definizione di serie di potenze centrata in x_0 .
(ii) Sia sviluppi in serie di potenze centrata in $x_0 = 0$ la seguente funzione:

$$f(x) = \frac{x}{3x - 2}.$$

Usando la serie geometrica, si ha

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x}{3x - 2} = -x \frac{1}{2 - 3x} = -x \frac{1}{3(\frac{2}{3} - x)} = -\frac{x}{3} \frac{1}{\frac{2}{3}(1 - \frac{3}{2}x)} \\ &= -\frac{x}{2} \frac{1}{1 - \frac{3}{2}x} = -\frac{x}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n x^n = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n}{2^{n+1}} x^{n+1}, \end{aligned}$$

se

$$\left| \frac{3}{2}x \right| < 1$$

che equivale a

$$|x| < \frac{2}{3}.$$