

Tizón tardío

Cultivo: papa · Agente causal: Phytophthora infestans

Identificación

lesiones de aspecto acuoso que se oscurecen rápidamente, con un moho blanco visible en el envés de la hoja bajo condiciones de alta humedad; es la enfermedad más agresiva y de más rápida expansión del cultivo, capaz de destruirlo en pocos días.

Manejo recomendado

es una emergencia fitosanitaria: aplica fungicida sistémico específico de inmediato ante los primeros síntomas y elimina plantas muy afectadas; en cultivo comercial se usan valores de severidad de enfermedad (DSV) para decidir el calendario de aspersión.

Prevención

usa semilla certificada libre del patógeno, evita el riego por aspersión (favorece humedad foliar) y monitorea condiciones climáticas húmedas y frescas, que son las que más favorecen al patógeno.

Fuente: UW-Madison Vegetable Pathology, actualizaciones de manejo de tizón tardío, <https://vegpath.plantpath.wisc.edu/tag/late-blight-fungicides> ; Cornell University (M. T. McGrath), 'Late Blight Occurrence and Management in Potatoes and Tomatoes in the Northeastern United States', <https://portage.extension.wisc.edu/files/2010/05/LateBlightOccurrenceandMGT2009McGrath.pdf>