

Quemazón de la hoja (leaf scorch)

Cultivo: fresa (frutilla) · Agente causal: Diplocarpon earliarum

Identificación

manchas rojo-púrpura de 1-5 mm en el haz de la hoja que, a diferencia de otras manchas foliares de la fresa, no cambian de color en el centro; en infecciones severas grandes áreas de la hoja se vuelven rojas o amarillas y luego marrones, con los bordes curvándose hacia arriba (aspecto 'quemado').

Manejo recomendado

si persisten condiciones húmedas, aplica fungicida a intervalos de 2 semanas, siempre combinado con las prácticas culturales de prevención (el fungicida solo no es tan efectivo).

Prevención

retira el follaje viejo tras la cosecha, mejora la ventilación entre plantas y prioriza variedades con tolerancia conocida a esta enfermedad.

Fuente: UC IPM (University of California), 'Leaf Scorch of Strawberries', <https://ipm.ucanr.edu/home-and-landscape/leaf-scorch-of-strawberries/> ; UMass Extension, 'Small Fruit IPM Fact Sheet SB-003', https://www.umass.edu/agriculture-food-environment/sites/ag.umass.edu/files/fact-sheets/pdf/strawberry_foliar_disease_fact_sheet_sb-003_0.pdf