

Tizón tardío de la papa — manejo en Colombia

Cultivo: papa · Agente causal: *Phytophthora infestans* · Documento: FT-2026-001 · Fecha: 2026

Identificación

en las zonas paperas de Cundinamarca, Boyacá y Nariño el tizón tardío avanza muy rápido en épocas de niebla y lluvia persistente (por eso se le llama históricamente 'la peste' o 'la rancho'); las lesiones acuosas se necrosan en 48-72 horas y el moho blanco esporulante es visible al amanecer en el envés.

Manejo recomendado

el ICA recomienda basar las aplicaciones en un sistema de alerta temprana (modelo de predicción tipo Fry/Ullrich adaptado a la zona andina) en vez de un calendario fijo: rotar fungicidas de distinto modo de acción (grupos FRAC) para evitar resistencia, priorizando productos con registro ICA vigente para el cultivo de papa; en brotes severos se recomienda destrucción del follaje antes de la cosecha para proteger los tubérculos.

Prevención

usar semilla certificada por el ICA (programa de semilla de papa), sembrar variedades con resistencia parcial (como Diacol Capiro o Pastusa Suprema en algunas regiones) y evitar el riego por aspersión en las horas de la tarde.

Ficha elaborada por el equipo para un ejercicio académico (SI4006, Universidad EAFIT), inspirada en información pública de la entidad citada. NO es una transcripción de un documento oficial vigente y no debe citarse como norma.

Referencia: Ficha técnica elaborada para este ejercicio académico, inspirada en lineamientos públicos de manejo fitosanitario del ICA y AGROSAVIA para el cultivo de papa en Colombia. No es un documento oficial vigente; no citar como norma.