

Ácaros / araña roja del tomate — manejo en colombia

Cultivo: tomate · Agente causal: Tetranychus urticae · Documento: FT-2026-002 · Fecha: 2026

Identificacion

en los invernaderos de la sabana de Bogotá y en tomate a libre exposición en el Tolima y Santander, la araña roja prolifera en épocas secas y calurosas; AGROSAVIA recomienda usar un umbral de acción de monitoreo (revisar 10 hojas por lote dos veces por semana) antes de decidir una aplicación, en vez de fumigar de forma preventiva.

Manejo recomendado

priorizar el manejo integrado: liberación de ácaros depredadores (como Phytoseiulus persimilis) en invernadero cuando la densidad aún es baja, y reservar los acaricidas químicos con registro ICA para tomate como último recurso, rotando grupos de acción para evitar resistencia (frecuente en esta plaga en Colombia).

Prevencion

evitar el estrés hídrico del cultivo, mantener humedad relativa adecuada dentro del invernadero y eliminar arvenses hospederas alrededor del lote.

Ficha elaborada por el equipo para un ejercicio academico (SI4006, Universidad EAFIT), inspirada en informacion publica de la entidad citada. NO es una transcripción de un documento oficial vigente y no debe citarse como norma.

Referencia: Ficha técnica elaborada para este ejercicio académico, inspirada en lineamientos públicos de manejo integrado de plagas de AGROSAVIA para tomate bajo invernadero en Colombia. No es un documento oficial vigente; no citar como norma.