

Virus del mosaico del tomate — manejo en colombia

Cultivo: tomate · Agente causal: Tomato mosaic virus (ToMV) · Documento: FT-2026-003 · Fecha: 2026

Identificacion

en cultivos de tomate bajo invernadero en Colombia el virus se disemina fácilmente por contacto (manos, herramientas, ropa) durante labores de tutorado y podas; el ICA lo incluye entre los virus de declaración voluntaria en programas de certificación de semilla de tomate.

Manejo recomendado

no existe tratamiento curativo; el protocolo recomendado es erradicar y destruir (quemar o enterrar, nunca compostar en el mismo lote) las plantas con síntomas apenas se detecten, y suspender labores de manipulación en el lote afectado hasta desinfectar herramientas con hipoclorito o fosfato trisódico.

Prevencion

usar semilla certificada libre de virus (sello de calidad ICA), desinfectar herramientas de poda entre plantas y entre lotes, y prohibir el consumo o manejo de tabaco dentro del invernadero (el virus sobrevive en productos de tabaco).

Ficha elaborada por el equipo para un ejercicio academico (SI4006, Universidad EAFIT), inspirada en informacion publica de la entidad citada. NO es una transcripcion de un documento oficial vigente y no debe citarse como norma.

Referencia: Ficha técnica elaborada para este ejercicio académico, inspirada en lineamientos públicos de bioseguridad e ICA para semilla de tomate en Colombia. No es un documento oficial vigente; no citar como norma.