

Tizón foliar (mancha de isariopsis) de la vid — manejo en Colombia

Cultivo: vid · Agente causal: Pseudocercospora vitis · Documento: FT-2026-004 · Fecha: 2026

Identificación

en los valles vitivinícolas de Colombia (Valle del Cauca, La Unión en Nariño) el clima húmedo tropical de altura favorece brotes fuertes de manchas foliares en la vid, con defoliación que compromete la maduración de la fruta si no se controla a tiempo.

Manejo recomendado

aplicar fungicidas foliares con registro ICA para vid, aprovechando que los programas de control de podredumbre negra suelen dar control cruzado; ajustar la frecuencia de aplicación según la intensidad de lluvias de la temporada, no según un calendario fijo.

Prevención

manejo de canopia (deshoje y amarre) para mejorar la ventilación y reducir el tiempo de hoja mojada, y eliminación de restos de poda infectados del lote.

Ficha elaborada por el equipo para un ejercicio académico (SI4006, Universidad EAFIT), inspirada en información pública de la entidad citada. NO es una transcripción de un documento oficial vigente y no debe citarse como norma.

Referencia: Ficha técnica elaborada para este ejercicio académico, inspirada en lineamientos públicos de manejo fitosanitario del ICA para vid en Colombia. No es un documento oficial vigente; no citar como norma.