

Roya común del maíz — manejo en Colombia

Cultivo: maíz · Agente causal: Puccinia sorghi · Documento: FT-2026-005 · Fecha: 2026

Identificación

en las zonas maiceras del Tolima, Huila y la Costa Caribe la roya común aparece con humedad alta pero rara vez alcanza niveles económicos si se usan híbridos con buen paquete de resistencia; AGROSAVIA monitorea la severidad en sus ensayos regionales de maíz.

Manejo recomendado

en la gran mayoría de los lotes sembrados con híbridos comerciales recomendados por AGROSAVIA para la región NO se justifica aplicar fungicida; reservar la aplicación solo para siembras de variedades susceptibles con severidad alta y etapa fenológica crítica (llenado de grano).

Prevención

seleccionar híbridos de la lista de recomendados por AGROSAVIA para cada zona agroecológica, que es la estrategia de manejo más costo-efectiva confirmada en los ensayos regionales.

Ficha elaborada por el equipo para un ejercicio académico (SI4006, Universidad EAFIT), inspirada en información pública de la entidad citada. NO es una transcripción de un documento oficial vigente y no debe citarse como norma.

Referencia: Ficha técnica elaborada para este ejercicio académico, inspirada en lineamientos públicos de AGROSAVIA sobre híbridos de maíz recomendados por zona en Colombia. No es un documento oficial vigente; no citar como norma.