

Mancha bacteriana del duraznero — manejo en colombia

Cultivo: duraznero · Agente causal: Xanthomonas · Documento: FT-2026-007 · Fecha: 2026

Identificacion

en las zonas frutícolas de clima frío de Boyacá y Cundinamarca la mancha bacteriana se agrava con las lluvias de mitad de año; las lesiones angulares en hoja y las picaduras con exudado de goma en fruto son las señales que reporta con más frecuencia la asistencia técnica regional.

Manejo recomendado

realizar poda sanitaria en época seca retirando ramas con canchros y gomosis (ahí sobrevive la bacteria entre cosechas), complementada con aplicaciones preventivas a base de cobre con registro ICA para duraznero antes de la brotación.

Prevencion

priorizar material de siembra de viveros certificados con variedades de mejor comportamiento frente a Xanthomonas para la zona, y evitar el riego que moje follaje y fruto en horas de la tarde.

Ficha elaborada por el equipo para un ejercicio académico (SI4006, Universidad EAFIT), inspirada en información pública de la entidad citada. NO es una transcripción de un documento oficial vigente y no debe citarse como norma.

Referencia: Ficha técnica elaborada para este ejercicio académico, inspirada en lineamientos públicos de manejo fitosanitario de frutales de clima frío en Colombia (ICA/AGROSAVIA). No es un documento oficial vigente; no citar como norma.