

Tizón temprano de la papa — manejo en colombia

Cultivo: papa · Agente causal: Alternaria solani · Documento: FT-2026-008 · Fecha: 2026

Identificacion

en la zona andina el tizón temprano suele confundirse con el tizón tardío por agricultores nuevos; AGROSAVIA distingue el patrón de anillos concéntricos en hojas viejas de la base de la planta como la seña más confiable para diferenciarlo en campo.

Manejo recomendado

aplicar fungicidas protectantes de forma preventiva guiándose por un modelo de acumulación de unidades de calor (P-Days) ajustado a la altitud de la zona andina, en vez de esperar a ver síntomas avanzados en toda la planta.

Prevencion

usar semilla sana, rotar con cultivos no solanáceos por al menos una temporada y destruir los residuos de cosecha, donde el hongo sobrevive entre ciclos en climas fríos de altura.

Ficha elaborada por el equipo para un ejercicio academico (SI4006, Universidad EAFIT), inspirada en informacion publica de la entidad citada. NO es una transcripcion de un documento oficial vigente y no debe citarse como norma.

Referencia: Ficha técnica elaborada para este ejercicio académico, inspirada en lineamientos públicos de AGROSAVIA para el manejo de tizón temprano de la papa en la zona andina colombiana. No es un documento oficial vigente; no citar como norma.