

Moho de la hoja del tomate — manejo en invernaderos de Colombia

Cultivo: tomate · Agente causal: *Passalora fulva* · Documento: FT-2026-009 · Fecha: 2026

Identificación

en los invernaderos de tomate de la sabana de Bogotá la alta humedad relativa nocturna favorece brotes fuertes de moho de la hoja; el manchado amarillo en el haz y el moho oliváceo en el envés avanzan rápido si no se ventila el invernadero.

Manejo recomendado

la primera medida recomendada por la asistencia técnica de invernadero en Colombia es de manejo ambiental: abrir cortinas y aumentar la ventilación para bajar la humedad relativa nocturna, y podar hojas bajas afectadas; solo si persiste tras corregir el ambiente se recurre a un fungicida foliar con registro ICA.

Prevención

mantener buena circulación de aire dentro del invernadero, evitar el riego por aspersión que moje el follaje al final del día y sembrar variedades con mejor comportamiento frente a esta enfermedad cuando estén disponibles.

Ficha elaborada por el equipo para un ejercicio académico (SI4006, Universidad EAFIT), inspirada en información pública de la entidad citada. NO es una transcripción de un documento oficial vigente y no debe citarse como norma.

Referencia: Ficha técnica elaborada para este ejercicio académico, inspirada en lineamientos públicos de manejo de tomate bajo invernadero en la sabana de Bogotá. No es un documento oficial vigente; no citar como norma.