

Roya del cafeto — manejo en colombia

Cultivo: café · Agente causal: Hemileia vastatrix · Documento: FT-2026-011 · Fecha: 2026

Identificacion

las pústulas de polvo color naranja en el envés de la hoja, típicas de la roya, son especialmente severas en Colombia en años de alta humedad y en cafetales sembrados con variedades susceptibles (Typica, Borbón) en zonas de menor altitud; Cenicafé mantiene una red de alerta temprana por regiones cafeteras.

Manejo recomendado

en cafetales con variedades resistentes (Castillo, Cenicafé 1) el manejo se centra en nutrición balanceada y buen manejo de sombrero; en variedades susceptibles con incidencia alta, Cenicafé recomienda fungicidas cúpricos o sistémicos con registro ICA para café, aplicados según el nivel de incidencia observado en el monitoreo regional, no de forma calendario.

Prevencion

renovar los cafetales viejos o de variedades susceptibles con las variedades resistentes desarrolladas por Cenicafé (programa de renovación de cafetales), que es la estrategia de manejo más efectiva y sostenible a largo plazo en el país.

Ficha elaborada por el equipo para un ejercicio academico (SI4006, Universidad EAFIT), inspirada en informacion publica de la entidad citada. NO es una transcripcion de un documento oficial vigente y no debe citarse como norma.

Referencia: Ficha técnica elaborada para este ejercicio académico, inspirada en información pública de Cenicafé sobre roya del café y el programa de variedades resistentes en Colombia. No es un documento oficial vigente; no citar como norma.