

Moniliasis del cacao — manejo en colombia

Cultivo: cacao · Agente causal: Moniliophthora roreri · Documento: FT-2026-012 · Fecha: 2026

Identificacion

la moniliasis es considerada por Fedecacao la enfermedad más limitante del cacao en Colombia; se manifiesta como manchas aceitosas irregulares en la mazorca que evolucionan a una capa de polvo blanco-grisáceo, y puede destruir la mayor parte de la cosecha si no se controla oportunamente.

Manejo recomendado

la práctica más efectiva y de menor costo recomendada por Fedecacao es la remoción semanal de mazorcas enfermas (incluyendo las asintomáticas de aspecto sospechoso) durante todo el ciclo, enterrándolas o alejándolas del lote; el control químico con fungicidas registrados ante el ICA se reserva como apoyo en épocas de mayor humedad, nunca como única medida.

Prevencion

podas de formación y fitosanitarias que mejoren la ventilación del cultivo, control de sombrío y siembra de material genético con tolerancia recomendado por Fedecacao/AGROSAVIA para la región cacaotera.

Ficha elaborada por el equipo para un ejercicio academico (SI4006, Universidad EAFIT), inspirada en informacion publica de la entidad citada. NO es una transcripcion de un documento oficial vigente y no debe citarse como norma.

Referencia: Ficha técnica elaborada para este ejercicio académico, inspirada en información pública de Fedecacao sobre el manejo de moniliasis en Colombia. No es un documento oficial vigente; no citar como norma.